

ЧЕК – ЛИСТ
Амбулаторное гинекологическое обследование

№	Действие аккредитуемого	Критерии оценки
1	Проверил наличие нужных инструментов и расходного материала, промаркировал стекла для микроскопии; эппендорф; контейнер для жидкостной цитологии	☐ да ☐ нет
2	Обработал руки гигиеническим способом	☐ да ☐ нет
3	Вскрыл в присутствии женщины упаковки с инструментарием, необходимым при исследовании (зеркала, инструменты для взятия биоматериала, перчатки),	☐ да ☐ нет
4	Надел стерильные смотровые перчатки	☐ да ☐ нет
5	Произвел осмотр наружных половых органов, прокомментировал	☐ да ☐ нет
6	Ввел во влагалище зеркало Куско, зафиксировал замок	☐ да ☐ нет
7	Оценил визуальные характеристики слизистой стенок влагалища и шейки матки, прокомментировал: состояние слизистой влагалища и шейки матки форму шейки матки, наружного зева	☐ да ☐ нет
Получение биоматериала из эндо и экзоцервикса для цитологического исследования		
8	Взял пинцетом стерильный марлевый тампон. Деликатно, тампоном, удалил слизь с поверхности шейки матки	☐ да ☐ нет
9	Утилизировал одноразовый пинцет и тампон в контейнер с отходами класса Б	☐ да ☐ нет
10	Взял цервикальную цитощетку с эндоцервикальным ёршиком (зонд урогенитальный тип F3/ F4 Cervix Brush с эндоцервикальным штифтом), центральную часть щетки ввел в цервикальный канал, а боковые щетинки распределились на влагалищной поверхности шейки матки. Провернул щетку по часовой стрелке 3-5 раз до появления первых капель «кровавой росы»	☐ да ☐ нет
11	Съемную головку цервикальной цитощетки (зонд урогенитальный тип F3/ F4 Cervix Brush с эндоцервикальным штифтом) с полученным материалом поместил в вialу со стабилизирующим раствором, отделив съемную рукоятку, не трогая цитощетку с полученным эксфолиативным материалом руками и инструментами и закрыл контейнер (вialу) крышкой	☐ да ☐ нет
12	Утилизировал рукоятку цервикальной цитощетки тип F3/ F4 Cervix Brush в контейнер с отходами класса Б	☐ да ☐ нет
Получение биоматериала для ПЦР на ВПЧ высокоонкогенного типа		
13	Взял зондом универсальным урогенитальным тип А мазок-соскоб из зоны трансформации с переходной зоной и крипт цервикального канала, (вращательными движениями сначала обработал часть	☐ да ☐ нет

	эктоцервикса, затем ввел щеточку в нижнюю треть цервикального канала, где произвел 3-5 оборотов.) Свободной рукой взял пробирку эппендорф, открыл крышку и суспензировал биоматериал в транспортную среду, погрузив наконечник универсального зонда тип А в пробирку. Закрыв плотно крышку	
14	Утилизировал зонд универсальный урогенитальный тип А в контейнер с отходами класса Б	☐ да ☐ нет
Получение биоматериала для микроскопического исследования		
15	Взял свободнолежащее отделяемое из цервикального канала зондом урогенитальным тип В (ложка Фолькмана) меньшей стороной ложки Фолькмана (диаметр 2 мм) и нанес максимально тонким слоем на 2 маркированных стекла	☐ да ☐ нет
16	Взял свободнолежащее отделяемое из сводов влагалища широкой стороной ложки Фолькмана (4мм) и нанес максимально тонким слоем на 2 маркированных стекла	☐ да ☐ нет
17	Утилизировал ложку Фолькмана в контейнер с отходами класса Б	☐ да ☐ нет
18	Извлек влагалищное зеркало и утилизировал его в контейнер с отходами класса	☐ да ☐ нет
19	Оставил стекла сушиться на открытом воздухе на 10 мин. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
20	Снял перчатки и утилизировал их в контейнер с отходами класса Б	☐ да ☐ нет
Бимануальное влагалищное исследование		
21	Надел новую пару смотровых стерильных перчаток	☐ да ☐ нет
22	Последовательно ввел во влагалище 3 и 2 пальцы правой руки, слегка надавливая на заднюю спайку влагалища. Провел полное введение двух пальцев в задний свод влагалища, при этом рука супинирована на 90 градусов, ладонной поверхностью кверху	☐ да ☐ нет
23	Расположил левую руку по средней линии живота над лобком, таким образом, что кисть руки всей ладонной поверхностью находится на передней брюшной стенке	☐ да ☐ нет
24	Выполнил двуручное исследование матки	☐ да ☐ нет
25	Прокомментировал результат пальпации: положение матки, подвижность, размер, поверхность ровная или бугристая, оценил болезненность при пальпации и смещении	☐ да ☐ нет
26	Перевел пальцы правой руки в левый свод влагалища, левую руку сместил влево от средней линии и выполнил двуручное исследование левых придатков	☐ да ☐ нет
27	Прокомментировал результат пальпации: размеры, если пропальпировал придатки, болезненность при пальпации и смещении, объемные образования в области придатков при их наличии описал параметры (размер, консистенцию, подвижность, болезненность)	☐ да ☐ нет
28	Перевел пальцы правой руки в правый свод влагалища, левую руку сместил вправо от средней линии и выполнил двуручное исследование правых придатков	☐ да ☐ нет
29	Прокомментировал результат пальпации: если пропальпировал придатки, то указать размеры, болезненность при пальпации и смещении; объемные образования в области придатков - при их	☐ да ☐ нет

	наличии описал параметры (размер, консистенцию, подвижность, болезненность)	
30	Провел пальпацию сводов влагалища и проговорил оцениваемые параметры: глубина, уплощение сглаженность или выбухание, болезненность	☐ да ☐ нет
31	Извлек указательный и средний пальцы правой руки из влагалища и оценил характер выделений из влагалища на перчатке, проговорил	☐ да ☐ нет
Завершение обследования		
32	Снял перчатки и утилизировал их в контейнер отходов класса Б	☐ да ☐ нет
33	Обработал руки гигиеническим способом	☐ да ☐ нет
34	Поблагодарил пациентку, сообщил, что осмотр закончился и попросил встать, одеться и сесть к столу	☐ да ☐ нет
35	Сообщил пациентке результаты обследования	☐ да ☐ нет
36	Сообщил пациентке правильный полный план дальнейшего обследования	☐ да ☐ нет
37	Сообщил пациентке правильное время повторного визита	☐ да ☐ нет

ЧЕК – ЛИСТ

Вакуум экстракция плода

№ п/п	Действие аккредитуемого	Критерии оценки
1.	Познакомился с пациенткой	☐ да ☐ нет
2.	Оценил акушерскую ситуацию	☐ да ☐ нет
3.	Оценил состояние плода по аускультации и КТГ	☐ да ☐ нет
4.	Дал команду продолжить запись КТГ до окончания родов	☐ да ☐ нет
5.	Провел гигиеническую обработку рук	☐ да ☐ нет
6.	Надел стерильные перчатки	☐ да ☐ нет
7.	Обработал наружные половые органы раствором антисептика	☐ да ☐ нет
8.	Провел влагалищное исследование и интерпретировал: головка находится в плоскости выхода малого таза, передний вид затылочного предлежания	☐ да ☐ нет
9.	Определил расстояние в сантиметрах между проводной точкой и задней спайкой	☐ да ☐ нет
10.	Назвал показания для вакуум-экстракции плода	☐ да ☐ нет
11.	Назвал условия для вакуум-экстракции плода	☐ да ☐ нет
12.	Получил согласие пациентки на проведение операции	☐ да ☐ нет
13.	Пригласил ответственного врача акушера-гинеколога	☐ да ☐ нет
14.	Пригласил неонатолога	☐ да ☐ нет
15.	Дал команду развернуть операционную	☐ да ☐ нет
<i>Проведение операции</i>		
16.	Провел обработку рук для хирургической операции	☐ да ☐ нет
17.	Надел стерильный халат	☐ да ☐ нет
18.	Надел стерильные перчатки	☐ да ☐ нет
19.	Проверил герметичность упаковки вакуум экстрактора	☐ да ☐ нет
20.	Проверил герметичность вакуум-экстрактора (приложил чашечку ВЭ к ладони и создал разрежение в системе)	☐ да ☐ нет
21.	Двумя пальцами сместил кзади заднюю спайку	☐ да ☐ нет
22.	Взял чашечку ВЭ, как писчее перо	☐ да ☐ нет
23.	Ввел чашечку ВЭ внутренней стороной к головке плода	☐ да ☐ нет
24.	Правильно разместил чашечку ВЭ: стреловидный шов делит чашечку ВЭ пополам	☐ да ☐ нет
25.	Правильно разместил чашечку ВЭ: край чашечки ВЭ располагается на 3 см кзади от заднего угла большого родничка	☐ да ☐ нет
26.	Создал необходимое разрежение (500-600 мм рт.ст.)	☐ да ☐ нет
27.	Проверил, нет ли ущемления тканей	☐ да ☐ нет
28.	Правильно расположил контролирующую руку: большой палец – на чашечке прибора, указательный – на головке плода рядом с краем чашечки ВЭ, пальцы почти параллельны	☐ да ☐ нет
29.	Правильно расположил тянущую руку: рука – продолжение тросика и строго перпендикулярна чашечке ВЭ	☐ да ☐ нет
30.	Правильно расположил тянущую руку (концевые фаланги 2-х или 4-х пальцев на ручке ВЭ: 2 пальца, когда головка находится в выходе малого таза, 4 – когда головка в полости малого таза)	☐ да ☐ нет

31.	Установил вербальный контакт с роженицей и проводил тракции только во время потуг (с нарастанием и ослаблением усилия)	☐ да ☐ нет
32.	Проводил тракции в правильном направлении: книзу (до формирования точки фиксации) и кпереди	☐ да ☐ нет
33.	При прорезывании теменных бугров дал указание помощнику провести защиту промежности	☐ да ☐ нет
34.	Снял чашечку вакуум-экстрактора после рождения головки	☐ да ☐ нет
35.	Оценил место прикрепления чашечки к головке плода	☐ да ☐ нет
36.	Сформулировал диагноз: оперативные влагалищные роды вакуум-экстракцией плода	☐ да ☐ нет
<i>Завершение испытания</i>		
37.	Утилизировал медицинскую маску и перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б	☐ да ☐ нет

ЧЕК – ЛИСТ

Обследование молочных желез

№ п/п	Действие аккредитуемого	Номер сценария	Критерии оценки
Подготовка к исследованию			
1.	Произвёл гигиеническую обработку рук		☐ да ☐ нет
2.	Надел одноразовые смотровые перчатки		☐ да ☐ нет
Осмотр молочных желез и описание результатов по оцениваемым параметрам <i>(N.B.! При невозможности определить какой-либо из оцениваемых параметров на данном оборудовании, тем не менее необходимо произнести название обязательно для оценки параметра)</i>			
3.	Оценил окраску кожных покровов и наличие/отсутствие локального уплощения, утолщения, втяжения, изъязвления кожи молочных желез, прокомментировал		☐ да ☐ нет
4.	Оценил наличие/отсутствие выделений из сосков, прокомментировал		☐ да ☐ нет
5.	Сравнил правую и левую молочные железы по симметричности, прокомментировал		☐ да ☐ нет
6.	Оценил наличие сосудистого рисунка и его характер (при необходимости использовал лупу), прокомментировал		☐ да ☐ нет
7.	Оценил наличие/отсутствие втяжения правого/левого соска молочных желез, прокомментировал		☐ да ☐ нет
8.	Осмотрел инфрамаммарные области, прокомментировал		☐ да ☐ нет
9.	Попросил поднять и скрестить руки за головой. Повторно осмотрел молочные железы и оценил наличие/отсутствие локальных изменений кожи молочных желез, сформулировал результат		☐ да ☐ нет
10.	Предупредил о предстоящей пальпации молочных желез. Попросил сообщать в случае появления болезненных ощущений		☐ да ☐ нет
Пальпация молочных желез в положении женщины стоя с поднятыми вверх и скрещенными за головой руками			
11.	Произвел круговую поверхностную пальпацию всей поверхности левой молочной железы от периферии к центру / от центра к периферии подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев, располагая их близко друг к другу и не отрывая их от кожи молочной железы, сформулировал результат по всем оцениваемым параметрам		☐ да ☐ нет
12.	Произвел круговую поверхностную пальпацию всей поверхности правой молочной железы от периферии к центру / от центра к периферии подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев, располагая их близко друг к другу и не отрывая их от кожи молочной железы, сформулировал результат по всем оцениваемым параметрам		☐ да ☐ нет
13.	Произвел глубокую круговую пальпацию всей поверхности левой молочной железы от периферии к центру / от центра к периферии		☐ да ☐ нет
	подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев, располагая их близко друг к другу и не отрывая их от кожи молочной железы, сформулировал результат по всем оцениваемым параметрам		

14.	Произвел глубокую круговую пальпацию всей поверхности правой молочной железы от периферии к центру / от центра к периферии подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев, располагая их близко друг к другу и не отрывая их от кожи молочной железы, сформулировал результат по всем оцениваемым параметрам	☐ да ☐ нет
15.	Поддерживал молочную железу ладонью не ведущей руки снизу или с противоположной от пальпации стороны	☐ да ☐ нет
Пальпация молочных желез в положении женщины стоя, руки опущены вдоль туловища		
16.	Попросил женщину опустить руки вниз и сообщать при появлении болезненных ощущений во время пальпации	☐ да ☐ нет
17.	Произвел круговую пальпацию всей поверхности правой молочной железы от центра к периферии (или наоборот) против часовой стрелки (можно по часовой стрелке), начиная с верхних квадрантов. Сформулировал результат по всем параметрам	☐ да ☐ нет
18.	Произвел круговую пальпацию всей поверхности левой молочной железы от центра к периферии (или наоборот) против часовой стрелки (можно по часовой стрелке), начиная с верхних квадрантов. Сформулировал результат по всем параметрам	☐ да ☐ нет
19.	Предупредил пациентку о предстоящем сжатии соска у его основания	☐ да ☐ нет
20.	Произвел 1 и 3 пальцами сжатие ткани молочной железы у основания соска, последовательно с обеих сторон	☐ да ☐ нет
21.1	При обнаружении выделений из соска/сосков взял мазок отпечаток выделений для цитологического исследования (по 2 стекла из каждой молочной железы, из которой есть выделения)	☐ да ☐ нет
Пальпация регионарных лимфатических узлов с обеих сторон		
52.	Предложил пациентке поставить руки на пояс	☐ да ☐ нет
53.	Пропальпировал апикальную группу подмышечных лимфоузлов с обеих сторон, сформулировал результат	☐ да ☐ нет
54.	Предложил опустить руки вдоль туловища	☐ да ☐ нет
55.	Произвел пальпацию остальных групп подмышечных лимфоузлов с обеих сторон одновременно, сформулировал результат по каждой стороне	☐ да ☐ нет
56.	Пропальпировал подключичные лимфатические узлы с обеих сторон одновременно, сформулировал результат по каждой стороне	☐ да ☐ нет
57.	Попросил пациентку повернуться к нему спиной, развернул тренажер к себе спиной. Аккредитуемый сам может перейти за спину пациентки.	☐ да ☐ нет
58.	Пропальпировал надключичные лимфоузлы с обеих сторон одновременно. Сформулировал результат	☐ да ☐ нет
Пальпация молочных желез в положении женщины лежа		
59.	Предложил пациентке лечь на кушетку для продолжения осмотра (аккредитуемый положил манекен в горизонтальное положение на спине на кушетку, застеленную одноразовой простыней)	☐ да ☐ нет
60.	Произвел круговую пальпацию всей поверхности правой молочной железы начиная с верхних квадрантов, сформулировал результат	☐ да ☐ нет
61.	Произвел круговую пальпацию всей поверхности левой молочной железы начиная с верхних квадрантов, сформулировал результат	☐ да ☐ нет

Завершение обследования		
62.	Поблагодарил пациентку, предложил одеться, пройти и сесть на стул к столу	☐ да ☐ нет
63.	Снял одноразовые смотровые перчатки и поместил в контейнер класса А. При наличии выделений из молочных желёз утилизировал перчатки и использованные расходные материалы в контейнер класса Б.	☐ да ☐ нет
64.	Произвёл гигиеническую обработку рук и сел к столу	☐ да ☐ нет
По результатам обследования		
65.	Сообщил пациентке результаты осмотра	☐ да ☐ нет
66.	Сообщил пациентке план дальнейшего обследования и пригласил на повторный прием с результатами обследований	☐ да ☐ нет
Графический протокол заполнил правильно		
37.	При отсутствии патологии – оставил графический протокол чистым (незаполненным)	☐ да ☐ нет
38.	Отметил лимфатические узлы в протоколе при патологии, в случае нормы отметок не делал	☐ да ☐ нет
39.	Отметил изменения кожи при наличии патологии в протоколе, в случае нормы отметок не делал	☐ да ☐ нет
40.	Отметил наличия объемного образования в протоколе, в случае нормы отметок не делал	☐ да ☐ нет
41.	Оформил медицинскую карту амбулаторного больного: выбрал правильное полное заключение	☐ да ☐ нет
42.	План обследования составил правильно, в полном объёме и назначил время повторного визита	☐ да ☐ нет

ЧЕК – ЛИСТ

Роды в тазовом предлежании

№ п/п	Действие аккредитуемого	Критерии оценки
1.	Надел халат	☐ да ☐ нет
2.	Надел маску	☐ да ☐ нет
3.	Надел шапку	☐ да ☐ нет
4.	Обработал руки как перед хирургической операцией	☐ да ☐ нет
5.	Надел стерильные перчатки	☐ да ☐ нет
6.	Правильно обработал наружные половые органы перед приемом родов. Стерильной салфеткой с раствором антисептика, захваченной корнцангом последовательно обработал лобок, большие половые губы, внутренние поверхности бедер, ягодиц, промежность и задний проход	☐ да ☐ нет
7.	Начал оказывать пособие при чистоягодичном предлежании плода. Прорезывающиеся ягодицы захватил обеими руками так, чтобы большие пальцы располагались на прижатых к животу бедрах плода, а остальные четыре пальца – на поверхности крестца. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
8.	В момент прорезывания ягодиц плода попросил ассистента выполнить центрально-латеральную эпизиотомию	☐ да ☐ нет
9.	По мере того как рождается туловище плода, удерживал руки у вульварного кольца, сохраняя правильное членорасположение плода. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
10.	Плод родился до нижних углов лопаток и дальнейшее поступательное движение плода прекратилось. Правильно оценил ситуацию и прокомментировал, что приступает к извлечению ручек плода	☐ да ☐ нет
11.	Начал оказывать пособие по выведению ручек плода. Захватил ножки плода в области голеностопных суставов и приподнял их вперед и в сторону, противоположную спинке плода. Чтобы исключить соскальзывание рук, использовал стерильную пленку. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
12.	Одноименной рукой со стороны спинки плода ввел два пальца во влагалище. Бережно, умывательным движением извлек заднюю ручку. Прокомментировал	☐ да ☐ нет

13.	Захватил двумя руками туловище плода (4 пальца спереди, 1 палец сзади) за грудную клетку и повернул его на 180° так, чтобы спинка плода проходила под лонным сочленением. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
14.	Захватил ножки плода в области голеностопных суставов и приподнял их вперед и в сторону, противоположную спинке плода. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
15.	Одноименной рукой со стороны спинки плода ввел два пальца во влагалище. Бережно, умывательным движением извлек заднюю ручку. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
16.	Начал оказывать прием Мориссо-Левре-Лашапель. Туловище плода поместил на предплечье «верхом», ноги плода расставлены, средний палец руки поместив в ротик плода, способствуя сгибанию и опусканию головки. Указательным и безымянными пальцами другой руки захватил плечевой пояс плода, располагая пальцы по бокам шеи плода, средний палец разместил на затылке плода. Выполнял тракцию плода сначала вниз, а потом на живот матери. Извлек ребенка. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
17.	Выложил ребенка на живот матери	☐ да ☐ нет
18.	Провел профилактику кровотечения	☐ да ☐ нет
19.	Наложил два зажима Кохера на расстоянии 8-10 и 15-20 см от пупочного кольца	☐ да ☐ нет
20.	Обработал место пересечения пуповины тампоном с антисептическим раствором	☐ да ☐ нет
21.	Пересек пуповину между зажимами (условно)	☐ да ☐ нет
22.	Катетеризировал мочевой пузырь (условно)	☐ да ☐ нет
23.	Оценил признаки отделения последа методом: Чукалова-Кюстнера/Альфельда/Довженко/Шредера/Клейна	☐ да ☐ нет
24.	Попросил роженицу потужиться и правильно извлек послед. Убедившись, что плацента отделилась, держал плаценту обеими руками и осторожно поворачивал ее, пока плодные оболочки не родились	☐ да ☐ нет
25.	Плаценту разложил на лотке материнской поверхность вверх и рассмотрел ее, чтобы удостовериться в их целостности. Прокомментировал	☐ да ☐ нет
26.	Оценил тонус матки после родов, прокомментировал	☐ да ☐ нет
27.	Снял перчатки, маску, шапку, халат и утилизировал их в контейнер для сбора отходов класса Б	☐ да ☐ нет
28.	Правильно сформулировал и озвучил диагноз, возникшие осложнения и проведенные операции и пособия	☐ да ☐ нет