Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Кафедра Челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Института стоматологии им. Е. В. Боровского

Фонд оценочных средств по дисциплине:

Челюстно-лицевая хирургия

2026

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021
$CATEGORY: $course$/top/2021

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021/Опухоли
$CATEGORY: $course$/top/2021/Опухоли

// question: 4123283 name: «Вирховская железа» – это:
::«Вирховская железа» – это\:::[html]«Вирховская железа» – это\:{
	~дополнительная доля околоушной слюнной железы;
	~надчелюстной лимфатический узел, пальпируемый по переднему краю жевательной мышцы;
	=метастаз в лимфатические узлы надключичной области при раке желудка;
	~реактивное воспаление лимфатических узлов корня языка
}

// question: 4174667 name: НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ БОКОВОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ
::НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ БОКОВОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ БОКОВОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~парез лицевого нерва
	~перелом подьязычной кости
	=повреждение крупных сосудов шеи
	~травма околоушной слюнной железы
}

// question: 4174668 name: НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СРЕДИННЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ (РЕЖЕ КИСТ)...
::НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СРЕДИННЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ (РЕЖЕ КИСТ)...::[html]НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СРЕДИННЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ (РЕЖЕ КИСТ) ЯВЛЯЕТСЯ{
	~парез лицевого нерва
	~парез голосовых связок
	~перелом подьязычной кости
	~травма околоушной слюнной железы
	=стеноз верхних дыхательных путей
}

// question: 4174841 name: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЮТСЯ

::НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЮТСЯ::[html]НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЮТСЯ{
	~сосудистая
	~межмышечная
	~цилиндрическая
	~плоскоклеточная
	=муко-эпидермоидная
}

// question: 4174867 name: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЮТСЯ
::НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~межмышечная
	~цилиндрическая
	=плоскоклеточная
	~муко-эпидермоидная
	~сосудистая
}

// question: 4174899 name: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ...
::НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ...::[html]НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~межмышечная
	~цилиндрическая
	=плоскоклеточная
	~муко-эпидермоидная
}

// question: 4174904 name: НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...
::НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=тело
	~ветвь
	~венечный отросток
	~фронтальный отдел
	~мыщелковый отросток
}

// question: 4174914 name: НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...
::НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~тело
	=угол
	~ветвь
	~мыщелковый отросток
}

// question: 4174752 name: НАИБОЛЕЕ ЧАСТО МЯГКАЯ ОДОНТОМА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТИ
::НАИБОЛЕЕ ЧАСТО МЯГКАЯ ОДОНТОМА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТИ::[html]НАИБОЛЕЕ ЧАСТО МЯГКАЯ ОДОНТОМА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТИ{
	~нижних моляров
	~верхних моляров
	=нижних премоляров
	~резцов нижней челюсти
	~резцов верхней челюсти
}

// question: 4174830 name: НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
::НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ::[html]НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ{
	~фибросаркома
	~остеосаркома
	~хондросаркома
	~гемандотелиома
	=ретикулосаркома
}

// question: 4174831 name: НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
::НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ::[html]НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ{
	=саркома Юинга
	~остеосаркома
	~гемангиоэндотелиома
	~фибросаркома
	~липосаркома
}

// question: 4174654 name: НАРУЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ БОКОВОГО СВИЩА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В
::НАРУЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ БОКОВОГО СВИЩА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В::[html]НАРУЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ БОКОВОГО СВИЩА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В{
	~носоглотке
	~щечной области
	~подьязычной области
	~области корня языка
	=поднижнечелюстной области
}

// question: 4174656 name: НАРУЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В
::НАРУЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В::[html]НАРУЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В{
	~щечной области
	~подьязычной области
	~области корня языка
	~поднижнечелюстной области
	=области подьязычной кости по средней линии шеи
}

// question: 4174808 name: НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
::НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ::[html]НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ{
	~переломе челюсти
	~синдроме Олбрайта
	~фиброзной дисплазии
	=паратиреоидной дистрофии
	~деформирующем остеите Педжета
}

// question: 4174693 name: НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА
::НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА::[html]НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА{
	~кератокиста
	~радикулярная
	~фолликулярная
	=носо-небного канала
}

// question: 4174694 name: НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА
::НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА::[html]НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА{
	~кератокиста
	~радикулярная
	~фолликулярная
	=шаровидно-верхнечелюстная
}

// question: 4174695 name: НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА
::НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА::[html]НЕОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ КИСТА{
	=носо-губная
	~кератокиста
	~радикулярная
	~фолликулярная
}

// question: 4123282 name: MALT – лимфома околоушной слюнной железы относится к опухолям:
::MALT – лимфома околоушной слюнной железы относится к опухолям\:::[html]MALT – лимфома околоушной слюнной железы относится к опухолям\:{
	=Низкой степени злокачественности;
	~Промежуточной степени злокачественности;
	~Высокой степени злокачественности;
	~Крайне высокой степени злокачественности
}

// question: 4123441 name: АГРЕССИВНАЯ ФОРМА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
::АГРЕССИВНАЯ ФОРМА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА::[html]АГРЕССИВНАЯ ФОРМА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА{
	~экзофитная форма
	~язвенно-некротическая
	=эндофитная
	~литическая
	~склеротическая
}

// question: 4174927 name: АДЕНОКИСТОЗНАЯ КАРЦИНОМА ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ ...

::АДЕНОКИСТОЗНАЯ КАРЦИНОМА ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ ...::[html]АДЕНОКИСТОЗНАЯ КАРЦИНОМА ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
~шейные
~глубокие шейные
~заглоточные и шейные
=легкие и кости гематогенным путем
~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
~подподбородочные и поднижнечелюстные
}

// question: 4137956 name: Аденома сальных желез кожи – это:
::Аденома сальных желез кожи – это\:::[html]Аденома сальных желез кожи – это\:{
~доброкачественное новообразование, которое развивается из волосяных фолликулов и содержащее железистые кисты
~доброкачественная опухоль волосяных фолликулов, состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов
~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
=доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
}

// question: 4123514 name: АДЕНОМА СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ
::АДЕНОМА СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ::[html]АДЕНОМА СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ{
~малые слюнные железы полости рта
~подчелюстную слюнную железу
=околоушную слюнную железу
~подъязычную слюнную железу
}

// question: 4137325 name: Амелобластома - это:
::Амелобластома - это\:::[html]Амелобластома - это\:{
=Одонтогенная эпителиальная опухоль
~Злокачественное поражение челюстных костей
~Врожденный порок развития челюстных костей
~Этап развития радикулярной кисты
}

// question: 4174744 name: АМЕЛОБЛАСТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
::АМЕЛОБЛАСТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ::[html]АМЕЛОБЛАСТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ{

~предраков
~воспалительных заболеваний
~опухолеподобное образование
~злокачественных одонтогенных опухолей
=доброкачественных одонтогенных опухолей
}

// question: 4137326 name: Амелобластома относится к группе:
::Амелобластома относится к группе\:::[html]Амелобластома относится к группе\:{
=Доброкачественных одонтогенных опухолей
~Злокачественных одонтогенных опухолей
~Опухолеподобных образований
~Предраковых сосудистых образований
}

// question: 4137318 name: Амелобластома развивается в:
::Амелобластома развивается в\:::[html]Амелобластома развивается в\:{
=Челюстях
~Костях лицевого черепа
~Костях мозгового черепа
~Трубчатых костях
}

// question: 4123488 name: АМЕЛОБЛАСТОМА ЭТО ОПУХОЛЬ, РАЗВИВШАЯСЯ ИЗ
::АМЕЛОБЛАСТОМА ЭТО ОПУХОЛЬ, РАЗВИВШАЯСЯ ИЗ::[html]АМЕЛОБЛАСТОМА ЭТО ОПУХОЛЬ, РАЗВИВШАЯСЯ ИЗ{
~эпителия слизистой оболочки полости рта
~эндотелия кровеносных сосудов челюсти
~надкостницы нижнечелюстного канала
=эпителия эмалевого органа
}

// question: 4123492 name: АМЕЛОБЛАСТОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ
::АМЕЛОБЛАСТОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ::[html]АМЕЛОБЛАСТОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ{
~с одонтомой
=с одонтогенной кистой челюсти
~с ретенционной кистой
~с эпидермоидной и дермоидной кистой
}

// question: 4174748 name: АМЕЛОБЛАСТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С

::АМЕЛОБЛАСТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]АМЕЛОБЛАСТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~хондромой
~твердой одонтомой
~цементомой
~пародонтитом
=радикулярной кистой
}

// question: 4137971 name: Амелобластомы развиваются из:
::Амелобластомы развиваются из\:::[html]Амелобластомы развиваются из\:{
~соединительной ткани
=эпителиальной ткани
~кровеносных сосудов
~лимфатических сосудов
}

// question: 4123255 name: Амплификация – это:
::Амплификация – это\:::[html]Амплификация – это\:{
~Переход гена с одного локуса хромосомы на другой
~Потеря гена
=Множественная репликация гена
~Инактивация гена
}

// question: 4137311 name: Ангиографию используют для диагностики:
::Ангиографию используют для диагностики\:::[html]Ангиографию используют для диагностики\:{
=Гемангиомы
~Лимфангиомы
~Перелома верхней челюсти
~Фибромы
}

// question: 4123256 name: Апоптоз – это:
::Апоптоз – это\:::[html]Апоптоз – это\:{
=Генетически запрограммированная гибель клетки
~Появление клетки с измененным генотипом
~Повышенная пролиферативная активность клеточной линии
~Состояние, при котором клетка перестает воспринимать растворимые сигнальные факторы
}

// question: 4123393 name: БАЗАЛИОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ
::БАЗАЛИОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ::[html]БАЗАЛИОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ{
	~лимфогенным путем
	~гематогенным путем
	=не метастазирует
	~по ходу нервных и сосудистых стволов
}

// question: 4123391 name: БАЗАЛИОМА, ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ
::БАЗАЛИОМА, ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ::[html]БАЗАЛИОМА, ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ{
	=к злокачественным новообразованиям
	~к доброкачественным новообразованиям
	~к опухолеподобным заболеваниям
	~к предраковым заболеваниям
}

// question: 4123344 name: БИОЛОГИЧЕСКИМИ КАНЦЕРОГЕНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
::БИОЛОГИЧЕСКИМИ КАНЦЕРОГЕНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]БИОЛОГИЧЕСКИМИ КАНЦЕРОГЕНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~продукты распада тканей в результате воспаления
	~рентгеновское излучение
	~полициклические ароматические углеводороды
	=онкогенные вирусы
}

// question: 4174651 name: БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ
::БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ::[html]БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ{
	~по средней линии шеи
	~в подподбородочной области
	~в поднижнечелюстной области
	~по переднему краю m. Trapesius
	=в средней трети шеи, по переднему краю m. Sternoclaidomastoideus
}

// question: 4137294 name: Боковая киста шеи локализуется:
::Боковая киста шеи локализуется\:::[html]Боковая киста шеи локализуется\:{
	=По переднему краю m.sternoclaidomastoideus
	~В подподбородочной области
	~По переднему краю m.trapesius
	~В поднижнечелюстной области

}

// question: 4174665 name: БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ НАД
::БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ НАД::[html]БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ НАД{
	~щитовидной артерией
	~лицевой артерией и веной
	~подключичной артерией и веной
	=бифуркацией общей сонной артерии
	~лицевой веной и верхней щитовидной артерией
}

// question: 4174664 name: БОКОВОЙ СВИЩ ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ОБЛАСТИ
::БОКОВОЙ СВИЩ ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ОБЛАСТИ::[html]БОКОВОЙ СВИЩ ШЕИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ОБЛАСТИ{
	~щитовидной артерии
	~общей сонной артерии
	~лицевой артерии и вены
	~лицевой вены и верхней щитовидной артерии
	=внутренней яремной вены и наружной сонной артерии
}

// question: 4123366 name: БОЛЕЗНЬ БОУЭНА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ
::БОЛЕЗНЬ БОУЭНА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ::[html]БОЛЕЗНЬ БОУЭНА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ{
	~лейкоплакии
	~сифилиса
	~красного плоского лишая
	~красной волчанки
	=глоссалгии
}

// question: 4123390 name: БОЛЕЗНЬ БОУЭНА НА КОЖЕ ЛИЦА КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ
::БОЛЕЗНЬ БОУЭНА НА КОЖЕ ЛИЦА КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ::[html]БОЛЕЗНЬ БОУЭНА НА КОЖЕ ЛИЦА КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ{
	~красных пятен с участками телеангиоэктазий и бородавчатых разрастаний
	~бородавчатых разрастаний с трудно отторгаемыми корками
	~безболезненного рогового выступа конической или цилиндрической формы
	=приподнятой над поверхностью кожи бляшки, покрытой сероватыми чешуйками

}

// question: 4123291 name: Болезнь Сезари является:
::Болезнь Сезари является\:::[html]Болезнь Сезари является\:{
	~Лимфогранулематозом;
	~Гистиоцитозом
	~Неходжкинской В-клеточной лимфомой
	=Неходжкинской Т-клеточной лимфомой
}

// question: 4174907 name: БОЛИ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОБУСЛОВЛЕНЫ
::БОЛИ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОБУСЛОВЛЕНЫ::[html]БОЛИ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОБУСЛОВЛЕНЫ{
	~распадом опухоли
	~инфильтрацией надкостницы
	~присоединением вторичной инфекции
	=сдавлением опухолью нижнечелюстного нерва
}

// question: 4123472 name: БОЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВЫЗВАНА
::БОЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВЫЗВАНА::[html]БОЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВЫЗВАНА{
	~распадом опухоли
	~инфильтрацией надкостницы
	~присоединением вторичной инфекции
	=прорастанием опухолью нижнечелюстного нерва
}

// question: 4174639 name: БОЛЬНОЙ С ДИАГНОЗОМ "ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ" ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОЙ ...
::БОЛЬНОЙ С ДИАГНОЗОМ "ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ" ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОЙ ...::[html]БОЛЬНОЙ С ДИАГНОЗОМ "ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ" ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН К{
	=районному онкологу
	~специалисту-радиологу
	~участковому терапевту
	~хирургу общего профиля
	~специалисту-стоматологу
}

// question: 4137948 name: Больной обратился с жалобами на болезненную опухоль, локализованную в ...
::Больной обратился с жалобами на болезненную опухоль, локализованную в ...::[html]Больной обратился с жалобами на болезненную опухоль, локализованную в околоушно-жевательной области, появившуюся около полугода назад. При осмотре выявлено, что опухоль находится в позадичелюстной ямке, плотной консистенции, шаровидной формы, с гладкой поверхностью, малоподвижная. При оскале зубов мышцы со стороны опухоли отстают в движении. После удаления образования получено патоморфологическое заключение – опухоль состоит из протоплазматического синцития с включением леммоцитов. Как называется эта опухоль\:{
	=Невринома
	~Нейрофиброматоз
	~посттравматическая неврома
	~хемодектома
}

// question: 4123394 name: БОЛЬНОЙ С ДИАГНОЗОМ «БАЗАЛИОМА КОЖИ ЛИЦА» ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬСЯ
::БОЛЬНОЙ С ДИАГНОЗОМ «БАЗАЛИОМА КОЖИ ЛИЦА» ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬСЯ::[html]БОЛЬНОЙ С ДИАГНОЗОМ «БАЗАЛИОМА КОЖИ ЛИЦА» ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬСЯ{
	~в отделении челюстно-лицевой хирургии
	=в онкологическом диспансере
	~у дерматолога
	~у стоматолога-хирурга
}

// question: 4123459 name: БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ...
::БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ...::[html]БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИМЕЕТ{
	~электроодонтометрия зубов верхней челюсти
	=риноскопия передняя и задняя, пальцевое исследование носоглотки
	~стоматоскопия
	~исследование жевательной функции
	~рентгенография зубов верхней челюсти
}

// question: 4123367 name: БОРОДАВЧАТЫЙ ПРЕДРАК ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО
::БОРОДАВЧАТЫЙ ПРЕДРАК ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО::[html]БОРОДАВЧАТЫЙ ПРЕДРАК ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО{
	~на слизистой оболочке губы

~на коже губы
=на красной кайме губы
~на коже в области углов рта
~на слизистой оболочке полости рта в любом месте
}

// question: 4123364 name: БОРОДАВЧАТЫЙ ПРЕДРАК НИЖНЕЙ ГУБЫ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ
::БОРОДАВЧАТЫЙ ПРЕДРАК НИЖНЕЙ ГУБЫ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ::[html]БОРОДАВЧАТЫЙ ПРЕДРАК НИЖНЕЙ ГУБЫ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ{
~в детском возрасте
~в возрасте после 20 лет
=в возрасте после 50 лет
~в любом возрасте
~в глубокой старости (после 80 лет)
}

// question: 4174863 name: В НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ...
::В НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ...::[html]В НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ{
~подмышечные
~околояремные
~глубокие шейные
=поднижнечелюстные
}

// question: 4174864 name: В НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ...
::В НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ...::[html]В НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ{
~подмышечные
~околояремные
~глубокие шейные
=подподбородочные
}

// question: 4137955 name: В какое время жизни ребенка лимфангиома чаще всего наиболее интенсивно ...
::В какое время жизни ребенка лимфангиома чаще всего наиболее интенсивно ...::[html]В какое время жизни ребенка лимфангиома чаще всего наиболее интенсивно увеличивается в размерах\:{

~в первые месяцы после рождения
=в первые годы
~с 3 до 7 лет
~с 8 до 14 лет
}

// question: 4123400 name: В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НА КОЖЕ ЛИЦА ПОЯВЛЯЕТСЯ
::В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НА КОЖЕ ЛИЦА ПОЯВЛЯЕТСЯ::[html]В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НА КОЖЕ ЛИЦА ПОЯВЛЯЕТСЯ{
~язва кратерообразной формы
=бородавчатое образование или узелок, который быстро увеличивается
~язва округлой формы с сальным дном
~свищевой ход
}

// question: 4123439 name: В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАКА ПОЛОСТИ РТА ВЫДЕЛЯЮТ ФОРМЫ РОСТА ОПУХОЛИ
::В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАКА ПОЛОСТИ РТА ВЫДЕЛЯЮТ ФОРМЫ РОСТА ОПУХОЛИ::[html]В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАКА ПОЛОСТИ РТА ВЫДЕЛЯЮТ ФОРМЫ РОСТА ОПУХОЛИ{
~фиброзную
~гиперпластическую
=папиллярную
~пузырьковую
}

// question: 4123286 name: В норме лимфатический узел имеет форму:
::В норме лимфатический узел имеет форму\:::[html]В норме лимфатический узел имеет форму\:{
~Круглую
=Бобовидную
~Каплевидную
~Квадратную
}

// question: 4123548 name: В ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ФИБРОМАТОЗ
::В ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ФИБРОМАТОЗ::[html]В ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ФИБРОМАТОЗ{
~Языка
=Десен
~Твердого неба
~Язычка

}

// question: 4123440 name: В РАЗВИТОМ ПЕРИОДЕ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ВЫДЕЛЯЮТ ФОРМЫ РОСТА ...
::В РАЗВИТОМ ПЕРИОДЕ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ВЫДЕЛЯЮТ ФОРМЫ РОСТА ...::[html]В РАЗВИТОМ ПЕРИОДЕ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ВЫДЕЛЯЮТ ФОРМЫ РОСТА ОПУХОЛИ{
	~солидную
	~кистозную
	=экзофитную
	~эрозивную
}

// question: 4123438 name: В РАЗВИТОМ ПЕРИОДЕ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОТМЕЧАЮТ
::В РАЗВИТОМ ПЕРИОДЕ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОТМЕЧАЮТ::[html]В РАЗВИТОМ ПЕРИОДЕ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОТМЕЧАЮТ{
	~шероховатость слизистой оболочки, чувство стянутости
	~безболезненные узелки, поверхностные эрозии, трещины
	=боль, запах из полости рта, формирование язвы с плотными краями и дном
	~ограничение раскрывания рта до 1 – 2 см, повышение температуры тела
}

// question: 4123454 name: В РАННЕЙ СТАДИИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЮТ ЖАЛОБЫ
::В РАННЕЙ СТАДИИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЮТ ЖАЛОБЫ::[html]В РАННЕЙ СТАДИИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЮТ ЖАЛОБЫ{
	~на ограничение открывания рта
	~боль при глотании
	=гнойные выделения из половины носа с прожилками крови
	~двоение в глазах
}

// question: 4174670 name: В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭМАЛЕВОГО ОРГАНА В ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЯХ ...
::В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭМАЛЕВОГО ОРГАНА В ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЯХ ...::[html]В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭМАЛЕВОГО ОРГАНА В ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЯХ ОБРАЗУЕТСЯ КИСТА{
	~кератокиста
	~радикулярная
	=фолликулярная
	~назоальвеолярная

~резцового канала
}

// question: 4174669 name: В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПАЛЕНИЯ В ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЯХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ
::В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПАЛЕНИЯ В ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЯХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ::[html]В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПАЛЕНИЯ В ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЯХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ{
~кератокиста
=радикулярная
~фолликулярная киста
~назоальвеолярная киста
~киста резцового канала
}

// question: 4137320 name: В результате воспаления в периапикальных тканях челюстей развивается киста:
::В результате воспаления в периапикальных тканях челюстей развивается киста\:::[html]В результате воспаления в периапикальных тканях челюстей развивается киста\:{
=Радикулярная
~Фолликулярная
~Резцового канала
~Ретенционная
}

// question: 4137321 name: В результате нарушения развития эмалевого органа развивается киста:
::В результате нарушения развития эмалевого органа развивается киста\:::[html]В результате нарушения развития эмалевого органа развивается киста\:{
~Радикулярная
=Фолликулярная
~Резцового канала
~Ретенционная
}

// question: 4123372 name: В СЛУЧАЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ПОКАЗАНО
::В СЛУЧАЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ПОКАЗАНО::[html]В СЛУЧАЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ПОКАЗАНО{
~прижигание
~флюктуоризация

~радиотерапия
~лучи Букки
=полное иссечение очага поражения
}

// question: 4123301 name: В состав лимфаденоидного глоточного кольца Пирогова-Вальдейера входят:
::В состав лимфаденоидного глоточного кольца Пирогова-Вальдейера входят\:::[html]В состав лимфаденоидного глоточного кольца Пирогова-Вальдейера входят\:{
~Глоточная и трубная миндалины
~Язычная и глоточная миндалины
~Небные, трубные и язычная миндалина
=Небные, трубные, язычная, глоточная миндалины
}

// question: 4123244 name: В структуре онкологической больницы должны находиться:
::В структуре онкологической больницы должны находиться\:::[html]В структуре онкологической больницы должны находиться\:{
~Хирургические отделения
~Радиологическое отделение
~Химиотерапевтическое отделение
=Все вышеперечиленные
}

// question: 4123303 name: В фолликулах лимфатических узлов находятся:
::В фолликулах лимфатических узлов находятся\:::[html]В фолликулах лимфатических узлов находятся\:{
=В-лимфоциты
~Т-лимфоциты
~Плазматические клетки
~Гистиоциты
}

// question: 4174653 name: ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ БОКОВОГО СВИЩА ШЕИ ОТКРЫВАЕТСЯ В
::ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ БОКОВОГО СВИЩА ШЕИ ОТКРЫВАЕТСЯ В::[html]ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ БОКОВОГО СВИЩА ШЕИ ОТКРЫВАЕТСЯ В{
~носоглотке
~щечной области
~подьязычной области
~поднижнечелюстной области
=области верхнего полюса миндалины
}

// question: 4174655 name: ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ ОТКРЫВАЕТСЯ В
::ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ ОТКРЫВАЕТСЯ В::[html]ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ ОТКРЫВАЕТСЯ В{
	~носоглотке
	~щечной области
	~подьязычной области
	~поднижнечелюстной области
	=области слепого отверстия корня языка
}

// question: 4123566 name: ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ ГЕМАНГИОМЫ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ
::ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ ГЕМАНГИОМЫ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ::[html]ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ ГЕМАНГИОМЫ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ{
	~Периодические приступы интенсивной боли
	~Постоянная боль в челюсти
	~Ощущение пульсации, чувство тяжести при наклоне головы и физической нагрузке
	=Частые спонтанные кровотечения из полости рта
}

// question: 4123412 name: ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА МАЛИГНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА
::ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА МАЛИГНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА::[html]ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА МАЛИГНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА{
	~дефицит витамина «В» в организме
	=однократная или хроническая травма
	~сахарный диабет
	~курение
}

// question: 4123399 name: ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ
::ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~курение
	~употребление суррогатов алкоголя
	=воздействие ультрафиолетового излучения
	~воздействие низких и высоких температур
}

// question: 4137296 name: Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в:
::Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в\:::[html]Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в\:{
	=Области верхнего полюса миндалины
	~Подъязычной области
	~Носоглотке
	~Заушной области
}

// question: 4123314 name: Внутреннее устье срединного свища шеи открывается в область
::Внутреннее устье срединного свища шеи открывается в область::[html]Внутреннее устье срединного свища шеи открывается в область{
	~Подподбородочных лимфатических узлов
	=Корня языка
	~Гортани
	~Трахеи
}

// question: 4123307 name: Врожденное заболевание, характеризующееся появлением участков лейкоплакии в ...
::Врожденное заболевание, характеризующееся появлением участков лейкоплакии в ...::[html]Врожденное заболевание, характеризующееся появлением участков лейкоплакии в области корня и боковых поверхностей языка, реже – других участков слизистой оболочки, сочетающееся с дистрофическими изменениями ногтей, гипергидрозом, ладонно-подошвенным кератозом. Это описание соответствует\:{
	=Синдрому Ядассона-Левандовского
	~Гранулематозу Вегенера
	~Синдрому Дарье
	~Волосатой лейкоплакии
}

// question: 4174918 name: ВТОРИЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ
::ВТОРИЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ::[html]ВТОРИЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ{
	=эпителия
	~нервной
	~лимфатической
	~соединительной ткани
	~эпителия островков Малассе
}

// question: 4123464 name: ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...
::ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...::[html]ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
	~островков Маляссе
	~из надкостницы челюсти
	~из остеонов
	=из слизистой оболочки альвеолярной части
}

// question: 4123465 name: ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...
::ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...::[html]ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
	~из эпителия одонтогенной кисты
	~из костного мозга
	~в результате метастазирования
	=из периодонта
}

// question: 4123304 name: Выберите симптомы характерные для хейлита Манганотти:
::Выберите симптомы характерные для хейлита Манганотти\:::[html]Выберите симптомы характерные для хейлита Манганотти\:{
	=Эрозии ярко-красного цвета, овальной или неправильной формы, нередко с гладкой, полированной на вид поверхностью
	~Эрозии бледно-розового цвета, овальной формы, с подрытыми краями, некоторые из них покрыты гнойными корками
	~Корки темно-желтого цвета, локализующиеся в углах рта, после удаления которых определяется мокнущая эрозивная поверхность
	~Увеличенная в объеме верхняя губа, эрозивных элементов поражения не определяется
}

// question: 4137973 name: Где чаще локализуются амелобластомы?
::Где чаще локализуются амелобластомы?::[html]Где чаще локализуются амелобластомы?{
	~на верхней челюсти
	~на нижней челюсти в области резцов
	=на нижней челюсти в области угла
	~в скуловой кости
}

// question: 4137954 name: Гемангиомы мягких тканей по строению бывают:
::Гемангиомы мягких тканей по строению бывают\:::[html]Гемангиомы мягких тканей по строению бывают\:{
	~капиллярная, плоская, сенильная
	~ветвистая, гроздевидная, рацемозная
	=капиллярная, ветвистая, кавернозная
	~смешанная
}

// question: 4123335 name: ГЕМАТОГЕННЫЙ ТИП МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН
::ГЕМАТОГЕННЫЙ ТИП МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН::[html]ГЕМАТОГЕННЫЙ ТИП МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН{
	~для любого типа опухоли
	~только для доброкачественных опухолей
	=только для злокачественных опухолей
	~только для опухолевидных заболеваний
}

// question: 4174769 name: ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
::ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ::[html]ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ{
	=истинных опухолей
	~опухолеподобное образование
	~пороков развития зубных тканей
	~злокачественных одонтогенных опухолей
	~доброкачественных одонтогенных опухолей
}

// question: 4174779 name: ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	~пародонтитом
	~ретенционной кистой
	~полиморфной аденомой
	~остеомиелитом челюсти
	=амелобластической фибромой
}

// question: 4174780 name: ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С

::ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ
С::[html]ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	=миксомой
	~пародонтитом
	~ретенционной кистой
	~полиморфной аденомой
	~остеомиелитом челюсти
}

// question: 4174781 name: ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ
С::[html]ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	~пародонтитом
	=кистой челюсти
	~ретенционной кистой
	~полиморфной аденомой
	~остеомиелитом челюсти
}

// question: 4174782 name: ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ
С::[html]ГИГАНТОКЛЕТОЧНУЮ ОПУХОЛЬ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	~пародонтитом
	~остеосаркомой
	~ретенционной кистой
	=полиморфной аденомой
	~остеомиелитом челюсти
}

// question: 4137330 name: Гигантоклеточная опухоль относится к группе:
::Гигантоклеточная опухоль относится к группе\:::[html]Гигантоклеточная опухоль относится к группе\:{
	=Истинных опухолей
	~Опухолеподобных образований
	~Пороков развития зубных тканей
	~Злокачественных одонтогенных опухолей
}

// question: 4123371 name: ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

::ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~выраженным гиперкератозом
~резкой пролиферацией покровного эпителия как вверх, так и вниз
=дефектом эпителия, заполненным густым диффузным инфильтратом
~утолщением эпителия за счет разрастания рогового и зернистого слоев
~разрушением базальной мембраны эпителиальными тяжами
}

// question: 4137268 name: Гистологические признаки бородавчатого предрака:
::Гистологические признаки бородавчатого предрака\:::[html]Гистологические признаки бородавчатого предрака\:{
~ акантоз
= гиперкератоз
~ спонгиоз
~ инфильтрации шиповидного слоя клеток
}

// question: 4174770 name: ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~отдельными зубоподобными структурами
~пролиферирующим одонтогенным эпителием
~тонкой фиброзной капсулой, выстланной ороговевающим плоским эпителием
=богато васкуляризированной тканью, состоящей из веретенообразных и гигантских клеток
~обизвествленными зубными тканями расположенными хаотично образующими единый конгломерат
}

// question: 4174764 name: ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЛОЖНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЛОЖНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЛОЖНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~отдельными зубоподобными структурами
~пролиферирующим одонтогенным эпителием
~разной степени минерализованной цементоподобной тканью
~тонкой фиброзной капсулой, выстланной ороговевающим плоским эпителием
=обизвествленными зубными тканями расположенными хаотично, образующими единый конгломерат

}

// question: 4137939 name: Главное преимущество пластики местными тканями заключается:
::Главное преимущество пластики местными тканями заключается\:::[html]Главное преимущество пластики местными тканями заключается\:{
	~В многоэтапности лечения
	~В широких пластических возможностях метода
	=В сходстве, однотипности тканей по строению
	~В различие кровоснабжения лоскутов
}

// question: 4123263 name: Главным признаком, отличающим инвазивный рак от неинвазивного, является
::Главным признаком, отличающим инвазивный рак от неинвазивного, является::[html]Главным признаком, отличающим инвазивный рак от неинвазивного, является{
	~Размер
	~Форма
	~Локализация
	=Васкуляризация
}

// question: 4123558 name: ГРАНИЦЫ ЛИПОМЫ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
::ГРАНИЦЫ ЛИПОМЫ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ::[html]ГРАНИЦЫ ЛИПОМЫ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ{
	~С трудом
	~Не определяются
	~Не четко
	=Достаточно четко
}

// question: 4137944 name: Два года назад на коже щеки появилась безболезненная опухоль плотной ...
::Два года назад на коже щеки появилась безболезненная опухоль плотной ...::[html]Два года назад на коже щеки появилась безболезненная опухоль плотной консистенции, выступающая над поверхностью кожи. Образование подвижное, имеет цвет нормальной кожи, поверхность опухоли гладкая. Какое заболевание кожи выявлено у больного\:{
	~меланома
	=фиброма

~базалиома
~плоскоклеточный рак
}

// question: 4174692 name: ДВУХЭТАПНАЯ ЦИСТОТОМИЯ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ КОГДА КИСТА БОЛЬШИХ ...
::ДВУХЭТАПНАЯ ЦИСТОТОМИЯ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ КОГДА КИСТА БОЛЬШИХ ...::[html]ДВУХЭТАПНАЯ ЦИСТОТОМИЯ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ КОГДА КИСТА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ОБЛАСТИ{
~клыков
~моляров
~премоляров
=тела и ветви
~мыщелкового отростка
}

// question: 4174691 name: ДВУХЭТАПНАЯ ЦИСТОТОМИЯ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ КОГДА КИСТА БОЛЬШИХ ...
::ДВУХЭТАПНАЯ ЦИСТОТОМИЯ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ КОГДА КИСТА БОЛЬШИХ ...::[html]ДВУХЭТАПНАЯ ЦИСТОТОМИЯ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ КОГДА КИСТА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ{
~прорастает поднадкостнично
~прорастает в верхнечелюстную пазуху
=разрушает костное дно полости носа
~располагается в области премоляров
}

// question: 4123380 name: ДЕКУБИТАЛЬНУЮ ЯЗВУ ОТНОСЯТ К ПРЕДРАКАМ
::ДЕКУБИТАЛЬНУЮ ЯЗВУ ОТНОСЯТ К ПРЕДРАКАМ::[html]ДЕКУБИТАЛЬНУЮ ЯЗВУ ОТНОСЯТ К ПРЕДРАКАМ{
~облигатным
=факультативным
~атипичным
~реактивным
~дистрофическим
}

// question: 4123430 name: ДЕФЕКТ ГУБЫ, ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ ЗАКРЫВАЮТ ПУТЕМ
::ДЕФЕКТ ГУБЫ, ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ ЗАКРЫВАЮТ ПУТЕМ::[html]ДЕФЕКТ ГУБЫ, ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ ЗАКРЫВАЮТ ПУТЕМ{
~операции Ванаха
~операции Крайла

=операции Блохина
~операции Венсана
}

// question: 4174790 name: ДИАГНОЗ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ
::ДИАГНОЗ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ::[html]ДИАГНОЗ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ{
~опроса
~цитологии
~гистологии
~анализов крови
=клинико-рентгенологического исследования
}

// question: 4123526 name: ДИАГНОЗ – «ПЛЕОМОРФНАЯ АДЕНОМА» МОЖНО УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ
::ДИАГНОЗ – «ПЛЕОМОРФНАЯ АДЕНОМА» МОЖНО УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ::[html]ДИАГНОЗ – «ПЛЕОМОРФНАЯ АДЕНОМА» МОЖНО УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ{
~компьютерной томографии
~локализации опухоли, ее консистенции
=данных морфологического исследования
~по внешнему виду опухоли после операции
}

// question: 4123493 name: ДИАГНОЗ – АМЕЛОБЛАСТОМА УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ
::ДИАГНОЗ – АМЕЛОБЛАСТОМА УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ::[html]ДИАГНОЗ – АМЕЛОБЛАСТОМА УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ{
=рентгенологического и морфологического исследования
~рентгенологического или ультразвукового исследования
~только данных компьютерной томографии
~данных анамнеза и клинической картины заболевания
}

// question: 4123281 name: Диагноз лимфогранулематоза при изолированном поражении лимфатических узлов ...
::Диагноз лимфогранулематоза при изолированном поражении лимфатических узлов ...::[html]Диагноз лимфогранулематоза при изолированном поражении лимфатических узлов шеи ставится на основании\:{
~Развернутого клинического анализа крови;

~Стернальной пункции;
~Комплексного ультразвукового обследования;
=Эксцизионной биопсии
}

// question: 4123242 name: Диспансеризация онкологических больных III группы, в течение первого года ...
::Диспансеризация онкологических больных III группы, в течение первого года ...::[html]Диспансеризация онкологических больных III группы, в течение первого года после лечения проводится\:{
~1 раз в месяц
=1 раз в 3 месяца
~1 раз в 6 месяцев
~1 раз в год
}

// question: 4137281 name: Дифференциальная диагностика лейкоплакии проводится с:
::Дифференциальная диагностика лейкоплакии проводится с\:::[html]Дифференциальная диагностика лейкоплакии проводится с\:{
~ сифилис
~ трещина губы
~ хронической механической травмой
= плоским лишаем
}

// question: 4123427 name: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РАКА ГУБЫ ПРОВОДЯТ
::ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РАКА ГУБЫ ПРОВОДЯТ::[html]ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РАКА ГУБЫ ПРОВОДЯТ{
=с сифилисом
~фурункулом
~карбункулом
~атеромой
}

// question: 4123370 name: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ПРОВОДЯТ СО ВСЕМИ ...
::ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ПРОВОДЯТ СО ВСЕМИ ...::[html]ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ПРОВОДЯТ СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ{
=хронического рецидивирующего афтозного стоматита
~эрозивной формы лейкоплакии

~эрозивной формы красной волчанки
~герпетической эрозии
~эрозивной формы КПЛ
}

// question: 4123383 name: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПРОВОДЯТ СО ВСЕМИ ...
::ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПРОВОДЯТ СО ВСЕМИ ...::[html]ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПРОВОДЯТ СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ{
~красного плоского лишая
=многоформной экссудативной эритемы
~вторичного сифилиса
~красной волчанки
~кандидоза
}

// question: 4174870 name: ДЛЯ НЕОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ НЕОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ НЕОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРНО{
=быстрое развитие, раннее метастазирование
~быстрое развитие, позднее метастазирование
~медленное развитие, раннее метастазирование
~медленное развитие, позднее метастазирование
}

// question: 4123340 name: ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО{
=наличие соединительнотканной капсулы
~раннее изъязвление
~незначительные распирающие боли
~быстрое распространение патологического процесса
}

// question: 4137262 name: Для гистологической картины болезни Боуэна характерно наличие:
::Для гистологической картины болезни Боуэна характерно наличие\:::[html]Для гистологической картины болезни Боуэна характерно наличие\:{
~ акантоза

= дискератоза
~ спонгиоза
~ инвазии в подэпителиальные ткани
}

// question: 4137278 name: Для гистологической картины кожного рога не характерно:
::Для гистологической картины кожного рога не характерно\:::[html]Для гистологической картины кожного рога не характерно\:{
= акантоз
~ гиперкератоз
~ папилломатозное разрастание эпителия
~ инфильтрация под эпителиальной зоной
}

// question: 4137274 name: Для гистологической картины красной волчанки характерно:
::Для гистологической картины красной волчанки характерно\:::[html]Для гистологической картины красной волчанки характерно\:{
~ гиперкератоз
= вакуольная дистрофия
~ атипическое ороговение
}

// question: 4137271 name: Для гистологической картины предраковых заболеваний характерно отсутствие:
::Для гистологической картины предраковых заболеваний характерно отсутствие\:::[html]Для гистологической картины предраковых заболеваний характерно отсутствие\:{
~ гиперкератоза
~ гиперхроматоза ядер
= атипического ороговения
~ гинвазии в подэпителиальные ткани
}

// question: 4123428 name: ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГУБЫ ПРИМЕНЯЮТ
::ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГУБЫ ПРИМЕНЯЮТ::[html]ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГУБЫ ПРИМЕНЯЮТ{
=инцизионную биопсию
~пункционную биопсию
~эксцизионную биопсию
~расширенную биопсию
}

// question: 4123564 name: ДЛЯ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ХАРАКТЕРЕН РОСТ
::ДЛЯ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ХАРАКТЕРЕН РОСТ::[html]ДЛЯ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ХАРАКТЕРЕН РОСТ{
	=Инвазивный
	~Экспансивный
	~Ограниченный
	~По ходу нервных стволов
}

// question: 4137963 name: Для какой кисты характерно наличие в полости кисты продуктов сальных и ...
::Для какой кисты характерно наличие в полости кисты продуктов сальных и ...::[html]Для какой кисты характерно наличие в полости кисты продуктов сальных и потовых желез\:{
	~срединной шеи
	~воспалительной корневой
	~прорезывания
	=дермоидной
}

// question: 4137327 name: Для клинической картины амелобластомы характерно наличие:
::Для клинической картины амелобластомы характерно наличие\:::[html]Для клинической картины амелобластомы характерно наличие\:{
	=Безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия
	~Болезненным дефектом костной ткани челюсти
	~Рыхлым безболезненным кровоточащим образованием десны
	~Плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
}

// question: 4123376 name: ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ИСПОЛЬЗУЮТ
::ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ИСПОЛЬЗУЮТ::[html]ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ИСПОЛЬЗУЮТ{
	~рентгенотерапию
	=диатермокоагуляцию
	~облучение гелий-неоновым лазером
	~диадинамотерапию
	~дорсонвализацию
}

// question: 4123377 name: ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПРИМЕНЯЮТ
::ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПРИМЕНЯЮТ::[html]ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ПРИМЕНЯЮТ{
	~аппликационную гамма терапию
	~прижигание
	~облучение гелий-неоновым лазером
	=иссечение
	~аппликационную терапию с кератопластическими препаратами
}

// question: 4123359 name: ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
::ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ::[html]ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ{
	=клеточный атипизм и клеточный полиморфизм
	~клеточный атипизм, клеточный полиморфизм и инвазивный рост
	~только инвазивный рост
	~дискератоз
}

// question: 4123522 name: ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИМЕНЯЮТСЯ
::ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИМЕНЯЮТСЯ::[html]ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИМЕНЯЮТСЯ{
	~контрастная сиалография
	~компьютерная томография
	~ультразвуковое исследование
	=тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ
	~спиральная компьютерная томография
}

// question: 4174722 name: ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ
::ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ::[html]ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ{
	=атипического ороговения
	~обизвествления миоцитов
	~воспалительного инфильтрата
	~инвазии в подэпителиальные ткани
}

// question: 4174723 name: ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ
::ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ::[html]ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ{
	=гиперхроматоза ядер
	~обизвествления миоцитов
	~воспалительного инфильтрата
	~вторичного казеозного некроза
	~инвазии в подэпителиальные ткани
}

// question: 4174724 name: ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ
::ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ::[html]ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ{
	=гиперкератоза
	~обизвествления миоцитов
	~воспалительного инфильтрата
	~вторичного казеозного некроза
	~инвазии в подэпителиальные ткани
}

// question: 4174720 name: ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО ОТСУТСТВИЕ
::ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО ОТСУТСТВИЕ::[html]ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДРАКА ХАРАКТЕРНО ОТСУТСТВИЕ{
	~гиперкератоза
	~гиперхроматоза ядер
	~атипического ороговения
	=инвазии в подэпителиальные ткани
}

// question: 4174703 name: ДЛЯ МЯГКОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В НЕЙ
::ДЛЯ МЯГКОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В НЕЙ::[html]ДЛЯ МЯГКОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В НЕЙ{
	~зрелой жировой ткани
	~зрелой фиброзной ткани
	=зрелой жировой и фиброзной ткани
	~плоского эпителия
}

// question: 4123497 name: ДЛЯ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРЕН
::ДЛЯ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРЕН::[html]ДЛЯ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРЕН{

~быстрый рост
~инвазивный рост
~деструктивный рост
=предел роста
}

// question: 4123279 name: Для определения сторожевого лимфатического узла следует выполнить:
::Для определения сторожевого лимфатического узла следует выполнить\:::[html]Для определения сторожевого лимфатического узла следует выполнить\:{
=радиоизотопную лимфографию;
~мультиспиральную компьютерную томографию;
~конусно-лучевую компьютерную томографию;
~ядерно-магнитнорезонансную томографию
}

// question: 4174869 name: ДЛЯ ОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ ОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ ОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРНО{
~быстрое развитие, раннее метастазирование
~быстрое развитие, позднее метастазирование
~медленное развитие, раннее метастазирование
=медленное развитие, позднее метастазирование
}

// question: 4123421 name: ДЛЯ ОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГУБЫ ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ ОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГУБЫ ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ ОРОГОВЕВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГУБЫ ХАРАКТЕРНО{
~быстрое развитие, раннее метастазирование
~быстрое развитие, позднее метастазирование
~медленное развитие, раннее метастазирование
=медленное развитие, позднее метастазирование
}

// question: 4137331 name: Для остеобластокластомы характерен следующий пунктат в виде жидкости цвета:
::Для остеобластокластомы характерен следующий пунктат в виде жидкости цвета\:::[html]Для остеобластокластомы характерен следующий пунктат в виде жидкости цвета\:{

=Бурого
~Янтарно-желтого
~Ярко-красного
~Болотного
}

// question: 4123455 name: ДЛЯ ПЕРИОДА ВЫРАЖЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ ПЕРИОДА ВЫРАЖЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ ПЕРИОДА ВЫРАЖЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРНО{
=нарушение носового дыхания
~боль при глотании
~онемение губы и кожи подбородка на стороне поражения
~нарушение артикуляционных взаимоотношений зубных рядов
}

// question: 4174689 name: ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ...
::ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ{
~симедент
~амальгаму
=фосфат-цемент
~эвгенол-тимоловую пасту
~резорцин-формалиновую пасту
}

// question: 4174657 name: ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА "БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ" ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ
::ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА "БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ" ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА "БОКОВАЯ КИСТА ШЕИ" ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ{
~биохимическое
=цитологическое
~радиоизотопное
~реакция Вассермана
~динамики тимоловой пробы
}

// question: 4174658 name: ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА "БОКОВОЙ СВИЩ ШЕИ" ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

::ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА "БОКОВОЙ СВИЩ ШЕИ" ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА "БОКОВОЙ СВИЩ ШЕИ" ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~цитологическое
	~радиоизотопное
	~реакция Вассермана
	~динамики тимоловой пробы
	=контрастная фистулография
}

// question: 4137298 name: Для подтверждения диагноза «боковая киста шеи» проводят исследование:
::Для подтверждения диагноза «боковая киста шеи» проводят исследование\:::[html]Для подтверждения диагноза «боковая киста шеи» проводят исследование\:{
	=Цитологическое
	~Биохимическое
	~Радиоизотопное
	~Иммунологическое
}

// question: 4123534 name: ДЛЯ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ХАРАКТЕРНЫ
::ДЛЯ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ХАРАКТЕРНЫ::[html]ДЛЯ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ХАРАКТЕРНЫ{
	=быстрый рост, боль, симптомы поражения лицевого нерва
	~медленный рост, формирование слюнных свищей, отсутствие боли
	~нарушение смыкания зубных рядов, патологический перелом нижней челюсти
	~увеличение опухоли до гигантских размеров при сохранении функции лицевого нерва
}

// question: 4123424 name: ДЛЯ РАННЕГО ПЕРИОДА РАКА ГУБЫ ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ РАННЕГО ПЕРИОДА РАКА ГУБЫ ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ РАННЕГО ПЕРИОДА РАКА ГУБЫ ХАРАКТЕРНО{
	~появление трещина губы
	~появление язвы с распадом в центре, сильная боль
	=появление шероховатого уплотнения, которое постепенно увеличивается
	~потеря чувствительности губы
}

// question: 4123437 name: ДЛЯ РАННЕЙ СТАДИИ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНО

::ДЛЯ РАННЕЙ СТАДИИ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ РАННЕЙ СТАДИИ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНО{
~появление выраженной боли
~кровоточивость очага поражения
=появление безболезненных узелков, поверхностных язв или трещин
~усиление саливции, появление запаха из полости рта
}

// question: 4174785 name: ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ КИСТОЗНОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ...
::ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ КИСТОЗНОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ...::[html]ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ КИСТОЗНОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО{
=очаговое разрежение в виде кисты, с четкими границами
~наличие мелких полостей, разделенных костными перегородками
~разрушение кортикального слоя бесструктурным очагом разрежения, рассасывание верхушек корней зубов
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
}

// question: 4174787 name: ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ...
::ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ...::[html]ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО{
~очаговое разрежение в виде кисты, с четкими границами
~наличие мелких полостей, разделенных костными перегородками
=разрушение кортикального слоя бесструктурным очагом разрежения, рассасывание верхушек корней зубов
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
}

// question: 4174672 name: ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНА ДЕСТРУКЦИЯ ...
::ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНА ДЕСТРУКЦИЯ ...::[html]ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНА ДЕСТРУКЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ{
~в виде "тающего сахара"
~с нечеткими границами в области образования
~в виде нескольких полостей с четкими контурами
=с четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов

}

// question: 4174675 name: ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНА ДЕСТРУКЦИЯ ...
::ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНА ДЕСТРУКЦИЯ ...::[html]ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНА ДЕСТРУКЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ{
	~в виде "тающего сахара"
	=с четкими контурами и тенью зуба в полости
	~с нечеткими границами в области образования
	~в виде нескольких полостей с четкими контурами
	~с четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов
}

// question: 4174786 name: ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЯЧЕИСТОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ...
::ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЯЧЕИСТОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ...::[html]ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЯЧЕИСТОЙ ФОРМЫ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО{
	~очаговое разрежение в виде кисты, с четкими границами
	=наличие мелких полостей, разделенных костными перегородками
	~разрушение кортикального слоя бесструктурным очагом разрежения, рассасывание верхушек корней зубов
	~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
}

// question: 4137317 name: Для рентгенологической картины амелобластомы в большинстве случаев характерно:
::Для рентгенологической картины амелобластомы в большинстве случаев характерно\:::[html]Для рентгенологической картины амелобластомы в большинстве случаев характерно\:{
	=Ячеистое строение образования
	~Уплотнение костной ткани
	~Разряжение без четких контуров
	~Наличие зуба в полости образования
}

// question: 4137957 name: Для склерозирующей терапии гемангиомы, расположенной в глубине мягких тканей,...
::Для склерозирующей терапии гемангиомы, расположенной в глубине мягких тканей,...::[html]Для склерозирующей терапии гемангиомы, расположенной в глубине мягких тканей, не используется\:{

~70%этиловый спирт
~20% раствор натрия хлорида
~65% раствор глюкозы
=жидкий азот
}

// question: 4174702 name: ДЛЯ ТВЕРДОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В НЕЙ
::ДЛЯ ТВЕРДОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В НЕЙ::[html]ДЛЯ ТВЕРДОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В НЕЙ{
~незрелой фиброзной ткани
~зрелой фиброзной ткани, бедной коллагеном
=зрелой, богатой коллагеном фиброзной ткани
~жировой ткани
}

// question: 4123416 name: ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА – МЕЛАНОМА ПРИМЕНЯЮТ
::ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА – МЕЛАНОМА ПРИМЕНЯЮТ::[html]ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА – МЕЛАНОМА ПРИМЕНЯЮТ{
~пункционную биопсию
~инцизионную биопсию
=цитологическое исследование мазка отпечатка
~компьютерную томографию
}

// question: 4174853 name: ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА РАКА ЯЗЫКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ
::ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА РАКА ЯЗЫКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ::[html]ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА РАКА ЯЗЫКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ{
~томография
~ангиография
~ляпароскопия
~иридодиагностика
=цитологическое исследование
}

// question: 4174854 name: ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА РАКА ЯЗЫКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ
::ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА РАКА ЯЗЫКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ::[html]ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА РАКА ЯЗЫКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ{
=биопсия
~томограф

~ангиография
~ляпароскопия
~иридодиагностика
}

// question: 4123467 name: ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА – ОПУХОЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ
::ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА – ОПУХОЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ::[html]ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА – ОПУХОЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ{
=прижизненное морфологическое исследование ткани опухоли
~ультразвуковую диагностику
~электромиографию
~электроодонтометрию
}

// question: 4123518 name: ДЛЯ ЦИЛИНДРОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ
::ДЛЯ ЦИЛИНДРОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ::[html]ДЛЯ ЦИЛИНДРОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ{
=боль в области опухоли
~длительный анамнез заболевания – до 10 лет
~большие размеры опухоли – до 20 см в диаметре
~гладкая поверхность опухоли
~толстая соединительнотканная капсула
}

// question: 4123519 name: ДЛЯ ЦИЛИНДРОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ
::ДЛЯ ЦИЛИНДРОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ::[html]ДЛЯ ЦИЛИНДРОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ{
~поражение ветвей лицевого нерва
~очень медленный рост
~отсутствие капсулы
=некроз тканей железы в зоне роста опухоли
}

// question: 4123503 name: ДЛЯ ЭПУЛИСА ТИПА АНГИОМЫ ХАРАКТЕРНЫ
::ДЛЯ ЭПУЛИСА ТИПА АНГИОМЫ ХАРАКТЕРНЫ::[html]ДЛЯ ЭПУЛИСА ТИПА АНГИОМЫ ХАРАКТЕРНЫ{
~ярко красная окраска, относительно медленный рост
=синюшная окраска, быстрый рост, кровоточивость при травме
~бледная окраска, плотная консистенция, медленный рост
~широкое основание, синюшно багровый цвет с коричневым оттенком
}

// question: 4123341 name: ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~склонностью к инвазивному росту
	=склонностью к экспансивному росту
	~склонностью к прорастанию сосудов и нервов
	~склонностью к быстрому росту
}

// question: 4123329 name: ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ ОДНОГО
::ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ ОДНОГО::[html]ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВСЕМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ ОДНОГО{
	~медленным ростом, четким отграничением от окружающих тканей
	~длительным сохранением подвижности, иногда капсулой
	~имеет один или несколько злокачественных аналогов
	=быстро увеличивается, обладает инвазивным ростом
}

// question: 4123296 name: Доброкачественной формой лангергансоклеточного гистиоцитоза является:
::Доброкачественной формой лангергансоклеточного гистиоцитоза является\:::[html]Доброкачественной формой лангергансоклеточного гистиоцитоза является\:{
	~Болезнь Розаи-Дорфмана
	~Болезнь Абта-Летерера-Зиве
	~Болезнь Хенда-Крсчиена-Шюллера
	=Эозинофильная гранулема
}

// question: 4123508 name: ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ - АДЕНОМЫ ПРОИСХОДЯТ
::ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ - АДЕНОМЫ ПРОИСХОДЯТ::[html]ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ - АДЕНОМЫ ПРОИСХОДЯТ{
	~из соединительнотканной капсулы слюнной железы
	~из стромы железы
	~из лимфатических узлов, залегающих в толще железы
	=из паренхимы слюнной железы
}

// question: 4137938 name: Дополнительным методом исследования, проводимым для уточнения диагноза ...

::Дополнительным методом исследования, проводимым для уточнения диагноза ...::[html]Дополнительным методом исследования, проводимым для уточнения диагноза «злокачественное новообразование челюстно-лицевой области» относится{
~физикальный
~биохимический
=гистологический
~ангиографический
}

// question: 4137251 name: Дополнительным методом обследования для диагностики злокачественных ...
::Дополнительным методом обследования для диагностики злокачественных ...::[html]Дополнительным методом обследования для диагностики злокачественных образований является\:{
=Цитологический
~Иммунологический
~Биохимический
~Бактериологический
}

// question: 4137252 name: Дополнительным методом обследования для диагностики злокачественных ...
::Дополнительным методом обследования для диагностики злокачественных ...::[html]Дополнительным методом обследования для диагностики злокачественных образований является\:{
=Гистологический
~Иммунологический
~Биохимический
~Бактериологический
}

// question: 4123525 name: ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ
::ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ::[html]ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ{
~быстрый рост, паралич мимической мускулатуры
~спаянность ткани опухоли с окружающей ее паренхимой железы, боль
=длительный анамнез заболевания, медленный рост, отсутствие боли
~медленный, в течение нескольких лет рост, а затем быстрое увеличение опухоли
}

// question: 4137260 name: Заболевание лейкоплакия относится:
::Заболевание лейкоплакия относится\:::[html]Заболевание лейкоплакия относится\:{
	~	Хейлиту
	=	Факультативному предраку
	~	Облигатному предраку
	~	Дерматозу
}

// question: 4123258 name: Замещение дифференцированных клеток клетками с недостаточной степенью ...
::Замещение дифференцированных клеток клетками с недостаточной степенью ...::[html]Замещение дифференцированных клеток клетками с недостаточной степенью дифференцировки называется\:{
	=Катаплазия
	~Метаплазия
	~Анаплазия
	~Автономность
}

// question: 4123259 name: Замещение дифференцированных клеток недифференцированными называется:
::Замещение дифференцированных клеток недифференцированными называется\:::[html]Замещение дифференцированных клеток недифференцированными называется\:{
	~Катаплазия
	~Метаплазия
	=Анаплазия
	~Автономность
}

// question: 4123257 name: Замещение дифференцированных клеток одного типа дифференцированными клетками ...
::Замещение дифференцированных клеток одного типа дифференцированными клетками ...::[html]Замещение дифференцированных клеток одного типа дифференцированными клетками другого типа называется\:{
	~Катаплазия
	=Метаплазия
	~Анаплазия
	~Автономность
}

// question: 4123460 name: ЗАПУЩЕННУЮ ФОРМУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЛЕЧАТ

::ЗАПУЩЕННУЮ ФОРМУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЛЕЧАТ::[html]ЗАПУЩЕННУЮ ФОРМУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЛЕЧАТ{
~физиотерапевтическими методами
=паллиативными методами
~путем проведения расширенной операции
~путем криодеструкции опухоли
}

// question: 4123402 name: ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ КОЖИ ЛИЦА РАЗМЕРОМ ДО 2 СМ В НАИБОЛЬШЕМ...
::ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ КОЖИ ЛИЦА РАЗМЕРОМ ДО 2 СМ В НАИБОЛЬШЕМ...::[html]ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ КОЖИ ЛИЦА РАЗМЕРОМ ДО 2 СМ В НАИБОЛЬШЕМ ИЗМЕРЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК{
~T3
~T2
=T1
~Tis
}

// question: 4123516 name: ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
::ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ::[html]ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ{
~онкоцитоз
~лимфаденома
=аденокарцинома
~плеоморфная аденома
~мономорфная аденома
}

// question: 4123490 name: ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ
::ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ::[html]ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ{
=моляры и премоляры нижней челюсти
~моляры и премоляры верхней челюсти
~фронтальные зубы верхней челюсти
~мыщелковый отросток нижней челюсти
}

// question: 4123392 name: ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ БАЗАЛИОМЫ
::ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ БАЗАЛИОМЫ::[html]ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ БАЗАЛИОМЫ{

=в области естественных складок лица, параорбитальной области, спинке и крыльях носа
~на волосистой части головы
~на ушных раковинах
~в щечных областях и передней поверхности шеи
}

// question: 4123542 name: ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПАПИЛЛОМЫ В ПОЛОСТИ РТА
::ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПАПИЛЛОМЫ В ПОЛОСТИ РТА::[html]ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПАПИЛЛОМЫ В ПОЛОСТИ РТА{
~Небные дужки и миндалины
~Мягкое небо
~Кончик языка
=Спинка языка
}

// question: 4123502 name: ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭПУЛИСА
::ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭПУЛИСА::[html]ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭПУЛИСА{
~мягкое небо
~твердое небо
=альвеолярный отросток верхней или нижней челюстей
~край нижней челюсти на уровне тела
}

// question: 4123346 name: ИНЦИЗИОННАЯ БИОПСИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
::ИНЦИЗИОННАЯ БИОПСИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ::[html]ИНЦИЗИОННАЯ БИОПСИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ{
~толстой инъекционной иглой
~путем контакта предметного стекла с поверхностью опухоли
=острым скальпелем или щипцами для биопсии
~при помощи диатермокоагулятора
}

// question: 4137962 name: Истинная доброкачественная опухоль это:
::Истинная доброкачественная опухоль это\:::[html]Истинная доброкачественная опухоль это\:{
~глобуломаксиллярная киста
~синдром Олбрайта
=оссифицирующая фиброма
~травматическая костная киста
}

// question: 4137958 name: Истинной доброкачественной опухолью является:
::Истинной доброкачественной опухолью является\:::[html]Истинной доброкачественной опухолью является\:{
	~эозинофильная гранулема
	=остеома
	~херувизм
	~фолликулярная киста
}

// question: 4137964 name: Истинной доброкачественной опухолью является:
::Истинной доброкачественной опухолью является\:::[html]Истинной доброкачественной опухолью является\:{
	~эозинофильная гранулема
	=гигантоклеточный эпулис
	~травматическая костная киста
	~фиброзная дисплазия
}

// question: 4137967 name: Истинной доброкачественной опухолью является:
::Истинной доброкачественной опухолью является\:::[html]Истинной доброкачественной опухолью является\:{
	~фиброзная дисплазия
	~экзостоз
	~околокорневая воспалительная киста
	=остеокластома
}

// question: 4137982 name: Истинной доброкачественной опухолью является:
::Истинной доброкачественной опухолью является\:::[html]Истинной доброкачественной опухолью является\:{
	~эозинофильная гранулема
	=остеома
	~херувизм
	~фолликулярная киста
}

// question: 4123310 name: Источником злокачественного роста является:
::Источником злокачественного роста является\:::[html]Источником злокачественного роста является\:{
	~Аденолимфома
	=Цилиндрома

~Ранула
~Цистаденома
}

// question: 4123420 name: К ВЕРОЯТНЫМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА ГУБЫ ОТНОСЯТ
::К ВЕРОЯТНЫМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА ГУБЫ ОТНОСЯТ::[html]К ВЕРОЯТНЫМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА ГУБЫ ОТНОСЯТ{
~ионизирующее излучение
~влажный климат
~врожденные пороки развития губы
=курение, хроническую травму, повышенную инсоляцию
}

// question: 4174640 name: К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА ...
::К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА ...::[html]К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА "ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ" ОТНОСИТСЯ{
~физикальный
~биохимический
=цитологический
~иммунологический
~ангиографический
}

// question: 4174641 name: К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА ...
::К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА ...::[html]К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА "ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ" ОТНОСИТСЯ{
~физикальный
~биохимический
=гистологический
~ангиографический
~иммунологический
}

// question: 4123509 name: К ЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ

::К ЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ::[html]К ЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ{
	~липому
	~ангиому
	~цилиндрому
	=смешанную опухоль (плеоморфную аденому)
}

// question: 4123510 name: К ЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ
::К ЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ::[html]К ЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ{
	~мукоэпидермоидную опухоль
	=аденому
	~цилиндрому
	~невриному
}

// question: 4174700 name: К ИСТИННЫМ ОПУХОЛЯМ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ
::К ИСТИННЫМ ОПУХОЛЯМ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ::[html]К ИСТИННЫМ ОПУХОЛЯМ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ{
	~эпулис
	=твердую фиброму
	~фиброматоз десен
	~липому
	~гемангиому
}

// question: 4174701 name: К ИСТИННЫМ ОПУХОЛЯМ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ
::К ИСТИННЫМ ОПУХОЛЯМ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ::[html]К ИСТИННЫМ ОПУХОЛЯМ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ{
	~эпулис
	~мягкую фиброму
	=фиброматоз десен
	~плеаморфную аденому
	~липому
}

// question: 4137299 name: К истинным опухолям из фиброзной ткани относят:
::К истинным опухолям из фиброзной ткани относят\:::[html]К истинным опухолям из фиброзной ткани относят\:{
	=Твердую фиброму
	~Эпулис
	~Фиброматоз десен

~Пародонтоз
}

// question: 4137936 name: К какой группе можно отнести амелобластому:
::К какой группе можно отнести амелобластому\:::[html]К какой группе можно отнести амелобластому\:{
~предрак
~опухолеподобных образований
=доброкачественных одонтогенных опухолей
~злокачественных одонтогенных опухолей
}

// question: 4123343 name: К КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ
::К КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ::[html]К КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ{
~сенсибилизацию организма
~интоксикацию организма
=ультрафиолетовое излучение
~длительную гипоксию тканей
}

// question: 4123411 name: К МЕЛАНОМООПАСНЫМ ПИГМЕНТНЫМ НЕВУСАМ ОТНОСЯТ
::К МЕЛАНОМООПАСНЫМ ПИГМЕНТНЫМ НЕВУСАМ ОТНОСЯТ::[html]К МЕЛАНОМООПАСНЫМ ПИГМЕНТНЫМ НЕВУСАМ ОТНОСЯТ{
~пограничный пигментный невус
~синий (голубой) невус
~гигантский пигментный невус
=ограниченный меланоз Дюбрея
}

// question: 4123511 name: К НЕЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ
::К НЕЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ::[html]К НЕЗРЕЛЫМ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСЯТ{
~аденолимфому
=цилиндрому
~саркому
~аденому
}

// question: 4137255 name: К облигатному предраку относится форма лейкоплакии:

::К облигатному предраку относится форма лейкоплакии\:::[html]К облигатному предраку относится форма лейкоплакии\:{
~ Мягкая
~ Эрозивно-язвенная
~ Плоская
~ Теппейнера
}

// question: 4137280 name: К облигатному предраку слизистой оболочки полости рта относят:
::К облигатному предраку слизистой оболочки полости рта относят\:::[html]К облигатному предраку слизистой оболочки полости рта относят\:{
~ хроническую трещину губы
~ кожный рог красной каймы губ
= болезнь Боуэна
~ лучевой мукозит
~ декубитальную язву языка
}

// question: 4123388 name: К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ КОЖИ ОТНОСЯТ
::К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ КОЖИ ОТНОСЯТ::[html]К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ КОЖИ ОТНОСЯТ{
~кожный рог
~туберкулезную волчанку
=болезнь Боуэна и пигментную ксеродерму
~трофические язвы
}

// question: 4137986 name: К одонтогенным опухолям относится:
::К одонтогенным опухолям относится\:::[html]К одонтогенным опухолям относится\:{
~эозинофильная гранулема
=амелобластома
~хондрома
}

// question: 4174721 name: К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА ОТНОСЯТСЯ
::К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА ОТНОСЯТСЯ::[html]К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА ОТНОСЯТСЯ{
~рожистое воспаление
~термический и химические ожоги
~бородавчатый предрак, ограниченный пред- раковый гиперкератоз, хейлит Манганотти

=болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма актинический кератоз, предраковый меланоз
}

// question: 4174726 name: К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТСЯ
::К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТСЯ::[html]К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТСЯ{
~рожистое воспаление
~термический и химические ожоги
=бородавчатый предрак, ограниченный пред- раковый гиперкератоз, хейлит Манганотти
~болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма актинический кератоз, предраковый меланоз
~эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, подслизистый фиброз
}

// question: 4174725 name: К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТСЯ
::К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТСЯ::[html]К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТСЯ{
~рожистое воспаление
~термический и химические ожоги
~бородавчатый предрак, ограниченный пред- раковый гиперкератоз, хейлит Манганотти
~болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма актинический кератоз, предраковый меланоз
=эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, подслизистый фиброз
}

// question: 4123253 name: К ранним осложнениям лучевой терапии относится:
::К ранним осложнениям лучевой терапии относится\:::[html]К ранним осложнениям лучевой терапии относится\:{
~Остеонекроз
~Тризм жевательной мускулатуры
=Мукозит
~Снижение вкусовой чувствительности
}

// question: 4123362 name: К ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ
::К ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ::[html]К ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ{
	=бородавчатого предрака
	~кератоакантомы
	~кожного рога
	~папилломы с ороговением
	~постлучевого хейлита
}

// question: 4123345 name: К ФИЗИЧЕСКИМ КАНЦЕРОГЕНАМ ОТНОСЯТ
::К ФИЗИЧЕСКИМ КАНЦЕРОГЕНАМ ОТНОСЯТ::[html]К ФИЗИЧЕСКИМ КАНЦЕРОГЕНАМ ОТНОСЯТ{
	~полициклические ароматические углеводороды
	~грибы, гормоны, желчные кислоты
	=рентгеновское излучение
	~курение
}

// question: 4174646 name: К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ...
::К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ...::[html]К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСЯТ{
	~химиотерапию
	~лучевую терапию
	=иссечение опухоли
	~комбинированное лечение
	~симптоматическую терапию
}

// question: 4174647 name: К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ...
::К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ...::[html]К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСЯТ{
	~химиотерапию
	=криодеструкция
	~лучевую терапию
	~комбинированное лечение
	~симптоматическую терапию
}

// question: 4174648 name: К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ...
::К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ...::[html]К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСЯТ{
	~химиотерапию
	=СВЧ-гипертермию
	~лучевую терапию
	~комбинированное лечение
	~симптоматическую терапию
}

// question: 4174872 name: К ЭНДОФИТНОЙ ФОРМЕ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ОТНОСЯТ
::К ЭНДОФИТНОЙ ФОРМЕ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ОТНОСЯТ::[html]К ЭНДОФИТНОЙ ФОРМЕ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ОТНОСЯТ{
	~папиллярную
	~бородавочную
	~некротическую
	=язвенно-инфильтративную, инфильтративную
}

// question: 4137282 name: К экзогенным факторам развития лейкоплакии относится:
::К экзогенным факторам развития лейкоплакии относится\:::[html]К экзогенным факторам развития лейкоплакии относится\:{
	~ ВПЧ
	= Гальваноз полости рта
	~ Наследственная предраспаложенность
	~ Заболевание ЖКТ
}

// question: 4174871 name: К ЭКЗОФИТНОЙ ФОРМЕ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ОТНОСЯТ
::К ЭКЗОФИТНОЙ ФОРМЕ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ОТНОСЯТ::[html]К ЭКЗОФИТНОЙ ФОРМЕ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ОТНОСЯТ{
	~язвенную
	~инфильтративную
	~язвенно-инфильтративную
	=папиллярную, бородавочную
}

// question: 4123436 name: К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ...

::К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ...::[html]К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТ{
~хронические одонтогенные очаги инфекции
~врожденные незаращения твердого и мягкого неба
=курение, алкоголь, хроническую травму
~воспалительные заболевания пародонта
}

// question: 4123560 name: КАВЕРНОЗНАЯ ГЕМАНГИОМА
::КАВЕРНОЗНАЯ ГЕМАНГИОМА::[html]КАВЕРНОЗНАЯ ГЕМАНГИОМА{
=Бугристая, тестообразной консистенции
~С четкими контурами, плотно-эластичной консистенции
~Плотная, бугристая, с четкими границами
~Напряженная, с очагами размягчения
}

// question: 4137941 name: Как называется вид пластики местными тканями, при котором ткани переносят из ...
::Как называется вид пластики местными тканями, при котором ткани переносят из ...::[html]Как называется вид пластики местными тканями, при котором ткани переносят из отдаленного от дефекта места\:{
=Лоскутами на ножке
~Мобилизация краев раны
~Треугольными лоскутами
~Пересадка свободной кожи
}

// question: 4137283 name: Какой метод лечения показ при длительном течении плоской лейкоплакии без ...
::Какой метод лечения показ при длительном течении плоской лейкоплакии без ...::[html]Какой метод лечения показ при длительном течении плоской лейкоплакии без заметного клинического эффекта\:{
~ Витаминотерапия
~ Гипосенсибилизирующая терапия
~ Седативная терапия
= Хирургическое иссечение
}

// question: 4137972 name: Какую из опухолей не относят к амелобластомам?
::Какую из опухолей не относят к амелобластомам?::[html]Какую из опухолей не относят к амелобластомам?{
~амелобластическую фиброму

=твёрдую одонтому
~одонтоамелобластому
~аденоамелобластому
}

// question: 4137950 name: Какую опухоль не относят к группе фибром:
::Какую опухоль не относят к группе фибром\:::[html]Какую опухоль не относят к группе фибром\:{
~твердая фиброма
=гибернома
~десмоид
~гистиоцитома
}

// question: 4123563 name: КАПИЛЛЯРНАЯ ГЕМАНГИОМА РАЗВИВАЕТСЯ В ВИДЕ
::КАПИЛЛЯРНАЯ ГЕМАНГИОМА РАЗВИВАЕТСЯ В ВИДЕ::[html]КАПИЛЛЯРНАЯ ГЕМАНГИОМА РАЗВИВАЕТСЯ В ВИДЕ{
~Бугристого образования на коже или слизистой оболочке, красного цвета
~Пятна на коже или слизистой оболочке, коричневого цвета
=Пятна на коже ярко-красного или розового цвета
~Множественных сосудистых звездочек, красного цвета
}

// question: 4123267 name: Категории M1MAR соответствует наличие метастаза:
::Категории M1MAR соответствует наличие метастаза\:::[html]Категории M1MAR соответствует наличие метастаза\:{
~В головном мозге
~В легких
=В костном мозге
~В печени
}

// question: 4123280 name: Категории N2c по международной классификации TNM при плоскоклеточном раке ...
::Категории N2c по международной классификации TNM при плоскоклеточном раке ...::[html]Категории N2c по международной классификации TNM при плоскоклеточном раке полости рта соответствует обнаружение лимфатических узлов шеи\:{
~на стороне поражения, при этом два и более лимфатических узла имеют размеры в пределах 3 – 6 см в наибольшем измерении;
=на противоположной поражению стороне или на обеих сторонах, при этом два и более лимфатических узла имеют размеры в пределах 3 – 6 см в наибольшем измерении;

~на стороне поражения, при этом один лимфатический узел имеет размеры в пределах 3 – 6 см в наибольшем измерении;
~на стороне поражения, при этом один лимфатический узел имеет размеры в пределах 3 – 6 см во всех измерениях
}

// question: 4123266 name: Категории M1 BRA соответствует наличие метастаза:
::Категории M1 BRA соответствует наличие метастаза\:::[html]Категории M1 BRA соответствует наличие метастаза\:{
=В головном мозге
~В легких
~В костном мозге
~В печени
}

// question: 4123403 name: КАТЕГОРИЮ N, ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ НЕ СМЕЩАЕМЫЕ РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, МОЖНО ...
::КАТЕГОРИЮ N, ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ НЕ СМЕЩАЕМЫЕ РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, МОЖНО ...::[html]КАТЕГОРИЮ N, ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ НЕ СМЕЩАЕМЫЕ РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК{
~N1
~N2
=N3
~Nx
}

// question: 4123306 name: Кератокиста формируется при:
::Кератокиста формируется при\:::[html]Кератокиста формируется при\:{
~Кровоизлиянии во время травмы челюстей или зубов
~Воспалительном процессе в области периапикальных тканей зубов
=Возникновении опухолеподобного образования, исходящего из одонтогенного эпителия
~При затруднении прорезывания зубов
}

// question: 4123385 name: КЕРАТОПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ
::КЕРАТОПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ::[html]КЕРАТОПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ{
~токоферола ацетата
~ретинола ацетата
~солкосерила

=госсипола
~лизоцима
}

// question: 4123270 name: Клетки для проведения цитологического исследования забираются с помощью
::Клетки для проведения цитологического исследования забираются с помощью::[html]Клетки для проведения цитологического исследования забираются с помощью{
=Смыва
~Инцизионной биопсии
~Эксцизионной биопсии
~Трепан-биопсии
}

// question: 4174788 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~язвенным гингивитом, стоматитом
~периодическими воспалительными реакциями в виде периостита
~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
~плотным безболезненным бугристым выбуханием участка кости, подвижностью зубов
=зудом и кровоточивостью десен, подвижностью интактных зубов, атрофии десен, обнажением корней зубов
}

// question: 4174874 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА I СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА I СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА I СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~язвой до 2 см, распространяющейся до мышечного слоя, одиночные метастазы
=первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
~язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
~язвой распространяющейся на соседние органы, множественные регионарные и отдаленные метастазы
}

// question: 4174846 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА I СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА I СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА I СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	=первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
	~язвой до А.5-2 см, распространяющейся до мышечного слоя, односторонние метастазы
	~язвой распространяющейся на соседние органы множественные регионарные и отдаленные метастазы
	~язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
}

// question: 4174875 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА II СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА II СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА II СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	=язвой до 2 см, распространяющейся до мышечного слоя, одиночные метастазы
	~первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
	~язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
	~язвой распространяющейся на соседние органы, множественные регионарные и отдаленные метастазы
}

// question: 4174847 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА II СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА II СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА II СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
	=язвой до А.5-2 см, распространяющейся до мышечного слоя, односторонние метастазы
	~язвой распространяющейся на соседние органы множественные регионарные и отдаленные метастазы
	~язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
}

// question: 4174876 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА III СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА III СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА III СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~язвой до 2 см, распространяющейся до мышечного слоя, одиночные метастазы
	~первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
	=язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
	~язвой распространяющейся на соседние органы, множественные регионарные и отдаленные метастазы
}

// question: 4174848 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА III СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА III СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА III СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
	~язвой до А.5-2 см, распространяющейся до мышечного слоя, односторонние метастазы
	~язвой распространяющейся на соседние органы множественные регионарные и отдаленные метастазы
	=язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
}

// question: 4174877 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА IV СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА IV СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА IV СТАДИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~язвой до 2 см, распространяющейся до мышечного слоя, одиночные метастазы
	~первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
	~язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
	=язвой распространяющейся на соседние органы, множественные регионарные и отдаленные метастазы
}

// question: 4174849 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА IV СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА IV СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА IV СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~первичным очагом до 1 см, распространяющимся на всю глубину слизистой оболочки
~язвой до А.5-2 см, распространяющейся до мышечного слоя, односторонние метастазы
=язвой распространяющейся на соседние органы множественные регионарные и отдаленные метастазы
~язвой распространяющейся на соседние анатомические образования, множественные метастазы
}

// question: 4174740 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АНГИОМАТОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АНГИОМАТОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АНГИОМАТОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~ограниченным участком ороговения десны
=рыхлым безболезненным кровоточащим образованием десны, красного цвета
~плотным безболезненным образованием на широком основании
~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
~2-3 эррозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
}

// question: 4174745 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~болезненным дефектом костной ткани челюсти
=безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия
~рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны
~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
~2-3 эррозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
}

// question: 4174727 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ БОУЭНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ БОУЭНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ БОУЭНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ{
~2-3 эррозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации

~эррозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей
=атрофичных уплощенных бляшек покрытых кор- ками, "географический" рисунок
~ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками
~болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм
}

// question: 4174730 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ...
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ...::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ{
~2-3 эррозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
~эррозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей
~атрофичных уплощенных бляшек покрытых кор- ками, "географический" рисунок
~ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками
=болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм
}

// question: 4174772 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~рубцовой контрактурой
~бессимптомным течением
~периодическими воспалительными реакциями в виде периостита
~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
=плотным безболезненным бугристым выбуханием кости, подвижностью зубов в этой области
}

// question: 4174753 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
=безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия
~рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны

~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
~плотным безболезненным инфильтратом в области нескольких зубов
~2-3 эррозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
}

// question: 4174741 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~ограниченным участком ороговения десны
~рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны
~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
=синюшно-бурым бугристым образованием на десне мягкой консистенции
~2-3 эррозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
}

// question: 4174731 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРЕДРАКОВОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРЕДРАКОВОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРЕДРАКОВОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ{
~2-3 эррозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
~эррозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей
~атрофичных уплощенных бляшек покрытых кор- ками, "географический" рисунок
=ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками
~болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм
}

// question: 4174765 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~свищами на коже
~контрактурой челюстей
=бессимптомным течением
~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
~периодическими воспалительными реакциями в виде периостита
}

// question: 4174739 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~ограниченным участком ороговения десны
	~рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны
	=плотным безболезненным образованием на широком основании
	~плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
	~2-3 эррозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
}

// question: 4174732 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ{
	=2-3 эррозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
	~эррозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей
	~атрофичных уплощенных бляшек покрытых кор- ками, "географический" рисунок
	~ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками
	~болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм
}

// question: 4174803 name: КЛИНИЧЕСКИ ЛИМФАНГИОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗНОВИДНОСТЯМИ
::КЛИНИЧЕСКИ ЛИМФАНГИОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗНОВИДНОСТЯМИ::[html]КЛИНИЧЕСКИ ЛИМФАНГИОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗНОВИДНОСТЯМИ{
	~ячеистой, кистозной, литической
	=капиллярной, кавернозной, кистозной
	~полиморфной, мономорфной, пролиферативной
	~субпериостальной, периапикальной, костеобразующей
}

// question: 4174706 name: КЛИНИЧЕСКИ ФИБРОМА - ЭТО ОПУХОЛЬ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ НА
::КЛИНИЧЕСКИ ФИБРОМА - ЭТО ОПУХОЛЬ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ НА::[html]КЛИНИЧЕСКИ ФИБРОМА - ЭТО ОПУХОЛЬ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ НА{
	~ножке

=широком основании
~инфильтрированном основании
~язвенной поверхности
}

// question: 4174794 name: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ СХОДЫ С
::КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ СХОДЫ С::[html]КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ СХОДЫ С{
=невусом
~фибромой
~папилломой
~гиперемией кожи
}

// question: 4174793 name: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАПИЛЛЯРНОЙ ГЕМАНГИОМЫ СХОДЫ С
::КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАПИЛЛЯРНОЙ ГЕМАНГИОМЫ СХОДЫ С::[html]КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАПИЛЛЯРНОЙ ГЕМАНГИОМЫ СХОДЫ С{
=невусом
~липомой
~фибромой
~папилломой
~гиперемией кожи
}

// question: 4174889 name: КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА НИЖНЕПЕРЕДНЕГО НАРУЖНОГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ...
::КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА НИЖНЕПЕРЕДНЕГО НАРУЖНОГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ...::[html]КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА НИЖНЕПЕРЕДНЕГО НАРУЖНОГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (по ОНГРЕНУ) ЯВЛЯЮТСЯ{
~онемение и подвижность области премоляров и клыка
=подвижность моляров, ограничение открывания рта
~парастезия зоны 2-й ветви тройничного нерва, экзофтальм, смещение глазного яблока
~экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели боль в зоне иннервации нижнеглазничного нерва
}

// question: 4174888 name: КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА НИЖНЕПЕРЕДНЕГО ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ...

::КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА НИЖНЕПЕРЕДНЕГО ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ...::[html]КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА НИЖНЕПЕРЕДНЕГО ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (по ОНГРЕНУ) ЯВЛЯЮТСЯ{

=онемение и подвижность области премоляров и клыка

~подвижность моляров, ограничение открывания рта

~парастезия зоны 2-й ветви тройничного нерва, экзофтальм, смещение глазного яблока

~экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели боль в зоне иннервации нижнеглазничного нерва

}

// question: 4174891 name: КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЗАДНЕГО НАРУЖНОГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ...
::КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЗАДНЕГО НАРУЖНОГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ...::[html]КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЗАДНЕГО НАРУЖНОГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (по ОНГРЕНУ) ЯВЛЯЮТСЯ{

~онемение и подвижность области премоляров и клыка

~подвижность моляров, ограничение открывания рта

~парастезия зоны 2-й ветви тройничного нерва, экзофтальм, смещение глазного яблока

=экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели боль в зоне иннервации нижнеглазничного нерва

}

// question: 4174890 name: КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЗАДНЕГО ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ...
::КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЗАДНЕГО ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ...::[html]КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЗАДНЕГО ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (по ОНГРЕНУ) ЯВЛЯЮТСЯ{

~онемение и подвижность области премоляров и клыка

~подвижность моляров, ограничение открывания рта

=парастезия зоны 2-й ветви тройничного нерва, экзофтальм, смещение глазного яблока

~экзофтальм, диплопия, сужение глазной щели боль в зоне иннервации нижнеглазничного нерва

}

// question: 4123487 name: КЛИНИКА ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
::КЛИНИКА ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ::[html]КЛИНИКА ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ{

~чувство дискомфорта и ощущение выросшего зуба

~беспричинные, быстро стихающие боли в зубе или челюсти

=без клинических проявлений

~появление куполообразного выпячивания свода преддверия рта

}

// question: 4123513 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА «АДЕНОМЫ» ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОЧЕНЬ СХОЖА
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА «АДЕНОМЫ» ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОЧЕНЬ СХОЖА::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА «АДЕНОМЫ» ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОЧЕНЬ СХОЖА{
~со слюнной кистой железы
=с плеоморфной аденомой
~с аденокистозной карциномой (цилиндромой)
~с раком околоушной слюнной железы
}

// question: 4123413 name: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВОСПАЛИВШЕГОСЯ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА ПОХОЖА НА
::КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВОСПАЛИВШЕГОСЯ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА ПОХОЖА НА::[html]КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВОСПАЛИВШЕГОСЯ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА ПОХОЖА НА{
~базальноклеточный рак
~плоскоклеточный рак
~меланому
~пиогенную гранулему
=сибирскую язву
}

// question: 4137975 name: Клинически оссифицирующая фиброма челюстей протекает как:
::Клинически оссифицирующая фиброма челюстей протекает как\:::[html]Клинически оссифицирующая фиброма челюстей протекает как\:{
~остеома
~фиброма
~фибросаркома
=фиброзная остеодисплазия
}

// question: 4137266 name: Клинические симптомы бородавчатого предрака красной каймы губы:
::Клинические симптомы бородавчатого предрака красной каймы губы\:::[html]Клинические симптомы бородавчатого предрака красной каймы губы\:{
~ эрозия без эпителизации, некровоточащая, безболезненная при пальпации, ярко-красного цвета
~ бляшка, покрытая коркой с атрофическим уплощением в центре, плотная, безболезненная при пальпации, серовато-красного цвета

~ участок ороговения с тонкими плотно сидящими чешуйками, плотный, безболезненный при пальпации, серо-белого цвета

= плотный узелок с бугристой поверхностью, покрытый чешуйками, четко очерченный

}

// question: 4137264 name: Клинические симптомы хейлита Манганотти характеризуются наличием:

::Клинические симптомы хейлита Манганотти характеризуются наличием\:::[html]Клинические симптомы хейлита Манганотти характеризуются наличием\:{

= эрозии с гладкой некровоточащей поверхностью, ярко-красного цвета, неправильной формы, иногда с коркой на поверхности

~ эрозии с фибринозным налетом, неправильной формы, демаркационной линией по границе, слабоболезненной

~ пятнисто-узелковых поражений, красного цвета, с гладкой или бархатистой поверхностью, неправильной формы

~ бляшки неправильной формы, с четкими границами шероховатой поверхностью, белого цвета

}

// question: 4137279 name: Клинические симптомы эрозивной формы лейкоплакии

::Клинические симптомы эрозивной формы лейкоплакии::[html]Клинические симптомы эрозивной формы лейкоплакии{

= кровоточащая эрозия, 3 мм в диаметре на фоне молочно-белых бородавчатых разрастаний с четкими границами

~ эрозия неправильной формы, болезненная при пальпации, покрытая фибринозным налетом с четкой демаркационной линией с кератинезацией, вокруг отек и гиперемия слизистой оболочки

~ кровоточащая эрозия неправильной формы, болезненная при пальпации, покрытая фибринозным налетом, с белой полосовидной радиальной исчерченностью вокруг

}

// question: 4137981 name: Клиническими признаками, сходными с обострением хронического остеомиелита, ...

::Клиническими признаками, сходными с обострением хронического остеомиелита, ...::[html]Клиническими признаками, сходными с обострением хронического остеомиелита, характеризуется\:{

=саркома Юинга

~остеогенный саркома

~фиброзная дисплазия

~херувизм

}

// question: 4123355 name: КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ
::КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ::[html]КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ{
	~о гистологической структуре опухоли
	=о локализации и распространенности опухоли
	~о степени злокачественности опухоли
}

// question: 4123557 name: КОНСИСТЕНЦИЯ ЛИПОМЫ
::КОНСИСТЕНЦИЯ ЛИПОМЫ::[html]КОНСИСТЕНЦИЯ ЛИПОМЫ{
	~Плотноэластическая
	=Мягко-эластическая
	~Деревянистая
	~Хрящеподобная
}

// question: 4123312 name: Коричневый узелок, размером 2-5 мм, слегка возвышающийся на окружающей кожей....
::Коричневый узелок, размером 2-5 мм, слегка возвышающийся на окружающей кожей....::[html]Коричневый узелок, размером 2-5 мм, слегка возвышающийся на окружающей кожей. По его периферии определяется четко очерченный беспигментный ободок. Данная картина характерна для\:{
	~Меланомы
	~Эпидермального невуса
	=Дарье-подобного невуса
	~Гало-невуса
}

// question: 4123523 name: КОСВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДАЕТ
::КОСВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДАЕТ::[html]КОСВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДАЕТ{
	~ортопантомография
	=контрастная сиалография
	~бужирование протока слюнной железы
	~сиалометрия
}

// question: 4123475 name: КОСТНЫЕ ИГЛЫ – СПИКУЛЫ, ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ ЗА СЧЕТ

::КОСТНЫЕ ИГЛЫ – СПИКУЛЫ, ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ ЗА СЧЕТ::[html]КОСТНЫЕ ИГЛЫ – СПИКУЛЫ, ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ ЗА СЧЕТ{
~рассасывания кости челюсти и резкого утолщения надкостницы
~обызвествления костного мозга и рассасывания надкостницы
=построения кости вдоль сосудов отслоенной надкостницы
~концентрации солей кальция по ходу нервов надкостницы
}

// question: 4123408 name: КРИОГЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОТНОСЯТ ::КРИОГЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОТНОСЯТ::[html]КРИОГЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОТНОСЯТ{
~к физиотерапевтическому методу
=к хирургическому методу
~к химиотерапевтическому методу
~к консервативному методу
}

// question: 4123315 name: Лейкоплакия Таппейнера – это: ::Лейкоплакия Таппейнера – это\:::[html]Лейкоплакия Таппейнера – это\:{
~Появление четко ограниченных очагов повышенного ороговения, возвышающихся над окружающей слизистой оболочкой, по форме различают бляшечную и бородавчатую форму
=Образование очагов серовато-белого цвета, без четких границ, локализующихся преимущественно в области неба. Слизистая уплотнена, на фоне очага поражения видны множественные красные точки. Встречается только у курильщиков
~Образование бляшек серовато-белого цвета на боковых поверхностях языка. Характерно для ВИЧ-инфицированных пациентов
~Образование очага повышенного ороговения на слизистой оболочки щеки, не возвышающегося над окружающей слизистой оболочкой
}

// question: 4137301 name: Лейомиома – это опухоль из: ::Лейомиома – это опухоль из\:::[html]Лейомиома – это опухоль из\:{
=Гладкомышечной ткани
~Поперечнополосатой мышечной ткани
~Периферических нервов
~Центральной нервной системы
}

// question: 4123535 name: ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОВОДИТ

::ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОВОДИТ::[html]ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОВОДИТ{
	~стоматолог
	~челюстно-лицевой хирург
	=эндокринолог
	~ЛОР специалист
}

// question: 4137285 name: Лечение липомы заключается в:
::Лечение липомы заключается в\:::[html]Лечение липомы заключается в\:{
	=Хирургическом иссечении
	~Динамическом наблюдении
	~Лучевой терапии
	~Устранении причинного фактора
}

// question: 4123417 name: ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ЛИЦА
::ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ЛИЦА::[html]ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ЛИЦА{
	~диатермокоагуляция опухоли
	~иссечение очага поражения отступя 5 – 6 мм от края
	=иссечение опухоли, отступя от краев не менее 3 см + лимфаденэктомия
	~только лучевая терапия
	~химиотерапевтическое лечение
}

// question: 4123528 name: ЛЕЧЕНИЕ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ
::ЛЕЧЕНИЕ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ::[html]ЛЕЧЕНИЕ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ{
	~предоперационная лучевая терапия, энуклеация опухоли
	~предоперационная химиотерапия, резекция слюнной железы с опухолью
	=субтотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва
	~субтотальная паротидэктомия, фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи
}

// question: 4123533 name: ЛЕЧЕНИЕ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
::ЛЕЧЕНИЕ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ::[html]ЛЕЧЕНИЕ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ{

~резекцию опухоли с сохранением язычного и подъязычного нервов
=экстирпацию подчелюстной слюнной железы с опухолью
~энуклеацию опухоли с сохранением железы
~марсупилизацию поднижнечелюстной слюнной железы
}

// question: 4123552 name: ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОМЫ ПОЛОСТИ РТА
::ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОМЫ ПОЛОСТИ РТА::[html]ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОМЫ ПОЛОСТИ РТА{
=Иссечение
~Коагуляция
~Марсупилизация
~Экстирпация
}

// question: 4123334 name: ЛИМФОГЕННЫЙ ТИП МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН
::ЛИМФОГЕННЫЙ ТИП МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН::[html]ЛИМФОГЕННЫЙ ТИП МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН{
~для доброкачественной опухоли
~для опухолеподобных заболеваний
~для любой опухоли
=для злокачественной опухоли
}

// question: 4123290 name: Лимфома Беркитта относится к опухолям:
::Лимфома Беркитта относится к опухолям\:::[html]Лимфома Беркитта относится к опухолям\:{
~Низкой степени злокачественности;
~Промежуточной степени злокачественности;
~Высокой степени злокачественности;
=Крайне высокой степени злокачественности
}

// question: 4123292 name: Лимфома из клеток маргинальной зоны лимфатических узлов относится к опухолям:
::Лимфома из клеток маргинальной зоны лимфатических узлов относится к опухолям\:::[html]Лимфома из клеток маргинальной зоны лимфатических узлов относится к опухолям\:{
=Низкой степени злокачественности;
~Промежуточной степени злокачественности;
~Высокой степени злокачественности;
~Крайне высокой степени злокачественности
}

// question: 4123555 name: ЛИПОМА ОПУХОЛЬ ИЗ
::ЛИПОМА ОПУХОЛЬ ИЗ::[html]ЛИПОМА ОПУХОЛЬ ИЗ{
	~Сальных желез
	~Нервной ткани
	=Соединительной ткани
	~Эпителиальной ткани
}

// question: 4123556 name: ЛИПОМА РАСТЕТ
::ЛИПОМА РАСТЕТ::[html]ЛИПОМА РАСТЕТ{
	=Медленно
	~Быстро
	~Разрушая окружающие ткани
	~Прорастая ткани на своем пути
}

// question: 4174713 name: ЛИПОМА СОСТОИТ ИЗ ТКАНИ
::ЛИПОМА СОСТОИТ ИЗ ТКАНИ::[html]ЛИПОМА СОСТОИТ ИЗ ТКАНИ{
	=зрелой жировой
	~незрелой жировой
	~незрелой и зрелой жировой
	~фиброзной ткани
}

// question: 4137951 name: Липома, состоящая из бурого жира называется:
::Липома, состоящая из бурого жира называется\:::[html]Липома, состоящая из бурого жира называется\:{
	~фибролипома
	~мягкая липома
	~мезенхимома
	=гибернома
}

// question: 4123559 name: ЛИПОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С
::ЛИПОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С::[html]ЛИПОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С{
	=Эпидермальной кистой
	~Лимфаденитом
	~Сиалоаденитом
	~Папилломой
}

// question: 4123297 name: Лихорадка Пеля-Эберштейна характерна для:
::Лихорадка Пеля-Эберштейна характерна для\:::[html]Лихорадка Пеля-Эберштейна характерна для\:{
	~Кератокисты
	~Амелобластомы
	~Остеокластомы
	=Лимфогранулематоза
}

// question: 4137942 name: Лоскут на ножке при индийской пластике берут:
::Лоскут на ножке при индийской пластике берут\:::[html]Лоскут на ножке при индийской пластике берут\:{
	~С шеи
	=С лобной части
	~С щечной области
	~С губо-щечной складки
}

// question: 4123365 name: МАЛИГНИЗАЦИЯ БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА ПРОИСХОДИТ
::МАЛИГНИЗАЦИЯ БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА ПРОИСХОДИТ::[html]МАЛИГНИЗАЦИЯ БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА ПРОИСХОДИТ{
	~в течение 2-3х недель
	~в течение десяти лет и более
	~в течение 2-3х лет
	=в течение первого года заболевания
	~в течение 5-6 лет
}

// question: 4123409 name: МЕЛАНОМА – ОПУХОЛЬ, ОБРАЗОВАННАЯ ИЗ
::МЕЛАНОМА – ОПУХОЛЬ, ОБРАЗОВАННАЯ ИЗ::[html]МЕЛАНОМА – ОПУХОЛЬ, ОБРАЗОВАННАЯ ИЗ{
	~соединительной ткани
	~эпителия
	=пигментообразующих клеток
	~эндотелия кровеносных сосудов
}

// question: 4123414 name: МЕЛАНОМА КОЖИ ЛИЦА ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК
::МЕЛАНОМА КОЖИ ЛИЦА ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК::[html]МЕЛАНОМА КОЖИ ЛИЦА ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК{
	~глубокая язва с подрытыми краями

=темное (черное) пятно, выстоящее над поверхностью кожи, диаметром до 1,5 – 2,5 см
~яркое багровое пятно, округлой формы, бугристое, диаметром до 3 см
~язва с инфильтратом у ее основания, покрытая гнойными корочками
~болезненный конусовидный инфильтрат багрового цвета, покрытый корочкой
}

// question: 4123415 name: МЕЛАНОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ
::МЕЛАНОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ::[html]МЕЛАНОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ{
~только в регионарные лимфатические узлы
=внутрикожно, в легкие, печень, головной мозг, позвоночный столб
~метастазирование для меланомы не характерно
~в сердечную мышцу
}

// question: 4123410 name: МЕЛАНОМА ОБРАЗУЕТСЯ ИЗ
::МЕЛАНОМА ОБРАЗУЕТСЯ ИЗ::[html]МЕЛАНОМА ОБРАЗУЕТСЯ ИЗ{
~кавернозной гемангиомы
~папилломы
~бородавки
=пигментного невуса
}

// question: 4174685 name: МЕСТНЫМ ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЦИСТЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ
::МЕСТНЫМ ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЦИСТЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]МЕСТНЫМ ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЦИСТЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~миозит
=рецидив
~панкреатит
~инфаркт миокарда
}

// question: 4174903 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ{
~заглоточные
~подмышечные
~околояремные
~глубокие шейные
=поднижнечелюстные

}

// question: 4174901 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРОИСХОДИТ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ{
	~подмышечные
	~околояремные
	=глубокие шейные
	~подподбородочные
}

// question: 4123336 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ – ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ – ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ – ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ{
	~распространением клеток опухоли путем прорастания капсулы
	=распространением клеток опухоли с током лимфы и венозной крови
	~распространением клеток опухоли воздушно-капельным путем
	~распространением клеток опухоли по ходу нервных стволов
}

// question: 4123338 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ{
	=увеличением одного или нескольких регионарных лимфатических узлов
	~гиперплазией соединительной ткани
	~угнетением соединительной ткани
	~сильной болью в зоне роста опухоли
}

// question: 4123401 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ЛИЦА ОТМЕЧАЕТСЯ
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ЛИЦА ОТМЕЧАЕТСЯ::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ЛИЦА ОТМЕЧАЕТСЯ{
	=в 1 – 2% случаев
	~в 10 -20% случаев
	~у 50% больных

~у 90% больных
}

// question: 4123444 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ РАКА ЯЗЫКА ПРОИСХОДИТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ РАКА ЯЗЫКА ПРОИСХОДИТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ РАКА ЯЗЫКА ПРОИСХОДИТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ{
~в кости, печень и головной мозг
~в легкие
=в поверхностные и глубокие лимфатические узлы шеи
~в нижнюю челюсть, шейный отдел позвоночника
}

// question: 4123527 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ПРОИСХОДИТ
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ПРОИСХОДИТ::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ПРОИСХОДИТ{
~в поверхностные и глубокие лимфатические узлы шеи
~в кости таза, легкие, позвоночник
=смешанная опухоль никогда не метастазирует
~в головной мозг и сердце
}

// question: 4123331 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРНО
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРНО::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРНО{
~для опухолеподобных заболеваний
=для злокачественных опухолей
~для доброкачественных опухолей
~для любых опухолей
}

// question: 4123457 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОИСХОДИТ{
~преимущественно в отдаленные органы
=преимущественно в регионарные лимфатические узлы
~преимущественно в кости таза и позвоночника
~преимущественно в головной мозг
}

// question: 4123288 name: Метод взятия тканевого столбика с помощью специальной иглы и биопсийного ...
::Метод взятия тканевого столбика с помощью специальной иглы и биопсийного ...::[html]Метод взятия тканевого столбика с помощью специальной иглы и биопсийного пистолета называется\:{
	~Тонкоигольной пункцией
	~Инцизионной биопсией
	~Эксцизионной биопсией
	=Сердцевинной бопсией
}

// question: 4174881 name: МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ...
::МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ...::[html]МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ{
	=биопсия
	~томография
	~клиническое
	~ультразвуковое
	~рентгенологическое
}

// question: 4174860 name: МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ...
::МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ...::[html]МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ{
	~томография
	~клиническое
	=цитологическое
	~ультразвуковое
	~рентгенологическое
}

// question: 4174880 name: МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ...
::МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ...::[html]МЕТОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ{
	~томография
	~клиническое
	=цитологическое

~ультразвуковое
~рентгенологическое
}

// question: 4137968 name: Метод лечения врожденной боковой кисты шеи:
::Метод лечения врожденной боковой кисты шеи\:::[html]Метод лечения врожденной боковой кисты шеи\:{
=хирургический
~хирургический с последующей лучевой терапией
~криодеструкция
~лучевая терапия
}

// question: 4123504 name: МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЛЮБОГО ЭПУЛИСА
::МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЛЮБОГО ЭПУЛИСА::[html]МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЛЮБОГО ЭПУЛИСА{
~электрокоагуляция
~криодеструкция
=иссечение
~резекция альвеолярного отростка с эпулисом, отступя от краев по 1,0 см
}

// question: 4123429 name: МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГУБЫ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ НАЗЫВАЮТ
::МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГУБЫ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ НАЗЫВАЮТ::[html]МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГУБЫ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ НАЗЫВАЮТ{
~комплексный
=комбинированный
~двухэтапный
~радикальный
}

// question: 4123273 name: Методика, позволяющая выявить повышенную гликолитическую активность ткани ...
::Методика, позволяющая выявить повышенную гликолитическую активность ткани ...::[html]Методика, позволяющая выявить повышенную гликолитическую активность ткани злокачественной опухоли – это\:{
~Компьютерная томография
~ЯМР-томография
~Позитронно-эмиссионная томография
=Сонотомография
}

// question: 4123272 name: Методика, при которой для гистологического исследования опухоль удаляется ...
::Методика, при которой для гистологического исследования опухоль удаляется ...::[html]Методика, при которой для гистологического исследования опухоль удаляется целиком, называется\:{
	~Инцицизионная биопсия
	=Эксцизионная биопися
	~Трепан-биопсия
	~Сердцевинная биопсия
}

// question: 4137985 name: Методом лечения врожденной боковой кисты шеи является:
::Методом лечения врожденной боковой кисты шеи является\:::[html]Методом лечения врожденной боковой кисты шеи является\:{
	=хирургический
	~хирургический с последующей лучевой терапией
	~криодеструкция
	~лучевая терапия
}

// question: 4137940 name: Методом пластики по Лимбергу является перемещение лоскутов:
::Методом пластики по Лимбергу является перемещение лоскутов\:::[html]Методом пластики по Лимбергу является перемещение лоскутов\:{
	~На питающей ножке
	=Встречных треугольных
	~Круглого стебельчатого
	~На сосудистом анастамозе
}

// question: 4137269 name: Методы лечения абразивного хейлита Манганотти:
::Методы лечения абразивного хейлита Манганотти\:::[html]Методы лечения абразивного хейлита Манганотти\:{
	~ химиотерапия
	~ комбинированная терапия
	~ лучевая терапия
	~ хирургическое лечение
	= медикаментозная терапия
}

// question: 4137273 name: Методы лечения веррукозной лейкоплакии:

::Методы лечения веррукозной лейкоплакии\:::[html]Методы лечения веррукозной лейкоплакии\:{
= химиотерапия
~ криотерапия
~ лучевая терапия
~ хирургическое лечение
~ медикаментозная терапия
}

// question: 4137267 name: Методы лечения ограниченного предракового гиперкератоза:
::Методы лечения ограниченного предракового гиперкератоза\:::[html]Методы лечения ограниченного предракового гиперкератоза\:{
~ химиотерапия
~ комбинированная терапия
~ лучевая терапия
= хирургическое лечение
~ медикаментозная терапия
}

// question: 4137265 name: Методы обследования больных с предраковыми заболеваниями:
::Методы обследования больных с предраковыми заболеваниями\:::[html]Методы обследования больных с предраковыми заболеваниями\:{
~ опрос
~ осмотр
~ пальпация
= пункционная биопсия, инцизионная биопсия
~ эксцизионная биопсия
}

// question: 4123268 name: Микро-РНК способны выполнять функции:
::Микро-РНК способны выполнять функции\:::[html]Микро-РНК способны выполнять функции\:{
~Онкогенов
~Антионкогенов
=Как онкогенов, так и антионкогенов
~Не участвуют в процессе онкогенеза
}

// question: 4123254 name: Микроинсерция – это:
::Микроинсерция – это\:::[html]Микроинсерция – это\:{
~Замена нуклеотида

~Потеря нуклеотида
=Множественная репликация нуклеотида
~Инактивация нуклеотида
}

// question: 4123363 name: МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ БОУЭНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ БОУЭНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ БОУЭНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~папилломатозом
=дискератозом
~баллонирующей дегенерацией
~акантолизом
~спонгиозом
}

// question: 4174751 name: МЯГКАЯ ОДОНТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
::МЯГКАЯ ОДОНТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ::[html]МЯГКАЯ ОДОНТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ{
~предраков
~воспалительных заболеваний
~опухолеподобное образование
~злокачественных одонтогенных опухолей
=доброкачественных одонтогенных опухолей
}

// question: 4174761 name: МЯГКАЯ ОДОНТОМА СКЛОННА К ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЮ С ПЕРЕРОЖДЕНИЕМ В
::МЯГКАЯ ОДОНТОМА СКЛОННА К ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЮ С ПЕРЕРОЖДЕНИЕМ В::[html]МЯГКАЯ ОДОНТОМА СКЛОННА К ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЮ С ПЕРЕРОЖДЕНИЕМ В{
~остеосаркому
~лимфосаркому
~рак слизистой дна полости рта
=амелобластическую фибросаркому
}

// question: 4174755 name: МЯГКУЮ ОДОНТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::МЯГКУЮ ОДОНТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]МЯГКУЮ ОДОНТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~гемангиомой
~пародонтитом
=амелобластомой

~полиморфной аденомой
~остеомиелитом челюсти
}

// question: 4174756 name: МЯГКУЮ ОДОНТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::МЯГКУЮ ОДОНТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]МЯГКУЮ ОДОНТОМУ
СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~гемангиомой
~пародонтитом
~полиморфной аденомой
~остеомиелитом челюсти
=гигантоклеточной опухолью
}

// question: 4174757 name: МЯГКУЮ ОДОНТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::МЯГКУЮ ОДОНТОМУ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]МЯГКУЮ ОДОНТОМУ
СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
=миксомой
~пародонтитом
~гемангиомой
~полиморфной аденомой
~остеомиелитом челюсти
}

// question: 4123275 name: На методике протонного удара основано проведение
следующего исследования:
::На методике протонного удара основано проведение следующего
исследования\:::[html]На методике протонного удара основано проведение
следующего исследования\:{
~Компьютерной томографии
=ЯМР-томографии
~Позитронно-эмиссионной томографии
~Сонотомографии
}

// question: 4123541 name: НА ПОВЕРХНОСТИ ПАПИЛЛОМЫ ВСЕГДА ИМЕЕТСЯ
::НА ПОВЕРХНОСТИ ПАПИЛЛОМЫ ВСЕГДА ИМЕЕТСЯ::[html]НА ПОВЕРХНОСТИ
ПАПИЛЛОМЫ ВСЕГДА ИМЕЕТСЯ{
~Неизмененный эпителий
=Гиперпластический эпителий
~Гиперпластический эндотелий
~Истонченный до 2 – 3-х слоев эпителий
}

// question: 4123446 name: НА ТВЕРДОМ НЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАЗВИВАЮТСЯ ОПУХОЛИ
::НА ТВЕРДОМ НЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАЗВИВАЮТСЯ ОПУХОЛИ::[html]НА ТВЕРДОМ НЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАЗВИВАЮТСЯ ОПУХОЛИ{
	=из малых слюнных желез
	~плоскоклеточный рак
	~соединительнотканные опухоли – саркомы
	~опухоли из пигментных клеток
}

// question: 4137308 name: Наиболее грозным осложнением удаления боковой кисты шеи является:
::Наиболее грозным осложнением удаления боковой кисты шеи является\:::[html]Наиболее грозным осложнением удаления боковой кисты шеи является\:{
	=Повреждение крупных сосудов шеи
	~Парез лицевого нерва
	~Перелом подъязычной кости
	~Травма околоушной слюнной железы
}

// question: 4123458 name: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~межмышечная
	~цилиндроклеточная
	=плоскоклеточная
	~мукоэпидермоидная
	~смешанная
}

// question: 4123317 name: Наиболее распространенной формой базальноклеточного рака, из которой исходят ...
::Наиболее распространенной формой базальноклеточного рака, из которой исходят ...::[html]Наиболее распространенной формой базальноклеточного рака, из которой исходят все другие формы, является\:{
	~Поверхностная
	=Узловая
	~Язвенная
	~Рубцовая

}

// question: 4123375 name: НАИБОЛЬШЕЙ СКЛОННОСТЬЮ К МАЛИГНИЗАЦИИ ОБЛАДАЕТ
::НАИБОЛЬШЕЙ СКЛОННОСТЬЮ К МАЛИГНИЗАЦИИ ОБЛАДАЕТ::[html]НАИБОЛЬШЕЙ СКЛОННОСТЬЮ К МАЛИГНИЗАЦИИ ОБЛАДАЕТ{
	~веррукозная лейкоплакия
	=эрозивная лейкоплакия
	~плоская лейкоплакия
	~лейкоплакия Таппейнера
	~мягкая лейкоплакия
}

// question: 4123302 name: Найдите ошибку: В лимфатическом узле располагаются:
::Найдите ошибку\: В лимфатическом узле располагаются\:::[html]Найдите ошибку\: В лимфатическом узле располагаются\:{
	~Подкапсулярный синус
	~Воротный синус
	~Вставочные синусы
	=Циркулярные синусы
}

// question: 4123284 name: Найдите ошибку: Ранние метастазы в регионарные лимфатические узлы могут ...
::Найдите ошибку\: Ранние метастазы в регионарные лимфатические узлы могут ...::[html]Найдите ошибку\: Ранние метастазы в регионарные лимфатические узлы могут отмечаться при\:{
	~Меланоме;
	~Хемодектоме;
	~Лимфоэпителиоме;
	=Плоскоклеточном раке
}

// question: 4123309 name: Найдите ошибку: Ранние метастазы в регионарные лимфатические узлы могут ...
::Найдите ошибку\: Ранние метастазы в регионарные лимфатические узлы могут ...::[html]Найдите ошибку\: Ранние метастазы в регионарные лимфатические узлы могут отмечаться при\:{
	~Меланоме;
	=Базалиоме;
	~Лимфоэпителиоме;
	~Плоскоклеточном раке
}

// question: 4123264 name: Найдите ошибку: Феномен укорочения теломер при клеточном делении характерен для:
::Найдите ошибку\: Феномен укорочения теломер при клеточном делении характерен для\:::[html]Найдите ошибку\: Феномен укорочения теломер при клеточном делении характерен для\:{
	~Мезенхимальных стволовых клеток
	~Соматически здоровых клеток
	=Клеток злокачественных опухолей
	~Клеток доброкачественных опухолей
}

// question: 4123243 name: Найдите ошибку: Форма 027-2/у «Протокол на случай выявления у больного ...
::Найдите ошибку\: Форма 027-2/у «Протокол на случай выявления у больного ...::[html]Найдите ошибку\: Форма 027-2/у «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования» при впервые выявленном раке слизистой полости рта заполняется в случае, если диагноз устанавливается\:{
	=II стадии заболевания
	~III стадии заболевания
	~IV стадии заболевания
	~Посмертно
}

// question: 4137984 name: Наличие в полости кисты продуктов сальных и потовых желез характерно для кисты:
::Наличие в полости кисты продуктов сальных и потовых желез характерно для кисты\:::[html]Наличие в полости кисты продуктов сальных и потовых желез характерно для кисты\:{
	~срединной шеи
	~воспалительной корневой
	=дермоидной
	~прорезывания
}

// question: 4123289 name: Наличие при лейкозе двух групп увеличенных лимфоузлов, обнаружение в анализе ...
::Наличие при лейкозе двух групп увеличенных лимфоузлов, обнаружение в анализе ...::[html]Наличие при лейкозе двух групп увеличенных лимфоузлов, обнаружение в анализе крови повышенного содержания лимфоцитов, при отсутствии признаков анемии и тромбоцитопении, соответствует стадии развития заболевания\:{
	=A
	~B

~C
~D
}

// question: 4137297 name: Наружное отверстие бокового свища шеи располагается в:
::Наружное отверстие бокового свища шеи располагается в\:::[html]Наружное отверстие бокового свища шеи располагается в\:{
=Поднижнечелюстной области
~Подъязычной области
~Носоглотке
~Заушной области
}

// question: 4137316 name: Нарушение движения нижней губы после паротидэктомии наблюдается при ...
::Нарушение движения нижней губы после паротидэктомии наблюдается при ...::[html]Нарушение движения нижней губы после паротидэктомии наблюдается при повреждении ветви лицевого нерва\:{
=Краевой
~Скуловой
~Щечной
~Височной
}

// question: 4123319 name: Начальный период плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта ...
::Начальный период плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта ...::[html]Начальный период плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта протекает в виде\:{
~Язвенной формы
~Узловатой формы
~Папиллярной формы
=Всех перечисленных форм
}

// question: 4137277 name: не относится к методам лечения кератоакантомы:
::не относится к методам лечения кератоакантомы\:::[html]не относится к методам лечения кератоакантомы\:{
~ химиотерапия
~ криотерапия
~ лучевая терапия
~ хирургическое лечение
~ медикаментозная терапия

}

// question: 4137303 name: Невриномы – это доброкачественные опухоли из:
::Невриномы – это доброкачественные опухоли из\:::[html]Невриномы – это доброкачественные опухоли из\:{
	~Параганглионарных структур
	=Оболочки нерва
	~Клеток головного мозга
	~Нервных ганглиев
}

// question: 4137953 name: Неврогенные опухоли мягких тканей, которые развиваются из оболочек ...
::Неврогенные опухоли мягких тканей, которые развиваются из оболочек ...::[html]Неврогенные опухоли мягких тканей, которые развиваются из оболочек периферических нервов\:{
	~невриномы
	~нейрофибромы
	=невриномы и нейрофибромы
	~ганглионевромы
}

// question: 4137960 name: Неодонтогенной этиологии:
::Неодонтогенной этиологии\:::[html]Неодонтогенной этиологии\:{
	~цементома
	=мукоэпидермоидная опухоль
	~одонтома мягкая
	~одонтома твердая
}

// question: 4137983 name: Неодонтогенную этиологию имеет:
::Неодонтогенную этиологию имеет\:::[html]Неодонтогенную этиологию имеет\:{
	~цементома
	~одонтома мягкая
	~одонтома твёрдая
	=мукоэпидермоидная опухоль
}

// question: 4137965 name: Нестабильные размеры, склонность к воспалению характерны для:
::Нестабильные размеры, склонность к воспалению характерны для\:::[html]Нестабильные размеры, склонность к воспалению характерны для\:{

~гемангиомы
=лимфангиомы
~фибромы
~остеомы
}

// question: 4123265 name: Низкодифференцированная опухоль соответствует категории:
::Низкодифференцированная опухоль соответствует категории\:::[html]Низкодифференцированная опухоль соответствует категории\:{
~G1
~G2
=G3
~G4
}

// question: 4123305 name: Облигатным предраком является (из перечисленных):
::Облигатным предраком является (из перечисленных)\:::[html]Облигатным предраком является (из перечисленных)\:{
~Плоская лейкоплакия
=Болезнь Боуэна
~Актинический хейлит
~Ромбовидный глоссит
}

// question: 4123295 name: Обнаружение на рентгенограмме очагов деструкции, имеющих «кружевной» рисунок,...
::Обнаружение на рентгенограмме очагов деструкции, имеющих «кружевной» рисунок,...::[html]Обнаружение на рентгенограмме очагов деструкции, имеющих «кружевной» рисунок, округлые, сглаженные четкие края, располагающийся в области альвеолярного края, при этом корни зубов как бы полностью «висят в воздухе», характерно для\:{
~Радикулярной кисты
~Кератокисты
~Амелобластомы
=Эозинофильной гранулемы
}

// question: 4123276 name: Обработка биопсийного материала ДНК-зондами называется:
::Обработка биопсийного материала ДНК-зондами называется\:::[html]Обработка биопсийного материала ДНК-зондами называется\:{
~Жидкая биопсия

~Иммуногистохимия
=FISH-гибридизация
~Core-биопсия
}

// question: 4123316 name: Объем хирургического вмешательства при амелобластме состоит в:
::Объем хирургического вмешательства при амелобластме состоит в\:::[html]Объем хирургического вмешательства при амелобластме состоит в\:{
~Выскабливании очага поражения в пределах здоровых тканей
=Резекции нижней челюсти, отступя 1 см от границ очага поражения
~Резекция ½ нижней челюсти с экзартикуляцией
~Резекция ½ нижней челюсти с экзартикуляцией и удалением содержимого поднижнечелюстного треугольника на стороне поражения
}

// question: 4123456 name: ОГРАНИЧЕНИЕ РАСКРЫВАНИЯ РТА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВЯЗАНО
::ОГРАНИЧЕНИЕ РАСКРЫВАНИЯ РТА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВЯЗАНО::[html]ОГРАНИЧЕНИЕ РАСКРЫВАНИЯ РТА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВЯЗАНО{
~с прорастанием опухоли в полость височно-нижнечелюстного сустава
~с прорастанием опухоли в собственно жевательную мышцу
~с прорастанием опухоли в височную мышцу
=с прорастанием опухоли в медиальную крыловидную мышцу
}

// question: 4123373 name: ОГРАНИЧЕННЫЙ ОЧАГ НА КРАСНОЙ КАЙМЕ ГУБЫ ДО 1 СМ В ДИАМЕТРЕ, КОНУСОВИДНОЙ ...
::ОГРАНИЧЕННЫЙ ОЧАГ НА КРАСНОЙ КАЙМЕ ГУБЫ ДО 1 СМ В ДИАМЕТРЕ, КОНУСОВИДНОЙ ...::[html]ОГРАНИЧЕННЫЙ ОЧАГ НА КРАСНОЙ КАЙМЕ ГУБЫ ДО 1 СМ В ДИАМЕТРЕ, КОНУСОВИДНОЙ ФОРМЫ, ТЕМНО-СЕРОГО ЦВЕТА, ПЛОТНО СПАЯННЫЙ С ОСНОВАНИЕМ – ЭТО, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО{
=кожный рог
~бородавчатый предрак
~кератоакантома
~папиллома
~ограниченный гиперкератоз
}

// question: 4123368 name: ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРЕДРАКОВЫЙ ГИПЕРКЕРАТОЗ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

::ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРЕДРАКОВЫЙ ГИПЕРКЕРАТОЗ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ::[html]ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРЕДРАКОВЫЙ ГИПЕРКЕРАТОЗ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ{
~на мягком небе
~на слизистой оболочке щеки
~на боковой поверхности языка
~на слизистой оболочке дна полости рта
=на красной кайме губы
}

// question: 4174911 name: ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~операция Крайля
~операция по Бильроту
~операция Колдуэлл-Люка
=частичная резекция челюсти
}

// question: 4174900 name: ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ...
::ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ...::[html]ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~СВЧ-гипертермия
~операция Крайля
~операция по Бильроту
~операция Колдуэлл-Люка
=резекция верхней челюсти
}

// question: 4174862 name: ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ...
::ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ...::[html]ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ{
~операция Крайля
=СВЧ-гипертермия
~операция по Бильроту
~операция Колдуэлл-Люка
~склерозирующая терапия
}

// question: 4174868 name: ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~ретенционная киста
	=облигатный предрак
	~факультативный предрак
	~эпидермальная киста
	~хронический периодонтит
}

// question: 4174763 name: ОДОНТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
::ОДОНТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ::[html]ОДОНТОМА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ{
	~воспалительных заболеваний
	~опухолеподобное образование
	=пороков развития зубных тканей
	~злокачественных одонтогенных опухолей
	~доброкачественных одонтогенных опухолей
}

// question: 4137969 name: Одонтогенной опухолью является:
::Одонтогенной опухолью является\:::[html]Одонтогенной опухолью является\:{
	~миксома челюсти
	~эозинофильная гранулема
	=амелобластома
	~саркома Юинга
}

// question: 4123495 name: ОДОНТОМА МОРФОЛОГИЧЕСКИ СОСТОИТ ИЗ
::ОДОНТОМА МОРФОЛОГИЧЕСКИ СОСТОИТ ИЗ::[html]ОДОНТОМА МОРФОЛОГИЧЕСКИ СОСТОИТ ИЗ{
	=перемешанных зубных тканей, спаянных между собой цементом
	~эпителиальных образований напоминающих строение эмалевого органа
	~остеокластов и остеобластов
	~фиброзных узлов, серозных и кровяных кист
}

// question: 4123499 name: ОДОНТОМА НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
::ОДОНТОМА НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ::[html]ОДОНТОМА НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ{
	=в хирургическом лечении не нуждаются

~удаляется путем резекции челюсти в пределах здоровых тканей
~удаляется по типу энуклеации опухоли
}

// question: 4123498 name: ОДОНТОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С
::ОДОНТОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С::[html]ОДОНТОМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С{
~одонтогенной кистой
~амелобластомой
=остеомой
~центральным раком нижней челюсти
}

// question: 4174747 name: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "АМЕЛОБЛАСТОМА" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ
::ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "АМЕЛОБЛАСТОМА" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ::[html]ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "АМЕЛОБЛАСТОМА" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ{
~опроса
~цитологии
=гистологии
~анализов крови
~клинико-рентгенологического исследования
}

// question: 4174773 name: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ
::ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ::[html]ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ{
~опроса
~цитологии
=гистологии
~анализов крови
~клинико-рентгенологического исследования
}

// question: 4174754 name: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "МЯГКАЯ ОДОНТОМА" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ
::ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "МЯГКАЯ ОДОНТОМА" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ::[html]ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ "МЯГКАЯ ОДОНТОМА" СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ{
~опроса
~цитологии

=гистологии
~анализов крови
~клинико-рентгенологического исследования
}

// question: 4123404 name: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – БАЗАЛИОМА КОЖИ ЛИЦА МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕ
::ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – БАЗАЛИОМА КОЖИ ЛИЦА МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕ::[html]ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – БАЗАЛИОМА КОЖИ ЛИЦА МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕ{
~биохимического исследования плазмы крови
~компьютерной томографии
~пункционной биопсии
=инцизионной биопсии
~консультации дерматолога
}

// question: 4123405 name: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ ОРОГОВЕВАЮЩИЙ РАК КОЖИ ЛИЦА МОЖНО ...
::ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ ОРОГОВЕВАЮЩИЙ РАК КОЖИ ЛИЦА МОЖНО ...::[html]ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ ОРОГОВЕВАЮЩИЙ РАК КОЖИ ЛИЦА МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕ{
~компьютерной томографии
~консультации онколога
~консультации челюстно-лицевого хирурга
~консультации дерматолога
=инцизионной биопсии
}

// question: 4137328 name: Окончательный диагноз «амелобластома» ставится на основании данных:
::Окончательный диагноз «амелобластома» ставится на основании данных\:::[html]Окончательный диагноз «амелобластома» ставится на основании данных\:{
=Гистологии
~Цитологии
~Опроса
~Рентгена
}

// question: 4123237 name: Онкологическая клиника Московского университета была открыта на пожертвования:

::Онкологическая клиника Московского университета была открыта на пожертвования\:::[html]Онкологическая клиника Московского университета была открыта на пожертвования\:{
	~Д.А. Голицина
	~Н.А. Алексеев
	=В.А. Морозова
	~П.М. Третьяков
}

// question: 4137935 name: Онкологическая настороженность подразумевает знание:
::Онкологическая настороженность подразумевает знание\:::[html]Онкологическая настороженность подразумевает знание\:{
	~профессиональных вредностей
	~препаратов для лечения опухолей
	~допустимых доз лучевой терапии
	=специальных методов обследования, ранней диагностики
}

// question: 4123506 name: ОПЕРАЦИЯ ЦИСТОСТОМИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ
::ОПЕРАЦИЯ ЦИСТОСТОМИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ::[html]ОПЕРАЦИЯ ЦИСТОСТОМИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ{
	~вскрытие полости нагноившейся кисты
	~радикальное удаление оболочки кисты
	=прекращение роста кисты и постепенное уменьшение патологической полости
	~пломбирование полости кисты
}

// question: 4123422 name: ОПУХОЛЬ ГУБЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 2 СМ, НО НЕ БОЛЕЕ 4 СМ В НАИБОЛЬШЕМ ИЗМЕРЕНИИ ...
::ОПУХОЛЬ ГУБЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 2 СМ, НО НЕ БОЛЕЕ 4 СМ В НАИБОЛЬШЕМ ИЗМЕРЕНИИ ...::[html]ОПУХОЛЬ ГУБЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 2 СМ, НО НЕ БОЛЕЕ 4 СМ В НАИБОЛЬШЕМ ИЗМЕРЕНИИ ОТНОСЯТ ПО КЛАССИФИКАЦИИ TNM{
	~T1
	~T2
	=T3
	~T4
}

// question: 4123328 name: ОПУХОЛЬ ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ
::ОПУХОЛЬ ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ::[html]ОПУХОЛЬ ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ{
	~некрозом тканей пораженного органа

~секвестрацией костной ткани
=пролиферацией собственных клеток организма
~образованием гнойных метастазов
}

// question: 4174905 name: ОПУХОЛЬ, ПРИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИИ КОТОРОЙ РАЗВИВАЕТСЯ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ОПУХОЛЬ, ПРИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИИ КОТОРОЙ РАЗВИВАЕТСЯ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ОПУХОЛЬ, ПРИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИИ КОТОРОЙ РАЗВИВАЕТСЯ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
~миксома
~хондрома
~одонтома
=амелобластома
~остеокластома
}

// question: 4174683 name: ОРОНАЗАЛЬНАЯ ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ
::ОРОНАЗАЛЬНАЯ ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ::[html]ОРОНАЗАЛЬНАЯ ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ{
~оттеснивших полость носа
~нижней челюсти больших размеров
~оттеснивших верхнечелюстную пазуху
=прорастающих в верхнечелюстную пазуху
}

// question: 4174684 name: ОРОНАЗАЛЬНАЯ ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ
::ОРОНАЗАЛЬНАЯ ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ::[html]ОРОНАЗАЛЬНАЯ ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ{
~оттеснивших полость носа
~нижней челюсти больших размеров
~оттеснивших верхнечелюстную пазуху
=прорастающих в верхнечелюстную пазуху, в полости которой находится несколько интактных зубов
}

// question: 4174804 name: ОСНОВНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛИМФАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

::ОСНОВНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛИМФАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛИМФАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
~пульсация
=ее воспаление
~наличие флеболитов
~боль при пальпации
~атрофия пораженного органа
}

// question: 4174845 name: ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ЯЗЫКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
::ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ЯЗЫКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В::[html]ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ЯЗЫКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
~явлениях интоксикации
~повышении температуры
~некрозе слизистой оболочки
=болезненности первичного очага
~обострении хронических заболеваний
}

// question: 4174797 name: ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
=пульсация
~наличие флеболитов
~боль при пальпации
~болезненный инфильтрат
~эррозии без тенденции к кровоточивости
}

// question: 4174671 name: ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~боль
~симптом Венсана
~нарушение глотания
~плотное обизвествленное образование
=безболезненная деформация в виде вздутия

}

// question: 4174857 name: ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ...
::ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ...::[html]ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~воспалительный инфильтрат
	~язва без инфильтрации краев
	~эррозия без инфильтрации краев
	=изьязвляющийся инфильтрат спаянный с окружающими тканями
	~гиперемия и отек участка слизистой оболочки
}

// question: 4174659 name: ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВРОЖДЕННОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ
::ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВРОЖДЕННОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ::[html]ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВРОЖДЕННОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ{
	~уплотнения кожи на шее
	~повышение температуры тела
	~болей спастического характера
	~положительной тимоловой пробы
	=новообразования округлой формы
}

// question: 4174912 name: ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~гиперсаливация
	~обнажение кости
	=опухолевый инфильтрат
	~парез мимической мускулатуры
	~нарушение вкусовой чувствительности
}

// question: 4174913 name: ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{

~гиперсаливация
~обнажение кости
~парез мимической мускулатуры
~нарушение вкусовой чувствительности
=эррозия, язва с инфильтрированными краями
}

// question: 4174916 name: ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~гиперсаливация
~обнажение кости
=подвижность интактных зубов
~парез мимической мускулатуры
~эррозия, язва с инфильтрированными краями
}

// question: 4174696 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ НЕОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ НЕОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ НЕОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ{
~цистотомия
=цистэктомия
~криодеструкция
~частичная резекция челюсти
~половинная резекция челюсти
}

// question: 4174735 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ПРЕКАНЦЕРОЗНОГО ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ПРЕКАНЦЕРОЗНОГО ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ПРЕКАНЦЕРОЗНОГО ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
=криодеструкция
~лучевая терапия
~иссечение вместе с капсулой
}

// question: 4174750 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИЛИ С ТЯЖЕЛОЙ ...
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИЛИ С ТЯЖЕЛОЙ ...::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИЛИ С ТЯЖЕЛОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~химиотерапия
	~лучевая терапия
	~резекция челюсти
	=декомпрессионная цистотомия
	~выскабливание оболочки новообразования
}

// question: 4174749 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~цистэктомия
	~химиотерапия
	~лучевая терапия
	=резекция челюсти
	~выскабливание оболочки новообразования
}

// question: 4174728 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БОУЭНА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БОУЭНА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БОУЭНА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~химиотерапия
	=хирургический
	~комбинированное
	~лучевая терапия
	~иссечение вместе с капсулой
}

// question: 4174729 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БОУЭНА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БОУЭНА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БОУЭНА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~химиотерапия
	=криодеструкция
	~лучевая терапия
	~иссечение вместе с капсулой
}

// question: 4174733 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОРОДАВЧАТОГО ПРЕДРАКА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=иссечение
	~мануальный
	~химиотерапия
	~комбинированное
	~лучевая терапия
}

// question: 4174661 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ КИСТ И СВИЩЕЙ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ КИСТ И СВИЩЕЙ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ КИСТ И СВИЩЕЙ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~криотерапия
	~химиотерапия
	~лучевая терапия
	~динамическое наблюдение
	=оперативное вмешательство
}

// question: 4174663 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ{
	~перевязка
	=иссечение
	~прошивание
	~криодеструкция
	~склерозирование
}

// question: 4174776 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~химиотерапия
	~криодеструкция
	~комбинированное

=резекция челюсти
~выскабливание опухоли
}

// question: 4174777 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~блок-резекция челюсти
~выскабливание опухоли
~декомпрессионная цистотомия
=резекция челюсти с одномоментной костной пластикой
}

// question: 4174774 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~криодеструкция
~комбинированное
~выскабливание опухоли
=удаление опухоли в пределах здоровых тканей
}

// question: 4174775 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~криодеструкция
~комбинированное
~выскабливание опухоли
=блок-резекция челюсти
}

// question: 4174792 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОЙ ФОРМЫ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОЙ ФОРМЫ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОЙ ФОРМЫ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~выскабливание опухоли
~блок-резекция челюсти
=хирургическое и лучевая терапия
~резекция челюсти с одномоментной костной пластикой
}

// question: 4174677 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ{
=цистэктомия
~криодеструкция
~склерозирование
~частичная резекция челюсти
~половинная резекция челюсти
}

// question: 4174678 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ{
=цистотомия
~цистэктомия
~криодеструкция
~частичная резекция челюсти
~половинная резекция челюсти
}

// question: 4174805 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФАНГИОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
=иссечение
~прошивание
~лучевое воздействие
~склерозирующая терапия
~эмболизация с последующим иссечением
}

// question: 4174715 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИПОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИПОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИПОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~химиотерапия
	~криодеструкция
	~комбинированное
	~лучевая терапия
	=иссечение вместе с капсулой
}

// question: 4174758 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~цистэктомия
	~химиотерапия
	~лучевая терапия
	=блок-резекция челюсти
	~выскабливание оболочки новообразования
}

// question: 4174734 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРЕДРАКОВОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА КРАСНОЙ ...
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРЕДРАКОВОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА КРАСНОЙ ...::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРЕДРАКОВОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~химиотерапия
	=криодеструкция
	~комбинированное
	~лучевая терапия
	~иссечение вместе с капсулой
}

// question: 4174791 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ФОРМЫ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ФОРМЫ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ФОРМЫ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~химиотерапия
	~выскабливание опухоли
	=комбинированное лечение
	~декомпрессионная цистотомия

~резекция челюсти с одномоментной костной пластикой
}

// question: 4174882 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
~физиотерапия
~химиотерапия
~хирургический
~лучевая терапия
=комбинированный метод
}

// question: 4174917 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~лучевая терапия
~операция Крайля
=комбинированное лечение
~половинная резекция челюсти
}

// question: 4174861 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ{
~физиотерапия
~химиотерапия
~хирургический
~лучевая терапия
=комбинированный метод
}

// question: 4174850 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~хирургический
~лучевая терапия

=комбинированный метод
~склерозирующая терапия
}

// question: 4174829 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
=хирургический
~лучевая терапия
~криодиструкция
~склерозирующая терапия
}

// question: 4174768 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~комбинированное
~выскабливание опухоли
=удаление новообазования
}

// question: 4174743 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~криодеструкция
~лучевая терапия
~комбинированное
=иссечение новообразования
}

// question: 4174815 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ{

~химиотерапия
~комбинированное
~лучевая терапия
=хирургическое
}

// question: 4174707 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМ ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~лучевая терапия
~комбинированное
=иссечение в пределах здоровых тканей
}

// question: 4174711 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~лучевая терапия
~комбинированное
=иссечение новообразования вместе с надкостницей
}

// question: 4174712 name: ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ{
~химиотерапия
~лучевая терапия
~комбинированное
=иссечение образования
}

// question: 4174807 name: ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В ТЕЧЕНИИ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В ТЕЧЕНИИ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В ТЕЧЕНИИ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ{
~рецидив кисты
~острый пульпит
~перелом челюсти
=очаговое нарушение костеобразования
~хроническая травма слизистой оболочки альвеолярного отростка

}

// question: 4174767 name: ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~большие размеры
	~отдаленные метастазы
	=наличие клинических проявлений
	~метастазы в регионарные лимфоузлы
}

// question: 4174855 name: ОСНОВНЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ
::ОСНОВНЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ::[html]ОСНОВНЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
	~Крайля
	~Венсана
	~Редона
	~Колдуэлл-Люка
	=половинная резекция языка
}

// question: 4174636 name: ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ...
::ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ...::[html]ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~гиперсаливация
	~частичная адентия
	~массивные зубные отложения
	=хроническая травма слизистой оболочки
	~заболевания желудочно-кишечного тракта
}

// question: 4174637 name: ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ...
::ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ...::[html]ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~гиперсаливация

~частичная адентия
=предраковые заболевания
~массивные зубные отложения
~заболевания желудочно-кишечного тракта
}

// question: 4174737 name: ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ...
::ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ...::[html]ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ{
~рецидив кисты
~острый пульпит
~перелом челюсти
=хроническая травма слизистой оболочки альвеолярного отростка
}

// question: 4174738 name: ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ...
::ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ...::[html]ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ХРОНИЧЕСКАЯ ТРАВМА{
~языка
=десны
~челюсти
~нижнего носового хода
}

// question: 4174801 name: ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ{
=иссечение
~прошивание и лучевая терапия
~электрокоагуляция и лучевая терапия
~лучевая и склерозирующая терапия
}

// question: 4174802 name: ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

::ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~прошивание
	~электрокоагуляция
	~лучевое воздействие
	~склерозирующая терапия
	=эмболизация с последующим иссечением
}

// question: 4174799 name: ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~прошивание
	~электрорезекция
	~лучевое воздействие
	=склерозирующая терапия
	~криодеструкция, лазерокоагуляция
}

// question: 4174798 name: ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ ГЕМАНГИОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~прошивание
	~электрорезекция
	~лучевое воздействие
	~склерозирующая терапия
	=криодеструкция, лазерокоагуляция
}

// question: 4174800 name: ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~прошивание
	~электрорезекция
	=электрокоагуляция
	~лучевое воздействие
	~склерозирующая терапия
}

// question: 4174717 name: ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ{
	~вторичная адентия
	~острые воспалительные процессы мягких тканей лица
	=хроническая травма слизистой оболочки полости рта
	~острые воспалительные процессы костей лицевого скелета
}

// question: 4174719 name: ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ{
	=вредные привычки
	~вторичная адентия
	~острые воспалительные процессы мягких тканей лица
	~острые воспалительные процессы костей лицевого скелета
}

// question: 4174718 name: ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ{
	~вторичная адентия
	=профессиональные вредности
	~острые воспалительные процессы мягких тканей лица
	~острые воспалительные процессы костей лицевого скелета
}

// question: 4123236 name: Основателем Российского онкологического научного центра является:
::Основателем Российского онкологического научного центра является\:::[html]Основателем Российского онкологического научного центра является\:{
	~Л.Л. Левшин
	~Н.Н. Петров
	~П.А. Герцен
	=Н.Н. Блохин

}

// question: 4137272 name: Основной метод лечения папилломы языка:
::Основной метод лечения папилломы языка\:::[html]Основной метод лечения папилломы языка\:{
= иссечение
~ мануальный
~ химиотерапия
~ комбинированное
~ лучевая терапия
}

// question: 4137250 name: Основной причиной злокачественных образований слизистой полости рта являются:
::Основной причиной злокачественных образований слизистой полости рта являются\:::[html]Основной причиной злокачественных образований слизистой полости рта являются\:{
=Предраковые заболевания
~Массивные зубные отложения
~Заболевания желудочно-кишечного тракта
~Множественные кариозные полости
}

// question: 4123374 name: ОСНОВНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ПРИВОДЯЩИЙ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ
::ОСНОВНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ПРИВОДЯЩИЙ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ::[html]ОСНОВНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ПРИВОДЯЩИЙ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ{
~патология желудочно-кишечного тракта
~влияние неблагоприятных метеорологических воздействий
~нарушение обмена витамина «А»
=местные раздражающие факторы
~профессиональные вредности
}

// question: 4137270 name: Основные этиологические факторы возникновения предраковых заболеваний:
::Основные этиологические факторы возникновения предраковых заболеваний\:::[html]Основные этиологические факторы возникновения предраковых заболеваний\:{
~ вторичная адентия
= острые воспалительные процессы мягких тканей лица
~ хроническая травма слизистой оболочки полости рта

~ хронические воспалительные процессы костей лицевого скелета
}

// question: 4137988 name: Основным методом лечения больного с врожденным свищем шеи является его:
::Основным методом лечения больного с врожденным свищем шеи является его\:::[html]Основным методом лечения больного с врожденным свищем шеи является его\:{
~перевязка
=иссечение
~прошивание
~склерозирование
}

// question: 4137305 name: Основным методом лечения врождённых кист и свищей шеи является:
::Основным методом лечения врождённых кист и свищей шеи является\:::[html]Основным методом лечения врождённых кист и свищей шеи является\:{
=Хирургический
~Лучевая терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
}

// question: 4137307 name: Основным методом лечения врождённых свищей шеи является их:
::Основным методом лечения врождённых свищей шеи является их\:::[html]Основным методом лечения врождённых свищей шеи является их\:{
=Иссечение
~Перевязка
~Склерозирование
~Прошивание
}

// question: 4137335 name: Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли больших размеров является:
::Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли больших размеров является\:::[html]Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли больших размеров является\:{
=Резекция челюсти
~Выскабливание опухоли
~Цистэктомия

~Радикальная синусотомия
}

// question: 4137334 name: Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли является:
::Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли является\:::[html]Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли является\:{
=Блок-резекция челюсти
~Выскабливание опухоли
~Цистэктомия
~Радикальная синусотомия
}

// question: 4137989 name: Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является:
::Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является\:::[html]Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является\:{
=цистэктомия
~криодеструкция
~склерозирование
~частичная резекция челюсти
}

// question: 4137333 name: Основным методом лечения пациентов с амелобластомой является:
::Основным методом лечения пациентов с амелобластомой является\:::[html]Основным методом лечения пациентов с амелобластомой является\:{
=Резекция челюсти
~Лучевая терапия
~Цистэктомия
~Химиотерапия
}

// question: 4123245 name: Основным структурным подразделением онкологической сети является:
::Основным структурным подразделением онкологической сети является\:::[html]Основным структурным подразделением онкологической сети является\:{
~Онкологический кабинет
=Онкологический диспансер
~Диагностический центр
~Смотровой кабинет

}

// question: 4137258 name: Основными этиологическими факторами в возникновении предрака являются:
::Основными этиологическими факторами в возникновении предрака являются\:::[html]Основными этиологическими факторами в возникновении предрака являются\:{
	~	Острые воспалительные процессы костей лицевого отдела черепа
	~	Острые воспалительные процессы мягкий тканей лица
	~	Вторичная адентия и несостоятельные ортопедические конструкции
	=	Хроническая травма слизистой и вредные привычки
}

// question: 4174762 name: ОСОБЕННОСТЬЮ АМЕЛОБЛАСТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К
::ОСОБЕННОСТЬЮ АМЕЛОБЛАСТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К::[html]ОСОБЕННОСТЬЮ АМЕЛОБЛАСТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К{
	=инвазивному росту
	~неинвазивному росту
	~метастазированию в отдаленные лимфоузлы
	~метастазированию в регионарные лимфоузлы
}

// question: 4174778 name: ОСОБЕННОСТЬЮ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К
::ОСОБЕННОСТЬЮ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К::[html]ОСОБЕННОСТЬЮ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К{
	=озлокачествлению
	~неинвазивному росту
	~метастазированию в отдаленные лимфоузлы
	~метастазированию в регионарные лимфоузлы
}

// question: 4174834 name: ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~бруксизм
	~аллопеции
	~бессимптомное течение
	=способность к лимфогенному метастазированию
}

// question: 4174835 name: ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~бруксизм
	~аллопеции
	~бессимптомное течение
	=лейкоцитоз, повышение температуры
}

// question: 4174836 name: ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСОБЕННОСТЬЮ САРКОМЫ ЮИНГА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~бруксизм
	~аллопеции
	=цикличное течение
	~бессимптомное течение
}

// question: 4137329 name: Остеобластокластома - это:
::Остеобластокластома - это\:::[html]Остеобластокластома - это\:{
	=Доброкачественная опухоль челюстей, состоящая из остеобластов и остеокластов
	~Название процесса в челюсти, сопровождающегося резорбцией костной ткани
	~Название процесса в челюсти, происходящего при травматических переломах челюстей
	~Собирательное понятие, характеризующее деструктивные процессы в челюстях
}

// question: 4174930 name: ОСТЕОГЕННАЯ САРКОМА ЧЕЛЮСТЕЙ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::ОСТЕОГЕННАЯ САРКОМА ЧЕЛЮСТЕЙ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]ОСТЕОГЕННАЯ САРКОМА ЧЕЛЮСТЕЙ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
	~шейные
	~глубокие шейные
	~заглоточные и шейные
	=легкие и кости гематогенным путем
	~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
	~подподбородочные и поднижнечелюстные
}

// question: 4137980 name: Остеосаркома челюсти при пальпации ее:
::Остеосаркома челюсти при пальпации ее\:::[html]Остеосаркома челюсти при пальпации ее\:{

=болезненная
~безболезненная
~определяется флюктуация
~определяется симптом пергаментного хруста
}

// question: 4137979 name: Остеосаркома челюсти рано метастазирует в:
::Остеосаркома челюсти рано метастазирует в\:::[html]Остеосаркома челюсти рано метастазирует в\:{
~печень
=легкие
~селезенку
~почки
}

// question: 4137977 name: Остеосаркома челюсти у лиц пожилого возраста не встречается на фоне:
::Остеосаркома челюсти у лиц пожилого возраста не встречается на фоне\:::[html]Остеосаркома челюсти у лиц пожилого возраста не встречается на фоне\:{
~хронического остеомиелита
~остеобластомы
~предшествующей травмы
=остеомы
}

// question: 4137978 name: Остеосаркомы челюстей — это:
::Остеосаркомы челюстей — это\:::[html]Остеосаркомы челюстей — это\:{
~медленно растущие опухоли
~рост опухоли средний
=быстрорастущие опухоли
}

// question: 4123369 name: ОЧАГ ОГРАНИЧЕННОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ
::ОЧАГ ОГРАНИЧЕННОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ::[html]ОЧАГ ОГРАНИЧЕННОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ{
~очага поражения, выступающего над поверхностью губы
=очага поражения, несколько западающего ниже поверхности губы
~очага поражения, резко выступающего над поверхностью губы
~очага поражения полушаровидной формы, покрытого чешуйками
~эрозии, покрытой гемморагическими корочками

}

// question: 4123553 name: ПАПИЛЛОМА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ
::ПАПИЛЛОМА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ::[html]ПАПИЛЛОМА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ{
	~Фибросаркому
	~Ангиосаркому
	~Липосаркому
	=Плоскоклеточный рак
}

// question: 4123361 name: ПАПИЛЛОМУ И ПАПИЛЛОМАТОЗ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТ К ГРУППЕ
::ПАПИЛЛОМУ И ПАПИЛЛОМАТОЗ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТ К ГРУППЕ::[html]ПАПИЛЛОМУ И ПАПИЛЛОМАТОЗ ПОЛОСТИ РТА ОТНОСЯТ К ГРУППЕ{
	=факультативных предраковых заболеваний
	~облигатных предраковых заболеваний
	~злокачественных опухолей
	~опухолеподобных заболеваний
	~сосудистых доброкачественных опухолей
}

// question: 4123538 name: ПАПИЛЛОМУ ОТНОСЯТ К
::ПАПИЛЛОМУ ОТНОСЯТ К::[html]ПАПИЛЛОМУ ОТНОСЯТ К{
	~Пигментным опухолям
	~Опухолям из железистой ткани
	=Фиброэпителиальным опухолям
	~Сосудистым опухолям
}

// question: 4123544 name: ПАПИЛЛОМУ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ
::ПАПИЛЛОМУ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ::[html]ПАПИЛЛОМУ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ{
	~С кератоакантомой
	~С трихоэпителиомой
	~С базалиомой
	=С фибромой
}

// question: 4123470 name: ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=вздутие кости и периостальная реакция в виде «шпоры»
	~очаг деструкции овальной формы и выраженным венчиком склероза по периферии
	~патологический перелом челюсти в зоне роста опухоли
	~деструкция кости без четких контуров по типу «тающего сахара»
}

// question: 4137338 name: Патогномоничным клиническим признаком озлакачествления амелобластомы является:
::Патогномоничным клиническим признаком озлакачествления амелобластомы является\:::[html]Патогномоничным клиническим признаком озлакачествления амелобластомы является\:{
	=Нарушение чувствительности кожи подбородка
	~Ощущение сухости во рту
	~Выраженный симптом «пергаментного хруста»
	~Нарушение вкусовой чувствительности
}

// question: 4123358 name: ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ НЕПОЛНОЕ ОРОГОВЕНИЕ ...
::ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ НЕПОЛНОЕ ОРОГОВЕНИЕ ...::[html]ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ НЕПОЛНОЕ ОРОГОВЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ КЛЕТОК ШИПОВАТОГО СЛОЯ ЭПИТЕЛИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ В НИХ УПЛОЩЁННЫХ ВЫТЯНУТЫХ ЯДЕР, НАЗЫВАЕТСЯ{
	~акантоз
	~акантолиз
	~дискератоз
	~гиперкератоз
	=паракератоз
}

// question: 4123241 name: Пациенты с предраковыми заболеваниями относятся к клинической группе:
::Пациенты с предраковыми заболеваниями относятся к клинической группе\:::[html]Пациенты с предраковыми заболеваниями относятся к клинической группе\:{
	=Ia
	~Ib
	~IIa

~III
}

// question: 4123234 name: Первая специализированная онкологическая клиника в Европе была создана:
::Первая специализированная онкологическая клиника в Европе была создана\:::[html]Первая специализированная онкологическая клиника в Европе была создана\:{
=В России
~В Германии
~Во Франции
~В Великобритании
}

// question: 4174919 name: ПЕРВИЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ
::ПЕРВИЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ::[html]ПЕРВИЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ{
~эпителия
~нервной
~лимфатической
~соединительной ткани
=эпителия островков Малассе
}

// question: 4174844 name: ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОДСЛИЗИСТО-ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА...
::ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОДСЛИЗИСТО-ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА...::[html]ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОДСЛИЗИСТО-ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ{
~гумма
~гиперкератоз
~трещина, язва
=подслизистый инфильтрат
~некроз слизистой оболочки
}

// question: 4174843 name: ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭНДОФИТНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ
::ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭНДОФИТНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭНДОФИТНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ{
~гумма
~гиперкератоз

=трещина, язва
~подслизистый инфильтрат
~некроз слизистой оболочки
}

// question: 4174842 name: ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭКЗОФИТНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ
::ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭКЗОФИТНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭКЗОФИТНОЙ ФОРМЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАКА ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ{
~гумма
~гиперкератоз
~подслизистый инфильтрат
~некроз слизистой оболочки
=разрастание слизистой оболочки
}

// question: 4137256 name: Первичной профилактикой рака и предрака губы является:
::Первичной профилактикой рака и предрака губы является\:::[html]Первичной профилактикой рака и предрака губы является\:{
~ Прием антибиотиков
~ Сбалансированное питание
~ Гигиена полости рта
= Предупреждение и устранение избытка солнечного излучение
}

// question: 4123463 name: ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...
::ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...::[html]ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
~эндотелия кровеносных сосудов
~из надкостницы челюсти
~из косных балочек
=из островков Маляссе
}

// question: 4137293 name: Первичным элементом эндофитной формы начальной стадии рака языка является:
::Первичным элементом эндофитной формы начальной стадии рака языка является\:::[html]Первичным элементом эндофитной формы начальной стадии рака языка является\:{
=Язва

~Гиперкератоз
~Некроз
~Пустула
}

// question: 4123287 name: Первые клинические признаки ВИЧ-инфекции
::Первые клинические признаки ВИЧ-инфекции::[html]Первые клинические признаки ВИЧ-инфекции{
~Линейная эритема десен
=Шейная лимфаденопатия
~Волосатая лейкоплакия
~Саркома Капоши
}

// question: 4123468 name: ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
~изменение окклюзионных взаимоотношений зубных рядов
~значительно выраженная деформация лица со стороны поражения
=зуд в деснах, боль в челюсти, расшатывание зубов
~обнажение шеек группы зубов со стороны поражения
}

// question: 4123235 name: Первым руководителем первой специализированной онкологической клиники в ...
::Первым руководителем первой специализированной онкологической клиники в ...::[html]Первым руководителем первой специализированной онкологической клиники в России являлся\:{
=Л.Л. Левшин
~Н.Н. Петров
~П.А. Герцен
~Н.Н. Блохин
}

// question: 4123238 name: Первым руководителем Управления противораковыми учреждениями Накромздрава ...
::Первым руководителем Управления противораковыми учреждениями Накромздрава ...::[html]Первым руководителем Управления противораковыми учреждениями Накромздрава СССР являлся\:{
~Л.Л. Левшин
=А.И. Савицкий

~П.А. Герцен
~Н.Н. Блохин
}

// question: 4123426 name: ПЕРИОД ЗАПУЩЕННОСТИ ПРИ РАКЕ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ::ПЕРИОД ЗАПУЩЕННОСТИ ПРИ РАКЕ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]ПЕРИОД ЗАПУЩЕННОСТИ ПРИ РАКЕ ГУБЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~появлением папиллярных разрастаний на губе или грибовидных выростов
=распространением опухоли за пределы губы, появлением метастазов на шее
~уменьшением размеров инфильтрации, стиханием болей, выраженным воспалением
~появлением боли при глотании и открывании рта
}

// question: 4174906 name: ПЕРИОСТАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ::ПЕРИОСТАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ПЕРИОСТАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
~"козырек"
~"спикулы"
=отсутствует
~"луковичные наслоения"
~равномерное утолщение надкостницы
}

// question: 4123473 name: ПЕРИОСТАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ::ПЕРИОСТАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ПЕРИОСТАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
~«козырек»
~«спикулы»
=отсутствует
~«луковичные наслоения»
~равномерное утолщение надкостницы
}

// question: 4174736 name: ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ГРАНУЛЕМА - ЭТО ::ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ГРАНУЛЕМА - ЭТО::[html]ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ГРАНУЛЕМА - ЭТО{
~костная опухоль
~мягкотканная опухоль
=опухолеподобное образование
~истинная одонтогенная опухоль
}

// question: 4123562 name: ПЕЩЕРИСТАЯ ГЕМАНГИОМА ПРОИСХОДИТ ИЗ
::ПЕЩЕРИСТАЯ ГЕМАНГИОМА ПРОИСХОДИТ ИЗ::[html]ПЕЩЕРИСТАЯ ГЕМАНГИОМА ПРОИСХОДИТ ИЗ{
	~Эпителиальной ткани
	=Соединительной ткани
}

// question: 4174809 name: ПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ, ДЕФОРМАЦИЯ КОСТЕЙ ЛИЦА, РАННЕЕ ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ...
::ПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ, ДЕФОРМАЦИЯ КОСТЕЙ ЛИЦА, РАННЕЕ ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ...::[html]ПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ, ДЕФОРМАЦИЯ КОСТЕЙ ЛИЦА, РАННЕЕ ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ХАРАКТЕРНО ПРИ{
	~переломе челюсти
	=синдроме Олбрайта
	~фиброзной дисплазии
	~паратиреоидной дистрофии
	~деформирующем остеите Педжета
}

// question: 4123398 name: ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ЛИЦА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
::ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ЛИЦА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ::[html]ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ЛИЦА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ{
	=у мужчин
	~у женщин
	~у детей
	~одинаково часто у мужчин и женщин
}

// question: 4123396 name: ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ЧАЩЕ
::ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ЧАЩЕ::[html]ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ЧАЩЕ{
	~на коже туловища
	~на коже нижних и верхних конечностей
	~на коже наружных половых органов
	=на коже лица
}

// question: 4123397 name: ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ МЕТАСТАЗИРУЕТ
::ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ МЕТАСТАЗИРУЕТ::[html]ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ МЕТАСТАЗИРУЕТ{
	~гематогенным путем
	=лимфогенным путем

~по ходу сосудов и нервов
~никогда не метастазирует
}

// question: 4123395 name: ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ОПУХОЛЬ
::ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ОПУХОЛЬ::[html]ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ОПУХОЛЬ{
~развивающаяся из потовых и сальных желез
~происходящая из подкожной жировой клетчатки
=возникающая из клеток эпителия кожи
~развивающаяся из пигментных клеток
}

// question: 4123561 name: ПЛОТНЫЕ ШАРОВИДНЫЕ ТЕЛА – ФЛЕБОЛИТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
::ПЛОТНЫЕ ШАРОВИДНЫЕ ТЕЛА – ФЛЕБОЛИТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ::[html]ПЛОТНЫЕ ШАРОВИДНЫЕ ТЕЛА – ФЛЕБОЛИТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ{
~Костной ангиомы
=Пещеристой ангиомы
~Ветвистой ангиомы
~Капиллярной ангиомы
}

// question: 4123356 name: ПЛОТНЫЕ, БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, СПАЯННЫЕ С ...
::ПЛОТНЫЕ, БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, СПАЯННЫЕ С ...::[html]ПЛОТНЫЕ, БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, СПАЯННЫЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ ТКАНЯМИ С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ГОВОРЯТ О{
~сифилисе
~остром гнойном лимфадените
=метастазах злокачественной опухоли
~остром серозном лимфадените
}

// question: 4123442 name: ПО КЛАССИФИКАЦИИ TNM ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ ДО 2 СМ В ...
::ПО КЛАССИФИКАЦИИ TNM ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ ДО 2 СМ В ...::[html]ПО КЛАССИФИКАЦИИ TNM ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ ДО 2 СМ В НАИБОЛЬШЕМ ИЗМЕРЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК{
=T1
~T2
~T3
~T4

}

// question: 4123321 name: По классификации TNM, обнаружение опухоли базальноклеточного рака кожи лица, ...
::По классификации TNM, обнаружение опухоли базальноклеточного рака кожи лица, ...::[html]По классификации TNM, обнаружение опухоли базальноклеточного рака кожи лица, размером 4-5 см, соответствует стадии\:{
	~T1
	=T2
	~T3
	~T4
}

// question: 4123313 name: По классификации TNM, обнаружение опухоли плоскоклеточного рака слизистой ...
::По классификации TNM, обнаружение опухоли плоскоклеточного рака слизистой ...::[html]По классификации TNM, обнаружение опухоли плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта, размером 3-4 см, соответствует стадии\:{
	~T1
	=T2
	~T3
	~T4
}

// question: 4123323 name: По классификации TNM, при меланоме категория M1b означает наличие метастазов:
::По классификации TNM, при меланоме категория M1b означает наличие метастазов\:::[html]По классификации TNM, при меланоме категория M1b означает наличие метастазов\:{
	~Сателлитов-в коже
	~Отдаленных лимфатических узлах
	=Легких
	~Печени
}

// question: 4123496 name: ПО КЛАССИФИКАЦИИ А.И. ЕВДОКИМОВА ОДОНТОМЫ ДЕЛЯТ
::ПО КЛАССИФИКАЦИИ А.И. ЕВДОКИМОВА ОДОНТОМЫ ДЕЛЯТ::[html]ПО КЛАССИФИКАЦИИ А.И. ЕВДОКИМОВА ОДОНТОМЫ ДЕЛЯТ{
	~ячеистую, литическую, солидную
	~кистозную, солидную, смешанную
	=простую, сложную, смешанную, мягкую
	~фиброзную, смешанную, неполную

}

// question: 4174697 name: ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ НЕОДОНТОГЕННЫЕ КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ
::ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ НЕОДОНТОГЕННЫЕ КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ::[html]ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ НЕОДОНТОГЕННЫЕ КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ{
	~связаны с зубами
	=не связаны с зубами
	~развиваются из дермы
	~развиваются из фиброзной ткани
}

// question: 4174643 name: ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ
::ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ::[html]ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ{
	~профессиональных вредностей
	~допустимых доз лучевой терапии
	~поздних симптомов злокачественных новообразований
	~препаратов для лечения злокачественных новообразований
	=системы организации помощи онкологическим больным
}

// question: 4174644 name: ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ
::ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ::[html]ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ{
	~профессиональных вредностей
	~препаратов для лечения опухолей
	~допустимых доз лучевой терапии
	=специальных методов обследования, ранней диагностики
}

// question: 4174642 name: ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ...
::ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ...::[html]ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ{
	=ранних симптомов
	~препаратов для лечения
	~профессиональных вредностей
	~допустимых доз лучевой терапии
}

// question: 4137253 name: Под онкологической настороженностью подразумевают знание:
::Под онкологической настороженностью подразумевают знание\:::[html]Под онкологической настороженностью подразумевают знание\:{
	=Ранних симптомов
	~Препаратов для лечения
	~Пищевых добавок
	~Дозировок анестетиков
}

// question: 4137254 name: Под онкологической настороженностью подразумевают знание:
::Под онкологической настороженностью подразумевают знание\:::[html]Под онкологической настороженностью подразумевают знание\:{
	=Поздних симптомов
	~Препаратов для лечения
	~Пищевых добавок
	~Дозировок анестетиков
}

// question: 4137261 name: Под онкологической настороженностью понимают знание:
::Под онкологической настороженностью понимают знание\:::[html]Под онкологической настороженностью понимают знание\:{
	~ Профессиональных вредностей
	= Симптомов предраковых заболеваний
	~ Организации онкологической помощи
	~ Поздних симптомов заболевания
}

// question: 4123252 name: Под стабилизацией опухоли понимается:
::Под стабилизацией опухоли понимается\:::[html]Под стабилизацией опухоли понимается\:{
	~Полное исчезновение клинических проявлений опухолевого процесса
	~Уменьшение величины опухолевого очага более чем на 50%
	=Уменьшение величины опухолевого очага менее чем на 50 %
	~Увеличение величины опухолевого очага более чем на 25%
}

// question: 4123505 name: ПОД ЦИСТЭКТОМИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПЕРАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ

::ПОД ЦИСТЭКТОМИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПЕРАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ::[html]ПОД ЦИСТЭКТОМИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПЕРАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ{
	=полное удаление кисты вместе с оболочкой
	~создание окна для сообщения кисты с полостью рта
	~заполнения полости остеотропным материалом без удаления оболочки
}

// question: 4174688 name: ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ ЦИСТОТОМИИ ВКЛЮЧАЕТ ПЛОМБИРОВАНИЕ
::ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ ЦИСТОТОМИИ ВКЛЮЧАЕТ ПЛОМБИРОВАНИЕ::[html]ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ ЦИСТОТОМИИ ВКЛЮЧАЕТ ПЛОМБИРОВАНИЕ{
	="причинного" зуба
	~всех зубов челюсти
	~зубов-антагонистов
	~всех зубов, корни которых обращены в полость кисты
}

// question: 4174687 name: ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ ЦИСТЭКТОМИИ ВКЛЮЧАЕТ ПЛОМБИРОВАНИЕ
::ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ ЦИСТЭКТОМИИ ВКЛЮЧАЕТ ПЛОМБИРОВАНИЕ::[html]ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ ЦИСТЭКТОМИИ ВКЛЮЧАЕТ ПЛОМБИРОВАНИЕ{
	~"причинного" зуба
	~всех зубов челюсти
	~зубов-антагонистов
	=всех зубов, корни которых обращены в полость кисты
}

// question: 4174679 name: ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЦИСТЭКТОМИИ РАДИКУЛЯРНИХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЦИСТЭКТОМИИ РАДИКУЛЯРНИХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЦИСТЭКТОМИИ РАДИКУЛЯРНИХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~прорастание кисты в полость носа
	~прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху
	=небольшие размеры (до 3-х зубов в полости)
	~большие размеры (более 3-х зубов в полости)
	~деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти
}

// question: 4174680 name: ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЦИСТЭКТОМИИ РАДИКУЛЯРНИХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЦИСТЭКТОМИИ РАДИКУЛЯРНИХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЦИСТЭКТОМИИ РАДИКУЛЯРНИХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~прорастание кисты в полость носа
	=одиночная киста с одним корнем в полости
	~прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху
	~большие размеры (более 3-х зубов в полости)
	~деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти
}

// question: 4137990 name: Показанием для цистэктомия радикулярных кист челюстей является:
::Показанием для цистэктомия радикулярных кист челюстей является\:::[html]Показанием для цистэктомия радикулярных кист челюстей является\:{
	~прорастание кисты в полости носа
	~прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху
	=небольшие размеры (в области 3-х зубов)
	~деструкция наружной кортикальную пластинки челюсти
}

// question: 4123480 name: ПОЛОСТЬ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ЗАПОЛНЕНА
::ПОЛОСТЬ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ЗАПОЛНЕНА::[html]ПОЛОСТЬ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ЗАПОЛНЕНА{
	~бесцветным жидким содержимым
	=жидким содержимым желтого цвета
	~жидким содержимым бурого цвета
	~холестеатомными массами
}

// question: 4123293 name: Поражение при лимфогранулематозе поднижнечелюстных и боковых глубоких шейных ...
::Поражение при лимфогранулематозе поднижнечелюстных и боковых глубоких шейных ...::[html]Поражение при лимфогранулематозе поднижнечелюстных и боковых глубоких шейных лимфатических узлов с одной стороны, сочетающееся с наличием опухолевого инфильтрата слизистой полости рта, соответствует следующей стадии развития заболевания (согласно Энн-Арборской классификации)\:{
	=I
	~II
	~III
	~IV
}

// question: 4123530 name: ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ИССЕЧЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ...
::ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ИССЕЧЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ...::[html]ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ИССЕЧЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ{
	=паралич мимических мышц
	~мышечно-суставная контрактура
	~щелкающие звуки в височно-нижнечелюстном суставе
	~лимфостаз паренхимы железы
}

// question: 4123531 name: ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ...
::ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ...::[html]ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ{
	=околоушный гипергидроз
	~нейропатия тройничного нерва
	~парестезия нижнего альвеолярного нерва со стороны вмешательства
	~гипертонус жевательных мышц
}

// question: 4123261 name: Появление клетки с измененным генотипом называется:
::Появление клетки с измененным генотипом называется\:::[html]Появление клетки с измененным генотипом называется\:{
	~Апоптоз
	~Автономность
	=Инициация
	~Промоция
}

// question: 4123262 name: Появление клетки с измененным фенотипом называется:
::Появление клетки с измененным фенотипом называется\:::[html]Появление клетки с измененным фенотипом называется\:{
	~Апоптоз
	~Автономность
	~Инициация
	=Промоция
}

// question: 4123239 name: Предельно допустимая доза ионизирующего излучения на человека, установленная ...

::Предельно допустимая доза ионизирующего излучения на человека, установленная ...::[html]Предельно допустимая доза ионизирующего излучения на человека, установленная Международной комиссией по радиологической медицине составляет\:{
	~0,1 мЭв/год
	=1мЭв/год
	~10мЭв/год
	~100 мЭв/год
}

// question: 4174716 name: ПРЕДРАКИ - ЭТО
::ПРЕДРАКИ - ЭТО::[html]ПРЕДРАКИ - ЭТО{
	~изьязвляющиеся воспалительные инфильтраты
	=дистрофические, нестойкие пролифераты не ставшие опухолью
	~доброкачественные новообразования с явлениями воспаления
	~острые язвенно-некротические процессы мягких тканей лица
}

// question: 4174821 name: ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ САРКОМ
::ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ САРКОМ::[html]ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ САРКОМ{
	~лимфогенный
	=гематогенный
	~смешанный
	~через протоки слюнных желез
}

// question: 4137313 name: Препарат, подавляющий слюноотделение:
::Препарат, подавляющий слюноотделение\:::[html]Препарат, подавляющий слюноотделение\:{
	=Атропин
	~Актовегин
	~Супрастин
	~Аспирин
}

// question: 4123469 name: ПРИ БЫСТРЫХ ТЕМПАХ РОСТА ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОГНОЗ
::ПРИ БЫСТРЫХ ТЕМПАХ РОСТА ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОГНОЗ::[html]ПРИ БЫСТРЫХ ТЕМПАХ РОСТА ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОГНОЗ{
	~благоприятный
	=неблагоприятный

~удовлетворительный
~сомнительный
}

// question: 4123285 name: При выполнении операций на путях лимфооттока, подъязычный нерв удаляется при:
::При выполнении операций на путях лимфооттока, подъязычный нерв удаляется при\:::[html]При выполнении операций на путях лимфооттока, подъязычный нерв удаляется при\:{
~Радикальной шейной диссекции
~Модифицированной радикальной шейной диссекции
~Селективной шейной диссекции
=Расширенной радикальной шейной диссекции
}

// question: 4137315 name: При гангренозном сиаладените показано:
::При гангренозном сиаладените показано\:::[html]При гангренозном сиаладените показано\:{
=Вскрытие капсулы железы
~Динамическое наблюдение
~Назначение антикоагулянтов
~Введение противостолбнячной сыворотки
}

// question: 4123311 name: При диагнозе полиморфная аденома околоушной слюнной железы, объем ...
::При диагнозе полиморфная аденома околоушной слюнной железы, объем ...::[html]При диагнозе полиморфная аденома околоушной слюнной железы, объем оперативного вмешательства предполагает\:{
~Удаление образования в пределах здоровых тканей
=Резекция слюнной железы в плоскости лицевого нерва
~Экстирпация железы и селективная супраомохиоидальная лимфаденэктомия
~Экстирпация железы и радикальная шейная лимфаденэктомия
}

// question: 4174662 name: ПРИ ИССЕЧЕНИИ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ НЕОБХОДИМО РЕЗЕЦИРОВАТЬ
::ПРИ ИССЕЧЕНИИ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ НЕОБХОДИМО РЕЗЕЦИРОВАТЬ::[html]ПРИ ИССЕЧЕНИИ СРЕДИННОГО СВИЩА ШЕИ НЕОБХОДИМО РЕЗЕЦИРОВАТЬ{
~щитовидный хрящ
~небную миндалину
=участок подьязычной кости
~подчелюстную слюнную железу

~проток подчелюстной слюнной железы
}

// question: 4137287 name: При иссечении меланомы нужно отступить от ее края:
::При иссечении меланомы нужно отступить от ее края\:::[html]При иссечении меланомы нужно отступить от ее края\:{
=3 cm
~2 cm
~1 cm
~0.5 cm
}

// question: 4137306 name: При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать:
::При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать\:::[html]При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать\:{
=Участок подъязычной кости
~Небную миндалину
~Щитовидный хрящ
~Подчелюстную слюнную железу
}

// question: 4137309 name: При лечении болезни моделунга применяют метод лечения:
::При лечении болезни моделунга применяют метод лечения\:::[html]При лечении болезни моделунга применяют метод лечения\:{
=Хирургический
~Лучевая терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
}

// question: 4137257 name: При лечении облигатных предраков предпочтение отдают:
::При лечении облигатных предраков предпочтение отдают\:::[html]При лечении облигатных предраков предпочтение отдают\:{
= Иссечению
~ Рефлексотерапии
~ Динамическому наблюдению
~ Лазеротерапии
}

// question: 4137286 name: При лечении облигатных предраков предпочтение отдают:

::При лечении облигатных предраков предпочтение отдают\:::[html]При лечении облигатных предраков предпочтение отдают\:{
	=Иссечению
	~Лазеротерапии
	~Рефлексотерапии
	~Динамическому наблюдению
}

// question: 4137312 name: При лечении пациентов с плеоморфной аденомой околоушной слюнной железы ...
::При лечении пациентов с плеоморфной аденомой околоушной слюнной железы ...::[html]При лечении пациентов с плеоморфной аденомой околоушной слюнной железы предпочтительно проведение\:{
	=Субтотальной резекции железы с образованием с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва
	~Субтотальной резекции железы с иссечением ветвей лицевого нерва
	~Резекция слюнной железы с сохранением ветвей тройничного нерва
	~Удаления всех больших слюнных желез для профилактики рецидива
}

// question: 4123406 name: ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ ЛИЦА И БАЗАЛИОМЫ ПРИМЕНЯЮТ
::ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ ЛИЦА И БАЗАЛИОМЫ ПРИМЕНЯЮТ::[html]ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ ЛИЦА И БАЗАЛИОМЫ ПРИМЕНЯЮТ{
	~диатермокоагуляцию
	~химиотерапию
	=комбинацию лучевого и хирургического методов лечения
	~физиотерапию
}

// question: 4123445 name: ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЛОСТИ РТА ПРИМЕНЯЮТ
::ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЛОСТИ РТА ПРИМЕНЯЮТ::[html]ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЛОСТИ РТА ПРИМЕНЯЮТ{
	=операцию Крайла
	~экстирпацию пораженных лимфатических узлов
	~операцию Блохина
	~операцию Брунса
}

// question: 4137310 name: При липоме шеи используют метод лечения:

::При липоме шеи используют метод лечения\:::[html]При липоме шеи используют метод лечения\:{
	=Хирургический
	~Лучевая терапия
	~Химиотерапия
	~Гирудотерапия
}

// question: 4123461 name: ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ВНУТРИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ АБЛАСТИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ...
::ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ВНУТРИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ АБЛАСТИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ...::[html]ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ВНУТРИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ АБЛАСТИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ{
	~в тщательном выскабливании слизистой оболочки вместе с опухолью
	~резекции одной из стенок пазухи, где локализуется опухоль
	~резекции верхней челюсти с двух сторон
	=удалении соответствующей половины верхней челюсти (правой или левой)
}

// question: 4123382 name: ПРИ ЛЮМИНИСЦЕНТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВЕРРУКОЗНАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ ОБНАРУЖИВАЕТ СВЕЧЕНИЕ
::ПРИ ЛЮМИНИСЦЕНТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВЕРРУКОЗНАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ ОБНАРУЖИВАЕТ СВЕЧЕНИЕ::[html]ПРИ ЛЮМИНИСЦЕНТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВЕРРУКОЗНАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ ОБНАРУЖИВАЕТ СВЕЧЕНИЕ{
	~интенсивное белое
	~белоснежно-голубое
	~мутно-белое
	=беловато-желтое
	~темно-фиолетовое
}

// question: 4174885 name: ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ...
::ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ...::[html]ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
	~Венсана
	~Ковтуновичу
	=Колдуэлл-Люка
	~футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи по полному варианту
}

// question: 4174886 name: ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ...
::ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ...::[html]ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
	=Крайля
	~Венсана
	~Колдуэлл-Люка
	~футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи по верхнему варианту
}

// question: 4174865 name: ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА В РЕГИОНАРНЫЕ ...
::ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА В РЕГИОНАРНЫЕ ...::[html]ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
	~Редона
	=Крайля
	~Венсана
	~Колдуэлл-Люка
}

// question: 4174866 name: ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА В РЕГИОНАРНЫЕ ...
::ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА В РЕГИОНАРНЫЕ ...::[html]ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
	~Редона
	~Венсана
	~Колдуэлл-Люка
	~удаление шейной фасции
	=футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи
}

// question: 4137304 name: При метастазах рака слизистой оболочки дна полости рта в регионарные ...
::При метастазах рака слизистой оболочки дна полости рта в регионарные ...::[html]При метастазах рака слизистой оболочки дна полости рта в регионарные лимфатические узлы проводят операцию\:{
	=Крайля
	~Венсана
	~Колдуэлл - Люка
	~Фарабефа
}

// question: 4174851 name: ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА ЯЗЫКА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ
::ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА ЯЗЫКА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ::[html]ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА ЯЗЫКА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
	~Редона
	=Крайля
	~Ковтуновича
	~Колдуэлл-Люка
	~цистотомия
}

// question: 4174852 name: ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА ЯЗЫКА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ
::ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА ЯЗЫКА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ::[html]ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА ЯЗЫКА В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
	~Редона
	~Венсана
	~Колдуэлл-Люка
	~удаление шейной фасции
	=футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи
}

// question: 4137937 name: При наличии амелобластомы рентгенологическая картина характеризуется:
::При наличии амелобластомы рентгенологическая картина характеризуется\:::[html]При наличии амелобластомы рентгенологическая картина характеризуется\:{
	~костными изменениями типа «тающего сахара»
	~костными изменениями типа «матового стекла»
	~деструкцией кости в виде множественных очагов
	=резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всем протяжении разрежения с четкими границами, разделенными костными перегородками
}

// question: 4123431 name: ПРИ НАЛИЧИИ В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ШЕИ МЕТАСТАЗОВ ВЫПОЛНЯЮТ ОПЕРАЦИЮ
::ПРИ НАЛИЧИИ В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ШЕИ МЕТАСТАЗОВ ВЫПОЛНЯЮТ ОПЕРАЦИЮ::[html]ПРИ НАЛИЧИИ В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ШЕИ МЕТАСТАЗОВ ВЫПОЛНЯЮТ ОПЕРАЦИЮ{
	=Крайла

~Аббе
~Милларда
~Пачеса
}

// question: 4123384 name: ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ...
::ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ ...::[html]ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ МЕТОДАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ{
~криодеструкции
~хирургического иссечения
~диатермокоагуляции
=рентгенотерапии
}

// question: 4123352 name: ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ{
=исследование регионарных лимфатических узлов
~исследование функции внешнего дыхания
~исследование мышечного тонуса
~исследование функции выделительных органов
}

// question: 4174884 name: ПРИ ОДИНОЧНЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ...
::ПРИ ОДИНОЧНЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ...::[html]ПРИ ОДИНОЧНЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ{
~Крайля
~Венсана
~Колдуэлл-Люка
~футлярно-фасциальное иссечение клетчатки по полному варианту
=футлярно-фасциальное иссечение клетчатки по верхнему варианту
}

// question: 4174699 name: ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ "ПРИЧИННОМУ" ЗУБУ ПРОИЗВОДЯТ

::ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ "ПРИЧИННОМУ" ЗУБУ ПРОИЗВОДЯТ::[html]ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ "ПРИЧИННОМУ" ЗУБУ ПРОИЗВОДЯТ{
	~гемисекцию
	~пломбирование канала
	~эндодентальный электорофарез
	=резекцию верхушки корня после пломбирования канала
}

// question: 4123540 name: ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ПАПИЛЛОМА
::ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ПАПИЛЛОМА::[html]ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ПАПИЛЛОМА{
	~Плотная
	=Мягкая
	~Болезненная
	~Бугристая
}

// question: 4123547 name: ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ФИБРОМА ЧАЩЕ
::ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ФИБРОМА ЧАЩЕ::[html]ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ФИБРОМА ЧАЩЕ{
	~Мягкая
	=Плотная
	~Бугристая
	~Шершавая
}

// question: 4137336 name: При периферической остеобластокластоме проводят:
::При периферической остеобластокластоме проводят\:::[html]При периферической остеобластокластоме проводят\:{
	=Резекцию альвеолярного отростка челюсти вместе с зубами
	~Резекцию опухоли в пределах здоровых тканей без удаления зубов
	~Удаление опухоли в пределах слизистой оболочки
	~Выскабливание оболочки опухоли до кровавой росы
}

// question: 4174638 name: ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ОПУХОЛЬ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬНОГО ...
::ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ОПУХОЛЬ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬНОГО ...::[html]ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ОПУХОЛЬ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ К{
	=районному онкологу
	~специалисту-радиологу
	~участковому терапевту
	~хирургу общего профиля

~специалисту-стоматологу
}

// question: 4137961 name: При подозрении на опухоль заключительный диагноз ставится на основании:
::При подозрении на опухоль заключительный диагноз ставится на основании\:::[html]При подозрении на опухоль заключительный диагноз ставится на основании\:{
=морфологического исследования послеоперационного материала
~пункционной биопсии
~макроскопии послеоперационного материала
~эхографии
}

// question: 4137322 name: При радикулярной кисте на рентгенограмме визуальзируется деструкция костной ...
::При радикулярной кисте на рентгенограмме визуальзируется деструкция костной ...::[html]При радикулярной кисте на рентгенограмме визуальзируется деструкция костной ткани\: {
=С четкими контурами в области верхушек зубов
~В виде сообщающихся полостей с четкими контурами
~С нечеткими границами в области образования
~В виде "тающего сахара"
}

// question: 4123423 name: ПРИ РАКЕ ГУБЫ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
::ПРИ РАКЕ ГУБЫ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО::[html]ПРИ РАКЕ ГУБЫ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО{
~гематогенным путем в легкие, сердце, печень
=лимфогенным путем в поверхностные и глубокие лимфоузлы шеи
~гематогенным путем в головной мозг и позвоночник
~лимфогенным путем в селезенку и поджелудочную железу
}

// question: 4137314 name: При расположении камня в выводном протоке подчелюстной слюнной железы следует:
::При расположении камня в выводном протоке подчелюстной слюнной железы следует\:::[html]При расположении камня в выводном протоке подчелюстной слюнной железы следует\:{
=Рассечь проток над камнем
~Провести удаление подчелюстной слюнной железы
~Бужировать выводной проток

~Проводить динамическое наблюдение
}

// question: 4123462 name: ПРИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ ДОСТУП
::ПРИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ ДОСТУП::[html]ПРИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ ДОСТУП{
~Кохера
=Вебера
~Ковтуновича
~Мартина
}

// question: 4123308 name: При типичном расположении боковых кист шеи, их внутренняя поверхность прилежит:
::При типичном расположении боковых кист шеи, их внутренняя поверхность прилежит\:::[html]При типичном расположении боковых кист шеи, их внутренняя поверхность прилежит\:{
~К наружной яремной вене
=К внутренней яремной вене
~К передней яремной вене
~к Затылочной артерии
}

// question: 4137323 name: При фолликулярной кисте на рентгенограмме визуальзируется деструкция костной ...
::При фолликулярной кисте на рентгенограмме визуальзируется деструкция костной ...::[html]При фолликулярной кисте на рентгенограмме визуальзируется деструкция костной ткани\:{
=С четкими границами и тенью зуба в полости
~В виде сообщающихся полостей с четкими контурами
~С нечеткими границами в области образования
~В виде "тающего сахара"
}

// question: 4137337 name: При центральной остеобластокластоме проводят:
::При центральной остеобластокластоме проводят\:::[html]При центральной остеобластокластоме проводят\:{
=Краевую резекцию нижней челюсти с сохранением ее непрерывности
~Частичную резекцию опухоли в пределах здоровых тканей без удаления зубов
~Удаление опухоли в пределах слизистой оболочки
~Выскабливание оболочки опухоли до кровавой росы
}

// question: 4123466 name: ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
::ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ::[html]ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ РАКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ{
	~тупая боль в области десны при пользовании съемным протезом или приеме пищи
	~ограничение раскрывания рта, припухлость мягких тканей
	=сильная боль в челюсти, выпадение или извращение отдельных видов чувствительности
	~вздутие нижней челюсти, чувство дискомфорта, несильная боль
}

// question: 4123294 name: При эксцизионной биопсии лимфатического узла у пациента с ...
::При эксцизионной биопсии лимфатического узла у пациента с ...::[html]При эксцизионной биопсии лимфатического узла у пациента с лимфогранулематозом, наименее прогностически благоприятным является следующий морфологический вариант\:{
	~Лимфоидное преобладание
	~Нодулярный
	=Смешанноклеточный
	~Не имеет значения
}

// question: 4123271 name: При эндоскопическом исследовании, материал для проведения гистологического ...
::При эндоскопическом исследовании, материал для проведения гистологического ...::[html]При эндоскопическом исследовании, материал для проведения гистологического исследования забирается с помощью\:{
	~Эксцизионной биопсии
	~Core-биопсии
	=Щипковой биопсии
	~Трепан-биопсии
}

// question: 4123543 name: ПРИЗНАК МАЛИГНИЗАЦИИ ПАПИЛЛОМЫ
::ПРИЗНАК МАЛИГНИЗАЦИИ ПАПИЛЛОМЫ::[html]ПРИЗНАК МАЛИГНИЗАЦИИ ПАПИЛЛОМЫ{
	~Изменение цвета папилломы на более темный
	=Появление уплотнения у основания, кровоточивость
	~Потеря чувствительности
	~Интенсивная пульсирующая боль

}

// question: 4123378 name: ПРИЗНАКАМИ МАЛИГНИЗАЦИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ
::ПРИЗНАКАМИ МАЛИГНИЗАЦИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ::[html]ПРИЗНАКАМИ МАЛИГНИЗАЦИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ{
	=исчезновение боли
	~уплотнение у основания язвы
	~ороговение краев язвы
	~уменьшение размеров язвы
	~отсутствие эффекта от лечения
}

// question: 4174698 name: ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ НЕОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ СВЯЗАНА С НАРУШЕНИЕМ
::ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ НЕОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ СВЯЗАНА С НАРУШЕНИЕМ::[html]ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ НЕОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ СВЯЗАНА С НАРУШЕНИЕМ{
	=эмбриогенеза лица
	~формирования корня зуба
	~формирования зачатка зуба
	~развития зубного фолликула
}

// question: 4174690 name: ПРИЧИНОЙ РЕЦИДИВА РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ЦИСТОТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПРИЧИНОЙ РЕЦИДИВА РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ЦИСТОТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПРИЧИНОЙ РЕЦИДИВА РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ЦИСТОТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~гематома
	~длительность существования кисты
	~послеоперационное воспаление раны
	~не полностью удаленная оболочка кисты
	=раннее закрытие трепанационного отверстия
}

// question: 4174686 name: ПРИЧИНОЙ РЕЦИДИВА РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПРИЧИНОЙ РЕЦИДИВА РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПРИЧИНОЙ РЕЦИДИВА РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~гематома
	~одонтогенная инфекция

~длительность существования кисты
~послеоперационное воспаление раны
=не полностью удаленная оболочка кисты
}

// question: 4123539 name: ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАПИЛЛОМЫ
::ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАПИЛЛОМЫ::[html]ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАПИЛЛОМЫ{
=Вирусная инфекция
~Бактериальная инфекция
~Хроническая травма
~Сенсибилизация организма
}

// question: 4123389 name: ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИГМЕНТНОЙ КСЕРОДЕРМЫ
::ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИГМЕНТНОЙ КСЕРОДЕРМЫ::[html]ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИГМЕНТНОЙ КСЕРОДЕРМЫ{
~дефицит витамина «А»
~длительное воздействие полициклических ароматических углеводородов
~хронические гнойничковые заболевания кожи
=конституционную сверхчувствительность кожи к солнечным лучам
}

// question: 4123484 name: ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ
::ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ::[html]ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ{
~раннее удаление временного зуба
~вредные привычки ребенка – сосание пальца или губы
=периодонтит временного зуба
~отсутствие зуба-антагониста на одной из челюстей
}

// question: 4123485 name: ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ
::ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ::[html]ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ{
~хроническая травма временного зуба, зубом антагонистом
~хроническая стафилококковая инфекция в носо - и ротоглотке
~однократная травма временного зуба в результате удара
=повреждение зубного зачатка во время удаления временного зуба
}

// question: 4123481 name: ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ В ПОЛОСТИ КИСТЫ

::ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ В ПОЛОСТИ КИСТЫ::[html]ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ В ПОЛОСТИ КИСТЫ{
	=пролиферация островков малассе в результате хронического воспаления периодонта
	~метаплазия грануляционной ткани в эпителиальную
	~образование эпителия в тканях периодонта
	~попадание эпителия через корневой канал зуба в полость кисты
}

// question: 4123529 name: ПРИЧИНА РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ ...
::ПРИЧИНА РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ ...::[html]ПРИЧИНА РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СМЕШАННОЙ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ{
	~проведение операции удаления опухоли с нарушением правил асептики
	=выполнение операции по типу энуклеации опухоли
	~неполное ушивание капсулы железы
	~повреждение лицевого нерва во время операции
}

// question: 4174859 name: ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ...
::ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ...::[html]ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА{
	~передний отдел
	~подьязычная область
	~челюстно-язычный желобок
	~боковой отдел с переходом на язык
	=задний отдел с переходом на корень языка
}

// question: 4174858 name: ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА...
::ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА...::[html]ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА{
	~задний отдел
	~боковой отдел
	=передний отдел
	~подьязычная область
	~челюстно-язычный желобок
}

// question: 4123432 name: ПРОГНОЗ ПРИ РАКЕ ГУБЫ ЗАВИСИТ
::ПРОГНОЗ ПРИ РАКЕ ГУБЫ ЗАВИСИТ::[html]ПРОГНОЗ ПРИ РАКЕ ГУБЫ ЗАВИСИТ{
	=от распространенности процесса и своевременности начала лечения
	~от возраста и пола больного
	~от социального статуса больного
	~от квалификации специалиста, проводящего лечение
}

// question: 4123249 name: Продукты жизнедеятельности грибов и микроорганизмов, используемые в ...
::Продукты жизнедеятельности грибов и микроорганизмов, используемые в ...::[html]Продукты жизнедеятельности грибов и микроорганизмов, используемые в химиотерапии опухолей называются\:{
	~Антиметаболитами
	~Алкилирующими агентами
	=Противоопухолевыми антибиотиками
	~Антимитогенными препаратами
}

// question: 4123277 name: Противопоказанием для проведения ЯМР-диагностики челюстно-лицевой области ...
::Противопоказанием для проведения ЯМР-диагностики челюстно-лицевой области ...::[html]Противопоказанием для проведения ЯМР-диагностики челюстно-лицевой области может являться\:{
	~Ишемическая болезнь сердца
	~Гипертоническая болезнь
	~Сахарный диабет
	=Наличие дентальных имплантатов
}

// question: 4137970 name: Проявлением синдрома Гарднера в челюстно-лицевой области является:
::Проявлением синдрома Гарднера в челюстно-лицевой области является\:::[html]Проявлением синдрома Гарднера в челюстно-лицевой области является\:{
	~врожденные свищи на нижней губе
	~врожденная расщелина неба
	~деформация ушных раковин, предушные свищи
	=множественные остеомы челюстных и лицевых костей
}

// question: 4123491 name: ПРОЯВЛЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ
::ПРОЯВЛЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ::[html]ПРОЯВЛЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ{
	~при инфильтрации нижнего альвеолярного нерва
	~при прорастании верхнечелюстного нерва
	=при выходе опухоли за пределы границы челюсти
	~при изъязвлении опухоли
}

// question: 4174660 name: ПУНКТАТ ВРОЖДЕННОЙ КИСТЫ ШЕИ ВНЕ ВОСПАЛЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД
::ПУНКТАТ ВРОЖДЕННОЙ КИСТЫ ШЕИ ВНЕ ВОСПАЛЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД::[html]ПУНКТАТ ВРОЖДЕННОЙ КИСТЫ ШЕИ ВНЕ ВОСПАЛЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД{
	~гноя
	~лимфы
	~крови
	~мутной жидкости
	=прозрачной опалесцирующей жидкости
}

// question: 4174676 name: ПУНКТАТ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ВНЕ ВОСПАЛЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД
::ПУНКТАТ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ВНЕ ВОСПАЛЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД::[html]ПУНКТАТ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ВНЕ ВОСПАЛЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД{
	~лимфы
	~крови
	~мутной жидкости
	~холестеотомных масс
	=прозрачной жидкости с кристаллами холестерина
}

// question: 4174796 name: ПУЛЬСАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ГЕМАНГИОМЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ТИПА
::ПУЛЬСАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ГЕМАНГИОМЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ТИПА::[html]ПУЛЬСАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ГЕМАНГИОМЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ТИПА{
	~кавернозной
	~капиллярной
	=артериальной
	~грануляционно-тканевого типа
}

// question: 4137987 name: Пунктат врожденной кисты шеи вне воспаления имеет вид:
::Пунктат врожденной кисты шеи вне воспаления имеет вид\:::[html]Пунктат врожденной кисты шеи вне воспаления имеет вид\:{
	~гноя
	=прозрачной опалесцирующей жидкости
	~крови
	~мутной жидкости
}

// question: 4123353 name: ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПРОВОДИТСЯ
::ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПРОВОДИТСЯ::[html]ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПРОВОДИТСЯ{
	~В случае поверхностного расположения опухоли
	=В случае глубокого залегания опухоли
	~В случае распада опухоли
	~В случае риска возникновения кровотечения из опухоли
}

// question: 4174873 name: ПУТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ
::ПУТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ::[html]ПУТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ{
	~неврогенный
	=лимфогенный
	~гематогенный
	~смешанный
}

// question: 4174892 name: РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ
::РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ{
	~насморк
	~снижение зрения
	~кровотечения из носа
	=затруднение носового дыхания
}

// question: 4174893 name: РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ
::РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ{

~насморк
~снижение зрения
~кровотечения из носа
=подвижность интактных зубов
}

// question: 4174894 name: РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ
::РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]РАННИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ{
~снижение зрения
~нарушение прикуса
=патологические разрастания в лунке удаленного зуба верхней челюсти
~головная боль
}

// question: 4174825 name: РАННИМИ СИМПТОМАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ САРКОМ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ
::РАННИМИ СИМПТОМАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ САРКОМ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]РАННИМИ СИМПТОМАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ САРКОМ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ{
=деформация челюсти, подвижность зубов
~сухость во рту, приступообразные острые боли, затруднение глотания
~гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти
~ночные боли, онемение
}

// question: 4174828 name: РАННИМИ СИМПТОМАМИ САРКОМ ОКОЛОЧЕЛЮСТНЫХ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ
::РАННИМИ СИМПТОМАМИ САРКОМ ОКОЛОЧЕЛЮСТНЫХ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]РАННИМИ СИМПТОМАМИ САРКОМ ОКОЛОЧЕЛЮСТНЫХ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ{
=безболезненное образование мягких тканей
~гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти
~подвижность зубов, периодические ноющие боли, утолщение челюсти
~сухость во рту, приступообразные острые боли, затруднение глотания
}

// question: 4174822 name: РАННИМИ СИМПТОМАМИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ САРКОМ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

::РАННИМИ СИМПТОМАМИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ САРКОМ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]РАННИМИ СИМПТОМАМИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ САРКОМ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ{
~гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти
~сухость во рту, приступообразные острые боли, затруднение глотания
=подвижность зубов, периодические ноющие боли, симптом Венсана, утолщение челюсти
~головная боль
}

// question: 4137302 name: Рабдомиома – это опухоль из:
::Рабдомиома – это опухоль из\:::[html]Рабдомиома – это опухоль из\:{
~Гладкомышечной ткани
=Поперечнополосатой мышечной ткани
~Периферических нервов
~Центральной нервной системы
}

// question: 4123478 name: РАДИКУЛЯРНАЯ КИСТА ЧЕЛЮСТИ ЭТО
::РАДИКУЛЯРНАЯ КИСТА ЧЕЛЮСТИ ЭТО::[html]РАДИКУЛЯРНАЯ КИСТА ЧЕЛЮСТИ ЭТО{
~патологическая полость в кости заполненная грануляционной тканью
~патологическая полость в кости заполненная кровью
=патологическая полость в кости, выстланная эпителием, содержащая жидкость
~патологическая полость в кости, выстланная соединительной тканью
}

// question: 4137324 name: Развитие неодонтогенных кист челюстей связано с нарушением:
::Развитие неодонтогенных кист челюстей связано с нарушением\:::[html]Развитие неодонтогенных кист челюстей связано с нарушением\:{
=Эмбриогенеза лица
~Формирования корня зуба
~Формирования зачатка зуба
~Развития зубного фолликула
}

// question: 4174910 name: РАЗВИТИЮ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СПОСОБСТВУЕТ
::РАЗВИТИЮ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СПОСОБСТВУЕТ::[html]РАЗВИТИЮ ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СПОСОБСТВУЕТ{
~сахарный диабет
~строение костной ткани
=предраковые заболевания

~дистопия третьих моляров
~особенности кровоснабжения
}

// question: 4137275 name: Развитию предраковых заболеваний способствует:
::Развитию предраковых заболеваний способствует\:::[html]Развитию предраковых заболеваний способствует\:{
~ системная красная волчанка
= период менопаузы у женщин
~ сахарный диабет
~ ишемическая болезнь сердца
}

// question: 4123425 name: РАЗВИТОЙ ПЕРИОД РАКА ГУБЫ КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
::РАЗВИТОЙ ПЕРИОД РАКА ГУБЫ КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ::[html]РАЗВИТОЙ ПЕРИОД РАКА ГУБЫ КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ{
~появлением эрозии на губе
~появлением чешуек и трещин на губе
=формированием язвы с неровным дном, инфильтрированными краями
~распространением опухоли за пределы губы, на кожу, слизистую оболочку
}

// question: 4174837 name: РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА
::РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА::[html]РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА{
~дискоидную
=экзофитную
~актиническую
~мультицентрическую
}

// question: 4174838 name: РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА
::РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА::[html]РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА{
~дискоидную
=эндофитную
~актиническую
~мультицентрическую
}

// question: 4174839 name: РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА

::РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА::[html]РАЗЛИЧАЮТ ФОРМЫ РОСТА РАКА ЯЗЫКА{
	~дискоидную
	~актиническую
	~мультицентрическую
	=подслизисто-инфильтративную
}

// question: 4174921 name: РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
	~глубокие шейные
	~подподбородочные
	~заглоточные и шейные
	=легкие и кости гематогенным путем
	~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
}

// question: 4174920 name: РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
	~шейные
	~глубокие шейные
	~заглоточные и шейные
	~легкие и кости гематогенным путем
	=подподбородочные и поднижнечелюстные
	~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
}

// question: 4174878 name: РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	~актиномикозом
	=декубитальной язвой
	~ретенционной кистой
	~гландулярным хейлитом
}

// question: 4174879 name: РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	=сифилисом

~актиномикозом
~ретенционной кистой
~кожным рогом
~хейлитом Манганотти
}

// question: 4174928 name: РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
~шейные
~глубокие шейные
~заглоточные и шейные
~легкие и кости гематогенным путем
=поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
~подподбородочные и поднижнечелюстные
}

// question: 4174908 name: РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~ретенционной кистой
~полиморфной аденомой
~хроническим гайморитом
~дистопией третьих моляров
=хроническим остеомиелитом
}

// question: 4174909 name: РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]РАК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~ретенционной кистой
~полиморфной аденомой
~хроническим гайморитом
=одонтогенными опухолями
~дистопией третьих моляров
}

// question: 4174922 name: РАК ВЕРХНЕЙ ГУБЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК ВЕРХНЕЙ ГУБЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК ВЕРХНЕЙ ГУБЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
~глубокие шейные
~подподбородочные

~заглоточные и шейные
~легкие и кости гематогенным путем
=поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
}

// question: 4174929 name: РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
~шейные
~глубокие шейные
=заглоточные и шейные
~легкие и кости гематогенным путем
~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
~подподбородочные и поднижнечелюстные
}

// question: 4174887 name: РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ
::РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ::[html]РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ{
~нервной
~мышечной
~лимфатической
=эпителиальной
~соединительной ткани
}

// question: 4174897 name: РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~ретенционной кистой
~полиморфной аденомой
=хроническим гайморитом
~дистопией третьих моляров
}

// question: 4123453 name: РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ
::РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ::[html]РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ{
~с аденокистозной карциномой
~мукоэпидермоидной опухолью
=с хроническим ринитом

~с острым ринитом
}

// question: 4123450 name: РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ
::РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ::[html]РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ{
~20 – 30 лет
~30 – 35 лет
=40 – 60 лет
~70 – 80 лет
}

// question: 4123452 name: РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ
::РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ::[html]РАК ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ{
~с ретенционной кистой верхнечелюстной пазухи
~с плеоморфной аденомой
=с хроническим гайморитом
~с дистопией третьих моляров
}

// question: 4123418 name: РАК ГУБЫ ОПУХОЛЬ ИЗ
::РАК ГУБЫ ОПУХОЛЬ ИЗ::[html]РАК ГУБЫ ОПУХОЛЬ ИЗ{
~многослойного плоского эпителия слизистой оболочки губы
~эпидермиса кожи губы
=многослойного плоского эпителия красной каймы губы
~малой слюнной железы губы
}

// question: 4123419 name: РАК ГУБЫ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НА
::РАК ГУБЫ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НА::[html]РАК ГУБЫ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НА{
~верхней губе
=нижней губе
~одинаково часто поражает обе губы
}

// question: 4174925 name: РАК ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ДНА ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В

::РАК ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ДНА ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ДНА ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
	~шейные
	=глубокие шейные
	~подподбородочные
	~заглоточные и шейные
	~легкие и кости гематогенным путем
	~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
}

// question: 4174923 name: РАК ЗАДНЕЙ ТРЕТИ ЯЗЫКА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК ЗАДНЕЙ ТРЕТИ ЯЗЫКА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК ЗАДНЕЙ ТРЕТИ ЯЗЫКА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
	~шейные
	=глубокие шейные
	~подподбородочные
	~заглоточные и шейные
	~легкие и кости гематогенным путем
	~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
}

// question: 4174926 name: РАК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
	=шейные
	~глубокие шейные
	~заглоточные и шейные
	~легкие и кости гематогенным путем
	~поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
	~подподбородочные и поднижнечелюстные
}

// question: 4123537 name: РАК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТАСТАЗИРУЕТ
::РАК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТАСТАЗИРУЕТ::[html]РАК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТАСТАЗИРУЕТ{
	=в лимфатические узлы шеи только с одной стороны
	~в лимфатические узлы шеи с двух сторон
	~метастазирование в лимфатические узлы не характерно
	~метастазирование в кости черепа и нижнюю челюсть
}

// question: 4123434 name: РАК ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
::РАК ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ::[html]РАК ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ{
	~30 – 35 лет
	~35 – 45 лет
	=60 – 70 лет
	~80 – 90 лет
}

// question: 4123435 name: РАК ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ
::РАК ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ::[html]РАК ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ{
	~на небных дужках и миндалинах
	~на мягком небе
	~на твердом небе
	=на языке
	~на слизистой оболочке полости рта
}

// question: 4174924 name: РАК ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ДНА ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В
::РАК ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ДНА ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В::[html]РАК ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ДНА ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ СТАДИЯХ МЕТАСТАЗИРУЕТ В{
	~шейные
	~глубокие шейные
	~подподбородочные
	~заглоточные и шейные
	~легкие и кости гематогенным путем
	=поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы
}

// question: 4174856 name: РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ
::РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ::[html]РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ{
	~нервной
	~мышечной
	~лимфатической
	=эпителиальной
	~соединительной ткани

}

// question: 4123433 name: РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОПУХОЛЬ
::РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОПУХОЛЬ::[html]РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ОПУХОЛЬ{
	=из многослойного плоского эпителия слизистой оболочки полости рта
	~из эпителиальных остатков зубообразовательной пластинки
	~из малых слюнных желез
	~из надкостницы верхней или нижней челюсти
}

// question: 4123330 name: РАК ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ
::РАК ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ::[html]РАК ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ{
	~костной ткани
	~фиброзной ткани
	=эпителиальной ткани
	~жировой ткани
}

// question: 4174840 name: РАК ЯЗЫКА МЕТАСТАЗИРУЕТ
::РАК ЯЗЫКА МЕТАСТАЗИРУЕТ::[html]РАК ЯЗЫКА МЕТАСТАЗИРУЕТ{
	=лимфогенно
	~гематогенно
	~смешанно
	~через протоки слюнных желез
}

// question: 4123443 name: РАК ЯЗЫКА ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ
::РАК ЯЗЫКА ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ::[html]РАК ЯЗЫКА ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ{
	~кончик языка
	~спинку языка
	~корень языка
	=боковую поверхность
}

// question: 4123278 name: Раннее выявление злокачественной опухоли соответствует стадии:
::Раннее выявление злокачественной опухоли соответствует стадии\:::[html]Раннее выявление злокачественной опухоли соответствует стадии\:{
	~T1N1-2M0
	~T2N1-2M0

=T1-2N0M0
~T1N3M0-1
}

// question: 4137290 name: Ранними симптомами центральных сарком челюстей являются:
::Ранними симптомами центральных сарком челюстей являются\:::[html]Ранними симптомами центральных сарком челюстей являются\:{
=Подвижность зубов, периодические ноющие боли, симптом Венсана, утолщение челюсти
~Гиперсаливация, озноб, муфтообразный инфильтрат челюсти
~Сухость во рту, приступообразные острые боли, затруднение глотания
~Изъязвление и гиперемия слизистой полости рта, гнойное отделяемое, неприятный запах изо рта
}

// question: 4123447 name: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ
::РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ::[html]РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ{
~от врача онколога
=от врача стоматолога
~от участкового терапевта
~от районного онколога
}

// question: 4174649 name: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛИ ЕЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОЦЕНИВАЕТ ...
::РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛИ ЕЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОЦЕНИВАЕТ ...::[html]РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛИ ЕЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОЦЕНИВАЕТ КЛАССИФИКАЦИЯ{
=T N M
~клиническая
~пятибальная
~онкологического центра
}

// question: 4174760 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТИЧЕСКОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТИЧЕСКОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТИЧЕСКОЙ ФИБРОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{

~костные изменения типа "тающего сахара"
~костные изменения типа "матового стекла"
~резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всем протяжении
~диффузной деструкцией губчатого вещества челюсти на всем протяжении
=кистозным очагом с четкими границами, в котором содержатся элементы зубных тканей
}

// question: 4174746 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА АМЕЛОБЛАСТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~костные изменения типа "тающего сахара"
~костные изменения типа "матового стекла"
=деструкцией кости в виде множественных очагов
~резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всем протяжении разрежения с четкими границами, разделенными костными перегородками
~диффузной деструкцией губчатого вещества челюсти на всем протяжении
}

// question: 4174902 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВТОРИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
=деструкцией костной ткани без четких границ по типу "тающего сахара"
~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4174771 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ...
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ...::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗНОВИДНОСТЯМИ{
~полиморфной, мономорфной
=ячеистой, кистозной, литической
~субпериостальной, периапикальной
~пролиферативной, костеобразующей
}

// question: 4174832 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ САРКОМЫ ЧЕЛЮСТИ ...
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ САРКОМЫ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ САРКОМЫ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	=деструкцией костной ткани с очагами просветления с нечеткими контурами
	~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
	~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
	~периоссальными наслоениями (спикулами), отслойкой надкостницы, краевой деструкцией кости
}

// question: 4174833 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ САРКОМЫ ЧЕЛЮСТИ ...
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ САРКОМЫ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ САРКОМЫ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~деструкцией костной ткани с очагами просветления с нечеткими контурами
	~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
	~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
	=периоссальными наслоениями (спикулами), отслойкой надкостницы, краевой деструкцией кости
}

// question: 4174915 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
	=деструкцией костной ткани с нечеткими контурами и сохранением кортикальной пластинки
	~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
	~деструкцией костной ткани без четких границ по типу "тающего сахара", разволокнением кортикального слоя
	~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
}

// question: 4174813 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕИТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕИТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕИТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~полиоссальным поражением костей лица
~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
~множественными остеолитическими очагами в области углов и ветвей нижней челюсти
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
=разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4174814 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПАРАТИРЕОИДНОЙ ОСТЕОДИСТРОФИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПАРАТИРЕОИДНОЙ ОСТЕОДИСТРОФИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПАРАТИРЕОИДНОЙ ОСТЕОДИСТРОФИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~полиоссальным поражением костей лица
=истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
~множественными остеолитическими очагами в области углов и ветвей нижней челюсти
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4174827 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ САРКОМЕ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ САРКОМЕ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ САРКОМЕ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
~деструкцией костной ткани с очагами просветления с нечеткими контурами
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
=периоссальными наслоениями (спикулами), отслойкой надкостницы, краевой деструкцией кости
}

// question: 4174812 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ХЕРУВИЗМЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ХЕРУВИЗМЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ХЕРУВИЗМЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~полиоссальным поражением костей лица
~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
=множественными остеолитическими очагами в области углов и ветвей нижней челюсти
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4174826 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ САРКОМЕ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ САРКОМЕ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ САРКОМЕ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
=деструкцией костной ткани с очагами просветления с нечеткими контурами
~множественными остеолитическими очагами в области углов и ветвей нижней челюсти
~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
~диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4174896 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ...
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ...::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
~мягкотканной тенью в виде купола
=нарушением прозрачности пазухи, разрушение костных границ
~нарушением прозрачности пазухи без изменения костных границ
~периоссальными наслоениями (спикулами), отслойкой надкостницы, краевой деструкцией кости
~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4174895 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НА РАННИХ СТАДИЯХ ...
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НА РАННИХ СТАДИЯХ ...::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НА РАННИХ СТАДИЯХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~мягкотканной тенью в виде купола
	~нарушением прозрачности пазухи, разрушение костных границ
	=нарушением прозрачности пазухи без изменения костных границ
	~периоссальными наслоениями (спикулами), отслойкой надкостницы, краевой деструкцией кости
	~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4174766 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛОЖНОЙ И СОСТАВНОЙ ОДОНТОМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~отсутствием костных изменений в области одонтомы
	=ограниченной гомогенной тенью плотности коронки зуба
	~резорбцией кортикальной пластинки на всем протяжении челюсти
	~очаговой деструкцией губчатого вещества на всем протяжении челюсти
}

// question: 4174742 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОГО ЭПУЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~наличием костных изменений в области эпулиса
	~резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всем протяжении
	=отсутствием костных изменений в области эпулиса
	~очаговой деструкцией губчатого вещества челюсти на всем протяжении
	~очаговой деструкцией губчатого вещества челюсти в области соседних зубов
}

// question: 4174811 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	~полиоссальным поражением костей лица

~истончением кортикального слоя кости, множеством кистозных просветлений
~множественными остеолитическими очагами в области углов и ветвей нижней челюсти
=диффузным увеличением кости, чередованием участков уплотнения и разрежения картиной "матового стекла"
~разволокнением кортикального слоя, пятнистоочаговым "ватным" рисунком, преобладанием костеобразования
}

// question: 4123483 name: РЕЗИДУАЛЬНАЯ КИСТА – ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛОСТЬ В КОСТИ
::РЕЗИДУАЛЬНАЯ КИСТА – ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛОСТЬ В КОСТИ::[html]РЕЗИДУАЛЬНАЯ КИСТА – ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛОСТЬ В КОСТИ{
~после нерадикального лечения радикулярной кисты
~после незавершенного удаления зуба
~после травмы интактного зуба
~после нерадикального лечения фолликулярной кисты
=оставшаяся после удаления зуба
}

// question: 4137974 name: Рост амелобластом:
::Рост амелобластом\:::[html]Рост амелобластом\:{
=медленный и безболезненный
~быстрый и безболезненный
~медленный и болезненный
~быстрый и болезненный
}

// question: 4123486 name: РОСТ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ
::РОСТ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ::[html]РОСТ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ{
~скопления экссудата, выделяемого соединительнотканной оболочкой
=разницы осмотического давления в костной ткани и в полости кисты
~экссудата, выделяемого эпителиальной выстилкой
~хронического воспаления костной ткани вокруг кисты
}

// question: 4123449 name: РОСТ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАЧИНАЕТСЯ
::РОСТ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАЧИНАЕТСЯ::[html]РОСТ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАЧИНАЕТСЯ{
~из эпителиальных островков Маляссе
=из слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи
~из слизистой оболочки лобной пазухи

~из слизистой оболочки твердого и мягкого неба
}

// question: 4123332 name: САРКОМА – ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ
::САРКОМА – ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ::[html]САРКОМА – ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ{
~из эпителия
=из соединительной ткани
~из островков Маляссе
~из сальных и потовых желез
}

// question: 4123451 name: САРКОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ
::САРКОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ::[html]САРКОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ{
~50 – 70 лет
~60 – 80 лет
=1 год – 35-40 лет
~одинаково часто в любом возрасте
}

// question: 4123471 name: САРКОМА ЮИНГА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У
::САРКОМА ЮИНГА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У::[html]САРКОМА ЮИНГА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У{
~людей среднего возраста
=детей
~пожилых людей
~одинаково часто во всех возрастных группах
}

// question: 4174816 name: САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ
::САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ::[html]САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
~эпителия
~железистой ткани
=соединительной ткани
~дермы
}

// question: 4174817 name: САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ

::САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ::[html]САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
	~эпителия
	=нервных волокон
	~железистой ткани
	~хрящевой ткани
}

// question: 4174818 name: САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ
::САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ::[html]САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
	=сосудов
	~эпителия
	~железистой ткани
	~хрящевой ткани
}

// question: 4174819 name: САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ
::САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ::[html]САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
	~эпителия
	~железистой ткани
	=мышечных волокон
	~хрящевой ткани
}

// question: 4174820 name: САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ
::САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ::[html]САРКОМЫ РАЗВИВАЮТСЯ ИЗ{
	~эпителия
	=лимфатических клеток
	~хрящевой ткани
	~дермы
}

// question: 4137288 name: Саркомы развиваются из ткани:
::Саркомы развиваются из ткани\:::[html]Саркомы развиваются из ткани\:{
	=Соединительной
	~Эпителиальной
	~Железистой
	~Ороговевающей
}

// question: 4137289 name: Саркомы развиваются из ткани:
::Саркомы развиваются из ткани\:::[html]Саркомы развиваются из ткани\:{
	=Мышечной

~Эпителиальной
~Железистой
~Ороговевающей
}

// question: 4174783 name: СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ
::СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ::[html]СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ{
~цилиндрома
~остеолизома
~остеосаркома
=остеокластома
~ретенционная киста
}

// question: 4174784 name: СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ
::СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ::[html]СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ{
~цилиндрома
~серая опухоль
=бурая опухоль
~красная опухоль
~ретенционная киста
}

// question: 4174759 name: СИНОНИМ МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ
::СИНОНИМ МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ::[html]СИНОНИМ МЯГКОЙ ОДОНТОМЫ{
~цилиндрома
~амелобластома
~фиброзная бластома
~амелобластическая киста
=амелобластическая фиброма
}

// question: 4174810 name: СИММЕТРИЧНОЕ УТОЛЩЕНИЕ УГЛОВ И ВЕТВЕЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРНО ПРИ
::СИММЕТРИЧНОЕ УТОЛЩЕНИЕ УГЛОВ И ВЕТВЕЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРНО ПРИ::[html]СИММЕТРИЧНОЕ УТОЛЩЕНИЕ УГЛОВ И ВЕТВЕЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ХАРАКТЕРНО ПРИ{
=херувизме
~синдроме Олбрайта
~фиброзной дисплазии
~паратиреоидной дистрофии

~деформирующем остеите Педжета
}

// question: 4123549 name: СИММЕТРИЧНЫЕ ФИБРОМЫ, КАК ПРАВИЛО, ЛОКАЛИЗУЮТСЯ
::СИММЕТРИЧНЫЕ ФИБРОМЫ, КАК ПРАВИЛО, ЛОКАЛИЗУЮТСЯ::[html]СИММЕТРИЧНЫЕ ФИБРОМЫ, КАК ПРАВИЛО, ЛОКАЛИЗУЮТСЯ{
=На небной поверхности альвеолярных отростков
~На слизистой оболочке щек
~На боковой поверхности языка
~В области углов рта
}

// question: 4123300 name: Симптом перемежающейся контрактуры жевательных мышц характерен для:
::Симптом перемежающейся контрактуры жевательных мышц характерен для\:::[html]Симптом перемежающейся контрактуры жевательных мышц характерен для\:{
~Лимфогранулематоза
~Плоскоклеточного рака
~Гистиоцитоза
=Актиномикоза
}

// question: 4174823 name: СИМПТОМАМИ САРКОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ
::СИМПТОМАМИ САРКОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]СИМПТОМАМИ САРКОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ{
=сукровичное выделяемое из носа
~сухость во рту, приступообразные острые боли, затруднение глотания
~гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти
~парез ветвей лицевого нерва
}

// question: 4174824 name: СИМПТОМАМИ САРКОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ
::СИМПТОМАМИ САРКОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]СИМПТОМАМИ САРКОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ{
=экзофтальм
~парез ветвей лицевого нерва
~сухость во рту, приступообразные острые боли, затруднение глотания
~гиперсаливация, ознобы, муфтообразный инфильтрат челюсти
~энофтальм
}

// question: 4137291 name: Симптомом саркомы верхней челюсти является:
::Симптомом саркомы верхней челюсти является\:::[html]Симптомом саркомы верхней челюсти является\:{
	=Экзофтальм
	~Парез ветвей лицевого нерва
	~Сухость во рту
	~Симптом Венсана
}

// question: 4137276 name: Симптомы малигнизации предраковых заболеваний:
::Симптомы малигнизации предраковых заболеваний\:::[html]Симптомы малигнизации предраковых заболеваний\:{
	~	уплотнение основания очага поражения
	~	изменение цвета очага поражения
	~	изъязвление очага поражения
	~	кровоточивость очага поражения
	=	Все вышеперечисленные
}

// question: 4123532 name: СИНДРОМ ФРЕЯ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
::СИНДРОМ ФРЕЯ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ::[html]СИНДРОМ ФРЕЯ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ{
	~нижнечелюстного нерва
	~верхнечелюстного нерва
	=ушно-височного нерва
	~лицевого нерва
}

// question: 4123298 name: Синдром Хеерфордта считается проявлением:
::Синдром Хеерфордта считается проявлением\:::[html]Синдром Хеерфордта считается проявлением\:{
	~Лимфогранулематоза
	=Саркоидоза
	~Болезни Стилла
	~Болезни Кавасаки
}

// question: 4123515 name: СИНОНИМ АДЕНОКИСТОЗНОЙ КАРЦИНОМЫ
::СИНОНИМ АДЕНОКИСТОЗНОЙ КАРЦИНОМЫ::[html]СИНОНИМ АДЕНОКИСТОЗНОЙ КАРЦИНОМЫ{
	=цилиндрома
	~мукоэпидермоидная опухоль

~ацинозноклеточная опухоль
~мономорфная аденома
~плеоморфная аденома
}

// question: 4123507 name: СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ
::СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ::[html]СИНОНИМ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ{
~цилиндрома
~серая опухоль
=бурая опухоль
~красная опухоль
~ретенционная киста
}

// question: 4123489 name: СИНОНИМОМ АМЕЛОБЛАСТОМЫ
::СИНОНИМОМ АМЕЛОБЛАСТОМЫ::[html]СИНОНИМОМ АМЕЛОБЛАСТОМЫ{
~цементома
~гигантома
=адамантинома
~хондробластома
}

// question: 4137947 name: Синонимом кожного рога является:
::Синонимом кожного рога является\:::[html]Синонимом кожного рога является\:{
~внутриэпидермальный кожный рак
=роговая кератома
~кератоакантома
~лейкоплакия бородавчатая
}

// question: 4137976 name: Синонимом остеосаркомы не является:
::Синонимом остеосаркомы не является\:::[html]Синонимом остеосаркомы не является\:{
~остеобластосаркома
~остеогенный саркома
~остеоидсаркома
=хондросаркома
}

// question: 4137949 name: Сирингоаденома – это:
::Сирингоаденома – это\:::[html]Сирингоаденома – это\:{

~доброкачественная опухоль волосяных фолликулов состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов
~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
~доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
=доброкачественное новообразование которое развивается из выводных протоков потовых желез
}

// question: 4137943 name: Сквозной дефект щеки устраняют лоскутами:
::Сквозной дефект щеки устраняют лоскутами\:::[html]Сквозной дефект щеки устраняют лоскутами\:{
~Мостовидными
~Опрокидывающимися
=Удвоенными по Рауэру
~Встречными треугольными
}

// question: 4137959 name: Склерозирующую терапию проводят при лечении:
::Склерозирующую терапию проводят при лечении\:::[html]Склерозирующую терапию проводят при лечении\:{
~ретенционной кисты
=гемангиомы
~папилломатоза
~фиброматоза
}

// question: 4123322 name: Сколько фототипов кожи человека существует:
::Сколько фототипов кожи человека существует\:::[html]Сколько фототипов кожи человека существует\:{
~8
=6
~4
~5
}

// question: 4123248 name: Совместное использование методов внутритканевого и дистанционного облучения ...
::Совместное использование методов внутритканевого и дистанционного облучения ...::[html]Совместное использование методов внутритканевого и дистанционного облучения опухоли называется\:{
~Комбинированным лечением

~Комплексным лечением
=Сочетанным лечением
~Паллиативным лечением
}

// question: 4123247 name: Совместное использование хирургического (местного) и химиотерапевтического ...
::Совместное использование хирургического (местного) и химиотерапевтического ...::[html]Совместное использование хирургического (местного) и химиотерапевтического (системного) воздействия на опухоль называется\:{
~Комбинированным лечением
=Комплексным лечением
~Сочетанным лечением
~Паллиативным лечением
}

// question: 4123260 name: Состояние, при котором клетка перестает воспринимать растворимые сигнальные ...
::Состояние, при котором клетка перестает воспринимать растворимые сигнальные ...::[html]Состояние, при котором клетка перестает воспринимать растворимые сигнальные факторы, называется\:{
~Катаплазия
~Метаплазия
~Анаплазия
=Автономность
}

// question: 4123354 name: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ...
::СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ...::[html]СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗЫВАЕТСЯ{
~в отделении челюстно-лицевой хирургии
=в онкологическом диспансере или онкологическом центре
~в любом хирургическом отделении
~в хирургическом кабинете стоматологической поликлиники
}

// question: 4123333 name: СПОСОБНОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИМПЛАНТАЦИИ ХАРАКТЕРНА
::СПОСОБНОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИМПЛАНТАЦИИ ХАРАКТЕРНА::[html]СПОСОБНОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИМПЛАНТАЦИИ ХАРАКТЕРНА{

~для опухолеподобных заболеваний
~для доброкачественных опухолей
=для злокачественных опухолей
~для любых опухолей
}

// question: 4123521 name: СРЕДИ ВСЕХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ
::СРЕДИ ВСЕХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ::[html]СРЕДИ ВСЕХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ{
=смешанная опухоль
~цилиндрома
~мукоэпидермоидная опухоль
~аденолимфома
~невринома
}

// question: 4123448 name: СРЕДИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРЕОБЛАДАЕТ
::СРЕДИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРЕОБЛАДАЕТ::[html]СРЕДИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРЕОБЛАДАЕТ{
~остеогенная саркома
=плоскоклеточный рак
~фибросаркома
~саркома Юинга
}

// question: 4174789 name: СРЕДИ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ РАЗЛИЧАЮТ
::СРЕДИ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ РАЗЛИЧАЮТ::[html]СРЕДИ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ РАЗЛИЧАЮТ{
~продуктивную, деструктивную
~язвенную, язвенно-некротическую
~ячеистую, кистозную, литическую
=очаговую, диффузную, генерализованную
}

// question: 4174652 name: СРЕДИННАЯ КИСТА ШЕИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ
::СРЕДИННАЯ КИСТА ШЕИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ::[html]СРЕДИННАЯ КИСТА ШЕИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ{
=по средней линии шеи

~в области яремной вырезки
~в поднижнечелюстной области
~по переднему краю m. Trapesius
}

// question: 4174650 name: СРЕДИННЫЕ И БОКОВЫЕ СВИЩИ ШЕИ ПО СВОЕМУ ПРОИСХОЖДЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ
::СРЕДИННЫЕ И БОКОВЫЕ СВИЩИ ШЕИ ПО СВОЕМУ ПРОИСХОЖДЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]СРЕДИННЫЕ И БОКОВЫЕ СВИЩИ ШЕИ ПО СВОЕМУ ПРОИСХОЖДЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ{
=врожденными
~одонтогенными
~травматическими
~онкологическими
~воспалительными
}

// question: 4137295 name: Срединная киста шеи локализуется:
::Срединная киста шеи локализуется\:::[html]Срединная киста шеи локализуется\:{
=Над щитовидным хрящом
~В области яремной вырезки
~В поднижнечелюстной области
~По переднему краю m.trapesius
}

// question: 4123379 name: СРЕДСТВАМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ ЯВЛЯЮТСЯ ...
::СРЕДСТВАМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ ЯВЛЯЮТСЯ ...::[html]СРЕДСТВАМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ{
=ацикловира
~ретинола ацетата
~пиридоксина
~преднизолона
~индометацина
}

// question: 4123476 name: СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ЕЁ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОДУ ...
::СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ЕЁ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОДУ ...::[html]СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ЕЁ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ{
~одномоментно с удалением опухоли

~не ранее чем через 2 месяца
~не ранее чем через 1 год
~не ранее чем через 6 месяцев
=не ранее чем через 2 года
}

// question: 4174645 name: СТАДИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ ...
::СТАДИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ ...::[html]СТАДИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ{
~жалоб больного
~размеров опухоли
~жалоб больного, размеров опухоли
~размеров опухоли, наличия близлежащих метастазов
=размеров опухоли, наличия отдаленных и близлежащих метастазов
}

// question: 4123251 name: Стимуляция белков-переносчиков на мембране опухолевых клеток, которые выводят...
::Стимуляция белков-переносчиков на мембране опухолевых клеток, которые выводят...::[html]Стимуляция белков-переносчиков на мембране опухолевых клеток, которые выводят из клетки цитостатики, прежде чем те реализуют свой терапевтический эффект, называется\:{
~Первичной резистентностью
=Вторичной резистентностью
~Третичной резистентностью
~Четвертичной резистентностью
}

// question: 4123299 name: Субфебрилитет, шейная лимфаденопатия, кольцевидная эритема кожи, развившияся ...
::Субфебрилитет, шейная лимфаденопатия, кольцевидная эритема кожи, развившияся ...::[html]Субфебрилитет, шейная лимфаденопатия, кольцевидная эритема кожи, развившияся через неделю после укуса клеща, характерны для\:{
~Лимфогранулематоза
~Псевдолимфомы
=Болезни Лайма
~Гистиоцитоза
}

// question: 4174883 name: СУММАРНАЯ ОЧАГОВАЯ ДОЗА ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ (ГРЕЙ)

::СУММАРНАЯ ОЧАГОВАЯ ДОЗА ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ (ГРЕЙ)::[html]СУММАРНАЯ ОЧАГОВАЯ ДОЗА ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ (ГРЕЙ){
	~ 20-40
	=40-60
	~60-80
	~80-100
	~свыше 100
}

// question: 4123246 name: Таргетная терапия опухолей – это:
::Таргетная терапия опухолей – это\:::[html]Таргетная терапия опухолей – это\:{
	~Внутритканевое облучение опухоли
	=Применение антагонистов онкоассоциированных молекул
	~Обработка опухоли фотосенсибилизаторами, с последующим лазерным облучением
	~Селективная эмболизация сосудов, питающих опухоль
}

// question: 4174704 name: ТВЕРДАЯ И МЯГКАЯ ФИБРОМА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ
::ТВЕРДАЯ И МЯГКАЯ ФИБРОМА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ::[html]ТВЕРДАЯ И МЯГКАЯ ФИБРОМА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ{
	=щек
	~губы
	~дна полости рта
	~мягкого неба
}

// question: 4174705 name: ТВЕРДАЯ И МЯГКАЯ ФИБРОМА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ
::ТВЕРДАЯ И МЯГКАЯ ФИБРОМА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ::[html]ТВЕРДАЯ И МЯГКАЯ ФИБРОМА ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ{
	~губы
	~дна полости рта
	=задней трети языка
	~верхнечелюстного синуса
}

// question: 4137952 name: Твердая фиброма кожи состоит из:
::Твердая фиброма кожи состоит из\:::[html]Твердая фиброма кожи состоит из\:{

=веретенообразных клеток типа фибробластов или фиброцитов и большого количества коллагеновых волокон
~волокнистой соединительной и жировой ткани
~волокнистой соединительной и сосудистой ткани
~коллагеновых волокон, фибробластов, фиброцитов и гистиоцитов
}

// question: 4123339 name: ТЕОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОНГЕЙМА ИНАЧЕ НАЗЫВАЮТ
::ТЕОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОНГЕЙМА ИНАЧЕ НАЗЫВАЮТ::[html]ТЕОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОНГЕЙМА ИНАЧЕ НАЗЫВАЮТ{
~вирусной теорией
~вирусно-генетической теорией
=эмбриональной теорией
~полиэтиологической теорией
}

// question: 4123351 name: ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕРАЗДРАЖЕНИЯ НОСИТ ...
::ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕРАЗДРАЖЕНИЯ НОСИТ ...::[html]ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕРАЗДРАЖЕНИЯ НОСИТ НАЗВАНИЕ ФАМИЛИИ АВТОРА{
~Конгейма
~Мечникова
~Подвысоцкого
=Вирхова
}

// question: 4123512 name: ТЕРМИНОМ «АДЕНОМА» ОБОЗНАЧАЮТ ОПУХОЛЬ СОСТОЯЩУЮ
::ТЕРМИНОМ «АДЕНОМА» ОБОЗНАЧАЮТ ОПУХОЛЬ СОСТОЯЩУЮ::[html]ТЕРМИНОМ «АДЕНОМА» ОБОЗНАЧАЮТ ОПУХОЛЬ СОСТОЯЩУЮ{
~из железистоподобных эпителиальных структур, лежащих среди лимфоидной ткани
~из эпителия выводных протоков слюнных желез
~из эндотелия кровеносных сосудов
=из железистой ткани и соединительнотканной стромы
}

// question: 4137966 name: Тестоватая консистенция характерна для:
::Тестоватая консистенция характерна для\:::[html]Тестоватая консистенция характерна для\:{
~гемангиомы

~околочелюстной флегмоны
=лимфангиомы
~фибромы
}

// question: 4123240 name: Тип вируса папилломы человека, вызывающий доброкачественные поражения:
::Тип вируса папилломы человека, вызывающий доброкачественные поражения\:::[html]Тип вируса папилломы человека, вызывающий доброкачественные поражения\:{
=6
~16
~31
~52
}

// question: 4174666 name: ТИПИЧНЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОКОВОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ
::ТИПИЧНЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОКОВОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ::[html]ТИПИЧНЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОКОВОЙ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ{
~в надключичной области
~по переднему краю m. Trapesius
~по переднему краю жевательной мышцы
=горизонтально по верхней шейной складке
}

// question: 4123320 name: Типичное расположение ранулы:
::Типичное расположение ранулы\:::[html]Типичное расположение ранулы\:{
~Щека
=Подъязычная область
~Твердое небо
~Мягкое небо
}

// question: 4123381 name: ТИПИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ
::ТИПИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ::[html]ТИПИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ{
~узел
~бугорок
=бляшка

~волдырь
~пузырек
}

// question: 4123269 name: Ткань для гистологического исследования забирается с помощью:
::Ткань для гистологического исследования забирается с помощью\:::[html]Ткань для гистологического исследования забирается с помощью\:{
~Тонкоигольной пункции
=Сердцевинной биопсии
~Мазка-отпечатка
~Соскоба
}

// question: 4123524 name: ТОНКОИГОЛЬНАЯ БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ
::ТОНКОИГОЛЬНАЯ БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ::[html]ТОНКОИГОЛЬНАЯ БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ{
~локализацию и распространенность опухоли
=морфологическую принадлежность опухоли
~длительность существования опухоли
~изменения контуров протоков железы
}

// question: 4123386 name: ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЯЗВА ИМЕЕТ СХОДСТВО СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ
::ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЯЗВА ИМЕЕТ СХОДСТВО СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ::[html]ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЯЗВА ИМЕЕТ СХОДСТВО СО ВСЕМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КРОМЕ{
~сифилиса (твердый шанкр)
=многоформной экссудативной эритемы
~красного плоского лишая (эрозивная форма)
~трофической язвы
~туберкулезной язвы
}

// question: 4137946 name: У пациента в толще мягких тканей боковой поверхности шеи имеется ...
::У пациента в толще мягких тканей боковой поверхности шеи имеется ...::[html]У пациента в толще мягких тканей боковой поверхности шеи имеется плотноэластичной консистенции образование, округлой формы, с четкими контурами, размером 3,5 см в диаметре. После удаления опухоли получено патоморфологическое заключение, что

опухоль состоит из жировой, фиброзной, сосудистой и хрящевой ткани, а также имеет участки ослизнения. Какая опухоль была удалена у больного\:{
	~хемодектома
	=мезенхимома
	~лимфогрануломатоз
	~ринофима
}

// question: 4137945 name: У пациента имеется обезображивание лица за счет наличия бугристой опухоли с ...
::У пациента имеется обезображивание лица за счет наличия бугристой опухоли с ...::[html]У пациента имеется обезображивание лица за счет наличия бугристой опухоли с относительно четкими границами, которая локализуется в мягких тканях правой половины лица, в полости рта, на альвеолярном отростке, небе, губах и шее с этой же стороны. Кожа над опухолью неравномерно пигментирована, опухолевые узлы безболезненные, подвижные, мягкой и эластичной консистенции. Какой предварительный диагноз Вы поставите больному\:{
	~невринома
	=нейрофиброматоз
	~посттравматическая неврома
	~хемодектома
}

// question: 4123565 name: УВЕЛИЧЕНИЕ ОПУХОЛИ ПРИ НАКЛОНЕ ГОЛОВЫ КНИЗУ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
::УВЕЛИЧЕНИЕ ОПУХОЛИ ПРИ НАКЛОНЕ ГОЛОВЫ КНИЗУ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ::[html]УВЕЛИЧЕНИЕ ОПУХОЛИ ПРИ НАКЛОНЕ ГОЛОВЫ КНИЗУ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ{
	~Липомы
	=Кавернозной гемангиомы
	~Эпидермальной кисты
	~Симметричной фибромы
}

// question: 4123567 name: УДАЛЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ
::УДАЛЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]УДАЛЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~Сложным вмешательством, требующим перевязки приводящих сосудов
	=Безопасным и простым вмешательством
}

// question: 4123482 name: УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОДОНТОГЕННЫХ КИСТ СРЕДИ ВСЕХ ОПУХОЛЕЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ

::УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОДОНТОГЕННЫХ КИСТ СРЕДИ ВСЕХ ОПУХОЛЕЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ::[html]УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОДОНТОГЕННЫХ КИСТ СРЕДИ ВСЕХ ОПУХОЛЕЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ{
	~5%
	~18%
	=36%
	~75%
}

// question: 4123477 name: УДЕРЖАНИЕ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ ...
::УДЕРЖАНИЕ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ ...::[html]УДЕРЖАНИЕ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДЯТ{
	~стальной спицей
	=реконструктивной пластиной
	~пластмассовым имплантатом
	~пластмассовой каппой
	~шиной Крамера
}

// question: 4123387 name: УКАЖИТЕ ИЗЛЮБЛЕННУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ
::УКАЖИТЕ ИЗЛЮБЛЕННУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ::[html]УКАЖИТЕ ИЗЛЮБЛЕННУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ{
	~ретромолярная область
	=угол рта, щеки по линии смыкания зубов
	~спинка языка
	~твердое небо
	~красная кайма нижней губы
}

// question: 4123360 name: УТОЛЩЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО СЛОЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЗА СЧЕТ ...
::УТОЛЩЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО СЛОЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЗА СЧЕТ ...::[html]УТОЛЩЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО СЛОЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЗА СЧЕТ ПРОЛИФЕРАЦИИ БАЗАЛЬНЫХ И ШИПОВИДНЫХ КЛЕТОК, НАЗЫВАЕТСЯ{
	=акантоз
	~акантолиз
	~дискератоз
	~гиперкератоз
	~паракератоз
}

// question: 4137263 name: Фактор, не способствующие развитию предраковых заболеваний:
::Фактор, не способствующие развитию предраковых заболеваний\:::[html]Фактор, не способствующие развитию предраковых заболеваний\:{
	~	аэрозоль щелочи
	~	испарение спирта
	~	испарения кислоты
	~	воздействие солнечных лучей
	~	горячий воздух в рабочем помещении
	=	Холодный воздух в рабочем помещении
}

// question: 4123318 name: Факультативным предраковым заболеванием является (из перечисленных)
::Факультативным предраковым заболеванием является (из перечисленных)::[html]Факультативным предраковым заболеванием является (из перечисленных){
	=Кожный рог
	~Ограниченный гиперкератоз
	~Бородавчатый предрак
	~Хейлит Манганотти
}

// question: 4174806 name: ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - ЭТО
::ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - ЭТО::[html]ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - ЭТО{
	~костная опухоль
	~мягкотканная опухоль
	~истинная одонтогенная опухоль
	=опухолеподобное образование кости
}

// question: 4137300 name: Фиброма - это опухоль:
::Фиброма - это опухоль\:::[html]Фиброма - это опухоль\:{
	=Состоящая из зрелой волокнистой соединительной ткани
	~Состоящая из жировой ткани
	~Представленная разрастанием сосудистой ткани
	~Представленная рыхлой костной тканью
}

// question: 4123550 name: ФИБРОМА МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ
::ФИБРОМА МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ::[html]ФИБРОМА МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ{
	~В карциному

=В фибросаркому
~В фибромиксому
~В ангиофиброму
}

// question: 4123546 name: ФИБРОМА ПОЛОСТИ РТА ОБЫЧНО ПОКРЫТА
::ФИБРОМА ПОЛОСТИ РТА ОБЫЧНО ПОКРЫТА::[html]ФИБРОМА ПОЛОСТИ РТА ОБЫЧНО ПОКРЫТА{
~Гиперпластическим эпителием
=Неизмененной слизистой оболочкой
~Ворсинчатым эпителием
~Сосочковыми разрастаниями
}

// question: 4123545 name: ФИБРОМА ЭТО
::ФИБРОМА ЭТО::[html]ФИБРОМА ЭТО{
~Опухоль из хрящевой ткани
~Опухоль из покровного эпителия
~Опухоль из эндотелия сосудов
=Опухоль из волокнистой соединительной ткани
}

// question: 4123554 name: ФИБРОМАТОЗ ДЕСЕН ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С
::ФИБРОМАТОЗ ДЕСЕН ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С::[html]ФИБРОМАТОЗ ДЕСЕН ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С{
~Пародонтитом
=Гипертрофическим гингивитом
~Плоскоклеточным раком
~Гнойным периоститом
}

// question: 4174708 name: ФИБРОМАТОЗ ОТНОСИТСЯ К
::ФИБРОМАТОЗ ОТНОСИТСЯ К::[html]ФИБРОМАТОЗ ОТНОСИТСЯ К{
~истинным опухолям
=опухолеподобным образованиям
~одонтогенным кистам
~одонтогенным опухолям
}

// question: 4174709 name: ФИБРОМАТОЗ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
::ФИБРОМАТОЗ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ::[html]ФИБРОМАТОЗ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ{

~вредных привычек
~нарушения эмбриогенеза
=хронического механического раздражения
~ожога
}

// question: 4174710 name: ФИБРОМАТОЗ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ
::ФИБРОМАТОЗ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ::[html]ФИБРОМАТОЗ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ{
~щек
~верхней губы
~дна полости рта
=переходной складки с вестибулярной стороны
}

// question: 4123551 name: ФИБРОМУ ПОЛОСТИ РТА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ
::ФИБРОМУ ПОЛОСТИ РТА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ::[html]ФИБРОМУ ПОЛОСТИ РТА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ{
~С кавернозной гемангиомой
~С кератомой
~С кератоакантомой
=С папилломой
}

// question: 4174795 name: ФЛЕБОЛИТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ГЕМАНГИОМЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ТИПА
::ФЛЕБОЛИТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ГЕМАНГИОМЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ТИПА::[html]ФЛЕБОЛИТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ГЕМАНГИОМЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ТИПА{
~ветвистой
~капиллярной
=кавернозной
~артериальной
~внутримышечной
}

// question: 4123536 name: ФЛЕБОЛИТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОПУХОЛИ
::ФЛЕБОЛИТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОПУХОЛИ::[html]ФЛЕБОЛИТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОПУХОЛИ{
~липомы
~невриномы
~мукоэпидермоидной

=кавернозной гемангиомы
~плеоморфной аденомы
}

// question: 4174673 name: ФОЛЛИКУЛЯРНУЮ КИСТУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::ФОЛЛИКУЛЯРНУЮ КИСТУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]ФОЛЛИКУЛЯРНУЮ КИСТУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~цементомой
=амелобластомой
~твердой одонтомой
~репаративной гранулемой
}

// question: 4174674 name: ФОЛЛИКУЛЯРНУЮ КИСТУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::ФОЛЛИКУЛЯРНУЮ КИСТУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]ФОЛЛИКУЛЯРНУЮ КИСТУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
~одонтомой
~цементомой
~радикулярной кистой
=репаративной гранулемой
}

// question: 4123479 name: ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА ЭТО
::ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА ЭТО::[html]ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА ЭТО{
=патологическая полость в кости, окружающая непрорезавшийся зуб
~патологическая полость в кости, окружающая фрагмент погибшей кости
~патологическая полость в кости, окружающая сверхкомплектный зуб
~патологическая полость в кости, содержащая корень ранее удаленного зуба
}

// question: 4137259 name: Формой красного плоского лишая, которую относят к факультативному ...
::Формой красного плоского лишая, которую относят к факультативному ...::[html]Формой красного плоского лишая, которую относят к факультативному предраковому процессу, является\:{
~ Эритематозная
= Эрозивно-язвенная
~ Экссудативно-гиперемическая
~ Типичная
}

// question: 4137292 name: Формой роста рака языка является:
::Формой роста рака языка является\:::[html]Формой роста рака языка является\:{
	=Экзофитная
	~Десквамативная
	~Актиническая
	~Гематогенная
}

// question: 4123350 name: ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ
::ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ::[html]ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ{
	=деструктивный рост
	~экспансивный рост
	~образование соединительнотканной капсулы
	~медленный, в течение нескольких лет, рост
}

// question: 4123348 name: ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~тканевая анаплазия
	=способность превращаться в злокачественные опухоли
	~деструктивный рост
	~способность к распространению путем имплантации
}

// question: 4123337 name: ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~длительный анамнез заболевания
	~медленный темп роста опухоли
	=быстрый темп роста опухоли
	~резкое повышение температуры тела
}

// question: 4123250 name: Химиотерапия, назначаемая после радикального удаления опухоли, с целью ...
::Химиотерапия, назначаемая после радикального удаления опухоли, с целью ...::[html]Химиотерапия, назначаемая после радикального удаления опухоли, с целью предупреждения ее рецидивов, называется\:{

~Излечивающей
~Паллиативной
=Адъювантной
~Неоадъювантной
}

// question: 4123407 name: ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БАЗАЛИОМЫ И ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
::ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БАЗАЛИОМЫ И ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ::[html]ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БАЗАЛИОМЫ И ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ{
~иссечение опухоли полуовальными разрезами, отступя от краев 5 – 10 см
~иссечение опухоли полуовальными разрезами, отступя от краев 3 – 5 см
=иссечение опухоли полуовальными разрезами отступя от краев 5 – 10 мм
~иссечение опухоли полуовальными разрезами отступя от краев 1 – 2 мм
}

// question: 4123494 name: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АМЕЛОБЛАСТОМЫ
::ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АМЕЛОБЛАСТОМЫ::[html]ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АМЕЛОБЛАСТОМЫ{
~энуклеации опухоли
~цистэктомии
~цистотомии
=резекции нижней челюсти в пределах здоровых тканей
~марсупиализации опухоли
}

// question: 4137319 name: Хирургическое лечение остеобластокластомы заключается в:
::Хирургическое лечение остеобластокластомы заключается в\:::[html]Хирургическое лечение остеобластокластомы заключается в\:{
=Резекции челюсти в пределах здоровых тканей
~Выскабливании с выделением оболочки
~Удалении причинных зубов
~Иссечении измененной слизистой оболочки
}

// question: 4137332 name: Хирургическое лечение остеобластокластомы заключается в:
::Хирургическое лечение остеобластокластомы заключается в\:::[html]Хирургическое лечение остеобластокластомы заключается в\:{
=Резекции челюсти в пределах здоровых тканей
~Выскабливании с выделением оболочки

~Удалении причинных зубов
~Иссечении измененной слизистой оболочки
}

// question: 4123474 name: ХОНДРОСАРКОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ
::ХОНДРОСАРКОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ::[html]ХОНДРОСАРКОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ{
~дифференцированных миоцитов
~дифференцированных фибробластов
=дифференцированных хрящевых клеток
~малодифференцированных остеоцитов
}

// question: 4174931 name: ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ НА ПУТЯХ ЛИМФООТТОКА ПРИ РАКЕ СЛИЗИСТОЙ ДНА ПОЛОСТИ РТА ...
::ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ НА ПУТЯХ ЛИМФООТТОКА ПРИ РАКЕ СЛИЗИСТОЙ ДНА ПОЛОСТИ РТА ...::[html]ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ НА ПУТЯХ ЛИМФООТТОКА ПРИ РАКЕ СЛИЗИСТОЙ ДНА ПОЛОСТИ РТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ В{
~внутренние органы
~отдаленные лимфоузлы
=регионарные лимфоузлы
~головной мозг
}

// question: 4123500 name: ЦЕМЕНТОМА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
::ЦЕМЕНТОМА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ::[html]ЦЕМЕНТОМА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ{
~на нижней челюсти в области ветви
~на нижней челюсти в области подбородка и тела
=на верхней челюсти
~одинаково часто поражает обе челюсти
}

// question: 4123520 name: ЦИЛИНДРОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ
::ЦИЛИНДРОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ::[html]ЦИЛИНДРОМА МЕТАСТАЗИРУЕТ{
~в головной мозг
=в легкие, позвоночный столб, кости таза, лимфатические узлы шеи
~цилиндрома никогда не метастазирует
}

// question: 4123517 name: ЦИЛИНДРОМА ПОРАЖАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
::ЦИЛИНДРОМА ПОРАЖАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО::[html]ЦИЛИНДРОМА ПОРАЖАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО{

~околоушную слюнную железу
~подъязычную слюнную железу
=твердое и мягкое небо
~подчелюстную слюнную железу
}

// question: 4174681 name: ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЕ ЧЕЛЮСТИ ЕСЛИ
::ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЕ ЧЕЛЮСТИ ЕСЛИ::[html]ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЕ ЧЕЛЮСТИ ЕСЛИ{
~прорастает в верхнечелюстной синус
~она имеет небольшие размеры (до 3-х зубов в полости)
=в полости ее находятся корни нескольких интактных зубов
~не прорастает в верхнечелюстной синус
}

// question: 4174682 name: ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЕ ЧЕЛЮСТИ ЕСЛИ
::ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЕ ЧЕЛЮСТИ ЕСЛИ::[html]ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЕ ЧЕЛЮСТИ ЕСЛИ{
=прорастает в полость носа
~прорастает в верхнечелюстной синус
~она имеет небольшие размеры (до 3-х зубов в полости)
~не прорастает в верхнечелюстной синус
}

// question: 4174898 name: ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ...
::ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ...::[html]ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРОВОДЯТ ИССЛЕДУЯ КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ{
~слюны
~пародонтальной жидкости
~соскоба задней стенки глотки
=промывных вод верхнечелюстной пазухи
}

// question: 4123349 name: ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОД СОБОЙ
::ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОД СОБОЙ::[html]ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОД СОБОЙ{
~исследование участка ткани опухоли
~полное исследование небольшой опухоли

~исследование распространенности опухоли
=исследование клеточного состава опухоли, полученное при пункции
}

// question: 4174714 name: ЧАЩЕ ВСЕГО ЛИПОМА ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В ОБЛАСТИ
::ЧАЩЕ ВСЕГО ЛИПОМА ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В ОБЛАСТИ::[html]ЧАЩЕ ВСЕГО ЛИПОМА ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В ОБЛАСТИ{
=щечной
~лобной
~височной
~околоушно-жевательной
}

// question: 4123347 name: ЧЕМ ВЫШЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
::ЧЕМ ВЫШЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК::[html]ЧЕМ ВЫШЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК{
~тем быстрее она растет
=тем медленнее она растет
~тем быстрее она метастазирует
~тем быстрее она изъязвляется
}

// question: 4123274 name: Шкала Хаунсфилда используется при выполнении следующей методики:
::Шкала Хаунсфилда используется при выполнении следующей методики\:::[html]Шкала Хаунсфилда используется при выполнении следующей методики\:{
=Компьютерной томографии
~ЯМР-томографии
~Позитронно-эмиссионной томографии
~Сонотомографии
}

// question: 4123342 name: ЭКСЦИЗИОННАЯ БИОПСИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ
::ЭКСЦИЗИОННАЯ БИОПСИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ::[html]ЭКСЦИЗИОННАЯ БИОПСИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ{
~исследование тканей патологического очага путем соскоба
=иссечение патологического очага и здоровых тканей
~исследование тканей путем иссечения кусочка ткани из центра опухоли
~исследование очага поражения путем пункции
}

// question: 4137284 name: Эндогенный фактор развития лейкоплакии:
::Эндогенный фактор развития лейкоплакии\:::[html]Эндогенный фактор развития лейкоплакии\:{
	=	ВПЧ
	~	Неблагоприятный метеорологический фактор
	~	Профессиональная вредность
	~	Чрезмерное употребление пряностей, алкоголя, курения
}

// question: 4123357 name: ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДЯТ ПРИ ОПУХОЛЯХ
::ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДЯТ ПРИ ОПУХОЛЯХ::[html]ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДЯТ ПРИ ОПУХОЛЯХ{
	~Глубоко залегающих в тканях
	~Метастазирующих в печень, почки или позвоночный столб
	=Локализующихся в верхнечелюстной пазухе и клетках решетчатого лабиринта
	~Локализующихся в полости рта
}

// question: 4123501 name: ЭПУЛИС МОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ
::ЭПУЛИС МОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ::[html]ЭПУЛИС МОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ{
	=опухолеподобное образование, локализующееся на десне
	~злокачественную опухоль
	~промежуточную группу между доброкачественными и злокачественными опухолями
	~реактивное разрастание слизистой оболочки
}

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021/ГВ3
$CATEGORY: $course$/top/2021/ГВ3

// question: 4123837 name: Симптом не характерный для медиастенита:
::Симптом не характерный для медиастенита\:::[html]Симптом не характерный для медиастенита\:{
	~появление сосудистого инфильтрата в области яремной впадины
	~расстройство дыхания
	=многократная рвота
}

// question: 4123696 name: Абсцесс верхней губы способствует развитию воспалительного процесса в ...

::Абсцесс верхней губы способствует развитию воспалительного процесса в ...::[html]Абсцесс верхней губы способствует развитию воспалительного процесса в лимфатических узлах\:{
	~Подподбородочных
	~Поднижнечелюстных
	=Околоушных
	~Молярных
}

// question: 4123214 name: АБСЦЕСС ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ
::АБСЦЕСС ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ::[html]АБСЦЕСС ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ{
	=Острой или хронической гнойной инфекции
	~Снижения защитных сил организма
	~Локального повреждения кожи или слизистой оболочки
	~Распространения гнойного воспаления по межфасциальным щелям
	~Вирусной инфекции
}

// question: 4123644 name: Абсцесс и флегмону языка стоит дифференцировать с:
::Абсцесс и флегмону языка стоит дифференцировать с\:::[html]Абсцесс и флегмону языка стоит дифференцировать с\:{
	=Флегмоной дна полости рта
	~Тризмом
	~Флегмоной щечной области
	~Флегмоной височной области
}

// question: 4123222 name: АБСЦЕСС КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА ФОРМИРУЕТСЯ В КЛЕТЧАТКЕ
::АБСЦЕСС КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА ФОРМИРУЕТСЯ В КЛЕТЧАТКЕ::[html]АБСЦЕСС КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА ФОРМИРУЕТСЯ В КЛЕТЧАТКЕ{
	~между шилоязычными и небно-язычными мышцами
	=между подбородочно-язычными и подъязычно-язычными мышцами
	~между передними брюшками двубрюшных мышц
	~между челюстно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцами
	~между подъязычной слюнной железой и боковой поверхностью языка
}

// question: 4123627 name: Абсцесс корня языка вскрывают:
::Абсцесс корня языка вскрывают\:::[html]Абсцесс корня языка вскрывают\:{
	~Со стороны полости рта
	~Через треугольник Пирогова
	~Со стороны подчелюстной области

=Со стороны подподбородочной области
}

// question: 4123186 name: АБСЦЕСС ОТГРАНИЧЕН
::АБСЦЕСС ОТГРАНИЧЕН::[html]АБСЦЕСС ОТГРАНИЧЕН{
=Пиогенной мембраной
~Базальной мембраной
~Миелиновой оболочкой
~Полупроницаемой мембраной
~Эндотелиальной выстилкой
}

// question: 4123202 name: АБСЦЕСС ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ
::АБСЦЕСС ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ::[html]АБСЦЕСС ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ{
~С острым или обострившимся периодонтитом
~С острым лимфаденитом
~С острым воспалением коньюктивы
=С острым гнойным периоститом верхней челюсти
~С пародонтальным абсцессом
}

// question: 4123193 name: АБСЦЕСС ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
::АБСЦЕСС ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ::[html]АБСЦЕСС ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ{
~В клетчаточное пространство поднижнечелюстного треугольника
=В клетчаточные пространства дна полости рта
~В толщу языка
~В зачелюстную ямку
~В подвисочную и крыловидно-небную ямки
}

// question: 4123184 name: АБСЦЕСС ЭТО
::АБСЦЕСС ЭТО::[html]АБСЦЕСС ЭТО{
~Разлитой очаг гнойного воспаления
~Вялотекущий очаг воспаления
=Ограниченный очаг гнойного воспаления
~Очаг гнойного воспаления без четких границ
~Реактивный очаг катарального воспаления

}

// question: 4137683 name: Абсцессом называется:
::Абсцессом называется\:::[html]Абсцессом называется\:{
	~Разлитое гнойно-воспалительное заболевание
	=Ограниченное гнойно-воспалительное заболевание
	~Воспаление волосяного фолликула
	~Воспаление сальной железы
}

// question: 4123668 name: Абсцессу подъязычной области присущи боль при глотании, а также
::Абсцессу подъязычной области присущи боль при глотании, а также::[html]Абсцессу подъязычной области присущи боль при глотании, а также{
	~боль при открывании рта
	~нарушение речи и затруднение открывания рта
	=нарушение речи, припухлость в подбородочной области, свободное открывание рта, затруднённое дыхание
	~дренировании имеющихся потенциальных гнойных очагов
	~открывании рта и пальпации позади ветви нижней челюсти
}

// question: 4123625 name: Ангиной Людвига считают:
::Ангиной Людвига считают\:::[html]Ангиной Людвига считают\:{
	=Гнилостно-некротическую флегмону дна полости рта
	~Гнилостную флегмону подподбородочной области
	~Гангренозную флегмону поднижнечелюстной области
	~Гангренозную флегмону подъязычной области и корня языка
}

// question: 4123792 name: Антибактериальную терапию при сепсисе следует начинать;
::Антибактериальную терапию при сепсисе следует начинать;::[html]Антибактериальную терапию при сепсисе следует начинать;{
	~При положительных посевах крови
	~После получения антибиотикограмм
	~При обнаружении первичного или метастатических очагов
	=С момента установления диагноза
}

// question: 4137690 name: Атерома может нагнаиваться:
::Атерома может нагнаиваться\:::[html]Атерома может нагнаиваться\:{
	=Верно

~Неверно
}

// question: 4137691 name: Атерома не может нагнаиваться:
::Атерома не может нагнаиваться\:::[html]Атерома не может нагнаиваться\:{
~Верно
=Неверно
}

// question: 4137699 name: Атерома требует хирургического лечения
::Атерома требует хирургического лечения::[html]Атерома требует хирургического лечения{
=Верно
~Неверно
}

// question: 4137689 name: Атерома ЧЛО – это:
::Атерома ЧЛО – это\:::[html]Атерома ЧЛО – это\:{
~Разлитое гнойно-воспалительное заболевание
~Ограниченное гнойно-воспалительное заболевание
~Воспаление волосяного фолликула
~Воспаление сальной железы
=Ретенционная киста сальной железы
}

// question: 4137704 name: Атерома ЧЛО лечится:
::Атерома ЧЛО лечится\:::[html]Атерома ЧЛО лечится\:{
=В один этап
~В два этапа
~В три этапа
~Хирургическому лечению не подлежит
}

// question: 4137706 name: Атерома ЧЛО лечится:
::Атерома ЧЛО лечится\:::[html]Атерома ЧЛО лечится\:{
~Амбулаторно косметологом
~Амбулаторно стоматологом
~В стационаре общим хирургом
=В стационаре челюстно-лицевым хирургом
}

// question: 4137703 name: Атерома является:
::Атерома является\:::[html]Атерома является\:{
	~Новообразованием
	~Воспалительным процессом
	=Ретенционной кистой
	~Специфическим воспалительным процессом
}

// question: 4123806 name: Бактериемия в крови характерна для:
::Бактериемия в крови характерна для\:::[html]Бактериемия в крови характерна для\:{
	~тромбофлебита
	~медиастинита
	=сепсиса
}

// question: 4123801 name: Боль за грудиной, усиливающаяся при глубоком вдохе и запрокидывании головы, ...
::Боль за грудиной, усиливающаяся при глубоком вдохе и запрокидывании головы, ...::[html]Боль за грудиной, усиливающаяся при глубоком вдохе и запрокидывании головы, свидетельствует о\:{
	~распространении инфекции на дно полости рта
	~генерализации инфекции
	=распространении гнойного процесса в средостение
}

// question: 4123212 name: БОЛЬ И НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ГНОЙНОГО ИНФИЛЬТРАТА В ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШКИ ...
::БОЛЬ И НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ГНОЙНОГО ИНФИЛЬТРАТА В ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШКИ ...::[html]БОЛЬ И НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ГНОЙНОГО ИНФИЛЬТРАТА В ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕЗЦА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАНИЕМ{
	~Для удаления центрального резца
	~Для проведения апикоэктомии (резекции верхушки корня)
	=Для вскрытия и дренирования инфильтрата путем инцизии в проекции верхушки корня
	~Для дренирования очага гнойного воспаления через канал корня зуба
	~Для проведения физиотерапевтического лечения
}

// question: 4123843 name: Боль при пальпации, поглаживании или оттягивании кверху сосудисто-нервного ...

::Боль при пальпации, поглаживании или оттягивании кверху сосудисто-нервного ...::[html]Боль при пальпации, поглаживании или оттягивании кверху сосудисто-нервного пучка - это\:{
	~симптом Герке
	~симптом Равич-Щербо
	~симптом Воскресенского
	=симптом Иванова
}

// question: 4123823 name: В какие сроки необходимо начинать применение ЛФК при воспалительных ...
::В какие сроки необходимо начинать применение ЛФК при воспалительных ...::[html]В какие сроки необходимо начинать применение ЛФК при воспалительных заболеваниях ЧЛО?{
	~В начале заболевания
	~В период острого течения
	~Как профилактические мероприятия
	=По окончании острого периода заболевания.
}

// question: 4123752 name: В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит:
::В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит\:{
	=Дезинтоксикационная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123753 name: В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит:
::В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит\:{
	=Антибактериальная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123754 name: В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит:

::В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса и флегмоны крыловидно-небной ямки входит\:{
=Анальгетическая терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123749 name: В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит:
::В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит\:{
=Дезинтоксикационная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123750 name: В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит:
::В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит\:{
=Антибактериальная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123751 name: В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит:
::В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса и флегмоны подвисочной ямки входит\:{
=Анальгетическая терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123711 name: В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит:
::В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит\:{
=Дезинтоксикационная терапия

~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123712 name: В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит:
::В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит\:{
=Антибактериальная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123713 name: В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит:
::В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса подглазничной области входит\:{
=Анальгетическая терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123714 name: В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит:
::В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит\:{
=Дезинтоксикационная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123715 name: В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит:
::В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит\:{
=Антибактериальная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123716 name: В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит:
::В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса скуловой области входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123717 name: В комплекс лечения абсцесса щечной области входит:
::В комплекс лечения абсцесса щечной области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса щечной области входит\:{
	=Дезинтоксикационная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123718 name: В комплекс лечения абсцесса щечной области входит:
::В комплекс лечения абсцесса щечной области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса щечной области входит\:{
	=Антибактериальная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123719 name: В комплекс лечения абсцесса щечной области входит:
::В комплекс лечения абсцесса щечной области входит\:::[html]В комплекс лечения абсцесса щечной области входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123576 name: В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит
::В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит::[html]В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит{
	=ГБО
	~криотерапия

~химиотерапия
~рентгенотерапия
}

// question: 4123577 name: В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит
::В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит::[html]В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит{
~лучевая терапия
~седативная терапия
~гипотензивная терапия
=антибактериальная терапия
}

// question: 4123578 name: В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит
::В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит::[html]В комплекс лечения гнилостно-некротической флегмоны лица входит{
~лучевая терапия
~седативная терапия
~гипотензивная терапия
=дезинтоксикационная терапия
}

// question: 4123746 name: В комплекс лечения флегмоны височной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны височной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны височной области входит\:{
=Дезинтоксикационная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123747 name: В комплекс лечения флегмоны височной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны височной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны височной области входит\:{
=Антибактериальная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123748 name: В комплекс лечения флегмоны височной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны височной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны височной области входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123654 name: В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит:
::В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит\:{
	=Дезинтоксикационная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123655 name: В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит:
::В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит\:{
	=Антибактериальная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123656 name: В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит:
::В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123708 name: В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит\:{
	=Дезинтоксикационная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия

~Лучевое воздействие
}

// question: 4123709 name: В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит\:{
=Антибактериальная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123710 name: В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны околоушно-жевательной области входит\:{
=Анальгетическая терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123705 name: В комплекс лечения флегмоны орбиты входит:
::В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:{
=Дезинтоксикационная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123706 name: В комплекс лечения флегмоны орбиты входит:
::В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:{
=Антибактериальная терапия
~Химиотерапия
~Криотерапия
~Лучевое воздействие
}

// question: 4123707 name: В комплекс лечения флегмоны орбиты входит:

::В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123743 name: В комплекс лечения флегмоны орбиты входит:
::В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:{
	=Дезинтоксикационная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123744 name: В комплекс лечения флегмоны орбиты входит:
::В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:{
	=Антибактериальная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123745 name: В комплекс лечения флегмоны орбиты входит:
::В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны орбиты входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123589 name: В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит\:{
	=Дезинтоксикационная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие

}

// question: 4123590 name: В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит\:{
	=Антибактериальная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123591 name: В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны поднижнечелюстной области входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123585 name: В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:{
	=Физиолечение
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123586 name: В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:{
	=Дезинтоксикационная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123587 name: В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:{
	=Антибактериальная терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123588 name: В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит:
::В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:::[html]В комплекс лечения флегмоны подподбородочной области входит\:{
	=Анальгетическая терапия
	~Химиотерапия
	~Криотерапия
	~Лучевое воздействие
}

// question: 4123198 name: В ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНА МЫШЦА
::В ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНА МЫШЦА::[html]В ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНА МЫШЦА{
	~Малая скуловая мышца
	~Треугольная мышца верхней губы
	=Квадратная мышца верхней губы
	~Мышца, поднимающая верхнее веко
	~Круговая мышца глаза
}

// question: 4123798 name: Важнейшим методом диагностики медиастинита является:
::Важнейшим методом диагностики медиастинита является\:::[html]Важнейшим методом диагностики медиастинита является\:{
	~пункция
	=рентгенография органов грудной клетки
	~посев крови на стерильность
}

// question: 4123199 name: ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ
::ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ::[html]ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ{
	~С венами верхнего зубного сплетения
	~С венами подвисочной ямки

~С венами полости носа
~С поперечной веной лица
=С верхней и нижней венами глазницы
}

// question: 4123225 name: ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ
::ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ::[html]ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ{
~С венами верхнего зубного сплетения
~С венами подвисочной ямки
~С венами полости носа
~С поперечной веной лица
=С верхней и нижней венами глазницы
}

// question: 4123776 name: Вены подглазничной области анастомозируют:
::Вены подглазничной области анастомозируют\:::[html]Вены подглазничной области анастомозируют\:{
~С венами верхнего зубного сплетения
~С венами подвисочной ямки
~С венами полости носа
~С поперечной веной лица
=С верхней и нижней венами глазницы
}

// question: 4123847 name: Верно ли утверждение: в стадии компенсации сепсиса еще нет признаков ...
::Верно ли утверждение\: в стадии компенсации сепсиса еще нет признаков ...::[html]Верно ли утверждение\: в стадии компенсации сепсиса еще нет признаков выраженных нарушений со стороны жизненно важных систем\:{
=Да
~нет
}

// question: 4123200 name: ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АБСЦЕССА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ
::ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АБСЦЕССА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ::[html]ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АБСЦЕССА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ{
=Хронический периодонтит верхнего клыка и первого премоляра
~Хронический периодонтит центрального резца
~Обострение хронического простого пульпита верхнего клыка и первого премоляра

~Хронический периодонтит первого верхнего моляра
~Хронический гангренозный пульпит второго верхнего моляра
}

// question: 4123187 name: ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОГО АБСЦЕССА
::ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОГО АБСЦЕССА::[html]ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОГО АБСЦЕССА{
~Глубокий кариес
~Острый гнойный пульпит
~Хронический фиброзный периодонтит
=Обострившийся гранулирующий периодонтит
~Обострившийся хронический простой пульпит
}

// question: 4123209 name: ВЕРОЯТНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ АБСЦЕССА В ПОДВИСОЧНОЙ ЯМКЕ
::ВЕРОЯТНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ АБСЦЕССА В ПОДВИСОЧНОЙ ЯМКЕ::[html]ВЕРОЯТНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ АБСЦЕССА В ПОДВИСОЧНОЙ ЯМКЕ{
~Премоляры верхней челюсти
~Клыки верхней челюсти
=Блокада верхних задних луночковых нервов
~Торусальная анестезия
~Блокада нижнего луночкового нерва
}

// question: 4123730 name: Верхней границей околоушно-жевательной области является:
::Верхней границей околоушно-жевательной области является\: ::[html]Верхней границей околоушно-жевательной области является\: {
=нижний край скуловой кости и скуловой дуги;
~нижний край тела нижней челюсти;
~нижняя стенка наружного слухового прохода.
}

// question: 4123740 name: Верхней границей подвисочной ямки является:
::Верхней границей подвисочной ямки является\:::[html]Верхней границей подвисочной ямки является\:{
=Подвисочный гребень основной кости
~Наружная пластинка крыловидного отростка
~Внутренняя поверхность ветви нижней челюсти

~Шиловидный отросток
}

// question: 4123702 name: Верхней границей подглазничной области является:
::Верхней границей подглазничной области является\:::[html]Верхней границей подглазничной области является\:{
=Нижний край глазницы
~Скулочелюстной шов
~Край грушевидного отверстия
~Ресницы нижнего века
}

// question: 4123618 name: Верхней границей позадичелюстной области является:
::Верхней границей позадичелюстной области является\:::[html]Верхней границей позадичелюстной области является\:{
~нижний край скуловой кости и скуловой дуги;
=нижняя стенка наружного слухового прохода;
~верхняя стенка наружного слухового прохода;
~латеральная крыловидная мышца.
}

// question: 4123635 name: Верхней границей челюстно-язычного желобка является:
::Верхней границей челюстно-язычного желобка является\:::[html]Верхней границей челюстно-язычного желобка является\:{
=Задний отдел челюстно-подъязычной мышцы
~Основание передней небной дужки
~Слизистая оболочка дна полости рта
~Внутренняя поверхность тела нижней челюсти на уровне моляров
}

// question: 4123727 name: Верхней границей щечной области является:
::Верхней границей щечной области является\:::[html]Верхней границей щечной области является\:{
=нижний край скуловой кости
~скулоальвеолярный гребень
~височная кость
~верхний край скуловой кости
}

// question: 4123741 name: Верхней и задней границей височной области является:
::Верхней и задней границей височной области является\:::[html]Верхней и задней границей височной области является\:{

=Височная линия
~Скуловая дуга
~Чешуя височной кости
~Лобный отросток скуловой кости
}

// question: 4123646 name: Верхняя граница дна полости рта:
::Верхняя граница дна полости рта\:::[html]Верхняя граница дна полости рта\:{
~Внутренняя поверхность тела нижней челюсти
~Заднее брюшко двубрюшной мышцы
=Слизистая оболочка дна полости рта
~Основание языка
}

// question: 4123651 name: Верхняя граница подъязычной области:
::Верхняя граница подъязычной области\:::[html]Верхняя граница подъязычной области\:{
~Внутренняя поверхность тела нижней челюсти
~Заднее брюшко двубрюшной мышцы
=Слизистая оболочка дна полости рта
~Основание языка
}

// question: 4123736 name: Височно-крыловидное пространство сверху сообщается с:
::Височно-крыловидное пространство сверху сообщается с\:::[html]Височно-крыловидное пространство сверху сообщается с\:{
=Глубокой клетчаткой височной ямки
~Клетчаткой межкрыловидного пространства
~Подподбородочной клетчатко
~Височным межапоневротическим пространством
}

// question: 4123633 name: Возбудителем гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта является:
::Возбудителем гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта является\:::[html]Возбудителем гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта является\:{
=Анаэробная микрофлора
~Грибковая инфекция
~Золотистый стафилококк
~Гемолитический стрептококк
}

// question: 4123570 name: Возбудителями гнилостно-некротической флегмоны лица являются
::Возбудителями гнилостно-некротической флегмоны лица являются::[html]Возбудителями гнилостно-некротической флегмоны лица являются{
	~туберкулезные микобактерии
	~стафилококки, стрептококки
	~лучистые грибы, стафилококки
	=факультативные анаэробы, гемолитический стрептококк
}

// question: 4123697 name: Воспалительная контрактура наблюдается при флегмоне:
::Воспалительная контрактура наблюдается при флегмоне\:::[html]Воспалительная контрактура наблюдается при флегмоне\:{
	~Подподбородочного пространства
	=Субмассетериального пространства
	~Крыловидно-небной ямки
	~Подвисочной ямки
}

// question: 4157712 name: Воспалительный процесс какой области является одонтогенной причиной для ...
::Воспалительный процесс какой области является одонтогенной причиной для ...::[html]Воспалительный процесс какой области является одонтогенной причиной для развития абсцесса и флегмоны языка\:{
	=зубы нижней челюсти
	~верхняя губа
	~зубы верхней челюсти
	~лимфоузлы околоушной области.
}

// question: 4123223 name: ВСКРЫТИЕ ГЛУБОКОГО АБСЦЕССА КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА ПРОВОДЯТ
::ВСКРЫТИЕ ГЛУБОКОГО АБСЦЕССА КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА ПРОВОДЯТ::[html]ВСКРЫТИЕ ГЛУБОКОГО АБСЦЕССА КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА ПРОВОДЯТ{
	~разрезом по средней линии через спинку языка
	~продольным разрезом через слепое отверстие языка
	~разрезом в средней трети боковой поверхности языка
	=разрезом через кожу в подподбородочной области
	~разрезом через кожу в поднижнечелюстной области
}

// question: 4123757 name: Вторичное поражение глазницы возникает в результате распространения инфекции из:
::Вторичное поражение глазницы возникает в результате распространения инфекции из\:::[html]Вторичное поражение глазницы возникает в результате распространения инфекции из\:{
	=подвисочной области
	~щечной
	~околоушно-жевательной
}

// question: 4123721 name: Вторичное поражение скуловой области развивается в результате распространения...
::Вторичное поражение скуловой области развивается в результате распространения...::[html]Вторичное поражение скуловой области развивается в результате распространения инфекции из\:{
	=щечной области
	~височной области
	~бокового отдела носа
	~крылонебной ямки
}

// question: 4123606 name: Выберите из перечисленных ниже, возможные источники инфицирования гнойных ...
::Выберите из перечисленных ниже, возможные источники инфицирования гнойных ...::[html]Выберите из перечисленных ниже, возможные источники инфицирования гнойных воспалительных процессов челюстно-лицевой области\:{
	~одонтогенные
	~тонзилогенные
	~риногенные и отогенные
	=Все ответы верны
}

// question: 4123607 name: Выберите правильный вариант ответа, характеризующий воспалительный инфильтрат:
::Выберите правильный вариант ответа, характеризующий воспалительный инфильтрат\:::[html]Выберите правильный вариант ответа, характеризующий воспалительный инфильтрат\:{
	~кожа обычной окраски;
	=кожа гиперемирована, горячая на ощупь;
	~при пальпации инфильтрат безболезненный.
}

// question: 4123834 name: Выбрать симптом Равич-Щербо:

::Выбрать симптом Равич-Щербо\:::[html]Выбрать симптом Равич-Щербо\:{
	~боль в глубине грудной клетки при перкуссии грудины
	=втяжение тканей яремной впадины при вдохе
	~то же, что диафрагмальный синдром
}

// question: 4123742 name: Выраженное ограничение открывания рта появляется при флегмоне области:
::Выраженное ограничение открывания рта появляется при флегмоне области\:::[html]Выраженное ограничение открывания рта появляется при флегмоне области\:{
	=Височной
	~Скуловой
	~Подчелюстной
	~Щечной
}

// question: 4123803 name: Гектическая лихорадка с разницей температуры тела 1 - 2°С свидетельствует о:
::Гектическая лихорадка с разницей температуры тела 1 - 2°С свидетельствует о\:::[html]Гектическая лихорадка с разницей температуры тела 1 - 2°С свидетельствует о\:{
	~тромбофлебите лицевых вен
	~медиастините
	=сепсисе
}

// question: 4123775 name: Глазничные вены (vv.orbitales) несут кровь в
::Глазничные вены (vv.orbitales) несут кровь в::[html]Глазничные вены (vv.orbitales) несут кровь в{
	=Пещеристый синус (sinus cavernosus)
	~Передня яремная вена (v.jugularis ant.)
	~Поверхностная височная вена (v.temporalis superficialis)
	~Сигмовидный синус (sinus sigmoideus)
}

// question: 4123657 name: Глотание болезненно при флегмоне (абсцессе) областей
::Глотание болезненно при флегмоне (абсцессе) областей::[html]Глотание болезненно при флегмоне (абсцессе) областей{
	~височной
	~щёчной
	=челюстно-язычного желобка
	~подподбородочной

~околоушно-жевательной
}

// question: 4123670 name: Глотание болезненно при флегмоне (абсцессе) областей
::Глотание болезненно при флегмоне (абсцессе) областей::[html]Глотание болезненно при флегмоне (абсцессе) областей{
~щёчной
=челюстно-язычного желобка
~подподбородочной
~околоушно-жевательной
}

// question: 4123760 name: Границы подвисочной ямки:
::Границы подвисочной ямки\:::[html]Границы подвисочной ямки\:{
~переднюю стенку составляют задняя поверхность тела верхней челюсти и глазничный отросток небной кости, сзади ямка ограничена крыловидным отростком клиновидной и медиально наружной поверхностью вертикальной части небной кости, сверху нижней поверхностью тела и основанием большого крыла клиновидной кости
=сверху – нижняя поверхность большого крыла клиновидной кости, спереди – бугор верхней челюсти и нижний отдел височной поверхности скуловой кости, снизу-щечно-глоточная фасция, сзади шиловидный отросток височной кости с отходящими от него мышцами и передняя поверхность мыщелкового отростка верхней челюсти, изнутри – наружная пластинка клиновидного отростка клиновидной кости, снаружи – внутренняя поверхность ветви нижней челюсти
}

// question: 4123783 name: Дайте определение сепсиса:
::Дайте определение сепсиса\:::[html]Дайте определение сепсиса\:{
=Сепсис - генерализованный инфекционный процесс нециклического типа в условиях постоянного или периодического поступления из очага инфекции в кровоток микроорганизмов и их токсинов на фоне неадекватной реакции организма вследствии несостоятельности иммунной системы
~Сепсис - общая гнойная инфекция, осложняющая течение местных гнойно-воспалительных процессов
~Сепсис - заболевание, возникающее при попадании инфекции в организм на фоне снижения активности иммунозащиты
~Сепсис - своеобразная реакция организма на инфицирование без каких-либо специфических проявлений
~Сепсис - наличие микробов в крови
}

// question: 4123810 name: Дифференциальная диагностика тромбоза кавернозного синуса проводится с:

::Дифференциальная диагностика тромбоза кавернозного синуса проводится с\:::[html]Дифференциальная диагностика тромбоза кавернозного синуса проводится с\:{
	=реактивным отеком глазницы
	~гайморитом
	~сиалоаденитом
	~лимфаденитом
}

// question: 4123613 name: Дифференциальный диагноз флегмоны позадичелюстной области следует проводит с:
::Дифференциальный диагноз флегмоны позадичелюстной области следует проводит с\:::[html]Дифференциальный диагноз флегмоны позадичелюстной области следует проводит с\:{
	=Острым паротитом
	~Флегмоной подглазничной области
	~Флегмоной корня языка
	~Аденофлегмоной верхнего отдела шеи
}

// question: 4123615 name: Дифференциальный диагноз флегмоны позадичелюстной области следует проводит с:
::Дифференциальный диагноз флегмоны позадичелюстной области следует проводит с\:::[html]Дифференциальный диагноз флегмоны позадичелюстной области следует проводит с\:{
	=острым паротитом
	~флегмоной подглазничной области
	~флегмоной корня языка
	~аденофлегмоной верхнего отдела шеи
}

// question: 4123700 name: Дифференциальный диагноз флегмоны щечной области необходимо проводить с:
::Дифференциальный диагноз флегмоны щечной области необходимо проводить с\:::[html]Дифференциальный диагноз флегмоны щечной области необходимо проводить с\:{
	=Субмассетериальным абсцессом
	~Флегмоной дна полости рта
	~Тризмом
	~Карбункулом нижней губы
}

// question: 4123666 name: Для абсцесса ретромолярного пространства не характерно:

::Для абсцесса ретромолярного пространства не характерно\:::[html]Для абсцесса ретромолярного пространства не характерно\:{
~боль в челюсти
~нарушение открывание рта
=онемение губы
~подвижность причинного зуба
}

// question: 4123671 name: Для абсцесса челюстно-язычного желобка характерны:
::Для абсцесса челюстно-язычного желобка характерны\:::[html]Для абсцесса челюстно-язычного желобка характерны\:{
~боль при глотании, повышение саливации, свободное открывание рта
~ограничение открывания рта, болезненное и затрудненное глотание
=болезненное открывание рта и глотание
~открывание рта резко ограничено, глотание безболезненное
~невозможность глотания, затрудненное дыхание, ограниченное открывание рта
}

// question: 4123207 name: ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОСТИНЬЕКЦИОННГО АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
::ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОСТИНЬЕКЦИОННГО АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ::[html]ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОСТИНЬЕКЦИОННГО АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ{
=Подробно собранный анамнез
~Проведение дополнительных методов исследования
~Знание фармакодинамики введенных лекарственных препаратов
~Подробно собранный аллергологический анамнез
~Знание анатомических ориентиров для выполнения анестезии
}

// question: 4123731 name: Для какой флегмоны характерна следующая клиническая картина: отек щеки, ...
::Для какой флегмоны характерна следующая клиническая картина\: отек щеки, ...::[html]Для какой флегмоны характерна следующая клиническая картина\: отек щеки, верхнего и нижнего века, кожа щечной области гиперемирована, отечна, лоснится, в складку не собирается, глазная щель сужена, открывание рта ограничено\:{
~крыловидной ямки
~околоушно-жевательной области
=щечной области
~окологлоточного пространства
}

// question: 4123831 name: Для какой цели назначаются микробные полисахариды:
::Для какой цели назначаются микробные полисахариды\:::[html]Для какой цели назначаются микробные полисахариды\:{
	~Дезинтоксикация
	=Повышение неспецифической резистентности организма
	~Седативное действие
	~Парентеральное питание
}

// question: 4123622 name: Для клинической картины флегмоны крылочелюстного пространства характерно:
::Для клинической картины флегмоны крылочелюстного пространства характерно\:::[html]Для клинической картины флегмоны крылочелюстного пространства характерно\:{
	~прогрессирующее ограничение открывания рта;
	~боль при глотании;
	~наличие болевой точки на внутренней поверхности угла нижней челюсти (в области прикрепления к кости сухожилия медиальной крыловидной мышцы).
	=Все ответы верны
}

// question: 4123185 name: ДЛЯ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН СИМПТОМ
::ДЛЯ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН СИМПТОМ::[html]ДЛЯ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН СИМПТОМ{
	~Зуд
	=Боль
	~Парестезия
	~Гипотермия
	~Иррадиация
}

// question: 4123664 name: Для острого периостита характерна боль в:
::Для острого периостита характерна боль в\:::[html]Для острого периостита характерна боль в\:{
	~"причинном" зубе
	~половине челюсти
	~участке челюсти
	=нескольких зубах
}

// question: 4123764 name: Для флегмон подвисочной ямки характерно:
::Для флегмон подвисочной ямки характерно\:::[html]Для флегмон подвисочной ямки характерно\:{

~сухость во рту, резкая боль при глотании, сглаженность передней небной дужки, передняя небная дужка смещена медиально, отечность и гиперемия кожи скуловой и височной области

=ограничение открывания рта, острое начало с высокой температурой тела, болезненный инфильтрат за бугром верхней челюсти, отек мягких тканей щечной и нижних отделов височной области

}

// question: 4123766 name: Для флегмоны височной области характерно:
::Для флегмоны височной области характерно\:::[html]Для флегмоны височной области характерно\:{

~осиплость речи, боль при глотании, обильная саливация

=высокая температура, глубокая флюктуация в височной области, воспалительная контрактура нижней челюсти

~свободное открывание рта, пальпация малоболезненная, одностороннее снижение слуха

}

// question: 4123701 name: Для флегмоны щеки характерно:
::Для флегмоны щеки характерно\:::[html]Для флегмоны щеки характерно\:{

=Сглаженность носогубной складки

~Свободное открывание рта

~Болезненное глотание

~Двоение в глазах

}

// question: 4123679 name: Дополнительные рентгенологические методы обследования больных с флегмоной дна...
::Дополнительные рентгенологические методы обследования больных с флегмоной дна...::[html]Дополнительные рентгенологические методы обследования больных с флегмоной дна полости рта проводятся с целью\:{

~выявления распространённости процесса в мягких тканях

=выявления «причинного» зуба и возможного распространение процесса на средостение

}

// question: 4123782 name: Доступ по В.И. Разумовскому применяют при:
::Доступ по В.И. Разумовскому применяют при\:::[html]Доступ по В.И. Разумовскому применяют при\:{

= Верхнем заднем медиастините

~Нижнем заднем медиастините

~Нижнем переднем медиастините

~При всех формах медиастинита

}

// question: 4123734 name: Доступ при хирургическом лечении абсцесса крыловидно-небной ямки заключается ...
::Доступ при хирургическом лечении абсцесса крыловидно-небной ямки заключается ...::[html]Доступ при хирургическом лечении абсцесса крыловидно-небной ямки заключается в разрезе\: {
	=Внутриротовом
	~Наружном
	~Предушном
	~Подподбородочном
}

// question: 4123733 name: Доступ при хирургическом лечении абсцесса подвисочной области заключается в ...
::Доступ при хирургическом лечении абсцесса подвисочной области заключается в ...::[html]Доступ при хирургическом лечении абсцесса подвисочной области заключается в разрезе\:{
	=Внутриротовом
	~Наружном
	~Предушном
	~Подподбородочном
}

// question: 4123732 name: Доступ при хирургическом лечении флегмоны височной области заключается в ...
::Доступ при хирургическом лечении флегмоны височной области заключается в ...::[html]Доступ при хирургическом лечении флегмоны височной области заключается в разрезе\:{
	~Окаймляющем угол нижней челюсти
	=Параллельно ветвям лицевого нерва
	~Перпендикулярно ветвям лицевого нерва
	~В подподбородочной области
}

// question: 4123189 name: ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА
::ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА::[html]ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА{
	~Марлевыми полосками
	~Ватными тампонами
	~Бумажными салфетками
	=Резиновыми полосками
	~Гемостатической губкой

}

// question: 4123217 name: ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА
::ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА::[html]ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА{
	~Марлевыми полосками
	~Ватными тампонами
	~Бумажными салфетками
	=Резиновыми полосками
	~Гемостатической губкой
}

// question: 4123215 name: ЕСЛИ ГНОЙ ЗАПОЛНЯЕТ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШУЮ ПОЛОСТЬ
::ЕСЛИ ГНОЙ ЗАПОЛНЯЕТ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШУЮ ПОЛОСТЬ::[html]ЕСЛИ ГНОЙ ЗАПОЛНЯЕТ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШУЮ ПОЛОСТЬ{
	~Нагноение
	~Абсцедирование
	~Затечник
	=Эмпиема
	~Флюктуация
}

// question: 4123724 name: Жалобы при флегмоне подглазничной области:
::Жалобы при флегмоне подглазничной области\:::[html]Жалобы при флегмоне подглазничной области\:{
	~боль при глотании
	~боль при открывании рта
	=нарушение бинокулярного зрения
	~боль при боковых движениях челюсти
}

// question: 4123726 name: Задней границей скуловой области является:
::Задней границей скуловой области является\:::[html]Задней границей скуловой области является\:{
	~передний край жевательной мыщцы
	=височно-скуловой шов
	~скулоальвеолярный гребень
	~нижний край н/челюсти
}

// question: 4123634 name: Задней границей челюстно-язычного желобка является:

::Задней границей челюстно-язычного желобка является\:::[html]Задней границей челюстно-язычного желобка является\:{
	~Задний отдел челюстно-подъязычной мышцы
	=Основание передней небной дужки
	~Слизистая оболочка дна полости рта
	~Внутренняя поверхность тела нижней челюсти на уровне моляров
}

// question: 4123652 name: Задняя граница дна полости рта:
::Задняя граница дна полости рта\:::[html]Задняя граница дна полости рта\:{
	~Внутренняя поверхность тела нижней челюсти
	=Заднее брюшко двубрюшной мышцы
	~Слизистая оболочка дна полости рта
	~Основание языка
}

// question: 4123639 name: Затруднение при глотании является симптомом флегмоны:
::Затруднение при глотании является симптомом флегмоны\:::[html]Затруднение при глотании является симптомом флегмоны\:{
	=Дна полости рта
	~Щечной области
	~Височной области
	~Крыловидно-небной ямки
}

// question: 4123653 name: Из-за отёка сглаживается челюстно-язычный желобок при флегмоне:
::Из-за отёка сглаживается челюстно-язычный желобок при флегмоне\:::[html]Из-за отёка сглаживается челюстно-язычный желобок при флегмоне\:{
	=Дна полости рта
	~Подподбородочной области
	~Крыловидно-нижнечелюстного пространства
	~Подглазничной области
}

// question: 4123781 name: Интенсивная боль в груди, усиливающаяся при глотании или запрокидывании ...
::Интенсивная боль в груди, усиливающаяся при глотании или запрокидывании ...::[html]Интенсивная боль в груди, усиливающаяся при глотании или запрокидывании головы называется\:{
	=Симптом Герке
	~Симптом Ортнера
	~Симптом Крымова

~Симптом Куприянова
}

// question: 4123704 name: Инфекционный процесс из глазницы может распространяться в:
::Инфекционный процесс из глазницы может распространяться в\:::[html]Инфекционный процесс из глазницы может распространяться в\:{
=Крыло-небную ямку
~Ретромолярную область
~Околоушно-жевательную область
~Поднижнечелюстную область
}

// question: 4123610 name: К вторичным флегмонам, прилегающим к нижней челюсти, относятся:
::К вторичным флегмонам, прилегающим к нижней челюсти, относятся\:::[html]К вторичным флегмонам, прилегающим к нижней челюсти, относятся\:{
~Флегмона крыловидно-небной ямки;
~Флегмона поднижнечелюстной области;
=Флегмона позадичелюстной области;
~Флегмона языка.
}

// question: 4123579 name: К задней границе подподбородочной области относят:
::К задней границе подподбородочной области относят\:::[html]К задней границе подподбородочной области относят\:{
~Передние брюшки двубрюшной мышцы
~Подъязычную кость
=Челюстно-язычную мышцу
~Нижний край подбородочного отдела нижней челюсти
}

// question: 4123604 name: К поверхностным флегмонам, прилегающим к нижней челюсти, относятся:
::К поверхностным флегмонам, прилегающим к нижней челюсти, относятся\:::[html]К поверхностным флегмонам, прилегающим к нижней челюсти, относятся\:{
=Флегмона поднижнечелюстной области
~Флегмона крыловидно-нижнечелюстного пространства
~Флегмоны окологлоточного пространства
~Флегмона позадичелюстной области
}

// question: 4123643 name: К развитию асфиксии может привести гнойно-некротический процесс:
::К развитию асфиксии может привести гнойно-некротический процесс\:::[html]К развитию асфиксии может привести гнойно-некротический процесс\:{
	~Корня языка
	=Дна полости рта
	~Крыловидного пространства
	~Поднижнечелюстного пространства
}

// question: 4123846 name: К тяжелым осложнениям гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО не отностся:
::К тяжелым осложнениям гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО не отностся\:::[html]К тяжелым осложнениям гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО не отностся\:{
	~сепсис
	~медиастенит
	=фурункул
	~тромбофлебит
}

// question: 4123758 name: Как отличить гнойный периостит верхней челюсти от абсцесса крылонебной ямки?
::Как отличить гнойный периостит верхней челюсти от абсцесса крылонебной ямки?::[html]Как отличить гнойный периостит верхней челюсти от абсцесса крылонебной ямки?{
	~по выраженности интоксикации организма
	~по выраженности температуры тела
	=по наличию сглаженности (выбухания) слизистой оболочки по переходной складке
	~по наличию флюктуации
}

// question: 4123820 name: Как производятся разрезы при оперативном лечении гнойных процессов ЧЛО:
::Как производятся разрезы при оперативном лечении гнойных процессов ЧЛО\:::[html]Как производятся разрезы при оперативном лечении гнойных процессов ЧЛО\:{
	=Параллельно ходу ветвей лицевого нерва
	~Перпендикулярно ходу ветвей лицевого нерва
}

// question: 4123687 name: Какая из следующих границ не является границей области челюстно-язычного ...
::Какая из следующих границ не является границей области челюстно-язычного ...::[html]Какая из следующих границ не является границей области челюстно-язычного желобка?{
	~слизистая оболочка дна полости рта;
	=нижний край скуловой кости и дуги;
	~челюстно-подъязычная мышца;
	~основание передней небной дужки.
}

// question: 4157711 name: Какие микроорганизмы чаще всего являются возмудителями при абсцессе и ...
::Какие микроорганизмы чаще всего являются возмудителями при абсцессе и ...::[html]Какие микроорганизмы чаще всего являются возмудителями при абсцессе и флегмоне языка\:{
	=стафилококки, стрептококки
	~анаэробы
	~лучистые грибы
	~бледные спирохеты
}

// question: 4123619 name: Какие мышцы образуют диафрагму Жанеско, разделяющую окологлоточное ...
::Какие мышцы образуют диафрагму Жанеско, разделяющую окологлоточное ...::[html]Какие мышцы образуют диафрагму Жанеско, разделяющую окологлоточное пространство на передний и задний отделы\:{
	~челюстно-подъязычная, подъязычно-язычная
	~медиальная и латеральная крыловидные мышцы, двубрюшная мышца
	=мышцы, которые отходят от шиловидного отростка (Риоланов пучок) к языку, глотке, подъязычной кости и окружающие их фасциальные футляры
}

// question: 4123605 name: Какие общие изменения возникают в организме при одонтогенных флегмонах?
::Какие общие изменения возникают в организме при одонтогенных флегмонах?::[html]Какие общие изменения возникают в организме при одонтогенных флегмонах?{
	~слабость
	~озноб
	~учащение пульса
	=Все ответы верны
}

// question: 4123838 name: Какие симптомы не характерны для острого медиастенита:
::Какие симптомы не характерны для острого медиастенита\:::[html]Какие симптомы не характерны для острого медиастенита\:{
	~симптом Попова
	~симптом Берше
	=симптом Менделя
}

// question: 4157721 name: Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя внутриротовой ...
::Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя внутриротовой ...::[html]Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя внутриротовой разрез при лечении абсцесса окологлоточного пространства\:{
	=внутривенная яремная вена
	~лицевая вена
	~угловая вена
	~щитовидная железа
}

// question: 4157706 name: Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя разрез при лечении ...
::Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя разрез при лечении ...::[html]Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя разрез при лечении флегмоны околоушно-жевательной области\:{
	~Щитовидную железу
	=Краевую ветвь n.facialis
	~Лицевую артерию
	~Подъязычную слюнную железу
	~Третью ветвь тройничного нерва
}

// question: 4157708 name: Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя разрез при лечении ...
::Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя разрез при лечении ...::[html]Какое анатомическое образование можно повредить, выполняя разрез при лечении флегмоны околоушно-жевательной области\:{
	=околоушную слюнную железу
	~лицевую артерию
	~щитовидную железу
	~подъязычную железу
	~третью ветвь тройничного нерва.
}

// question: 4123722 name: Какое образование располагается в щечной области:
::Какое образование располагается в щечной области\:::[html]Какое образование располагается в щечной области\:{
	=комок Биша
	~подглазничный нерв
	~угловая вена
}

// question: 4123833 name: Какое осложнение не является осложнением гнойновоспалительных заболеваний ЧЛО:
::Какое осложнение не является осложнением гнойновоспалительных заболеваний ЧЛО\:::[html]Какое осложнение не является осложнением гнойновоспалительных заболеваний ЧЛО\:{
	~задний медиастинит
	=поддиафрагмальный абсцесс
	~менингит
}

// question: 4123832 name: Какой вид иммунитета корригируется при введении стафилококкового анатоксина?
::Какой вид иммунитета корригируется при введении стафилококкового анатоксина?::[html]Какой вид иммунитета корригируется при введении стафилококкового анатоксина?{
	=Специфический
	~Неспецифический
	~Все ответы верны
}

// question: 4123836 name: Какой вид обезболивания используется при операции дренирования заднего ...
::Какой вид обезболивания используется при операции дренирования заднего ...::[html]Какой вид обезболивания используется при операции дренирования заднего средостения?{
	~местное обезболивание
	~анестезия по Берше - Дубову
	=эндотрахеальный наркоз
	~масочный наркоз
}

// question: 4157707 name: Какой доступ используется для вскрытия флегмоны околоушно-жевательной области:

::Какой доступ используется для вскрытия флегмоны околоушно-жевательной области\:::[html]Какой доступ используется для вскрытия флегмоны околоушно-жевательной области\:{
	=наружный
	~внутриротовой
}

// question: 4123761 name: Какой отдел окологлоточного пространства сообщается с крылонебной ямкой?
::Какой отдел окологлоточного пространства сообщается с крылонебной ямкой?::[html]Какой отдел окологлоточного пространства сообщается с крылонебной ямкой?{
	=передний
	~задний
	~никакой
}

// question: 4123611 name: Какой характерный признак флегмоны окологлоточного пространства наиболее ...
::Какой характерный признак флегмоны окологлоточного пространства наиболее ...::[html]Какой характерный признак флегмоны окологлоточного пространства наиболее выражен, если осмотр проводить в полости рта\:{
	~Сглаженность крылочелюстной складки
	=Выбухание и гиперемия боковой стенки глотки
	~Кровоточивость стенки глотки
	~Отек языка
}

// question: 4123675 name: Какую вынужденную позу принимает больной с флегмоной дна полости рта:
::Какую вынужденную позу принимает больной с флегмоной дна полости рта\:::[html]Какую вынужденную позу принимает больной с флегмоной дна полости рта\:{
	~лёжа
	=наклонив голову назад
	~наклонив голову вперёд
}

// question: 4157719 name: Какую манипуляцию необходимо провести с операционной раной после вскрытия ...
::Какую манипуляцию необходимо провести с операционной раной после вскрытия ...::[html]Какую манипуляцию необходимо провести с операционной раной после вскрытия флегмоны или абсцесса языка наружным доступом\:{

=Дренировать и перевязать
~Перевязать
~Исследовать рентгенологически
~Оставить открытой на 1 час
}

// question: 4123841 name: Клиника тромбофлебитов:
::Клиника тромбофлебитов\:::[html]Клиника тромбофлебитов\:{
~набухание вен лица;
~головная боль;
~отек вен.
=Все ответы верны
}

// question: 4123210 name: КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК АБСЦЕССА ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО- НЕБНОЙ ЯМОК
::КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК АБСЦЕССА ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО- НЕБНОЙ ЯМОК::[html]КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК АБСЦЕССА ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМОК{
~Боль при глотании
=Инфильтрат в заднем отделе свода преддверия рта
~Припухлость околоушно-жевательной области
~Припухлость и покраснение щечной области
~Заложенность носа на стороне поражения
}

// question: 4157700 name: Комплекс терапии флегмоны дна полости рта включает:
::Комплекс терапии флегмоны дна полости рта включает\:::[html]Комплекс терапии флегмоны дна полости рта включает\:{
~Седативную
=Антибактериальную
~Лучевую
~Мануальную
~Гипотензивную
}

// question: 4123818 name: Компонентами лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО являются:
::Компонентами лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО являются\:::[html]Компонентами лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО являются\:{
~Антибактериальный
~Дезинтоксикационный

~Десенсибилизирующий
=Все ответы верны
}

// question: 4123739 name: Круглое отверстие, берущее начало от средней черепной ямки, открывается:
::Круглое отверстие, берущее начало от средней черепной ямки, открывается\:::[html]Круглое отверстие, берущее начало от средней черепной ямки, открывается\:{
~Глазницу
=Крыловидно-небную ямку
~Полость носа
~Подвисочную ямку
}

// question: 4123196 name: ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА РАСПОЛАГАЮТ
::ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА РАСПОЛАГАЮТ::[html]ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА РАСПОЛАГАЮТ{
~Параллельно кости альвеолярной части нижней челюсти
=Перпендикулярно кости альвеолярной части нижней челюсти
~Параллельно основанию языка
~Перпендикулярно основанию языка
~Перпендикулярно выводному протоку поднижнечелюстной слюнной железы
}

// question: 4123220 name: ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА РАСПОЛАГАЮТ
::ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА РАСПОЛАГАЮТ::[html]ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА РАСПОЛАГАЮТ{
~Параллельно кости альвеолярной части нижней челюсти
=Перпендикулярно кости альвеолярной части нижней челюсти
~Параллельно основанию языка
~Перпендикулярно основанию языка
~Перпендикулярно выводному протоку поднижнечелюстной слюнной железы
}

// question: 4123797 name: Лечение больного с диагнозом медиастинит проводится:
::Лечение больного с диагнозом медиастинит проводится\:::[html]Лечение больного с диагнозом медиастинит проводится\:{
~в отделение челюстно-лицевой хирургии

=в отделение интенсивной терапии
}

// question: 4123815 name: Лечение больных с тромбозом кавернозного синуса проводят:
::Лечение больных с тромбозом кавернозного синуса проводят\:::[html]Лечение больных с тромбозом кавернозного синуса проводят\:{
~в отделении челюстно-лицевой хирургии
=в отделении интенсивной терапии
}

// question: 4123598 name: Лимфа от нижних моляров и премоляров оттекает в лимфатические узлы:
::Лимфа от нижних моляров и премоляров оттекает в лимфатические узлы\:::[html]Лимфа от нижних моляров и премоляров оттекает в лимфатические узлы\:{
~Затылочные
~Подподбородочные
=Поднижнечелюстные
~Околоушные
}

// question: 4123597 name: Лимфа от нижних резцов оттекает в:
::Лимфа от нижних резцов оттекает в\:::[html]Лимфа от нижних резцов оттекает в\:{
=Подподбородочные лимфатические узлы
~Околоушные лимфатические узлы
~Подчелюстные лимфатические узлы
~Заглоточные лимфатические узлы
}

// question: 4123626 name: Лимфа от языка оттекает в лимфатические узлы:
::Лимфа от языка оттекает в лимфатические узлы\:::[html]Лимфа от языка оттекает в лимфатические узлы\:{
~Глубокие передние шейные
~Подподбородочные
=Поднижнечелюстные и глубокие латеральные шейные
~Околоушные
}

// question: 4123640 name: Локализация абсцесса какой области способствует развитию флегмоны дна полости...

::Локализация абсцесса какой области способствует развитию флегмоны дна полости...::[html]Локализация абсцесса какой области способствует развитию флегмоны дна полости рта\:{
	=Позадичелюстное и окологлоточное пространства
	~Подвисочная ямка
	~Щечная область
	~Жевательная мышца
}

// question: 4123221 name: МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ВАРИАНТ ДРЕНИРОВАНИЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА
::МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ВАРИАНТ ДРЕНИРОВАНИЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА::[html]МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ВАРИАНТ ДРЕНИРОВАНИЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА{
	~Рассечение слизистой оболочки на уровне верхушки корня зуба
	~Рассечение надкостницы на уровне верхушки корня зуба
	~Трепанация компактной кости на уровне верхушки корня зуба
	~Удаление зуба
	=Через корневой канал корня зуба
}

// question: 4123802 name: Медикаментозная подготовка к операции медиастинотомии проводится с целью:
::Медикаментозная подготовка к операции медиастинотомии проводится с целью\:::[html]Медикаментозная подготовка к операции медиастинотомии проводится с целью\:{
	~уменьшения кровопотери при операции
	=дезинтоксикации, улучшения микроциркуляции
	~восполнения дефицита белка
}

// question: 4123229 name: МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
::МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА::[html]МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА{
	~Инфильтрация в заднем отделе свода преддверия рта
	~Припухлость мягких тканей в поднижнечелюстной области
	~Гиперемия и краснота передней небной дужки и боковой стенки глотки
	=Припухлость в области крыловидно-челюстной складки
	~Онемение в зоне иннервации нижнего луночкового нерва
}

// question: 4123817 name: Местным осложнением при фурункулах лица является:
::Местным осложнением при фурункулах лица является\:::[html]Местным осложнением при фурункулах лица является\:{
	~гайморит
	~гипертонический криз
	~тромбофлебит лицевых вен
}

// question: 4123789 name: Метастатические гнойные очаги при сепсисе чаще всего локализуются:
::Метастатические гнойные очаги при сепсисе чаще всего локализуются\:::[html]Метастатические гнойные очаги при сепсисе чаще всего локализуются\:{
	~В легких
	~Печени
	~Подкожной клетчатке
	=Все ответы верны
}

// question: 4123829 name: Минимальная продолжительность курса антибиотикотерапии при острых ...
::Минимальная продолжительность курса антибиотикотерапии при острых ...::[html]Минимальная продолжительность курса антибиотикотерапии при острых воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области\:{
	=7-10 дней
	~3-5 дней
	~15-20 дней
	~5-7 дней
}

// question: 4123683 name: На сколько «этажей» делится клетчаточное пространство дна полости рта:
::На сколько «этажей» делится клетчаточное пространство дна полости рта\:::[html]На сколько «этажей» делится клетчаточное пространство дна полости рта\:{
	~1
	=2
	~3
	~4
}

// question: 4137700 name: Нагноившаяся атерома требует хирургического лечения
::Нагноившаяся атерома требует хирургического лечения::[html]Нагноившаяся атерома требует хирургического лечения{

=Верно
~Неверно
}

// question: 4137705 name: Нагноившаяся атерома ЧЛО лечится:
::Нагноившаяся атерома ЧЛО лечится\:::[html]Нагноившаяся атерома ЧЛО лечится\:{
~В один этап
=В два этапа
~В три этапа
~Хирургическому лечению не подлежит
}

// question: 4137707 name: Нагноившаяся атерома ЧЛО лечится:
::Нагноившаяся атерома ЧЛО лечится\:::[html]Нагноившаяся атерома ЧЛО лечится\:{
~Амбулаторно косметологом
~Амбулаторно стоматологом
~В стационаре общим хирургом
=В стационаре челюстно-лицевым хирургом
}

// question: 4123684 name: Назовите верхнюю границу подъязычной области:
::Назовите верхнюю границу подъязычной области\:::[html]Назовите верхнюю границу подъязычной области\:{
~челюстно-подъязычная мышца
=слизистая оболочка дна полости рта
~поверхностный листок собственной фасции шеи
~подъязычная кость
}

// question: 4123681 name: Назовите возможные источники инфицирования при абсцессе челюстно-язычного ...
::Назовите возможные источники инфицирования при абсцессе челюстно-язычного ...::[html]Назовите возможные источники инфицирования при абсцессе челюстно-язычного желобка\:{
~премоляры верхней челюсти;
=ретенция нижнего зуба мудрости;
~паротит.
}

// question: 4157693 name: Назовите медиальную границу подглазничной области:
::Назовите медиальную границу подглазничной области\:::[html]Назовите медиальную границу подглазничной области\:{

~Нижний край глазницы
=Край грушевидного отверстия
~Альвеолярный отросток верхней челюсти
~Скулочелюстной шов
}

// question: 4123620 name: Назовите наружную границу крыло-челюстного пространства:
::Назовите наружную границу крыло-челюстного пространства\:::[html]Назовите наружную границу крыло-челюстного пространства\:{
=внутренняя поверхность ветви нижней челюсти
~наружная поверхность ветви нижней челюсти
~околоушно-жевательная фасция
~задний край ветви нижней челюсти
}

// question: 4157692 name: Назовите нижнюю границу подглазничной области:
::Назовите нижнюю границу подглазничной области\:::[html]Назовите нижнюю границу подглазничной области\:{
~Скулочелюстной шов
=Альвеолярный отросток верхней челюсти
~Нижний край глазницы
~Край грушевидного отверстия
}

// question: 4123612 name: Назовите нижнюю границу позадичелюстной области:
::Назовите нижнюю границу позадичелюстной области\:::[html]Назовите нижнюю границу позадичелюстной области\:{
~Сосцевидный отросток височной кости и грудино-ключичнососцевидная мышца;
~Шиловидный отросток височной кости и мышцы Риоланова пучка;
=Нижний полюс околоушной слюнной железы.
~Все ответы верны
}

// question: 4123614 name: Назовите нижнюю границу позадичелюстной области:
::Назовите нижнюю границу позадичелюстной области\:::[html]Назовите нижнюю границу позадичелюстной области\:{
~сосцевидный отросток височной кости и грудино-ключично-сосцевидная мышца
~шиловидный отросток височной кости и мышцы Риоланова пучка
=нижний полюс околоушной слюнной железы
}

// question: 4123609 name: Назовите область, имеющую следующие границы: наружная - внутренняя ...
::Назовите область, имеющую следующие границы\: наружная - внутренняя ...::[html]Назовите область, имеющую следующие границы\: наружная - внутренняя поверхность ветви нижней челюсти, медиальная крыловидная мышца; верхняя - латеральная; крыловидная мышца; передняя - щечно-глоточный шов\:{
	~Окологлоточное пространство;
	~Позадичелюстная область;
	~Височная область;
	=Крыло - челюстное пространство.
}

// question: 4123828 name: Назовите препарат, не использующийся для десенсибилизирующей терапии:
::Назовите препарат, не использующийся для десенсибилизирующей терапии\:::[html]Назовите препарат, не использующийся для десенсибилизирующей терапии\:{
	~Супрастин
	=Атропин
	~Димедрол
	~Тавегил
}

// question: 4123804 name: Назовите причину, способствующую развитию осложнения при одонтогенной инфекции:
::Назовите причину, способствующую развитию осложнения при одонтогенной инфекции\:::[html]Назовите причину, способствующую развитию осложнения при одонтогенной инфекции\:{
	=заболевания эндокринной системы (сахарный диабет)
	~полученная травма (перелом нижней челюсти)
}

// question: 4157696 name: Назовите типичный клинический признак флегмоны дна полости рта:
::Назовите типичный клинический признак флегмоны дна полости рта\:::[html]Назовите типичный клинический признак флегмоны дна полости рта\:{
	~Тризм
	=Инфильтрат мягких тканей в поднижнечелюстных и подбородочной областях.
	~Отек крыло-челюстной складки
	~Гиперемия кожи в области нижней губы
}

// question: 4123780 name: Наиболее информативные при медиастините методы исследования:
::Наиболее информативные при медиастините методы исследования\:::[html]Наиболее информативные при медиастините методы исследования\:{
	=Компьютерная томография и УЗИ
	~Рентгенография грудной клетки
	~Пневмомедиастинография
	~Медиастиноскопия
}

// question: 4123699 name: Наиболее типичной причиной, вызывающей флегмонозный процесс в глазнице, ...
::Наиболее типичной причиной, вызывающей флегмонозный процесс в глазнице, ...::[html]Наиболее типичной причиной, вызывающей флегмонозный процесс в глазнице, является\:{
	~Флегмона дна полости рта
	=Острый гнойный гайморит
	~Фурункул лобной области
	~Острый остеомиелит нижней челюсти
}

// question: 4123808 name: Наиболее часто распространение инфекции при тромбозе кавернозного синуса ...
::Наиболее часто распространение инфекции при тромбозе кавернозного синуса ...::[html]Наиболее часто распространение инфекции при тромбозе кавернозного синуса происходит\:{
	~лимфогенным путем
	=гематогенным путем
	~по протяжению
	~контактным путем
}

// question: 4123582 name: Наружней границей подподбородочной области является:
::Наружней границей подподбородочной области является\:::[html]Наружней границей подподбородочной области является\:{
	~Подъязычная кость
	~Челюстно-язычная мышца
	=Передние брюшки двубрюшной мышцы
	~Нижний край подбородочного отдела нижней челюсти
}

// question: 4123637 name: Наружной границей челюстно-язычного желобка является:

::Наружной границей челюстно-язычного желобка является\:::[html]Наружной границей челюстно-язычного желобка является\:{
	~Задний отдел челюстно-подъязычной мышцы
	~Основание передней небной дужки
	~Слизистая оболочка дна полости рта
	=Внутренняя поверхность тела нижней челюсти на уровне моляров
}

// question: 4123636 name: Наружные межмышечные промежутки дна полости рта располагаются между:
::Наружные межмышечные промежутки дна полости рта располагаются между\:::[html]Наружные межмышечные промежутки дна полости рта располагаются между\:{
	~Челюстно-подъязычной мышцей и слизистой оболочкой дна полости рта
	=Подбородочно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцами
	~Челюстно-подъязычной мышцей и передними брюшками двубрюшных мышц
	~Подбородочно-язычными мышцами
}

// question: 4123648 name: Наружняя граница подъязычной области:
::Наружняя граница подъязычной области\:::[html]Наружняя граница подъязычной области\:{
	=Внутренняя поверхность тела нижней челюсти
	~Заднее брюшко двубрюшной мышцы
	~Слизистая оболочка дна полости рта
	~Основание языка
}

// question: 4137686 name: Не является абсцессом:
::Не является абсцессом\:::[html]Не является абсцессом\:{
	=Разлитое гнойно-воспалительное заболевание
	~Ограниченное гнойно-воспалительное заболевание
}

// question: 4137687 name: Не является флегмоной:
::Не является флегмоной\:::[html]Не является флегмоной\:{
	~Разлитое гнойно-воспалительное заболевание
	=Ограниченное гнойно-воспалительное заболевание
}

// question: 4137688 name: Не является фурункулом:
::Не является фурункулом\:::[html]Не является фурункулом\:{

=Разлитое гнойно-воспалительное заболевание
~Ограниченное гнойно-воспалительное заболевание
~Воспаление волосяного фолликула и прилежащей клетчатки
}

// question: 4123596 name: Неблагоприятное течение флегмоны подподбородочной области выражается в ...
::Неблагоприятное течение флегмоны подподбородочной области выражается в ...::[html]Неблагоприятное течение флегмоны подподбородочной области выражается в распространении гнойного процесса в\:{
=Область корня языка
~Крыловидно-небное венозное сплетение
~Поднижнечелюстную слюнную железу
~Эпидуральное пространство
}

// question: 4123593 name: Неблагоприятное течение флегмоны подподбородочной области способствует ...
::Неблагоприятное течение флегмоны подподбородочной области способствует ...::[html]Неблагоприятное течение флегмоны подподбородочной области способствует распространению инфекции в\:{
~Крыловидно-небное венозное сплетение
~Субдуральное пространство
=Направлении корня языка
~Околоушную слюнную железу
}

// question: 4123201 name: НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ АБСЦЕССА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ
::НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ АБСЦЕССА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ::[html]НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ АБСЦЕССА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ{
~Острый одонтогенный периостит верхней челюсти
=Тромбофлебит лицевой вены
~Паралич мимической мускулатуры со стороны поражения
~Офтальмоплегия
~Снижение остроты зрения
}

// question: 4123580 name: Нижней границей подподбородочной области является:
::Нижней границей подподбородочной области является\:::[html]Нижней границей подподбородочной области является\:{
=Подъязычная кость

~Челюстно-язычная мышца
~Передние брюшки двубрюшной мышцы
~Нижний край подбородочного отдела нижней челюсти
}

// question: 4123632 name: Нижней границей челюстно-язычного желобка является:
::Нижней границей челюстно-язычного желобка является\:::[html]Нижней границей челюстно-язычного желобка является\:{
=Задний отдел челюстно-подъязычной мышцы
~Основание передней небной дужки
~Слизистая оболочка дна полости рта
~Внутренняя поверхность тела нижней челюсти на уровне моляров
}

// question: 4123650 name: Нижняя граница дна полости рта:
::Нижняя граница дна полости рта\:::[html]Нижняя граница дна полости рта\:{
=Кожа и поднижнечелюстных областей
~Заднее брюшко двубрюшной мышцы
~Слизистая оболочка дна полости рта
~Основание языка
}

// question: 4123197 name: НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНА
::НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНА::[html]НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНА{
~Нижний край грушевидного отверстия
~Нижний край глазницы
~Клыковой ямкой
=Луночковыми возвышениями верхнего свода преддверия рта
~Скулочелюстным швом
}

// question: 4123649 name: Нижняя граница подъязычной области:
::Нижняя граница подъязычной области\:::[html]Нижняя граница подъязычной области\:{
=Челюстно-подъязычная мышца
~Заднее брюшко двубрюшной мышцы
~Слизистая оболочка дна полости рта
~Основание языка
}

// question: 4123665 name: Ограничение открывания рта может наблюдаться при остром воспалительном ...
::Ограничение открывания рта может наблюдаться при остром воспалительном ...::[html]Ограничение открывания рта может наблюдаться при остром воспалительном процессе в{
	~челюсти в области\:
	~премоляров
	=моляров
	~фронтальных зубов
}

// question: 4123641 name: Одним из клинических признаков, типичных для флегмоны дна полости рта, является:
::Одним из клинических признаков, типичных для флегмоны дна полости рта, является\:::[html]Одним из клинических признаков, типичных для флегмоны дна полости рта, является\:{
	=Инфильтрат мягких тканей
	~Тризм
	~Гиперемия щечных областей
	~Отек крыловидно-челюстной складки
}

// question: 4123630 name: Одной из причин развития флегмоны дна полости рта является воспалительный ...
::Одной из причин развития флегмоны дна полости рта является воспалительный ...::[html]Одной из причин развития флегмоны дна полости рта является воспалительный процесс в области\:{
	=Зубов нижней челюсти
	~Зубов верхней челюсти
	~Верхней губы
	~Лимфоузлов щечной области
}

// question: 4123594 name: Одной из причин развития флегмоны подподбородочной области является первичный...
::Одной из причин развития флегмоны подподбородочной области является первичный...::[html]Одной из причин развития флегмоны подподбородочной области является первичный воспалительный очаг в области\:{
	=Фронтальной группы зубов на нижней челюсти
	~Фронтальной группы зубов на верхней челюсти
	~Верхней губы
	~Щечной
}

// question: 4123723 name: Одонтогенным источником инфекции при флегмонах скуловой области являются:
::Одонтогенным источником инфекции при флегмонах скуловой области являются\:::[html]Одонтогенным источником инфекции при флегмонах скуловой области являются\:{
	~1, 2, 3 зубами верхней челюсти
	~3, 4, 5 зубами верхней челюсти
	~6, 7, 8 зубами верхней челюсти
	=4, 5, 6 зубами верхней челюсти
}

// question: 4123616 name: Одонтогенными источниками флегмоны крыло-челюстного пространства чаще всего ...
::Одонтогенными источниками флегмоны крыло-челюстного пространства чаще всего ...::[html]Одонтогенными источниками флегмоны крыло-челюстного пространства чаще всего являются\:{
	~резцы нижней челюсти
	~премоляры нижней челюсти
	=моляры нижней челюсти
	~моляры верхней челюсти
}

// question: 4123575 name: Оперативное вмешательство при лечении гнилостно-некротической флегмоны дна ...
::Оперативное вмешательство при лечении гнилостно-некротической флегмоны дна ...::[html]Оперативное вмешательство при лечении гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта предусматривает дренирование клетчаточных пространств{
	~щечной области
	~позадичелюстной
	~околоушно-жевательной
	=корня языка, окологлоточной, крыловидно-челюстной
}

// question: 4123230 name: ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
::ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА::[html]ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА{
	~Разрез параллельно внутренней поверхности нижней челюсти на уровне моляров
	=Разрез слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке
	~Разрез со стороны кожи, окаймляющий угол нижней челюсти
	~Разрез со стороны кожи в поднижнечелюстной области

~Разрез слизистой оболочки по краю передней небной дужки
}

// question: 4123767 name: Оперативный доступ при абсцессе крыловидно-небной ямки производят
::Оперативный доступ при абсцессе крыловидно-небной ямки производят::[html]Оперативный доступ при абсцессе крыловидно-небной ямки производят{
=со стороны полости рта
~снаружи
~со стороны полости рта и снаружи
}

// question: 4123762 name: Оперативный доступ при абсцессе крылонебного пространства:
::Оперативный доступ при абсцессе крылонебного пространства\:::[html]Оперативный доступ при абсцессе крылонебного пространства\:{
~наружный
=внутриротовой
}

// question: 4123692 name: Оперативный доступ при лечении абсцесса околоушной области осуществляется ...
::Оперативный доступ при лечении абсцесса околоушной области осуществляется ...::[html]Оперативный доступ при лечении абсцесса околоушной области осуществляется разрезом\:{
~по носогубной складке
~в подподбородочной области
=по ходу ветвей лицевого нерва
~по слизистой оболочке крыловидно-нижнечелюстной складки
~в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти
}

// question: 4123682 name: Оперативный доступ при флегмоне корня языка:
::Оперативный доступ при флегмоне корня языка\:::[html]Оперативный доступ при флегмоне корня языка\:{
=Разрез в подбородочной области;
~Разрез в подчелюстной области;
~Воротникообразный разрез.
~Все ответы верны
}

// question: 4123729 name: Оперативный доступ при флегмоне околоушно-жевательной области:
::Оперативный доступ при флегмоне околоушно-жевательной области\:::[html]Оперативный доступ при флегмоне околоушно-жевательной области\:{
	=Разрез параллельно ходу ветвей пищевого нерва, разрез параллельно нижнему краю нижней челюсти
	~Разрез в подбородочной области
	~Все ответы верны
}

// question: 4123188 name: ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА
::ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА::[html]ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА{
	~Физиотерапевтическое лечение
	~Назначение антибиотиков широкого спектра действия
	=Инцизия
	~Полоскание раствором соды
	~Пункция
}

// question: 4123216 name: ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА
::ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА::[html]ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА{
	~Физиотерапевтическое лечение
	~Назначение антибиотиков широкого спектра действия
	=Инцизия
	~Полоскание раствором соды
	~Пункция
}

// question: 4123845 name: Осложнением флегмоны височной области является:
::Осложнением флегмоны височной области является\:::[html]Осложнением флегмоны височной области является\:{
	~сепсис
	~менингит
	~абсцессы мозга
	=Все ответы верны
}

// question: 4123737 name: Основным источником инфекции при абсцессе или флегмоне крыловидно-небной ямки...

::Основным источником инфекции при абсцессе или флегмоне крыловидно-небной ямки...::[html]Основным источником инфекции при абсцессе или флегмоне крыловидно-небной ямки является воспалительный процесс в\:{
=Молярах
~Премолярах
~Клыках
~Резцах
}

// question: 4123759 name: Основным источником инфицирования крылонебной и подвисочной ямок является
::Основным источником инфицирования крылонебной и подвисочной ямок является::[html]Основным источником инфицирования крылонебной и подвисочной ямок является{
~патологические процессы, возникающие в\:
~резцах, клыках верхней челюсти
=в молярах
~в премолярах
}

// question: 4123770 name: Основным функциональным нарушением при флегмоне височной области
::Основным функциональным нарушением при флегмоне височной области::[html]Основным функциональным нарушением при флегмоне височной области{
~снижение слуха
~нарушение открывание рта
=диплопия
}

// question: 4123790 name: Острый сепсис развивается в сроки:
::Острый сепсис развивается в сроки\:::[html]Острый сепсис развивается в сроки\:{
~1-3 суток
=5-10 суток
~10-14 суток
~более 14 дней
}

// question: 4123844 name: Очагом внедрения микробов при сепсисе не являяются:
::Очагом внедрения микробов при сепсисе не являяются\:::[html]Очагом внедрения микробов при сепсисе не являяются\:{
~открытые травмы
=множественные закрытые переломы

~местные гнойные процессы
~операционные раны
}

// question: 4123769 name: Первичной локализацией гнойного очага при одонтогенной флегмоне височной ...
::Первичной локализацией гнойного очага при одонтогенной флегмоне височной ...::[html]Первичной локализацией гнойного очага при одонтогенной флегмоне височной области может быть{
~абсцесс крыловидно-челюстной области
~абсцесс окологлоточного пространства
=абсцесс крыловидно-небной ямки
}

// question: 4123690 name: Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне околоушно-жевательной ...
::Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне околоушно-жевательной ...::[html]Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне околоушно-жевательной области чаще всего является абсцесс\:{
~в клыковой ямке
=в височной области
~в верхне-челюстной пазухе
~в подподбородочной области
~в челюстно-язычном желобке
}

// question: 4123595 name: Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне подподбородочной области ...
::Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне подподбородочной области ...::[html]Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне подподбородочной области чаще всего бывает абсцесс в\:{
~Подвисочной ямке
=Подподбородочной области
~Щечной области
~Жевательной мышце
}

// question: 4123695 name: Первичный гнойный очаг при флегмоне околоушно-жевательной области чаще всего ...
::Первичный гнойный очаг при флегмоне околоушно-жевательной области чаще всего ...::[html]Первичный гнойный очаг при флегмоне околоушно-жевательной области чаще всего представляет собой абсцесс в\:{
~Скуловой области

=Околоушной слюнной железе
~Клыковой ямке
~Подподбородочной области
}

// question: 4123631 name: Первичный очаг гнойного воспаления, переходящий в флегмону дна полости рта, ...
::Первичный очаг гнойного воспаления, переходящий в флегмону дна полости рта, ...::[html]Первичный очаг гнойного воспаления, переходящий в флегмону дна полости рта, локализуется в\:{
~Жевательной мышце
~Подвисочной ямке
=Поднижнечелюстной области
~Околоушной слюнной железе
}

// question: 4123592 name: Первичный очаг гнойной инфекции при флегмоне подподбородочной области чаще ...
::Первичный очаг гнойной инфекции при флегмоне подподбородочной области чаще ...::[html]Первичный очаг гнойной инфекции при флегмоне подподбородочной области чаще всего является абсцессом в\:{
~Окологлоточном пространстве
=Подъязычной области
~Щечной области
~Подвисочной ямке
}

// question: 4123581 name: Передневерхней границей подподбородочной области является:
::Передневерхней границей подподбородочной области является\:::[html]Передневерхней границей подподбородочной области является\:{
~Подъязычная кость
~Челюстно-язычная мышца
~Передние брюшки двубрюшной мышцы
=Нижний край подбородочного отдела нижней челюсти
}

// question: 4123703 name: Передней границей скуловой области является:
::Передней границей скуловой области является\:::[html]Передней границей скуловой области является\:{
=Скулочелюстной шов
~Скуловисочный шов
~Передневерхний отдел щечной области

~Передненижний отдел щечной области
}

// question: 4123647 name: Передненаружная граница дна полости рта:
::Передненаружная граница дна полости рта\:::[html]Передненаружная граница дна полости рта\:{
=Внутренняя поверхность тела нижней челюсти
~Заднее брюшко двубрюшной мышцы
~Слизистая оболочка дна полости рта
~Основание языка
}

// question: 4123226 name: ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
::ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА::[html]ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА{
~Передний край ветви нижней челюсти
=Крыловидно-челюстной шов (щечно-глоточный апоневроз)
~Наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы
~Межкрыловидная фасция
~Боковая стенка глотки
}

// question: 4123227 name: ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА ОКОЛОГЛОТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
::ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА ОКОЛОГЛОТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА::[html]ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА ОКОЛОГЛОТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА{
~Передняя небная дужка
~Передний край медиальной крыловидной мышцы
~Передний край ветви нижней челюсти
~Боковая стенка глотки
=Крыловидно-челюстной шов (щечно-глоточный апоневроз)
}

// question: 4123208 name: ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА ПОДВИСОЧНОЙ ЯМКИ
::ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА ПОДВИСОЧНОЙ ЯМКИ::[html]ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА ПОДВИСОЧНОЙ ЯМКИ{
~Подвисочный гребень основной кости
~Шиловидный отросток с начинающимися от него мышцами
~Наружная пластинка крыловидного отростка
=Бугор верхней челюсти и скуловая кость
~Внутренняя поверхность ветви нижней челюсти
}

// question: 4123600 name: Плотный резко болезненный инфильтрат в поднижнечелюстном треугольнике с кожей...
::Плотный резко болезненный инфильтрат в поднижнечелюстном треугольнике с кожей...::[html]Плотный резко болезненный инфильтрат в поднижнечелюстном треугольнике с кожей красного цвета отмечается при\:{
	~Флегмоне дна полости рта
	=Флегмоне поднижнечелюстного треугольника
	~Гнойном лимфадените
	~Флегмоне крыловидно-челюстного пространства
}

// question: 4123785 name: По каким признакам классифицируется сепсис:
::По каким признакам классифицируется сепсис\:::[html]По каким признакам классифицируется сепсис\:{
	~По виду и характеру возбудителя
	~По наличию или отсутствию первичного очага
	~По характеру первичного очага
	=Все ответы верны
}

// question: 4123786 name: По каким признакам классифицируется сепсис:
::По каким признакам классифицируется сепсис\:::[html]По каким признакам классифицируется сепсис\:{
	~По клиническому течению
	~По характеру генерализации инфекции
	~По фазам развития
	=Все ответы верны
}

// question: 4123787 name: По наличию или отсутствию первичного очага сепсиса различают:
::По наличию или отсутствию первичного очага сепсиса различают\:::[html]По наличию или отсутствию первичного очага сепсиса различают\:{
	=Первичный или криптогенный
	~Гинекологический
	~Одонтогенный
	~Вторичный
}

// question: 4123788 name: По характеру генерализации инфекции при сепсисе различают:

::По характеру генерализации инфекции при сепсисе различают\:::[html]По характеру генерализации инфекции при сепсисе различают\:{
=Гиперергическая, гипоергическая и нормоергическая
~Отогенный и одонтогенный
~Молниеносный и хронический
~Острый и хронический
}

// question: 4123728 name: Поверхностное клетчаточное пространство около верхней челюсти:
::Поверхностное клетчаточное пространство около верхней челюсти\:::[html]Поверхностное клетчаточное пространство около верхней челюсти\:{
~крыловидно-нижнечелюстное
~подъязычное
~челюстно-язычный желобок
=околоушно-жевательное
~окологлоточное
}

// question: 4123599 name: Подподбородочные лимфатические узлы находятся относительно двубрюшной мышцы:
::Подподбородочные лимфатические узлы находятся относительно двубрюшной мышцы\:::[html]Подподбородочные лимфатические узлы находятся относительно двубрюшной мышцы\:{
~Между передним и задним брюшками
~Около переднего брюшка
=Между передними брюшками
~Возле заднего брюшка
}

// question: 4123693 name: После вскрытия флегмоны подмассетериального пространства дренажи вводятся:
::После вскрытия флегмоны подмассетериального пространства дренажи вводятся\:::[html]После вскрытия флегмоны подмассетериального пространства дренажи вводятся\:{
~после разреа кожи или слизистой оболочки
=в конце операции
~во время 1-ой перевязки
~на второй день
~на третий день
}

// question: 4123791 name: Постоянная лихорадка при сепсисе на уровне 39 градусов без разницы вечерней и...
::Постоянная лихорадка при сепсисе на уровне 39 градусов без разницы вечерней и...::[html]Постоянная лихорадка при сепсисе на уровне 39 градусов без разницы вечерней и утренней температуры характерна для;{
	=Септицемии
	~Септикопиемии
	~Хрониосепсиса
	~Не характерно для сепсиса
}

// question: 4123819 name: Препарат, способный стимулировать рост грануляции:
::Препарат, способный стимулировать рост грануляции\:::[html]Препарат, способный стимулировать рост грануляции\:{
	~Бальзам Шестаковского
	=Мазь Вишневского
	~Метилурациловая мазь
	~Все ответы верны
}

// question: 4123821 name: Препараты для лечения гнойной раны в 1 фазе раневого процесса:
::Препараты для лечения гнойной раны в 1 фазе раневого процесса\:::[html]Препараты для лечения гнойной раны в 1 фазе раневого процесса\:{
	~Антисептики
	~Антибиотики
	~Некролитические препараты
	=Все ответы верны
}

// question: 4123660 name: При абсцессе корня языка конфигурация лица:
::При абсцессе корня языка конфигурация лица\:::[html]При абсцессе корня языка конфигурация лица\:{
	=изменяется
	~не изменяется
}

// question: 4123659 name: При абсцессе спинки и тела языка конфигурация лица:
::При абсцессе спинки и тела языка конфигурация лица\:::[html]При абсцессе спинки и тела языка конфигурация лица\:{
	~изменяется
	=не изменяется
}

// question: 4123661 name: При абсцессе тела языка открывание рта:
::При абсцессе тела языка открывание рта\:::[html]При абсцессе тела языка открывание рта\:{
	=болезненное
	~безболезненное
}

// question: 4123645 name: При ангине Людвига поражаются:
::При ангине Людвига поражаются\:::[html]При ангине Людвига поражаются\:{
	=Все клетчаточные пространства дна полости рта
	~Височная, щечная и клыковой ямки
	~Височная и подвисочная ямки
	~Подвисочная ямка
}

// question: 4123680 name: При асфиксии у больного с флегмоной дна полости рта проводят:
::При асфиксии у больного с флегмоной дна полости рта проводят\:::[html]При асфиксии у больного с флегмоной дна полости рта проводят\:{
	~искусственное дыхание
	=трахеостомию
}

// question: 4123673 name: При воспалительной контрактуре челюсти осмотр полости рта возможен после ...
::При воспалительной контрактуре челюсти осмотр полости рта возможен после ...::[html]При воспалительной контрактуре челюсти осмотр полости рта возможен после проведения анестезии\:{
	~туберальной
	~торусальной
	~мандибулярной
	=по Берше-Дубову
}

// question: 4123195 name: ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
::ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ::[html]ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ{
	~Носонебного нерва
	~Резцового нерва

=Небной артерии
~Верхнечелюстной артерии
~Верхнего среднего зубного сплетения
}

// question: 4123571 name: При гнилостно-некротической флегмоне лица наиболее часто поражается ...
::При гнилостно-некротической флегмоне лица наиболее часто поражается ...::[html]При гнилостно-некротической флегмоне лица наиболее часто поражается клетчаточное пространство{
=крыловидно-челюстное
~щечной области
~височной области
~околоушно-жевательной области
}

// question: 4123572 name: При гнилостно-некротической флегмоне лица наиболее часто поражаются ...
::При гнилостно-некротической флегмоне лица наиболее часто поражаются ...::[html]При гнилостно-некротической флегмоне лица наиболее часто поражаются клетчаточные пространства{
~височной и подвисочной областей
~височной, щечной областей и клыковой ямки
=все клетчаточные пространства дна полости рта
~крыло-небной, височной и подвисочной областей
}

// question: 4123678 name: При двустороннем поражении верхнего отдела дна полости рта разрез:
::При двустороннем поражении верхнего отдела дна полости рта разрез\:::[html]При двустороннем поражении верхнего отдела дна полости рта разрез\:{
=внутриротовой
~двусторонний подчелюстной
~воротникообразный
}

// question: 4123676 name: При двустороннем поражении нижнего отдела дна полости рта не применяют разрез:
::При двустороннем поражении нижнего отдела дна полости рта не применяют разрез\:::[html]При двустороннем поражении нижнего отдела дна полости рта не применяют разрез\:{
~поднижнечелюстной справа и слева
=внутриротовой

~воротникообразный
}

// question: 4123667 name: При затрудненном прорезывании нижнего третьего моляра, занимающего по данным ...
::При затрудненном прорезывании нижнего третьего моляра, занимающего по данным ...::[html]При затрудненном прорезывании нижнего третьего моляра, занимающего по данным рентгенограммы правильное положение, болезненном открывании рта и нарастании воспалительных явлений рекомендуется\:{
~удаление этого зуба
~активная антибиотикотерапия
=иссечение всей слизистой оболочки, покрывающей этот зуб
~иссечение треугольного лоскута слизистой оболочки над этем зубом
~рассечение слизистой оболочки над тем зубом
}

// question: 4157720 name: При лечении флегмоны щечной области разрез является достаточным, если он ...
::При лечении флегмоны щечной области разрез является достаточным, если он ...::[html]При лечении флегмоны щечной области разрез является достаточным, если он выполнен\:{
=На всю ширину инфильтрата
~В области флюктуации
~В проекции корня языка
~В месте наибольшей болезненности.
}

// question: 4123772 name: При медиастините встречаются симптомы:
::При медиастините встречаются симптомы\:::[html]При медиастините встречаются симптомы\:{
~Герке
~Иванова
~Равич-Щербо
=Все ответы верны
}

// question: 4123795 name: При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта ...
::При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта ...::[html]При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта ранним общим осложнением является{
=медиастенит
~ксеростомия

~слюнные свищи
~рубцовая контрактура
}

// question: 4123574 name: При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта ...
::При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта ...::[html]При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта инфекция распространяется{
=в средостение
~в околоушную слюнную железу
~в венозные синусы головного мозга
~в крыло-небное венозное сплетение
}

// question: 4123794 name: При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны лица общим ...
::При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны лица общим ...::[html]При неблагоприятном течении гнилостно-некротической флегмоны лица общим осложнением является{
=сепсис
~ксеростомия
~слюнные свищи
~рубцовая контрактура
}

// question: 4123642 name: При неблагоприятном течении флегмоны дна полости рта инфекция ...
::При неблагоприятном течении флегмоны дна полости рта инфекция ...::[html]При неблагоприятном течении флегмоны дна полости рта инфекция распространяется в\:{
=Средостение
~Околоушную слюнную железу
~Крыловидно-небное венозное сплетение
~Субдуральное пространство
}

// question: 4123584 name: При обращении пациента с флегмоной подподбородочной области необходимо:
::При обращении пациента с флегмоной подподбородочной области необходимо\:::[html]При обращении пациента с флегмоной подподбородочной области необходимо\:{
=Произвести вскрытие и дренирование гнойного очага в день обращения
~Сделать новокаиновую блокаду

~Ввести внутримышечно дыхательные аналептики
~Назначить антибактериальную терапию и отправить пациента на амбулаторное долечивание
}

// question: 4123796 name: При обследовании больного с подозрением на медиастинит необходима консультация:
::При обследовании больного с подозрением на медиастинит необходима консультация\:::[html]При обследовании больного с подозрением на медиастинит необходима консультация\:{
~терапевта
~невропатолога
=торакального хирурга
}

// question: 4123677 name: При односторонней флегмоне дна полости рта разрез:
::При односторонней флегмоне дна полости рта разрез\:::[html]При односторонней флегмоне дна полости рта разрез\:{
~внутриротовой
~воротникообразный
=подчелюстной
}

// question: 4123814 name: При подозрении на тромбоз кавернозного синуса необходима консультация:
::При подозрении на тромбоз кавернозного синуса необходима консультация\:::[html]При подозрении на тромбоз кавернозного синуса необходима консультация\:{
~терапевта
~инфекциониста
=невропатолога
~окулиста
}

// question: 4123799 name: При поступлении больного с диагнозом медиастинит лечение начинают с:
::При поступлении больного с диагнозом медиастинит лечение начинают с\:::[html]При поступлении больного с диагнозом медиастинит лечение начинают с\:{
~хирургического пособия
=проведения дезинтоксикационной терапии
}

// question: 4123805 name: При септикопиемии показано лечение:
::При септикопиемии показано лечение\:::[html]При септикопиемии показано лечение\:{
	~консервативное
	=оперативное
}

// question: 4123624 name: При флегмоне дна полости рта поражаются:
::При флегмоне дна полости рта поражаются\:::[html]При флегмоне дна полости рта поражаются\:{
	~Подвисочная ямка и крыловидно-небное пространство
	=Поднижнечелюстное и подподбородочное пространства
	~Подвисочная ямка и околоушная слюнная железа
	~Корень языка и щечная область
}

// question: 4123608 name: При флегмоне крылочелюстного пространства боковые движения нижней челюсти:
::При флегмоне крылочелюстного пространства боковые движения нижней челюсти\:::[html]При флегмоне крылочелюстного пространства боковые движения нижней челюсти\:{
	~ограничены в «больную» сторону;
	~не ограничены;
	=ограничены в «здоровую» сторону
	~Все ответы верны
}

// question: 4123617 name: При флегмоне позадичелюстной области оперативный доступ осуществляют:
::При флегмоне позадичелюстной области оперативный доступ осуществляют\:::[html]При флегмоне позадичелюстной области оперативный доступ осуществляют\:{
	~параллельно ходу ветвей лицевого нерва и нижнему краю нижней челюсти
	=параллельно заднему краю ветви нижней челюсти
	~со стороны полости рта, разрез в области крылочелюстной складки
}

// question: 4123686 name: При флегмоне челюстно-язычного желобка оперативный доступ осуществляется:
::При флегмоне челюстно-язычного желобка оперативный доступ осуществляется\:::[html]При флегмоне челюстно-язычного желобка оперативный доступ осуществляется\:{

=со стороны слизистой оболочки полости рта параллельно внутренней поверхности нижней челюсти на уровне больших коренных зубов;
~разрез в подбородочной области;
~разрез в подчелюстной области, отступив 1,5-2,0 см ниже края нижней челюсти;
~со стороны кожных покровов - разрез, окаймляющий угол нижней челюсти с отсечением медиальной крыловидной мышцы.
}

// question: 4123812 name: При фурункулах и карбункулах лица и шеи возможно развитие следующего ...
::При фурункулах и карбункулах лица и шеи возможно развитие следующего ...::[html]При фурункулах и карбункулах лица и шеи возможно развитие следующего общесоматического осложнения\:{
~гайморита
=тромбоза кавернозного синуса
~рожистого воспаления
}

// question: 4123811 name: При фурункулах и карбункулах лица и шеи возможно развитие следующих ...
::При фурункулах и карбункулах лица и шеи возможно развитие следующих ...::[html]При фурункулах и карбункулах лица и шеи возможно развитие следующих общесоматических осложнений\:{
=сепсиса
~гайморита
~диплопии
~медиастинита
}

// question: 4123698 name: Признак воспалительной контрактуры наблюдается при флегмоне:
::Признак воспалительной контрактуры наблюдается при флегмоне\:::[html]Признак воспалительной контрактуры наблюдается при флегмоне\:{
~Окологлоточного пространства
~Дна полости рта
=Субмассетериального пространства
~Подподбородочной области
}

// question: 4123827 name: Принципы лечения острой одонтогенной инфекции:
::Принципы лечения острой одонтогенной инфекции\:::[html]Принципы лечения острой одонтогенной инфекции\:{

~Этиотропная терапия
~Патогенетическая терапия
~Симптоматическая терапия
=Все ответы верны
}

// question: 4123194 name: ПРИЧИНА АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА
::ПРИЧИНА АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА::[html]ПРИЧИНА АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА{
=Боковые резцы и первые премоляры
~Центральные резцы
~Третьи моляры верхней челюсти
~Абсцедирование малой слюнной железы
~Распространение инфекции по ходу большого небного нерва
}

// question: 4123219 name: ПРИЧИНА АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА
::ПРИЧИНА АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА::[html]ПРИЧИНА АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА{
=Боковые резцы и первые премоляры
~Центральные резцы
~Третьи моляры верхней челюсти
~Абсцедирование малой слюнной железы
~Распространение инфекции по ходу большого небного нерва
}

// question: 4123205 name: ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА
::ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА::[html]ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА{
~Высокая доза сосудосуживающего препарата в карпуле
~Наличие метилпарабена в карпуле местного анестетика
=Не соблюдение правил асептики и антисептики во время анестезии
~Не переносимость местного анестетика
~Ответная реакция организма на введение антигена
}

// question: 4123228 name: ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ АБСЦЕССА В КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
::ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ АБСЦЕССА В КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ::[html]ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ АБСЦЕССА В КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ{
=Зубы 1.8 и 2.8, инфицирование во время анестезии
~Вторичное распространение инфекции из околоушно-жевательной области
~Распространение инфекции со стороны небных миндалин по протяжению

~Вторичное распространение инфекции из щечной области
~Премоляры и моляры верхней челюсти
}

// question: 4123213 name: ПРОВЕДЕНИЕ ИНЦИЗИИ В ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА 2.1 НЕ ПОКАЗАНО
::ПРОВЕДЕНИЕ ИНЦИЗИИ В ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА 2.1 НЕ ПОКАЗАНО::[html]ПРОВЕДЕНИЕ ИНЦИЗИИ В ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА 2.1 НЕ ПОКАЗАНО{
=При обострении хронического простого пульпита зуба 2.1
~При остром гнойном периостите челюсти от зуба 2.1
~При нагноении радикулярной кисты верхней челюсти от зуба 2.1
~При обострении хронического периодонтита зуба 2.1 после пломбирования канала
~При формировании подслизистого абсцесса после эндодонтического лечения 2.1
}

// question: 4123725 name: Проводниковая анестезия при вскрытии подглазничной флегмоны делается у:
::Проводниковая анестезия при вскрытии подглазничной флегмоны делается у\:::[html]Проводниковая анестезия при вскрытии подглазничной флегмоны делается у\:{
~круглого отверстия
~овального отверстия
=подглазничного отверстия
~надглазничной вырезки
}

// question: 4123685 name: Продолжительность фазы альтерации при возникновении флегмоны подъязычного ...
::Продолжительность фазы альтерации при возникновении флегмоны подъязычного ...::[html]Продолжительность фазы альтерации при возникновении флегмоны подъязычного пространства\:{
~свыше 2 недель
~свыше 10 дней
=3-5 дней
~свыше 1 месяца
}

// question: 4123658 name: Профилактика осложнений абсцессов состоит в:
::Профилактика осложнений абсцессов состоит в\:::[html]Профилактика осложнений абсцессов состоит в\:{

~интенсивной антибиотикотерапии
~стимуляции неспецифической резистентности организма
=дренировании имеющихся гнойных очагов
~стимуляции иммунитета
}

// question: 4123839 name: Профилактика развития тяжелых осложнений гнойно-воспалительных процессов ...
::Профилактика развития тяжелых осложнений гнойно-воспалительных процессов ...::[html]Профилактика развития тяжелых осложнений гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области включает\:{
~ликвидацию очагов инфекции
~своевременное выявление воспалительных заболеваний
~соблюдение асептики и антисептики
=Все ответы верны
}

// question: 4123773 name: Пульсирующая боль в области груди, иррадиирующая в межлопаточную область и ...
::Пульсирующая боль в области груди, иррадиирующая в межлопаточную область и ...::[html]Пульсирующая боль в области груди, иррадиирующая в межлопаточную область и усиливающаяся при надавливании на остистые отростки грудных позвонков, усиление боли при попытке проглотить пищу или во время глубокого вдоха наблюдаются при\:{
=Заднем медиастините
~Сепсисе
~Переднем медиастените
~Флегмоне дна полости рта
}

// question: 4123720 name: Пути распространения инфекции из скуловой области
::Пути распространения инфекции из скуловой области::[html]Пути распространения инфекции из скуловой области{
=височная
~подвисочная
~подчелюстная
}

// question: 4123756 name: Путь распространения инфекции из глазницы:
::Путь распространения инфекции из глазницы\:::[html]Путь распространения инфекции из глазницы\:{
~околоушно-жевательная область
~кости основания черепа

~крылонебная ямка
}

// question: 4123206 name: РАЗВИТИЕ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА СОПРОВОЖДАЕТСЯ
::РАЗВИТИЕ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА СОПРОВОЖДАЕТСЯ::[html]РАЗВИТИЕ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА СОПРОВОЖДАЕТСЯ{
~Бурной воспалительной реакцией организма
~Выраженными явлениями интоксикации организма
~Аллергической реакцией замедленного типа на введенный препарат
~Сильной болью и нарушением функции
=Медленно развивающейся воспалительной реакцией
}

// question: 4123190 name: РАЗРЕЗ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫПОЛНЯЮТ
::РАЗРЕЗ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫПОЛНЯЮТ::[html]РАЗРЕЗ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫПОЛНЯЮТ{
~По верхнему краю прикрепленной десны
~Перпендикулярно большой небной артерии
~Параллельно малой небной артерии
=Параллельно большой небной артерии
~По ходу носонебного нерва
}

// question: 4123218 name: РАЗРЕЗ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫПОЛНЯЮТ
::РАЗРЕЗ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫПОЛНЯЮТ::[html]РАЗРЕЗ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЕБА ВЫПОЛНЯЮТ{
~По верхнему краю прикрепленной десны
~Перпендикулярно большой небной артерии
~Параллельно малой небной артерии
=Параллельно большой небной артерии
~По ходу носонебного нерва
}

// question: 4123191 name: РЕВИЗИЮ ПОЛОСТИ АБСЦЕССА ПРОВОДЯТ ПРИ ПОМОЩИ
::РЕВИЗИЮ ПОЛОСТИ АБСЦЕССА ПРОВОДЯТ ПРИ ПОМОЩИ::[html]РЕВИЗИЮ ПОЛОСТИ АБСЦЕССА ПРОВОДЯТ ПРИ ПОМОЩИ{
~Стоматологического пинцета
~Стоматологического зонда
=Кровоостанавливающего зажима
~Кюретажной ложечки

~Желобоватого зонда
}

// question: 4123669 name: Резкая болезненность при открывании рта и глотании характерна для абсцесса ...
::Резкая болезненность при открывании рта и глотании характерна для абсцесса ...::[html]Резкая болезненность при открывании рта и глотании характерна для абсцесса (флегмоны) пространств\:{
~подъязычного
=челюстно-язычного желобка
~околоушного-жевательного
~переднего отдела подъязычного
~подподбородочного
}

// question: 4123672 name: Резкая болезненность при открывании рта и глотании характерны для абсцессов ...
::Резкая болезненность при открывании рта и глотании характерны для абсцессов ...::[html]Резкая болезненность при открывании рта и глотании характерны для абсцессов пространств\:{
~подъязычного
=челюстно-язычного
~околоушно-жевательного
~переднего отдела подъязычного
~подподбородочного
}

// question: 4157709 name: С каким анатомическим образованием сообщается крыло-небная ямка:
::С каким анатомическим образованием сообщается крыло-небная ямка\:::[html]С каким анатомическим образованием сообщается крыло-небная ямка\:{
=Подвисочная ямка
~щечная область
~лобный синус
~клыковая ямка
}

// question: 4157710 name: С каким анатомическим образованием сообщается крыло-небная ямка:
::С каким анатомическим образованием сообщается крыло-небная ямка\:::[html]С каким анатомическим образованием сообщается крыло-небная ямка\:{
=Крыло-челюстное пространство
~Лобный синус

~Щечная область
~Околоушно-жевательная область
}

// question: 4123763 name: С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона ...
::С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона ...::[html]С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона подвисочной и крылонебной ямок\:{
~флегмона мягких тканей дна полости рта
=флегмона височной области и глазницы
~флегмона окологлоточного пространства
~флегмона щеки
~флегмона языка
}

// question: 4157702 name: С чем необходимо дифференцировать абсцесс челюстно-язычного желобка:
::С чем необходимо дифференцировать абсцесс челюстно-язычного желобка\:::[html]С чем необходимо дифференцировать абсцесс челюстно-язычного желобка\:{
~тризм
=абсцесс крыловидно-челюстного пространства
~карбункул нижней губы
~флегмона височной области
~флегмона щечной области
}

// question: 4157697 name: С чем необходимо дифференцировать флегмону дна полости рта:
::С чем необходимо дифференцировать флегмону дна полости рта\:::[html]С чем необходимо дифференцировать флегмону дна полости рта\:{
~Тризм
=Ангина Людвига
~Карбункул нижней губы
~Флегмона щечной области
~Флегмона височной области
}

// question: 4123777 name: Серьезным осложнением флегмон нижних отделов лица является:
::Серьезным осложнением флегмон нижних отделов лица является\:::[html]Серьезным осложнением флегмон нижних отделов лица является\:{
~Парез лицевого нерва

~Гематома мягких тканей
=Медиастинит
~Все ответы верны
}

// question: 4123771 name: Симптомы Герке, Иванова, Равич-Щербо встречаются при:
::Симптомы Герке, Иванова, Равич-Щербо встречаются при\:::[html]Симптомы Герке, Иванова, Равич-Щербо встречаются при\:{
~Флегмоне дна полости рта
~Сепсисе
=Медиастините
~Пневмонии
}

// question: 4123842 name: Симптомы медиастенита:
::Симптомы медиастенита\:::[html]Симптомы медиастенита\:{
~расстройство дыхания
~вынужденное положение
~симптом Попова
=Все ответы верны
}

// question: 4123765 name: Симптомы флегмоны крылонебной ямки:
::Симптомы флегмоны крылонебной ямки\:::[html]Симптомы флегмоны крылонебной ямки\:{
~сухость во рту, ассиметрия лица, боль в области тела нижней челюсти
=болезненное ограничение открывания рта, отечность и болезненность слизистой оболочки за бугром верхней челюсти, распирающая головная боль
}

// question: 4123825 name: Современные принципы лечения острой одонтогенной инфекции:
::Современные принципы лечения острой одонтогенной инфекции\:::[html]Современные принципы лечения острой одонтогенной инфекции\:{
~Хирургическое лечение
~Противомикробное лечение
~Общеукрепляющее и стимулирующее лечение
=Все ответы верны
}

// question: 4123826 name: Современные принципы лечения острой одонтогенной инфекции:

::Современные принципы лечения острой одонтогенной инфекции\:::[html]Современные принципы лечения острой одонтогенной инфекции\:{
~Дренирование внутрикостного очага воспаления и гнойного очага в мягких тканях
~Противомикробная терапия
~Дезинтоксикационная терапия
=Все ответы верны
}

// question: 4123755 name: Сочетание ограниченного открывания рта с болезненным глотанием характерно для...
::Сочетание ограниченного открывания рта с болезненным глотанием характерно для...::[html]Сочетание ограниченного открывания рта с болезненным глотанием характерно для флегмон{
~дна полости и подподбородочной области
~подподбородочной и поднижнечелюстной области
~поднижнечелюстной области и корня языка
=крылонёбной и подвисочной ямок
~височной ямки и глазницы
}

// question: 4123224 name: СФОРМИРОВАВШИЙСЯ АБСЦЕСС КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТЕМ
::СФОРМИРОВАВШИЙСЯ АБСЦЕСС КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТЕМ::[html]СФОРМИРОВАВШИЙСЯ АБСЦЕСС КОРНЯ (ОСНОВАНИЯ) ЯЗЫКА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТЕМ{
~рентгенологического исследования
~тщательного сбора анамнеза
~пальпации
~компьютерной томографии
=пункции
}

// question: 4123830 name: Терапевтическое действие метилурацила, пентоксила, оротата калия:
::Терапевтическое действие метилурацила, пентоксила, оротата калия\:::[html]Терапевтическое действие метилурацила, пентоксила, оротата калия\:{
~стимулирующее гемопоэз;
=повышающее неспецифическую резистентность организма;
~антиаллергическое
~стимулирующее фагоцитоз.
}

// question: 4123203 name: ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА
::ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА::[html]ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА{
	~Поднижнечелюстной треугольник
	~Окологлоточное пространство
	~Подъязычная область
	~Подглазничная область
	=Крыловидно-нижнечелюстное пространство
}

// question: 4123204 name: ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА
::ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА::[html]ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА{
	~Щечная область
	=Подвисочная ямка
	~Клыковая ямка
	~Подподбородочный треугольник
	~Височная ямка
}

// question: 4123694 name: Типичным доступом при хирургическом лечении флегмоны щечной области является ...
::Типичным доступом при хирургическом лечении флегмоны щечной области является ...::[html]Типичным доступом при хирургическом лечении флегмоны щечной области является разрез, выполненный\:{
	~В подподбородочной области по средней линии
	~В поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти
	=По губо-щечной складке
	~Окаймляя угол нижней челюсти
}

// question: 4123688 name: Типичным клиническим признаком при флегмоне околоушно-жевательной области ...
::Типичным клиническим признаком при флегмоне околоушно-жевательной области ...::[html]Типичным клиническим признаком при флегмоне околоушно-жевательной области является\:{
	~отек верхнего века
	~отек крыловидно-челюстной складки
	~отек и гиперемия щечной области
	~гиперемия кожи в области нижней губы
	=инфильтрат и гиперемия околоушно-жевательной области
}

// question: 4123774 name: Типичным признаком тромбофлебита вен лица является:
::Типичным признаком тромбофлебита вен лица является\:::[html]Типичным признаком тромбофлебита вен лица является\:{
	=Болезненный воспалительный тяж по ходу угловой вены
	~Гиперемия и коллатеральный отек кожи верхнего и нижнего века
	~Инфильтрат плотной консистенции в подглазничной области
	~Онемение кожи в проекции выхода подглазничного нерва
}

// question: 4123835 name: Тромбозы вен лица и пещеристого синуса чаще всего являются ложнением ...
::Тромбозы вен лица и пещеристого синуса чаще всего являются ложнением ...::[html]Тромбозы вен лица и пещеристого синуса чаще всего являются ложнением фурункулов и карбункулов лица, острых полисинусит°С' флегмон подвисочной ямки и крылонебной ямки\:{
	=да
	~нет
}

// question: 4123778 name: Тромбофлебит вен лица чаще является осложнением:
::Тромбофлебит вен лица чаще является осложнением\:::[html]Тромбофлебит вен лица чаще является осложнением\:{
	=Фурункула
	~Периостита
	~Гайморита
	~Атеромы
}

// question: 4123807 name: Тромбофлебит вен лица чаще является осложнением:
::Тромбофлебит вен лица чаще является осложнением\:::[html]Тромбофлебит вен лица чаще является осложнением\:{
	~гайморита
	~периодонтита
	=фурункула
	~рожистого воспаления
	~периостита
}

// question: 4123809 name: Укажите анастомоз вен лица с кавернозным синусом:
::Укажите анастомоз вен лица с кавернозным синусом\:::[html]Укажите анастомоз вен лица с кавернозным синусом\:{

~наружная яремная вена
~лицевая вена
=нижняя глазничная вена
~верхняя глазничная вена
}

// question: 4123800 name: Укажите наиболее вероятный путь инфицирования при одонтогенном медиастините:
::Укажите наиболее вероятный путь инфицирования при одонтогенном медиастините\:::[html]Укажите наиболее вероятный путь инфицирования при одонтогенном медиастините\:{
~лимфогенный
~гематогенный
=по протяжению
}

// question: 4157713 name: Укажите наиболее частую неодонтогенную причину для развития абсцесса и флегмоны:
::Укажите наиболее частую неодонтогенную причину для развития абсцесса и флегмоны\:::[html]Укажите наиболее частую неодонтогенную причину для развития абсцесса и флегмоны\:{
~острый периодонтит зубов нижней челюсти
~лимфаденит щечной области
~фурункул нижней губы
=травма языка
}

// question: 4157714 name: Укажите наиболее частую неодонтогенную причину для развития абсцесса и флегмоны:
::Укажите наиболее частую неодонтогенную причину для развития абсцесса и флегмоны\:::[html]Укажите наиболее частую неодонтогенную причину для развития абсцесса и флегмоны\:{
~острый периодонтит зубов нижней челюсти
~лимфаденит околоушной области
~фурункул нижней губы
=острый тонзиллит
}

// question: 4123663 name: Укажите оперативный доступ при вскрытии абсцесса корня языка:
::Укажите оперативный доступ при вскрытии абсцесса корня языка\:::[html]Укажите оперативный доступ при вскрытии абсцесса корня языка\:{
~разрез в подчелюстной области

=разрез в подподбородочной области
~разрез по краю языка
}

// question: 4123662 name: Укажите оперативный доступ при вскрытии абсцесса тела языка:
::Укажите оперативный доступ при вскрытии абсцесса тела языка\:::[html]Укажите оперативный доступ при вскрытии абсцесса тела языка\:{
~разрез в подчелюстной области
~разрез в подподбородочной области
=разрез по краю языка
}

// question: 4123793 name: Укажите пути распространения инфекции при сепсисе внутри организма:
::Укажите пути распространения инфекции при сепсисе внутри организма\:::[html]Укажите пути распространения инфекции при сепсисе внутри организма\:{
~Межмышечный
=Гематогенный
~Фасциальный
~Лимфогенный
}

// question: 4157715 name: Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка:
::Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка\:::[html]Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка\:{
=Отек и инфильтрат языка
~асимметрия лица
~затрудненное открывание рта
~отек крыло-челюстной складки
}

// question: 4157716 name: Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка:
::Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка\:::[html]Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка\:{
=боли при глотании
~отек и гиперемия щечных областей
~отек крыло-челюстной складки
~затрудненное открывание рта
}

// question: 4157717 name: Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка:
::Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка\:::[html]Укажите типичный клинический признак абсцесса и флегмоны языка\:{
	=затрудненное дыхание
	~отек и гиперемия щечных областей
	~отек крыло-челюстной складки
	~затрудненное открывание рта
}

// question: 4157703 name: Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного ...
::Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного ...::[html]Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного пространства\:{
	~диплопия
	=боль и ограничение открывания рта
	~отек и гиперемия щечных областей
	~инфильтрат челюстно-язычного желобка
	~инфильтрат мягких тканей подподбородочной области.
}

// question: 4157704 name: Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного ...
::Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного ...::[html]Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного пространства\:{
	~диплопия
	=инфильтрат мягких тканей в области угла нижней челюсти.
	~отек и гиперемия щечных областей.
	~инфильтрат челюстно-язычного желобка
	~гиперемия кожи околоушно-жевательной области.
}

// question: 4157705 name: Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного ...
::Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного ...::[html]Укажите типичный клинический признак флегмоны крыловидно-челюстного пространства\:{
	~диплопия
	=отек и гиперемия крыловидно-челюстной складки.
	~инфильтрат челюстно-язычного желобка

~гиперемия кожи околоушно-жевательной области
}

// question: 4123784 name: Укажите, воздействием каких основных факторов определяется развитие сепсиса?
::Укажите, воздействием каких основных факторов определяется развитие сепсиса?::[html]Укажите, воздействием каких основных факторов определяется развитие сепсиса?{
~Микробиологический фактор (вид. вирулентность, количество, длительность воздействия попавших в организм бактерий)
~Очаг внедрения инфекции (область, характер, объем разрушения тканей и др.)
~Реактивность организма
=Все ответы верны
}

// question: 4137702 name: Флегмона не требует хирургического лечения
::Флегмона не требует хирургического лечения::[html]Флегмона не требует хирургического лечения{
~Верно
=Неверно
}

// question: 4123738 name: Флегмона орбиты - это:
::Флегмона орбиты - это\:::[html]Флегмона орбиты - это\:{
~Воспаление периоста глазницы, субпериостальный абсцесс глазницы
~Ангионевратический отек Квинке
~Воспаление теноновой капсулы
=Острое диффузное гнойное воспаление ретробульбарной клетчатки с последующей некротизацией и расплавлением
}

// question: 4123583 name: Флегмона подподбородочной области при хирургическом лечении характеризуется ...
::Флегмона подподбородочной области при хирургическом лечении характеризуется ...::[html]Флегмона подподбородочной области при хирургическом лечении характеризуется достаточным разрезом, если он сделан\:{
~В месте наибольшей болезненности
=На всю ширину инфильтрата
~В области флюктуации
~По границе гиперемии кожи
}

// question: 4137701 name: Флегмона требует хирургического лечения
::Флегмона требует хирургического лечения::[html]Флегмона требует хирургического лечения{
	=Верно
	~Неверно
}

// question: 4137684 name: Флегмоной называется:
::Флегмоной называется\:::[html]Флегмоной называется\:{
	=Разлитое гнойно-воспалительное заболевание
	~Ограниченное гнойно-воспалительное заболевание
	~Воспаление волосяного фолликула
	~Воспаление сальной железы
}

// question: 4123768 name: Флегмону височной области нужно дифференцировать с
::Флегмону височной области нужно дифференцировать с::[html]Флегмону височной области нужно дифференцировать с{
	~флегмоной дна полости рта
	~флегмоной окологлоточного пространства
	=флегмоной глазницы
}

// question: 4123638 name: Флегмону дна полости рта необходимо дифференцировать с:
::Флегмону дна полости рта необходимо дифференцировать с\:::[html]Флегмону дна полости рта необходимо дифференцировать с\:{
	=Ангиной Людвига
	~Карбункулом нижней губы
	~Флегмоной височной области
	~Флегмоной щечной области
}

// question: 4123689 name: Флегмону околоушно-жевательной области необходимо дифференцировать с:
::Флегмону околоушно-жевательной области необходимо дифференцировать с\:::[html]Флегмону околоушно-жевательной области необходимо дифференцировать с\:{
	~ангиной Людвига
	~карбункулом нижней губы
	~флегмоной височной области
	=подмассетериальным абсцессом
	~обострением хронического гайморита

}

// question: 4123840 name: Формы сепсиса (по Костюченко):
::Формы сепсиса (по Костюченко)\:::[html]Формы сепсиса (по Костюченко)\:{
	~гнойно-резорбтивная лихорадка
	~начальный сепсис
	~септицемия
	~хронический сепсис
	=все перечисленные
}

// question: 4123211 name: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АБСЦЕССЕ ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМОК
::ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АБСЦЕССЕ ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМОК::[html]ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АБСЦЕССЕ ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМОК{
	~Выраженное ограничение открывания рта
	~Нарушение зрения из-за отека век на стороне заболевания
	~Нарушение жевания, глотания и речи из-за боли
	=Умеренное ограничение открывания рта и боковых движений нижней челюсти
	~Резкое нарушение глотания из-за боли
}

// question: 4137692 name: Фурункул – это гнойно-воспалительное заболевание:
::Фурункул – это гнойно-воспалительное заболевание\:::[html]Фурункул – это гнойно-воспалительное заболевание\:{
	=Верно
	~Неверно
}

// question: 4137696 name: Фурункул – это закупорка сальной железы:
::Фурункул – это закупорка сальной железы\:::[html]Фурункул – это закупорка сальной железы\:{
	~Верно
	=Неверно
}

// question: 4137693 name: Фурункул – это не гнойно-воспалительной заболевание:
::Фурункул – это не гнойно-воспалительной заболевание\:::[html]Фурункул – это не гнойно-воспалительной заболевание\:{
	~Верно
	=Неверно

```
}


// question: 4137695  name: Фурункул – это новообразование:
::Фурункул – это новообразование\:::[html]Фурункул – это новообразование\:{
        ~Верно
        =Неверно
}


// question: 4137694  name: Фурункул – это разлитое гнойно-воспалительное
заболевание:
::Фурункул – это разлитое гнойно-воспалительное заболевание\:::[html]Фурункул – это
разлитое гнойно-воспалительное заболевание\:{
        =Верно
        ~Неверно
}


// question: 4137698  name: Фурункул не требует хирургического лечения
::Фурункул не требует хирургического лечения::[html]Фурункул не требует
хирургического лечения{
        ~Верно
        =Неверно
}


// question: 4137709  name: Фурункул средней зоны лица лечится:
::Фурункул средней зоны лица лечится\:::[html]Фурункул средней зоны лица лечится\:{
        ~Амбулаторно косметологом
        ~Амбулаторно стоматологом
        ~В стационаре общим хирургом
        =В стационаре челюстно-лицевым хирургом
}


// question: 4137697  name: Фурункул требует хирургического лечения
::Фурункул требует хирургического лечения::[html]Фурункул требует хирургического
лечения{
        =Верно
        ~Неверно
}


// question: 4137708  name: Фурункул ЧЛО лечится:
::Фурункул ЧЛО лечится\:::[html]Фурункул ЧЛО лечится\:{
        ~Амбулаторно косметологом
```

~Амбулаторно стоматологом
~В стационаре общим хирургом
=В стационаре челюстно-лицевым хирургом
}

// question: 4137685 name: Фурункулом называется:
::Фурункулом называется\:::[html]Фурункулом называется\:{
~Разлитое гнойно-воспалительное заболевание
~Ограниченное гнойно-воспалительное заболевание
=Воспаление волосяного фолликула и прилежащей клетчатки
~Воспаление сальной железы
}

// question: 4123573 name: Характерной особенностью клинической картины гнилостно-некротической флегмоны...
::Характерной особенностью клинической картины гнилостно-некротической флегмоны...::[html]Характерной особенностью клинической картины гнилостно-некротической флегмоны дна полости рта является{
=выраженная интоксикация
~отсутствие интоксикации
~наличие четких границ воспалительного инфильтрата
~ограниченный воспалительный инфильтрат корня языка
}

// question: 4123813 name: Характерным клиническим признаком при тромбофлебите вен лица является:
::Характерным клиническим признаком при тромбофлебите вен лица является\:::[html]Характерным клиническим признаком при тромбофлебите вен лица является\:{
~разлитой инфильтрат плотной деревянистой консистенции
~онемение кожи лица
=болезненный воспалительный тяж по ходу угловой вены
}

// question: 4123735 name: Характерным клиническим признаком флегмоны подвисочной области является:
::Характерным клиническим признаком флегмоны подвисочной области является\:::[html]Характерным клиническим признаком флегмоны подвисочной области является\:{
~Гиперемия щечной области
=Симптом “песочных часов”
~Отек подподбородочной области
~Гиперемия кожи верхней губы

}

// question: 4123779 name: Характерным рентгенологическим симптомом медиастинита является:
::Характерным рентгенологическим симптомом медиастинита является\:::[html]Характерным рентгенологическим симптомом медиастинита является\:{
	~Смещение средостения
	~Усиление легочного рисунка
	=Расширение границ средостения
	~Расширение границ сердца
}

// question: 4123629 name: Хирургический доступ при вскрытии флегмоны дна полости рта осуществляют:
::Хирургический доступ при вскрытии флегмоны дна полости рта осуществляют\:::[html]Хирургический доступ при вскрытии флегмоны дна полости рта осуществляют\:{
	=Параллельно краю нижней челюсти, дугообразной формы, от угла до угла
	~В области челюстно-язычного желобка
	~В подподбородочной области
	~По крыловидно-нижнечелюстной складке
}

// question: 4123628 name: Хирургический доступ при вскрытии флегмоны языка осуществляют:
::Хирургический доступ при вскрытии флегмоны языка осуществляют\:::[html]Хирургический доступ при вскрытии флегмоны языка осуществляют\:{
	=В подподбородочной области по средней линии
	~По крыловидно-нижнечелюстной складке
	~Дугообразно вдоль угла нижней челюсти
	~В поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти
}

// question: 4123816 name: Хирургический метод лечения тромбофлебита вен лица применяется:
::Хирургический метод лечения тромбофлебита вен лица применяется\:::[html]Хирургический метод лечения тромбофлебита вен лица применяется\:{
	~при появлении отека
	=при абсцедировании
	~при удалении тромба

}

// question: 4123623 name: Хирургическое вмешательство при лечении ангины Людвига предусматривает ...
::Хирургическое вмешательство при лечении ангины Людвига предусматривает ...::[html]Хирургическое вмешательство при лечении ангины Людвига предусматривает вскрытие и дренирование следующих клетчаточных пространств\:{
	~Позадичелюстных, околоушно-жевательных
	~Челюстно-язычных, щечных
	=Подчелюстных, подподбородочных, подъязычных
	~Височных, подвисочных
}

// question: 4123621 name: Хирургическое лечение абсцессов и флегмон окологлоточного пространства проводят:
::Хирургическое лечение абсцессов и флегмон окологлоточного пространства проводят\:::[html]Хирургическое лечение абсцессов и флегмон окологлоточного пространства проводят\:{
	=внутриротовым вертикальным разрезом 1,5—2 см;
	~внутриротовым горизонтальным разрезом 5 - 6 см;
	~внеротовым разрезом в области заднего отдела поднижнечелюстного треугольника.
}

// question: 4123691 name: Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой ...
::Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой ...::[html]Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области следует начинать с\:{
	~вскрытия гнойного очага и госпитализации больного
	~удаления «причинного» зуба и назначения физиотерапии
	~вскрытия гнойного очага и назначения тепловых процедур
	=удаления «причинного» зуба и вскрытие гнойного очага
	~удаления «причинного» зуба и пунктирования гнойного очага
}

// question: 4123192 name: ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНЫЙ ЖЕЛОБОК ПОДЪЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА НАХОДИТСЯ
::ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНЫЙ ЖЕЛОБОК ПОДЪЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА НАХОДИТСЯ::[html]ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНЫЙ ЖЕЛОБОК ПОДЪЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА НАХОДИТСЯ{
	~На уровне резцов нижней челюсти и кончика языка
	=В заднебоковом отделе подъязычной области

~Между выводными протоками поднижнечелюстной слюнной железы
~Между корнем языка и крыловидно-нижнечелюстной складкой
~В переднебоковом отделе подъязычной области
}

// question: 4157699 name: Что входит в комплекс терапии флегмоны дна полости рта:
::Что входит в комплекс терапии флегмоны дна полости рта\:::[html]Что входит в комплекс терапии флегмоны дна полости рта\:{
~Мануальная
=Дезинтоксикационная
~Лучевая
~Седативная
~Гипотензивная
}

// question: 4157698 name: Что входит в комплекстерапии флегмоны дна полости рта:
::Что входит в комплекстерапии флегмоны дна полости рта\:::[html]Что входит в комплекстерапии флегмоны дна полости рта\:{
~Лучевая
=Десенсибилизирующая
~Седативная
~Гипотензивная
~Мануальная
}

// question: 4123822 name: Что входит в состав многокомпонентных мазей дегидратирующего действия:
::Что входит в состав многокомпонентных мазей дегидратирующего действия\:::[html]Что входит в состав многокомпонентных мазей дегидратирующего действия\:{
~Антибактериальные препараты
~Гидрофильная основа
~Местный анестетик
=Все ответы верны
}

// question: 4157701 name: Что необходимо сделать в день обращения при флегмоне подподбородочной области:
::Что необходимо сделать в день обращения при флегмоне подподбородочной области\:::[html]Что необходимо сделать в день обращения при флегмоне подподбородочной области\:{
~начать иглорефлексотерапию

=вскрыть гнойный очаг
~сделать новокаиновую блокаду
~назначить физиотерапевтическое лечение
~ввестивнутримышеяно дыхательные аналептики
}

// question: 4157691 name: Что является верхней границей подглазничной области:
::Что является верхней границей подглазничной области\:::[html]Что является верхней границей подглазничной области\:{
~Скулочелюстной шов
=Нижний край глазницы
~Край грушевидного отверстия
~Альвеолярный отросток верхней челюсти
}

// question: 4123674 name: Что является границей верхнего и нижнего этажей дна полости рта:
::Что является границей верхнего и нижнего этажей дна полости рта\:::[html]Что является границей верхнего и нижнего этажей дна полости рта\:{
~мышцы языка
=челюстно-подъязычная мышца
}

// question: 4157694 name: Что является латеральной границей подглазничной области:
::Что является латеральной границей подглазничной области\:::[html]Что является латеральной границей подглазничной области\:{
~Нижний край глазницы
=Скулочелюстной шов
~Край грушевидного отверстия
~Альвеолярный отросток верхней челюсти
}

// question: 4157718 name: Что является местным осложнением флегмоны и абсцесса языка:
::Что является местным осложнением флегмоны и абсцесса языка\:::[html]Что является местным осложнением флегмоны и абсцесса языка\:{
=Стеноз верхних дыхательных путей
~менингоэнцефалит
~тромбоз венозных синусов головного мозга.
~рубцовый выворот нижней губы
}

// question: 4157695 name: Что является показанием для проведения блокад по Вишневскому:
::Что является показанием для проведения блокад по Вишневскому\:::[html]Что является показанием для проведения блокад по Вишневскому\:{
	~Отек
	=Инфильтрат
	~Эмпиема верхнечелюстной пазухи
	~Инфильтрат с признаками абсцедирования.
}

// question: 4123824 name: Является ли оперативный метод лечения основным у больных с острыми ...
::Является ли оперативный метод лечения основным у больных с острыми ...::[html]Является ли оперативный метод лечения основным у больных с острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи\:{
	=Да
	~Нет
}

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021/Травматология
$CATEGORY: $course$/top/2021/Травматология

// question: 4124043 name: «Золотым стандартом» при подозрении на перелом скуло-носо-орбитального ...
::«Золотым стандартом» при подозрении на перелом скуло-носо-орбитального ...::[html]«Золотым стандартом» при подозрении на перелом скуло-носо-орбитального комплекса является проведение\:{
	~Рентгенограммы черепа в прямой проекции
	=Компьютерной томографии черепа
	~Рентгенограммы черепа в боковой проекции
	~Ортопантомограммы
}

// question: 4124119 name: Анизокория – это:
::Анизокория – это\:::[html]Анизокория – это\:{
	~Спонтанные дрожательные движения глазных яблок в крайних отведениях
	~Слабо выраженная реакция зрачков на свет
	=Разница в размере зрачков более 1 мм
	~Неподвижность глазных яблок?
}

// question: 4124116 name: Антероградная амнезия это:
::Антероградная амнезия это\:::[html]Антероградная амнезия это\:{
	~Пациент не может вспомнить события, происходившие с ним до момента травмы
	=Пациент не может вспомнить события, происходившие с ним после момента травмы
	~Пациент не может вспомнить сам момент травмы и соответствующий ему промежуток времени
	~Пациент утрачивает ориентацию во времени и пространстве
}

// question: 4123912 name: Асфиксия от закупорки дыхательной трубки инородным телом:
::Асфиксия от закупорки дыхательной трубки инородным телом\:::[html]Асфиксия от закупорки дыхательной трубки инородным телом\:{
	~Клапанная
	~Стенотическая
	=Обтурационная
	~Аспирационная
	~Дислокационная
}

// question: 4123915 name: Асфиксия от нарушения проходимости дыхательных путей вдыханием жидкого ...
::Асфиксия от нарушения проходимости дыхательных путей вдыханием жидкого ...::[html]Асфиксия от нарушения проходимости дыхательных путей вдыханием жидкого раневого содержимого или рвотных масс\:{
	~Клапанная
	~Стенотическая
	~Обтурационная
	=Аспирационная
	~Дислокационная
}

// question: 4123914 name: Асфиксия от нарушения проходимости дыхательных путей смещенными поврежденными...
::Асфиксия от нарушения проходимости дыхательных путей смещенными поврежденными...::[html]Асфиксия от нарушения проходимости дыхательных путей смещенными поврежденными органами\:{
	~Клапанная
	~Стенотическая
	~Обтурационная
	~Аспирационная
	=Дислокационная

}

// question: 4123913 name: Асфиксия от сдавления дыхательной трубки:
::Асфиксия от сдавления дыхательной трубки\:::[html]Асфиксия от сдавления дыхательной трубки\:{
	~Клапанная
	=Стенотическая
	~Обтурационная
	~Аспирационная
	~Дислокационная
}

// question: 4123916 name: Асфиксия от частичного и периодичного закрытия дыхательных путей ...
::Асфиксия от частичного и периодичного закрытия дыхательных путей ...::[html]Асфиксия от частичного и периодичного закрытия дыхательных путей поврежденными тканями с затруднением вдоха или выдоха\:{
	=Клапанная
	~Стенотическая
	~Обтурационная
	~Аспирационная
	~Дислокационная
}

// question: 4123991 name: Биорезорбируемые платины для остеосинтеза изготавливаются из:
::Биорезорбируемые платины для остеосинтеза изготавливаются из\:::[html]Биорезорбируемые платины для остеосинтеза изготавливаются из\:{
	~Титана
	~Циркония
	=Полилактидов
	~Тантала
}

// question: 4124067 name: Блоковый нерв попадает из полости черепа в глазницу через:
::Блоковый нерв попадает из полости черепа в глазницу через\:::[html]Блоковый нерв попадает из полости черепа в глазницу через\:{
	~Зрительный канал
	=Верхнюю глазничную щель
	~Нижнюю глазничную щель
	~Круглое отверстие
}

// question: 4123949 name: Большие пальцы рук при вправлении вывиха нижней челюсти врач устанавливат на:
::Большие пальцы рук при вправлении вывиха нижней челюсти врач устанавливат на\:::[html]Большие пальцы рук при вправлении вывиха нижней челюсти врач устанавливат на\:{
	=Моляры нижней челюсти
	~Резцы нижней челюсти
	~Углы нижней челюсти
	~Альвеолярный отросток верхней челюсти
}

// question: 4123970 name: В какие сроки проводят первичную хирургическую обработку ран лица:
::В какие сроки проводят первичную хирургическую обработку ран лица\:::[html]В какие сроки проводят первичную хирургическую обработку ран лица\:{
	=до 48 часов
	~до 72 и более часов
	~до 24 часов
}

// question: 4124015 name: В комплексном лечении пациентов с переломами верхней челюсти не применяют ...
::В комплексном лечении пациентов с переломами верхней челюсти не применяют ...::[html]В комплексном лечении пациентов с переломами верхней челюсти не применяют препараты\:{
	=Гипотензивные
	~Обезболивающие
	~Антибактериальные
	~Все ответы верны
}

// question: 4124023 name: В средней зоне лица выделяют контрфорсы:
::В средней зоне лица выделяют контрфорсы\:::[html]В средней зоне лица выделяют контрфорсы\:{
	~Лобно-носовой
	~Скуловой
	~Крыло-небный
	~Небный
	=Все ответы верны
}

// question: 4123942 name: Ведущим симптомом при переднем вывихе нижней челюсти является:
::Ведущим симптомом при переднем вывихе нижней челюсти является\:::[html]Ведущим симптомом при переднем вывихе нижней челюсти является\:{
	=Невозможность сомкнуть зубы
	~Снижение высоты прикуса
	~Обильное слезотечение
	~Умеренная тошнота
}

// question: 4124029 name: Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через
::Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через::[html]Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через{
	~Сонное отверстие
	~Овальное отверстие
	~Остистое отверстие
	=Круглое отверстие
}

// question: 4124064 name: Верхняя стенка глазницы:
::Верхняя стенка глазницы\:::[html]Верхняя стенка глазницы\:{
	=Глазничная часть лобной кости и малое крыло клиновидной кости
	~Глазничная пластинка решетчатой кости, лобный отросток верхней челюсти, слезная кость, тело клиновидной кости, лобная кость
	~Глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости, лобный отросток скуловой кости, скуловой отросток лобной кости
	~Глазничная поверхность верхней челюсти, скуловая кость
}

// question: 4124028 name: Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:
::Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:::[html]Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:{
	~I-й
	=II-й
	~III-й
	~Не иннервируется
}

// question: 4124070 name: Ветвь глазной артерии, учатсвующая в кровоснабжении стенок носовой полости:

::Ветвь глазной артерии, учатсвующая в кровоснабжении стенок носовой полости\:::[html]Ветвь глазной артерии, учатсвующая в кровоснабжении стенок носовой полости\:{
	~Надблоковая артерия
	=Передняя решетчатая артерия
	~Слезная артерия
	~Дорзальная артерия носа
}

// question: 4124071 name: ВЕТВЬЮ ГЛАЗНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ВЕТВЬЮ ГЛАЗНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ВЕТВЬЮ ГЛАЗНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	~угловая артерия
	~клиновидно-небная артерия
	=надблоковая артерия
	~подглазничная артерия
}

// question: 4124072 name: Ветвями верхнечелюстного нерва (n. maxillaris) являются:
::Ветвями верхнечелюстного нерва (n. maxillaris) являются\:::[html]Ветвями верхнечелюстного нерва (n. maxillaris) являются\:{
	~подглазничный нерв (n. infraorbitalis)
	~скуловой нерв (n. zygomaticus)
	~менингеальная ветвь (ramus meningeus)
	=Все ответы верны
}

// question: 4123922 name: Вид асфиксии у раненых с отрывом подбородочного отдела нижней челюсти:
::Вид асфиксии у раненых с отрывом подбородочного отдела нижней челюсти\:::[html]Вид асфиксии у раненых с отрывом подбородочного отдела нижней челюсти\:{
	~Клапанная
	~Стенотическая
	~Обтурационная
	~Аспирационная
	=Дислокационная
}

// question: 4124113 name: Внутричерепные гематомы считаются хроническими, если они определяются:
::Внутричерепные гематомы считаются хроническими, если они определяются\:::[html]Внутричерепные гематомы считаются хроническими, если они определяются\:{

~Спустя 3-е суток после травмы
~Спустя 1 неделю после травмы
~Спустя 2 недели после травмы
=Спустя 3 недели после травмы?
}

// question: 4138038 name: Возможные осложнения при неправильно сросшихся переломах:
::Возможные осложнения при неправильно сросшихся переломах\:::[html]Возможные осложнения при неправильно сросшихся переломах\:{
=Неврит тройничного нерва
~Заболевания ВНЧС
~Кариозные поражения зубов
~Нарушение окклюзионных взаимоотношений
}

// question: 4124134 name: Возможный риск при наличии зуба в линии перелома у пациента с сочетанной ...
::Возможный риск при наличии зуба в линии перелома у пациента с сочетанной ...::[html]Возможный риск при наличии зуба в линии перелома у пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой\:{
~Развитие кровотечения
~Повторный перелом в этом же месте
=Развитие остеомиелита
~Патологическая стираемость зуба
}

// question: 4123948 name: Вправление нижней челюсти при вывихе проводят в положении больного:
::Вправление нижней челюсти при вывихе проводят в положении больного\: ::[html]Вправление нижней челюсти при вывихе проводят в положении больного\: {
=Сидя
~Лёжа
~Стоя
~Нагнувшись
}

// question: 4123925 name: Временная остановка кровотечения у раненых в челюстно-лицевую область ...
::Временная остановка кровотечения у раненых в челюстно-лицевую область ...::[html]Временная остановка кровотечения у раненых в челюстно-лицевую область заключается\:{

~В наложении жгута
=В тугой тампонаде
~В пальцевом прижатии сосуда
~В перевязке сосуда на протяжении
}

// question: 4123935 name: Вторичными ранящими снарядами являются:
::Вторичными ранящими снарядами являются\:::[html]Вторичными ранящими снарядами являются\:{
=Осколки зубов
~Разрывные пули
~Осколки снаряда
~Зоны некроза
}

// question: 4124127 name: Выполнение тройного приема Сафара, заключающегося в запрокидывании головы, ...
::Выполнение тройного приема Сафара, заключающегося в запрокидывании головы, ...::[html]Выполнение тройного приема Сафара, заключающегося в запрокидывании головы, раскрывании рта, выдвижении нижней челюсти кпереди противопоказано при\:{
~Двустороннем переломе нижней челюсти. сопровождающимся смещением центрального отломка кзади
~Переломе верхней челюсти, сопровождающемся смещением ее фрагмента вниз и кнутри
=Переломе шейного отдела позвоночника
~Верно все вышеперечисленное?
}

// question: 4123976 name: Для временной иммобилизации при переломах нижней челюсти используют:
::Для временной иммобилизации при переломах нижней челюсти используют\:::[html]Для временной иммобилизации при переломах нижней челюсти используют\:{
=Межчелюстное лигатурное связывание
~Наложение шин Тигерштедта
~Остеосинтез титановыми пластинами
~Наложение шин Васильева
}

// question: 4123975 name: Для иммобилизации отломков при переломе беззубых челюстей применяют шину:

::Для иммобилизации отломков при переломе беззубых челюстей применяют шину\:::[html]Для иммобилизации отломков при переломе беззубых челюстей применяют шину\:{
	=Порта
	~Ванкевича
	~Тигерштедта
	~Васильева
}

// question: 4138050 name: Для иммобилизации переломов беззубых челюстей используется:
::Для иммобилизации переломов беззубых челюстей используется\:::[html]Для иммобилизации переломов беззубых челюстей используется\:{
	~Шина Тигерштедта
	~Шина Ванкевича
	=Шина Порта
	~Шина Лимберга
}

// question: 4124129 name: Для обезболивания у пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой ...
::Для обезболивания у пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой ...::[html]Для обезболивания у пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой предпочтительным препаратом является (из перечисленных)\:{
	=Анальгин
	~Промедол
	~Морфий
	~Омнопон
}

// question: 4138042 name: Для оказания первой врачебной помощи при переломах челюстей используют:
::Для оказания первой врачебной помощи при переломах челюстей используют\:::[html]Для оказания первой врачебной помощи при переломах челюстей используют\:{
	=Стандартную транспортную шину
	~Аппарат Илизарова
	~Проволочную шину Тегерштедта
	~Шину Васильева
}

// question: 4124135 name: Для осуществления первичной фиксации верхней челюсти при ее переломе у ...

::Для осуществления первичной фиксации верхней челюсти при ее переломе у ...::[html]Для осуществления первичной фиксации верхней челюсти при ее переломе у пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой, сопровождающейся многократной «мозговой» рвотой, показано наложение\:{
~Лигатурной межзубной повязки по Ivi
~Двучелюстных шин с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой
~Окружающего шва по Black
=Фронто-максиллярного остеосинтеза по Adams?
}

// question: 4124131 name: Для осуществления первичной фиксации фрагментов нижней челюсти при ее ...
::Для осуществления первичной фиксации фрагментов нижней челюсти при ее ...::[html]Для осуществления первичной фиксации фрагментов нижней челюсти при ее переломе у пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой, сопровождающейся многократной «мозговой» рвотой, показано наложение\:{
~Лигатурной межзубной повязки по Ivi
~Двучелюстных шин с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой
=Окружающего шва по Black
~Фронто-максиллярного остеосинтеза по Adams?
}

// question: 4123923 name: Для профилактики асфиксии при операциях со значительным смещением тканей дна ...
::Для профилактики асфиксии при операциях со значительным смещением тканей дна ...::[html]Для профилактики асфиксии при операциях со значительным смещением тканей дна полости рта проводят\:{
~Введение воздуховода
=Наложение трахеостомы
~Наложение бимаксиллярных шин
~Прошивание и выведение языка
}

// question: 4124085 name: Для реопозиции скуловой кости при ее переломе применяют
::Для реопозиции скуловой кости при ее переломе применяют::[html]Для реопозиции скуловой кости при ее переломе применяют{
~шпатель
~распатор
~зажим Кохера
~крючок Фарабефа
=крючок Лимберга
}

// question: 4124086 name: Для реопозиции скуловой кости при ее переломе применяют
::Для реопозиции скуловой кости при ее переломе применяют::[html]Для реопозиции скуловой кости при ее переломе применяют{
	~шпатель
	~распатор
	~зажим Кохера
	~крючок Фарабефа
	=крючок Карапетяна
}

// question: 4124042 name: Для репозиции скуловой кости применяют:
::Для репозиции скуловой кости применяют\:::[html]Для репозиции скуловой кости применяют\:{
	~Зажим Кохера
	~Крючок Фарабефа
	~Распатор
	=Крючок Лимберга
}

// question: 4124059 name: Для репозиции скуловой кости применяют:
::Для репозиции скуловой кости применяют\:::[html]Для репозиции скуловой кости применяют\:{
	=Элеватор Карапетяна
	~Крючок Лимберга
	~Зажим Кохера
	~Элеватор Волкова
}

// question: 4124128 name: Для того, чтобы придать больному с сочетанной черепно-лицевой травмой «позу ...
::Для того, чтобы придать больному с сочетанной черепно-лицевой травмой «позу ...::[html]Для того, чтобы придать больному с сочетанной черепно-лицевой травмой «позу спасения» его следует уложить{
	~на живот
	=на бок
	~на спину
	~Верно все вышеперечисленное?
}

// question: 4124133 name: Для того, чтобы уложить пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой в «позу...

::Для того, чтобы уложить пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой в «позу...::[html]Для того, чтобы уложить пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой в «позу спасения» надо придать следующее положение ног\:{
~Обе ноги должны быть вытянуты
=Одна нога сгибается в коленном и тазобедренном суставах, другая укладывается поверх нее в вытянутом положении
~Обе ноги сгибаются в коленном и тазобедренном суставах
~Верно все вышеперечисленное?
}

// question: 4124021 name: Для уточнения наличия ликвореи применяют:
::Для уточнения наличия ликвореи применяют\:::[html]Для уточнения наличия ликвореи применяют\:{
=Пробу двойного пятна
~Пробу носового платка
~Водную пробу
~Воздушную пробу
}

// question: 4123993 name: Для фиксации фрагментов нижней челюсти при переломе оптимальной конфигурацией...
::Для фиксации фрагментов нижней челюсти при переломе оптимальной конфигурацией...::[html]Для фиксации фрагментов нижней челюсти при переломе оптимальной конфигурацией пластины является\:{
~Прямая
~X-образная
~Y-образная
=Конфигурация не имеет значения
}

// question: 4123990 name: Для фиксации фрагментов нижней челюсти, в случае образования дефекта костной ...
::Для фиксации фрагментов нижней челюсти, в случае образования дефекта костной ...::[html]Для фиксации фрагментов нижней челюсти, в случае образования дефекта костной ткани показано применение\:{
~Микропластин
~Мини-пластин
~Компрессионных пластин
=Реконструктивных пластин
}

// question: 4124035 name: Дополнительные методы исследования для диагностики переломов верхней челюсти:

::Дополнительные методы исследования для диагностики переломов верхней челюсти\: ::[html]Дополнительные методы исследования для диагностики переломов верхней челюсти\: {
	~ЭОД
	~Биопсия
	=Рентгенография
	~Радиоизотопное
}

// question: 4124006 name: Дополнительный метод обследования при переломах верхней челюсти:
::Дополнительный метод обследования при переломах верхней челюсти\:::[html]Дополнительный метод обследования при переломах верхней челюсти\:{
	=Компьютерная томография
	~Магнитно-резонансная томография
	~Ультразвуковое исследование
	~Все ответы верны
}

// question: 4123978 name: Дополнительным методом диагностики перелома нижней челюсти является:
::Дополнительным методом диагностики перелома нижней челюсти является\:::[html]Дополнительным методом диагностики перелома нижней челюсти является\:{
	=Рентгенография
	~Биопсия
	~Цитология
	~Электроодонтодианостика
}

// question: 4124088 name: Доступ для репозиции скуловой кости крючком Лимберга
::Доступ для репозиции скуловой кости крючком Лимберга::[html]Доступ для репозиции скуловой кости крючком Лимберга{
	=внеротовой
	~внутриротовой
}

// question: 4124087 name: Доступ для репозиции скуловой кости элеватором Карапетяна
::Доступ для репозиции скуловой кости элеватором Карапетяна::[html]Доступ для репозиции скуловой кости элеватором Карапетяна{
	~внеротовой

=внутриротовой
}

// question: 4124041 name: Доступ для репозиции скуловой кости элеватором Карапетяна:
::Доступ для репозиции скуловой кости элеватором Карапетяна\:::[html]Доступ для репозиции скуловой кости элеватором Карапетяна\:{
=Внутриротовой
~Внеротовой
~Комбинированный
~Наружный
}

// question: 4124077 name: Задней границей скуловой области является:
::Задней границей скуловой области является\:::[html]Задней границей скуловой области является\:{
~Передний край жевательной мыщцы
=Височно-скуловой шов
~Скулоальвеолярный гребень
~Нижний край нижней челюсти
}

// question: 4124095 name: Затруднения открывания рта при переломе скуловой кости обусловлено травмой мышц
::Затруднения открывания рта при переломе скуловой кости обусловлено травмой мышц::[html]Затруднения открывания рта при переломе скуловой кости обусловлено травмой мышц{
~височной
~жевательной
=крыловидных
}

// question: 4124080 name: Затруднения открывания рта при переломе скуловой кости обусловлено травмой мышц:
::Затруднения открывания рта при переломе скуловой кости обусловлено травмой мышц\:::[html]Затруднения открывания рта при переломе скуловой кости обусловлено травмой мышц\:{
~Височной
=Жевательной
~Крыловидных
~Щечной
}

// question: 4138039 name: Зубонадесневые шина:
::Зубонадесневые шина\:::[html]Зубонадесневые шина\:{
	=Шина Вебера
	~Шина Тигерштедта
	~Шина Порта
	~Шина Васильева
}

// question: 4124105 name: Иммобилизация отломков лицевого скелета у больных с сочетанными кранио - ...
::Иммобилизация отломков лицевого скелета у больных с сочетанными кранио - ...::[html]Иммобилизация отломков лицевого скелета у больных с сочетанными кранио - фациальными повреждениями необходимо проводить\:{
	=Как можно раньше после травмы
	~Не ранее, чем через 3-4 дня после травмы
	~Не ранее, чем через 7 дней после травмы
	~Не ранее, чем через 14 дней после травмы
}

// question: 4124022 name: К временным способам иммобилизации при переломах верхней челюсти относятся:
::К временным способам иммобилизации при переломах верхней челюсти относятся\:::[html]К временным способам иммобилизации при переломах верхней челюсти относятся\:{
	~Бинтовая подбородочно-теменная повязка
	~Эластичная подбородочная праща (повязка) Померанцевой-Урбанской
	~Все ответы неверны
	=Все ответы верны
}

// question: 4124053 name: К дополнительным методам исследования для диагностики переломов скуловой ...
::К дополнительным методам исследования для диагностики переломов скуловой ...::[html]К дополнительным методам исследования для диагностики переломов скуловой кости относится\:{
	=Компьютерная томография черепа
	~Биопсия
	~Магнитно-резонансная томография черепа
	~Радиоизотопное исследование
}

// question: 4123958 name: К известным видам асфиксий не относят:

::К известным видам асфиксий не относят\:::[html]К известным видам асфиксий не относят\:{
	=спастическую
	~клапанную
	~дислокационную
	~обтурационную
	~стенотическую
	~аспирационную
}

// question: 4124038 name: К осложнениям переломов скуловой кости, костей носа и скуловой дуги в позднем...
::К осложнениям переломов скуловой кости, костей носа и скуловой дуги в позднем...::[html]К осложнениям переломов скуловой кости, костей носа и скуловой дуги в позднем периоде относят\:{
	~Гипосаливацию
	~Парез ветвей лицевого нерва
	=Вторичные деформации лицевого скелета
	~Нарушение смыкания зубов
}

// question: 4124016 name: К хирургическим методам лечения переломов верхней челюсти относят:
::К хирургическим методам лечения переломов верхней челюсти относят\:::[html]К хирургическим методам лечения переломов верхней челюсти относят\:{
	~Металлостеосинтез с применением титановых мини-пластин
	~Фиксация верхней челюсти по В.И. Мелкому
	~Фиксация верхней челюсти по Фальтину-Адамсу
	=Все ответы верны
}

// question: 4124148 name: Какая из перечисленных локализаций линии перелома, наиболее часто приводит к ...
::Какая из перечисленных локализаций линии перелома, наиболее часто приводит к ...::[html]Какая из перечисленных локализаций линии перелома, наиболее часто приводит к развитию воспалительных осложнений{
	~Мыщелкового отростка нижней челюсти
	~Венечного отростка нижней челюсти
	~Ветви нижней челюсти
	=Тела нижней челюсти
}

// question: 4124101 name: Клинические формы черепно-мозговых травм:

::Клинические формы черепно-мозговых травм\:::[html]Клинические формы черепно-мозговых травм\:{
=Сотрясение головного мозга
~Ушиб (контузия) головного мозга
~Сдавление головного мозга
~Дислокация головного мозга
}

// question: 4124108 name: Коматозное состояние сознания больного характеризуется
::Коматозное состояние сознания больного характеризуется::[html]Коматозное состояние сознания больного характеризуется{
~Оцепенением, застыванием конечностей и туловища в любом положении, часто очень неудобном
=Бессознательным состоянием с утратой рефлексов
~Состоянием оглушения, рефлексы сохранены, на вопросы отвечает, дезориентацией в пространстве и времени
~Состоянием оглушения с короткими периодами "просветления", сохранением рефлексов и реакцией на болевые раздражители
~Нарушением ориентации в окружающей обстановке, больной на вопросы отвечает медленно, с опозданием
}

// question: 4124098 name: Комбинированная травма:
::Комбинированная травма\:::[html]Комбинированная травма\:{
~Одновременное повреждение двух и более анатомических областей одним или несколькими поражающими факторами
=Повреждение, которое возникает в результате воздействия разных травмирующих факторов
~Оба ответа верны
~Оба ответа неверны
}

// question: 4124117 name: Конградная амнезия это:
::Конградная амнезия это\:::[html]Конградная амнезия это\:{
~Пациент не может вспомнить события, происходившие с ним до момента травмы
~Пациент не может вспомнить события, происходившие с ним после момента травмы
=Пациент не может вспомнить сам момент травмы и соответствующий ему промежуток времени
~Пациент утрачивает ориентацию во времени и пространстве
}

// question: 4124054 name: Кровотечение при переломе скуло-носо-орбитального комплекса встречается при:
::Кровотечение при переломе скуло-носо-орбитального комплекса встречается при\:::[html]Кровотечение при переломе скуло-носо-орбитального комплекса встречается при\:{
	~Повышении внутричерепного давления в результате травмы
	=Повреждении стенок верхнечелюстного синуса с разрывом слизистой оболочки
	~Повреждении лицевой артерии
	~Все ответы верны
}

// question: 4124061 name: Латеральная стенка глазницы:
::Латеральная стенка глазницы\:::[html]Латеральная стенка глазницы\:{
	=Глазничная часть лобной кости и малое крыло клиновидной кости
	~Глазничная поверхность верхней челюсти, скуловая кость
	~Глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости, лобный отросток скуловой кости, скуловой отросток лобной кости
	~Глазничная пластинка решетчатой кости, лобный отросток верхней челюсти, слезная кость, тело клиновидной кости, лобная кость
}

// question: 4123920 name: Лечебные мероприятия при аспирационной асфиксии на поле боя:
::Лечебные мероприятия при аспирационной асфиксии на поле боя\:::[html]Лечебные мероприятия при аспирационной асфиксии на поле боя\:{
	~Трахеотомия
	~Введение воздуховода
	~Удаление инородного тела
	=Положить раненого на бок или живот
	~Восстановление анатомического положения органа
}

// question: 4123919 name: Лечебные мероприятия при дислокационной асфиксии на поле боя:
::Лечебные мероприятия при дислокационной асфиксии на поле боя\:::[html]Лечебные мероприятия при дислокационной асфиксии на поле боя\:{
	~Трахеотомия
	~Введение воздуховода
	~Удаление инородного тела
	=Вывести и закрепить язык булавкой
}

// question: 4123918 name: Лечебные мероприятия при дислокационной асфиксии:
::Лечебные мероприятия при дислокационной асфиксии\:::[html]Лечебные мероприятия при дислокационной асфиксии\:{
	~Трахеотомия
	~Введение воздуховода
	~Удаление инородного тела
	=Восстановление анатомического положения органа
}

// question: 4123917 name: Лечебные мероприятия при стенотической асфиксии:
::Лечебные мероприятия при стенотической асфиксии\:::[html]Лечебные мероприятия при стенотической асфиксии\:{
	=Трахеотомия
	~Введение воздуховода
	~Удаление инородного тела
	~Восстановление анатомического положения органа
}

// question: 4138041 name: Лечение переломов челюстей:
::Лечение переломов челюстей\:::[html]Лечение переломов челюстей\:{
	=Комплексное
	~Терапевтическое
	~Антибактериальное
	~Ортопедическое
}

// question: 4123947 name: Лечение при вывихе нижней челюсти заключается в:
::Лечение при вывихе нижней челюсти заключается в\:::[html]Лечение при вывихе нижней челюсти заключается в\:{
	=Введении суставной головки в суставную впадину
	~Резекции мыщелкового отростка нижней челюсти
	~Резекции суставного бугорка
	~Прошивании суставной капсулы
}

// question: 4138032 name: Линия перелома на рентгенологическом снимке визуализируется в течение:
::Линия перелома на рентгенологическом снимке визуализируется в течение\:::[html]Линия перелома на рентгенологическом снимке визуализируется в течение\:{
	~1 месяца
	~3 месяцев
	=6 месяцев

~12 месяцев
}

// question: 4124062 name: Медиальная стенка глазницы:
::Медиальная стенка глазницы\:::[html]Медиальная стенка глазницы\:{
~Глазничная часть лобной кости и малое крыло клиновидной кости
~Глазничная поверхность верхней челюсти, скуловая кость
~Глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости, лобный отросток скуловой кости, скуловой отросток лобной кости
=Глазничная пластинка решетчатой кости, лобный отросток верхней челюсти, слезная кость, тело клиновидной кости, лобная кость
}

// question: 4124139 name: Местным воспалительным осложнением при переломах челюстей является:
::Местным воспалительным осложнением при переломах челюстей является\:::[html]Местным воспалительным осложнением при переломах челюстей является\:{
=Остеомиелит
~Периостит
~Фурункулез
~Рожистое воспаление
}

// question: 4124106 name: Метод обследования, наиболее информативный у пациентов с сочетанными травмами...
::Метод обследования, наиболее информативный у пациентов с сочетанными травмами...::[html]Метод обследования, наиболее информативный у пациентов с сочетанными травмами лицевого скелета\:{
~Обзорная рентгенография черепа в прямой проекции
=Мультиспиральная компьютерная томография
~Обзорная рентгенография черепа в боковой проекции
~Магнитно-резонансная томография
}

// question: 4124076 name: Метод фиксации при переломах костей носа:
::Метод фиксации при переломах костей носа\:::[html]Метод фиксации при переломах костей носа\:{
~Остеосинтез
~Пращевидная повязка
~Тампонада носовых ходов
~Наружная повязка из гипса или коллодия
=Тампонада носовых ходов и наружная повязка из гипса или коллодия

}

// question: 4124120 name: Мидриаз – характерный признак поражения:
::Мидриаз – характерный признак поражения\:::[html]Мидриаз – характерный признак поражения\:{
	=Глазодвигательного нерва
	~Отводящего нерва
	~Блокового нерва
	~Глазного нерва?
}

// question: 4138049 name: Минипластины для остеосинтеза изготавливаются из:
::Минипластины для остеосинтеза изготавливаются из\:::[html]Минипластины для остеосинтеза изготавливаются из\:{
	~Стали
	=Титана
	~Аллюминия
	~Нержавеющей стали
}

// question: 4123988 name: Минипластины к отломкам челюстей фиксируют:
::Минипластины к отломкам челюстей фиксируют\:::[html]Минипластины к отломкам челюстей фиксируют\:{
	~Спицей
	=Винтами
	~Проволочной лигатурой
	~Брекетами
}

// question: 4123979 name: Мышца, опускающая нижнюю челюсть:
::Мышца, опускающая нижнюю челюсть\:::[html]Мышца, опускающая нижнюю челюсть\:{
	=Двубрюшная
	~Круговая рта
	~Щечная
	~Жевательная
}

// question: 4123980 name: Мышца, поднимающая нижнюю челюсть:
::Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:::[html]Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:{
	=Жевательная

~Двубрюшная
~Грудино-ключично-сосцевидная
~Подбородочно-подъязычная
}

// question: 4123981 name: Мышца, поднимающая нижнюю челюсть:
::Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:::[html]Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:{
=Височная
~Двубрюшная
~Грудино-ключично-сосцевидная
~Подбородочно-подъязычная
}

// question: 4123982 name: Мышца, поднимающая нижнюю челюсть:
::Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:::[html]Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:{
=Наружная крыловидная
~Двубрюшная
~Грудино-ключично-сосцевидная
~Подбородочно-подъязычная
}

// question: 4123983 name: Мышца, поднимающая нижнюю челюсть:
::Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:::[html]Мышца, поднимающая нижнюю челюсть\:{
=Внутренняя крыловидная
~Двубрюшная
~Грудино-ключично-сосцевидная
~Подбородочно-подъязычная
}

// question: 4138040 name: Надесневые шины:
::Надесневые шины\:::[html]Надесневые шины\:{
~Шина Вебера
~Шина Тигерштедта
=Шина Порта
~Шина Васильева
}

// question: 4123960 name: Наиболее информативным методом диагностики переломов челюстей является

::Наиболее информативным методом диагностики переломов челюстей является::[html]Наиболее информативным методом диагностики переломов челюстей является{
	~реография
	~электромиография
	~ортопантомография
	=компьютерная томография
}

// question: 4123996 name: Наибольшая вероятность повреждения основного ствола лицевого нерва возникает ...
::Наибольшая вероятность повреждения основного ствола лицевого нерва возникает ...::[html]Наибольшая вероятность повреждения основного ствола лицевого нерва возникает при использовании для остеосинтеза\:{
	~Внутриротового доступа
	~Поднижнечелюстного доступа
	=Предушного доступа
	~Позадичелюстного доступа
}

// question: 4124147 name: Наибольшая вероятность развития воспалительных осложнений отмечается при ...
::Наибольшая вероятность развития воспалительных осложнений отмечается при ...::[html]Наибольшая вероятность развития воспалительных осложнений отмечается при переломах{
	=Нижней челюсти
	~Верхней челюсти
	~Скуловой кости
	~Носовой кости
}

// question: 4123944 name: Наибольшей резистентностью к электротравме обладает:
::Наибольшей резистентностью к электротравме обладает\:::[html]Наибольшей резистентностью к электротравме обладает\:{
	=Кость
	~Кожа
	~Слизистая
	~Жир
}

// question: 4124112 name: Найдите ошибку: Компьютерная томография головного мозга применяется для ...

::Найдите ошибку\: Компьютерная томография головного мозга применяется для ...::[html]Найдите ошибку\: Компьютерная томография головного мозга применяется для диагностики{
=Сотрясения головного мозга;
~Ушиба головного мозга
~Эпидуральной гематома
~Субарахноидальной гематомы?
}

// question: 4124146 name: Найдите ошибку: Непосредственным осложнением двустороннего перелома нижней ...
::Найдите ошибку\: Непосредственным осложнением двустороннего перелома нижней ...::[html]Найдите ошибку\: Непосредственным осложнением двустороннего перелома нижней челюсти со смещением отломков при черепно-лицевой травме, является\:{
~Дислокационная асфиксия
~Кровотечение
=Нагноение костной раны
~Травматический шок
}

// question: 4124121 name: Найдите ошибку: Непосредственным осложнением сочетанной черепно-лицевой ...
::Найдите ошибку\: Непосредственным осложнением сочетанной черепно-лицевой ...::[html]Найдите ошибку\: Непосредственным осложнением сочетанной черепно-лицевой травмы является\:{
~Травматический шок
~Обтурационная асфиксия
=Аспирационная пневмония
~Стенотическая асфиксия?
}

// question: 4124122 name: Найдите ошибку: Отдаленным осложнением сочетанной черепно-лицевой травмы ...
::Найдите ошибку\: Отдаленным осложнением сочетанной черепно-лицевой травмы ...::[html]Найдите ошибку\: Отдаленным осложнением сочетанной черепно-лицевой травмы является\:{
~Травматический остеомиелит
~Нагноение мягких тканей
=Аспирационная асфиксия
~Нарушение прикуса
}

// question: 4123998 name: Найдите ошибку: При переломе нижней челюсти, показанием для проведения ...
::Найдите ошибку\: При переломе нижней челюсти, показанием для проведения ...::[html]Найдите ошибку\: При переломе нижней челюсти, показанием для проведения операции остеосинтеза является\:{
	=Наличие зуба в линии перелома
	~Выраженное смещение отломков
	~Интерпозиция мягких тканей между отломками
	~Полная вторичная адентия
}

// question: 4124013 name: Наличие ликвореи характерно для:
::Наличие ликвореи характерно для\:::[html]Наличие ликвореи характерно для\:{
	=Переломов верхней челюсти
	~Переломов нижней челюсти
	~Одностороннего перелома скуловой кости
	~Одностороннем переломе скуло-носо-орбитального комплекса
}

// question: 4124082 name: Наличие подкожной эмфиземы при переломе скуло-глазничного комплекса объясняется:
::Наличие подкожной эмфиземы при переломе скуло-глазничного комплекса объясняется\:::[html]Наличие подкожной эмфиземы при переломе скуло-глазничного комплекса объясняется\:{
	~Подвижностью отломков
	~Нарушением проходимости воздушных масс через носовые ходы
	~Нарушением целостности мягких тканей
	~Кровоизлиянием в мягких тканях лица
	=Нарушением целостности костных стенок гайморовой пазухи
}

// question: 4124012 name: Наличие симптома «лица панды» характерно для:
::Наличие симптома «лица панды» характерно для\:::[html]Наличие симптома «лица панды» характерно для\:{
	=Переломов верхней челюсти
	~Переломов нижней челюсти
	~Одностороннего перелома скуловой кости
	~Одностороннем переломе скуло-носо-орбитального комплекса
}

// question: 4124011 name: Наличие симптома «очков» характерно для:
::Наличие симптома «очков» характерно для\:::[html]Наличие симптома «очков» характерно для\:{

=Переломов верхней челюсти
~Переломов нижней челюсти
~Одностороннего перелома скуловой кости
~Одностороннем переломе скуло-носо-орбитального комплекса
}

// question: 4124136 name: Наличие функционирующего ликворного свища при сочетанной черепно-лицевой ...
::Наличие функционирующего ликворного свища при сочетанной черепно-лицевой ...::[html]Наличие функционирующего ликворного свища при сочетанной черепно-лицевой травме опасно развитием\:{
=Менингита
~Нарушения мозгового кровообращения
~Аспирационной асфиксии
~Дисбактериоза?
}

// question: 4124036 name: Нарушение функций черепно-мозговых нервов как правило происходит при:
::Нарушение функций черепно-мозговых нервов как правило происходит при\:::[html]Нарушение функций черепно-мозговых нервов как правило происходит при\:{
=суббазальном переломе верхней челюсти
~суборбитальном переломе верхней челюсти
~отрыве альвеолярного отростка
~переломе нижней челюсти
}

// question: 4123929 name: Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является:
::Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:::[html]Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:{
=Асфиксия
~Пародонтит
~Потеря сознания
~Неврит лицевого нерва
}

// question: 4123930 name: Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является:

::Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:::[html]Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:{
=Кровотечение
~Пародонтит
~Потеря сознания
~Неврит лицевого нерва
}

// question: 4123931 name: Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является:
::Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:::[html]Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:{
=Шок
~Пародонтит
~Потеря сознания
~Неврит лицевого нерва
}

// question: 4124063 name: Нижняя стенка глазницы:
::Нижняя стенка глазницы\:::[html]Нижняя стенка глазницы\:{
=Глазничная поверхность верхней челюсти, скуловая кость
~Глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости, лобный отросток скуловой кости, скуловой отросток лобной кости
~Глазничная часть лобной кости и малое крыло клиновидной кости
~Глазничная пластинка решетчатой кости, лобный отросток верхней челюсти, слезная кость, тело клиновидной кости, лобная кость
}

// question: 4124025 name: О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода ...
::О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода ...::[html]О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода свидетельствует\:{
=Положительная проба “двойного пятна”
~Отрицательная реакция Вассермана
~Положительная реакция Вассермана
~Повышение СОЭ в общем анализе крови
}

// question: 4124014 name: Обязательный симптом перелома основания черепа:

::Обязательный симптом перелома основания черепа\:::[html]Обязательный симптом перелома основания черепа\:{
	~Кровотечение из носа
	=Ликворея
	~Диплопия
	~Кровотечение из наружного слухового прохода
}

// question: 4123966 name: Одновременное повреждение нескольких костей лица называется:
::Одновременное повреждение нескольких костей лица называется\:::[html]Одновременное повреждение нескольких костей лица называется\:{
	=Множественным;
	~Комбинированным;
	~Сочетанным
}

// question: 4123965 name: Одновременные повреждения ЧЛО и других областей тела называются:
::Одновременные повреждения ЧЛО и других областей тела называются\:::[html]Одновременные повреждения ЧЛО и других областей тела называются\:{
	~Множественными;
	~Комбинированными;
	=Сочетанными
}

// question: 4124090 name: Оперативное вмешательство при переломе скуловой кости со смещением ее в ...
::Оперативное вмешательство при переломе скуловой кости со смещением ее в ...::[html]Оперативное вмешательство при переломе скуловой кости со смещением ее в верхнечелюстную пазуху{
	~радикальная гайморотомия
	~остеотомия верхней челюсти
	~гайморотомия с репозицией отломков
	=радикальная гайморотомия с репозицией отломков
}

// question: 4124008 name: Оперативный доступ при хирургическом лечении перелома верхней челюсти по типу...

::Оперативный доступ при хирургическом лечении перелома верхней челюсти по типу...::[html]Оперативный доступ при хирургическом лечении перелома верхней челюсти по типу Ле Фор I\:{
	=Внутриротовой
	~Комбинированный
	~Наружный
	~Все ответы верны
}

// question: 4124027 name: Определить тип перелома по Ле-Фор, если плоскость перелома проходит через ...
::Определить тип перелома по Ле-Фор, если плоскость перелома проходит через ...::[html]Определить тип перелома по Ле-Фор, если плоскость перелома проходит через носовые, слезные кости, дно глазницы, скуло-челюстной шов\:{
	~Нижний (I)
	=Средний (II)
	~Верхний (III)
	~Другой
}

// question: 4123992 name: Оптимальным оперативным доступом при высоком переломе мыщелкового отростка ...
::Оптимальным оперативным доступом при высоком переломе мыщелкового отростка ...::[html]Оптимальным оперативным доступом при высоком переломе мыщелкового отростка нижней челюсти является (из перечисленных)\:{
	~Внутриротовой
	~Поднижнечелюстной
	=Транстрагальный
	~Гемикоронарный
}

// question: 4124040 name: Основной жалобой при переломе скуло-носо-орбитального комплекса является:
::Основной жалобой при переломе скуло-носо-орбитального комплекса является\:::[html]Основной жалобой при переломе скуло-носо-орбитального комплекса является\:{
	~Нарушение смыкания зубов
	~Двоение в глазах при взгляде в сторону
	=Кровотечение из носового хода на стороне поражения
	~Возникновение периодических приступов тошноты и головокружения
}

// question: 4123940 name: Основной причиной вывиха нижней челюсти является:

::Основной причиной вывиха нижней челюсти является\:::[html]Основной причиной вывиха нижней челюсти является\:{
=Слабость суставной капсулы
~Артрит ВНЧС
~Нижняя макрогнатия
~Глубокое резцовое перекрытие
}

// question: 4123941 name: Основной причиной вывиха нижней челюсти является:
::Основной причиной вывиха нижней челюсти является\:::[html]Основной причиной вывиха нижней челюсти является\:{
=Снижение высоты суставного бугорка
~Артрит ВНЧС
~Нижняя макрогнатия
~Глубокое резцовое перекрытие
}

// question: 4124073 name: Основной симптом перелома костей носа:
::Основной симптом перелома костей носа\:::[html]Основной симптом перелома костей носа\:{
~Гематома
~Подкожная эмфизема
~Затруднение носового дыхания
=Патологическая подвижность костей носа
}

// question: 4124044 name: Основной симптом при изолированном переломе скуловой дуги со смещением:
::Основной симптом при изолированном переломе скуловой дуги со смещением\:::[html]Основной симптом при изолированном переломе скуловой дуги со смещением\:{
=Западение в области скуловой дуги (симптом «ступеньки»)
~Ограничение боковых движений нижней челюсти
~Нарушение кожной чувствительности в подглазничной области
~Деформация носа
}

// question: 4124057 name: Основные симптомы перелома скуловой кости со смещением:
::Основные симптомы перелома скуловой кости со смещением\:::[html]Основные симптомы перелома скуловой кости со смещением\:{
=Симптом «ступеньки», ограничение открывания рта
~Деформация носа, затруднение дыхания

~Парез ветвей лицевого нерва
~Кровотечение из носа, головокружение
}

// question: 4124060 name: Основные симптомы перелома скуловой кости:
::Основные симптомы перелома скуловой кости\:::[html]Основные симптомы перелома скуловой кости\:{
=Симптом «ступеньки», диплопия
~Кровотечение из носа, головокружение
~Симптом Венсана
~Нарушение прикуса
}

// question: 4123972 name: Основным симптомом перелома нижней челюсти является
::Основным симптомом перелома нижней челюсти является::[html]Основным симптомом перелома нижней челюсти является{
=Патологическая подвижность костных фрагментов
~Повреждение слизистой оболочки рта
~Обильное кровотечение из крупных сосудов
~Боль при наклоне головы в сторону поражения
}

// question: 4123977 name: Основным симптомом перелома нижней челюсти является:
::Основным симптомом перелома нижней челюсти является\: ::[html]Основным симптомом перелома нижней челюсти является\: {
=Подвижность фрагментов
~Носовое кровотечение
~Головная боль
~Эксфолиативный хейлит
}

// question: 4123971 name: Основными жалобами при переломе нижней челюсти являются:
::Основными жалобами при переломе нижней челюсти являются\:::[html]Основными жалобами при переломе нижней челюсти являются\:{
=Нарушение прикуса, боль
~Сухость во рту, кровоподтеки
~Резкая светобоязнь, снижение слуха
~Головокружение, тошнота
}

// question: 4123961 name: Особенности огнестрельных ранений лица:
::Особенности огнестрельных ранений лица\:::[html]Особенности огнестрельных ранений лица\:{
	~лечение всегда протекает с осложнениями;
	~всегда тяжелые;
	=несоответствие между видом и тяжестью ранения;
	~требуется всегда иммобилизации;
	~всегда загрязненные
}

// question: 4123989 name: Остеосинтез по Макиенко проводится:
::Остеосинтез по Макиенко проводится\:::[html]Остеосинтез по Макиенко проводится\:{
	=Спицей Киршнера
	~Минипластинами
	~Стальной проволокой
	~Бронзово-алюминиевой лигатурой
}

// question: 4124132 name: Осуществление иммобилизации фрагментов костей лицевого скелета при переломах,...
::Осуществление иммобилизации фрагментов костей лицевого скелета при переломах,...::[html]Осуществление иммобилизации фрагментов костей лицевого скелета при переломах, у пациентов с сочетанной черепно-лицевой травмой показано проводить\:{
	~независимо от общего состояния больного
	=при стабилизации среднединамического артериального давления на уровне 90-95 мм рт ст
	~при стабилизации среднединамического артериального давления на уровне 100-110 мм рт ст
	~после купирования неврологической симптоматики?
}

// question: 4123956 name: Открытый прикус, невозможность закрыть рот и смещение подбородка кпереди ...
::Открытый прикус, невозможность закрыть рот и смещение подбородка кпереди ...::[html]Открытый прикус, невозможность закрыть рот и смещение подбородка кпереди могут быть при\:{
	~двустороннем переломе нижнее челюсти в области мыщелковых отростков
	=двустороннем переднем вывихе нижней челюсти
	~контрактуре нижней челюсти
}

// question: 4123959 name: Открытым переломом челюстных костей называется перелом, при котором:
::Открытым переломом челюстных костей называется перелом, при котором\:::[html]Открытым переломом челюстных костей называется перелом, при котором\:{
	=линия перелома проходит через зубной ряд, придаточные пазухи носа, глазницу
	~именяется прикус по типу “открытого прикуса”
}

// question: 4124111 name: Отсроченное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме...
::Отсроченное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме...::[html]Отсроченное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме заключается\:{
	~В остановке кровотечения, улучшении функции внешнего дыхания
	=В лечении осложнений воспалительного характера, окончательной иммобилизации переломов костей лица
	~В первичной хирургической обработке раны, временной или окончательной иммобилизации переломов костей лица
	~Все ответы верны
}

// question: 4123962 name: Паралич мимической мускулатуры половины лица возникает при повреждении:
::Паралич мимической мускулатуры половины лица возникает при повреждении\:::[html]Паралич мимической мускулатуры половины лица возникает при повреждении\:{
	~языкоглоточного;
	~щечного;
	=ствола лицевого нерва;
	~II ветви тройничного нерва;
	~III ветви тройничного нерва.
}

// question: 4123952 name: Пациент А., 43 лет подвергся нападению бродячей собаки. На правой щеке ...
::Пациент А., 43 лет подвергся нападению бродячей собаки. На правой щеке ...::[html]Пациент А., 43 лет подвергся нападению бродячей собаки. На правой щеке имеется рана с неровными краями, длиной 5 см. Края раны зияют. Общее состояние больного удовлетворительное, гемодинамические параметры стабильные. На какой срок после травмы следует провести ушивание раны\:{
	~Незамедлительно;
	~Не ранее суток;

=Не ранее 3 суток;
~Не ранее 7 суток?
}

// question: 4123995 name: Первым отечественным автором, описавшим методы фиксации при переломах костей ...
::Первым отечественным автором, описавшим методы фиксации при переломах костей ...::[html]Первым отечественным автором, описавшим методы фиксации при переломах костей лицевого скелета, является\:{
~Н.И. Пирогов
~Ю.К. Шимановский
=Е.О. Мухин
~Р.Р. Вреден
}

// question: 4124017 name: Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор I:
::Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор I\:::[html]Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор I\:{
=Линия перелома проходит над альвеолярным отростком и над твердым небом (почти параллельно им), через нижний край грушевидного отверстия и концы крыловидных отростков клиновидной кости, по дну верхнечелюстных пазух.
~Линия перелома проходит через корень носа (место соединения лобных отростков верхней челюсти и носового отростка лобной кости), далее идет по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, проходит через нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты к месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью. Сзади линия перелома идет через крыловидные отростки клиновидной кости.
~Линия перелома проходит в области корня носа (место соединения лобных отростков верхнечелюстных костей с носовым отростком лобной кости, по медиальной стенке глазницы до нижнеглазничной щели, через крыловидные отростки клиновидной кости, затем направляется вперед по нижней стенке орбиты, через лобно - скуловой шов (место соединения лобного отростка со скуловым отростком лобной кости и большим крылом клиновидной кости) и скуловую дугу, которая образуется скуловым отростком височной кости и височным отростком скуловой кости.
~Верного ответа нет.
}

// question: 4124018 name: Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор II:
::Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор II\:::[html]Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор II\:{
~Линия перелома проходит над альвеолярным отростком и над твердым небом (почти параллельно им), через нижний край грушевидного отверстия и концы крыловидных отростков клиновидной кости, по дну верхнечелюстных пазух.

=Линия перелома проходит через корень носа (место соединения лобных отростков верхней челюсти и носового отростка лобной кости), далее идет по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, проходит через нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты к месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью. Сзади линия перелома идет через крыловидные отростки клиновидной кости.

~Линия перелома проходит в области корня носа (место соединения лобных отростков верхнечелюстных костей с носовым отростком лобной кости, по медиальной стенке глазницы до нижнеглазничной щели, через крыловидные отростки клиновидной кости, затем направляется вперед по нижней стенке орбиты, через лобно - скуловой шов (место соединения лобного отростка со скуловым отростком лобной кости и большим крылом клиновидной кости) и скуловую дугу, которая образуется скуловым отростком височной кости и височным отростком скуловой кости.

~Верного ответа нет.

}

// question: 4124019 name: Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор III:
::Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор III\:::[html]Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор III\:{

~Линия перелома проходит над альвеолярным отростком и над твердым небом (почти параллельно им), через нижний край грушевидного отверстия и концы крыловидных отростков клиновидной кости, по дну верхнечелюстных пазух.

~Линия перелома проходит через корень носа (место соединения лобных отростков верхней челюсти и носового отростка лобной кости), далее идет по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, проходит через нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты к месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью. Сзади линия перелома идет через крыловидные отростки клиновидной кости.

=Линия перелома проходит в области корня носа (место соединения лобных отростков верхнечелюстных костей с носовым отростком лобной кости, по медиальной стенке глазницы до нижнеглазничной щели, через крыловидные отростки клиновидной кости, затем направляется вперед по нижней стенке орбиты, через лобно - скуловой шов (место соединения лобного отростка со скуловым отростком лобной кости и большим крылом клиновидной кости) и скуловую дугу, которая образуется скуловым отростком височной кости и височным отростком скуловой кости.

~Верного ответа нет.

}

// question: 4138048 name: Перелом костей основания черепа происходит при:
::Перелом костей основания черепа происходит при\:::[html]Перелом костей основания черепа происходит при\:{

~Переломе по Герену

~Переломе по Ле-Фору 2

=Переломе по Ле-Фору 3

~Переломе альвеолярного отростка верхней челюсти

}

// question: 4124010 name: Перелом костей основания черепа происходит при:
::Перелом костей основания черепа происходит при\:::[html]Перелом костей основания черепа происходит при\:{
	~Переломе верхней челюсти по типу Ле Фор I
	~Суборбитальном переломе верхней челюсти
	=Суббазальном переломе верхней челюсти
	~Переломе верхней челюсти по типу Ле Фор II
}

// question: 4124031 name: Перелом костей основания черепа, как правило, происходит при:
::Перелом костей основания черепа, как правило, происходит при\:::[html]Перелом костей основания черепа, как правило, происходит при\:{
	~Отрыве альвеолярного отростка
	=Суббазальном переломе верхней челюсти
	~Суборбитальном переломе верхней челюсти
	~Переломе мыщелкового отростка
}

// question: 4124051 name: Перелом скуловой кости характеризуется парестезией крыла носа и верхней губы ...
::Перелом скуловой кости характеризуется парестезией крыла носа и верхней губы ...::[html]Перелом скуловой кости характеризуется парестезией крыла носа и верхней губы при повреждении\:{
	~Лицевого нерва
	~III ветви тройничного нерва
	=II ветви тройничного нерва
	~I ветви тройничного нерва
}

// question: 4124024 name: Переломы верхней челюсти возникают при действии силы:
::Переломы верхней челюсти возникают при действии силы\:::[html]Переломы верхней челюсти возникают при действии силы\:{
	=Перпендикулярно контрфорсам
	~Параллельно контрфорсам
	~В косом направлении относительно контрфорсов
	~Все ответы верны
}

// question: 4123968 name: Переломы челюсти в пределах зубного ряда являются:

::Переломы челюсти в пределах зубного ряда являются\:::[html]Переломы челюсти в пределах зубного ряда являются\:{
	~закрытыми
	~локальными
	=открытыми
}

// question: 4123985 name: Переломы челюсти в пределах зубного ряда являются:
::Переломы челюсти в пределах зубного ряда являются\:::[html]Переломы челюсти в пределах зубного ряда являются\:{
	~закрытыми
	~локальными
	=открытыми
}

// question: 4123987 name: Пластины для металлостеосинтеза нижней челюсти изготавливают из:
::Пластины для металлостеосинтеза нижней челюсти изготавливают из\:::[html]Пластины для металлостеосинтеза нижней челюсти изготавливают из\:{
	=Титана
	~Алюминия
	~Ванадия
	~Вибраниума
}

// question: 4124002 name: По классификации Ле Фор выделяют:
::По классификации Ле Фор выделяют\:::[html]По классификации Ле Фор выделяют\:{
	~2 типа переломов
	=3 типа переломов
	~4 типа переломов
	~Классификации не существует
}

// question: 4124137 name: По мере уменьшения чувствительности к кислородной недостаточности органы ...
::По мере уменьшения чувствительности к кислородной недостаточности органы ...::[html]По мере уменьшения чувствительности к кислородной недостаточности органы можно расположить в следующем порядке\:{
	=Кора, мозжечок, продолговатый мозг, спинной мозг
	~Кора, продолговатый мозг, мозжечок, спинной мозг
	~Мозжечок, кора, продолговатый мозг, спинной мозг
	~Кора, мозжечок, продолговатый мозг, спинной мозг
}

// question: 4123955 name: По месту приложения силы к нижнечелюстной кости перелом называется:
::По месту приложения силы к нижнечелюстной кости перелом называется\:::[html]По месту приложения силы к нижнечелюстной кости перелом называется\:{
	~дистанционным
	=прямым
	~отраженным
}

// question: 4138044 name: По способу фиксации внутри ротовые аппараты для лечения переломов бывают:
::По способу фиксации внутри ротовые аппараты для лечения переломов бывают\:::[html]По способу фиксации внутри ротовые аппараты для лечения переломов бывают\:{
	=Назубные, зубодесневые, надесневые
	~Назубные, надесневые
	~Зубодесневые, надесневые
	~Дуговые, надесневые
}

// question: 4123967 name: Повреждение возникающие в результате воздействия различных повреждающих ...
::Повреждение возникающие в результате воздействия различных повреждающих ...::[html]Повреждение возникающие в результате воздействия различных повреждающих факторов, называются\:{
	~Множественными
	=Комбинированными Сочетанными
}

// question: 4124030 name: Под действием тяги мышц смещение верхней челюсти при суборбитальном переломе ...
::Под действием тяги мышц смещение верхней челюсти при суборбитальном переломе ...::[html]Под действием тяги мышц смещение верхней челюсти при суборбитальном переломе происходит\:{
	=Книзу и кзади
	~Кверху и вперед
	~Медиально и вперед
	~Латерально и кверху
}

// question: 4124138 name: Позднее осложнение воспалительного характера при переломах челюстей:
::Позднее осложнение воспалительного характера при переломах челюстей\:::[html]Позднее осложнение воспалительного характера при переломах челюстей\:{
	=Остеомиелит
	~Периостит
	~Актиномикоз
	~Рожистое воспаление
}

// question: 4124140 name: Позднее осложнение перелома скуловой кости:
::Позднее осложнение перелома скуловой кости\:::[html]Позднее осложнение перелома скуловой кости\:{
	=Деформация лица
	~Гипосаливация
	~Телеангиоэктазии
	~Парез лицевого нерва
}

// question: 4124089 name: Позднее осложнение переломов скуловой кости, костей носа и скуловой дуги
::Позднее осложнение переломов скуловой кости, костей носа и скуловой дуги::[html]Позднее осложнение переломов скуловой кости, костей носа и скуловой дуги{
	~птоз
	~гипосаливация
	~телеангиоэктазии
	~парез ветвей лицевого нерва
	=вторичные деформации лицевого скелета
}

// question: 4124048 name: Поздние осложнения после перелома скуло-носо-орбитального комплекса:
::Поздние осложнения после перелома скуло-носо-орбитального комплекса\:::[html]Поздние осложнения после перелома скуло-носо-орбитального комплекса\:{
	~Нарушение прикуса
	=Вторичная деформация лицевого скелета
	~Гипосаливация
	~Парез ветвей лицевого нерва
}

// question: 4124141 name: Поздним осложнением ранения области лица является:
::Поздним осложнением ранения области лица является\:::[html]Поздним осложнением ранения области лица является\:{
	=Остеомиелит
	~Потеря сознания
	~Клапанная асфиксия
	~Шок
}

// question: 4124142 name: Поздним осложнением ранения области лица является:
::Поздним осложнением ранения области лица является\:::[html]Поздним осложнением ранения области лица является\:{
	=Диплопия
	~Потеря сознания
	~Клапанная асфиксия
	~Шок
}

// question: 4124143 name: Поздним осложнением ранения области лица является:
::Поздним осложнением ранения области лица является\:::[html]Поздним осложнением ранения области лица является\:{
	=Анкилоз
	~Потеря сознания
	~Клапанная асфиксия
	~Шок
}

// question: 4124144 name: Поздним осложнением ранения области лица является:
::Поздним осложнением ранения области лица является\:::[html]Поздним осложнением ранения области лица является\:{
	=Ложный сустав
	~Потеря сознания
	~Клапанная асфиксия
	~Шок
}

// question: 4124145 name: Поздним осложнением ранения области лица является:
::Поздним осложнением ранения области лица является\:::[html]Поздним осложнением ранения области лица является\:{
	=Рубцовая контрактура
	~Потеря сознания
	~Клапанная асфиксия
	~Шок

}

// question: 4123932 name: Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является:
::Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:::[html]Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:{
	~Кровотечение
	~Асфиксия
	=Травматический остеомиелит
	~Шок
}

// question: 4123933 name: Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является:
::Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:::[html]Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:{
	~Кровотечение
	~Асфиксия
	=Травматический гайморит
	~Шок
}

// question: 4123934 name: Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является:
::Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:::[html]Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является\:{
	~Кровотечение
	~Асфиксия
	=Диплопия
	~Шок
}

// question: 4124058 name: Показание для эндопротезирования нижней стенки глазницы:
::Показание для эндопротезирования нижней стенки глазницы\:::[html]Показание для эндопротезирования нижней стенки глазницы\:{
	~Снижение остроты зрения на стороне поражения
	=Ограничение подвижности глазного яблока
	~Кровоизлияние в области верхнего и нижнего век
	~Смещение скуловой кости в областьт скуло-лобного шва

}

// question: 4123950 name: После вправления вывиха нижней челюсти рекомендовано:
::После вправления вывиха нижней челюсти рекомендовано\:::[html]После вправления вывиха нижней челюсти рекомендовано\:{
	=Наложение пращевидной повязки
	~Введение в жевательные мышцы 70° спирта
	~Межчелюстное шинирование с прокладкой на моляры
	~Введение 10% настойки йода периартикулярно
}

// question: 4124091 name: После репозиции фиксация скуловой кости при ее переломе со смещением в ...
::После репозиции фиксация скуловой кости при ее переломе со смещением в ...::[html]После репозиции фиксация скуловой кости при ее переломе со смещением в верхнечелюстную пазуху осуществляется{
	~наружными швами
	~коллодийной повязкой
	~пластмассовым вкладышем
	=тампоном, пропитанным йодоформом
}

// question: 4124092 name: После фиксации скуловой кости йодоформным тампоном конец его выводится через ...
::После фиксации скуловой кости йодоформным тампоном конец его выводится через ...::[html]После фиксации скуловой кости йодоформным тампоном конец его выводится через отверстие{
	~в скуловой области
	~по переходной складке
	~в области бугра верхней челюсти
	=в области нижнего носового хода
}

// question: 4123926 name: Постоянная остановка кровотечения у раненых челюстно-лицевую область ...
::Постоянная остановка кровотечения у раненых челюстно-лицевую область ...::[html]Постоянная остановка кровотечения у раненых челюстно-лицевую область заключается\:{
	~В тугой тампонаде
	=В прошивании сосуда в ране
	~В пальцевом прижатии сосуда
	~В перевязке сосуда на протяжении
}

// question: 4123953 name: При временной остановке кровотечения из раны мягких тканей щеки не следует:
::При временной остановке кровотечения из раны мягких тканей щеки не следует\:::[html]При временной остановке кровотечения из раны мягких тканей щеки не следует\:{
	~тампонада раны;
	~прижатие лицевой артерии у края нижней челюсти;
	~наложение тугой повязки на рану лица;
	~перевязка наружной сонной артерии;
	=пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку YI шейного позвонка;
	~правильное наложение резинового жгута на шею
}

// question: 4123997 name: При выполнении операции остеосинтеза в области основания и шейки мыщелкового ...
::При выполнении операции остеосинтеза в области основания и шейки мыщелкового ...::[html]При выполнении операции остеосинтеза в области основания и шейки мыщелкового отростка имеется высокая вероятность повреждения\:{
	=Верхнечелюстной артерии
	~Нижнечелюстной артерии
	~Лицевой артерии
	~Поперечной артерии лица
}

// question: 4123969 name: При двустороннем ментальном переломе нижней челюсти угроза для жизни ...
::При двустороннем ментальном переломе нижней челюсти угроза для жизни ...::[html]При двустороннем ментальном переломе нижней челюсти угроза для жизни возникает при нарушении\:{
	~жевания
	~глотания
	=дыхания
	~речи
}

// question: 4123986 name: При двустороннем ментальном переломе нижней челюсти угроза для жизни ...
::При двустороннем ментальном переломе нижней челюсти угроза для жизни ...::[html]При двустороннем ментальном переломе нижней челюсти угроза для жизни возникает при нарушении\:{
	~жевания

~глотания
=дыхания
~речи
}

// question: 4138030 name: При двустороннем переломе мыщелкового отростка характерным симптомом является:
::При двустороннем переломе мыщелкового отростка характерным симптомом является\:::[html]При двустороннем переломе мыщелкового отростка характерным симптомом является\:{
=Открытый прикус
~Кровотечение из носа
~Разрыв слизистой оболочки альвеолярного отростка
~Передний вывих нижней челюсти
}

// question: 4123984 name: При двустороннем переломе нижней челюсти в области клыков происходит смещение...
::При двустороннем переломе нижней челюсти в области клыков происходит смещение...::[html]При двустороннем переломе нижней челюсти в области клыков происходит смещение фрагмента\:{
=Книзу
~Кверху
~Медиально
~Латерально
}

// question: 4123928 name: При клапанной асфиксии необходимо сделать
::При клапанной асфиксии необходимо сделать::[html]При клапанной асфиксии необходимо сделать{
~Интубацию
~Трахеотомию
~Ввести воздуховод
=Отсечение "клапана" или устранение его фиксацией поврежденных тканей +
}

// question: 4123999 name: При косом переломе нижней челюсти, оптимальным фиксатором является (из ...
::При косом переломе нижней челюсти, оптимальным фиксатором является (из ...::[html]При косом переломе нижней челюсти, оптимальным фиксатором является (из перечиленных){
~Скобы с памятью формы
~Динамическая компрессионная пластина

~Эксцентрическая компрессионная пластина
=Мини-пластины
}

// question: 4124125 name: При надавливании на болевую точку у верхнего края глазницы в стадии комы I ...
::При надавливании на болевую точку у верхнего края глазницы в стадии комы I ...::[html]При надавливании на болевую точку у верхнего края глазницы в стадии комы I наблюдается\:{
=Сгибание верхних конечностей и разгибание нижних
~Разгибание верхних и нижних конечностей
~Сгибание верхних и нижних конечностей
~Разгибание верхних конечностей и сгибание нижних?
}

// question: 4124126 name: При надавливании на болевую точку у верхнего края глазницы в стадии комы II ...
::При надавливании на болевую точку у верхнего края глазницы в стадии комы II ...::[html]При надавливании на болевую точку у верхнего края глазницы в стадии комы II наблюдается\:{
~Сгибание верхних конечностей и разгибание нижних
=Разгибание верхних и нижних конечностей
~Сгибание верхних и нижних конечностей
~Разгибание верхних конечностей и сгибание нижних?
}

// question: 4123927 name: При невозможности остановки кровотечения из корня языка или боковой стенки ...
::При невозможности остановки кровотечения из корня языка или боковой стенки ...::[html]При невозможности остановки кровотечения из корня языка или боковой стенки глотки необходимо сделать\:{
~Тугую тампонаду
~Пальцевое прижатие сосуда
~Положить гемостатическую трубку
=Экстренную трахеотомию и тугую тампонаду
}

// question: 4123937 name: При ожоге второй степени поражается:
::При ожоге второй степени поражается\:::[html]При ожоге второй степени поражается\:{
~Поверхностный эпидермис
~Кожа и подлежащие ткани
~Поверхностный эпидермис и капилляры

~Все слои эпидермиса
}

// question: 4123936 name: При ожоге первой степени поражается:
::При ожоге первой степени поражается\:::[html]При ожоге первой степени поражается\:{
=Поверхностный эпидермис
~Кожа и подлежащие ткани
~Поверхностный эпидермис и капилляры
~Все слои эпидермиса
}

// question: 4123938 name: При ожоге четвертой степени поражается:
::При ожоге четвертой степени поражается\:::[html]При ожоге четвертой степени поражается\:{
~Поверхностный эпидермис
=Кожа и подлежащие ткани
~Поверхностный эпидермис и капилляры
~Все слои эпидермиса
}

// question: 4138035 name: При падении на подбородок отраженный перелом нижней челюсти следует ожидать в...
::При падении на подбородок отраженный перелом нижней челюсти следует ожидать в...::[html]При падении на подбородок отраженный перелом нижней челюсти следует ожидать в области\:{
~Углов нижней челюсти
~Ветвей нижней челюсти
=Мыщелковых отростков
~Альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 4124020 name: При переломах верхней челюсти могут встречаться симптомы:
::При переломах верхней челюсти могут встречаться симптомы\:::[html]При переломах верхней челюсти могут встречаться симптомы\:{
=Малевича
~Герена
~Венсана
~Все ответы верны
}

// question: 4123964 name: При переломах костей лица наиболее часто повреждается:
::При переломах костей лица наиболее часто повреждается\:::[html]При переломах костей лица наиболее часто повреждается\:{
	~верхняя челюсть;
	=нижняя челюсть;
	~скуловая кость.
}

// question: 4124068 name: При переломе костей носа со смещением проводят:
::При переломе костей носа со смещением проводят\:::[html]При переломе костей носа со смещением проводят\:{
	~Фиксацию пращевидной повязкой
	~Остеосинтез
	=Пальце-инструментальную репозицию
	~Пальцевую репозицию
}

// question: 4124039 name: При переломе скуло-носо-орбитального комплекса причиной возникновения ...
::При переломе скуло-носо-орбитального комплекса причиной возникновения ...::[html]При переломе скуло-носо-орбитального комплекса причиной возникновения диплопии является\:{
	~Эмфизема в параорбитальной клетчатке
	=Изменение положения глазного яблока
	~Механическое повреждение глазного яблока
	~Травмирование зрительного нерва
}

// question: 4124046 name: При переломе скуловой кости для устранения смещения и репозиции отломков ...
::При переломе скуловой кости для устранения смещения и репозиции отломков ...::[html]При переломе скуловой кости для устранения смещения и репозиции отломков используют\:{
	~Крючок Обвегезера
	=Крючок Лимберга
	~Зажим Кохера
	~Элеватор Волкова
}

// question: 4138029 name: При переломе скуловой кости со смещением ее в верхнечелюстную пазуху ...

::При переломе скуловой кости со смещением ее в верхнечелюстную пазуху ...::[html]При переломе скуловой кости со смещением ее в верхнечелюстную пазуху оперативное вмешательство состоит в проведении\:{
~Радикальной операции гайморотомии
~Остеотомии верхней челюсти
~Спиц Киршнера через скуловую кость по методу Макиенко
=Радикальной операции гайморотомии с репозицией отломков
}

// question: 4124069 name: При переломе скуловой кости со смещением ее в верхнечелюстную пазуху проводят:
::При переломе скуловой кости со смещением ее в верхнечелюстную пазуху проводят\:::[html]При переломе скуловой кости со смещением ее в верхнечелюстную пазуху проводят\:{
~Радикальную верхнечелюстную синусотомию
~Остеотомию верхней челюсти
~Верхнечелюстную синусотомию с репозицией отломков
=Радикальную верхнечелюстную синусотомию с репозицией и фиксацией отломков
}

// question: 4123911 name: При повреждениях мягких тканей скуловой области временный гемостаз ...
::При повреждениях мягких тканей скуловой области временный гемостаз ...::[html]При повреждениях мягких тканей скуловой области временный гемостаз осуществляется\:{
~Эмболизацией сосуда
~Лигированием сосуда в ране
~Наложением сосудистого шва
=Давящей повязкой, пальцевым прижатием
}

// question: 4123957 name: При признаках травматического шока на месте происшествия прежде всего следует:
::При признаках травматического шока на месте происшествия прежде всего следует\:::[html]При признаках травматического шока на месте происшествия прежде всего следует\:{
~напоить больного;
~согреть грелками;
~обеспечить покой;
=внутримышечно ввести наркотический аналгетик
~провести временную иммобилизацию нижней челюсти
}

// question: 4123946 name: При проведении первичной хирургической обработки ран лица обязательным ...
::При проведении первичной хирургической обработки ран лица обязательным ...::[html]При проведении первичной хирургической обработки ран лица обязательным является введеение\:{
	=Противостолбнячной сыворотки
	~Антирабической сыворотки
	~Стафилококкового анатоксина
	~Гамма-глобулина
}

// question: 4138036 name: При ударе в область тела нижней челюсти слева отраженный перелом локализуется...
::При ударе в область тела нижней челюсти слева отраженный перелом локализуется...::[html]При ударе в область тела нижней челюсти слева отраженный перелом локализуется в области\:{
	=Правого мыщелкового отростка
	~Левого мыщелкового отростка
	~Подбородка
	~Угла нижней челюсти слева
}

// question: 4123994 name: При фиксации линейного перелома, расположенного во фронтальном отделе нижней ...
::При фиксации линейного перелома, расположенного во фронтальном отделе нижней ...::[html]При фиксации линейного перелома, расположенного во фронтальном отделе нижней челюсти, согласно методу Champy оптимальным является использование\:{
	~одной мини-пластины
	=двух мини-пластин
	~трех мини-пластин
	~четырех мини-пластин?
}

// question: 4124000 name: При фиксации реконструктивной пластины, в случае образования костного дефекта...
::При фиксации реконструктивной пластины, в случае образования костного дефекта...::[html]При фиксации реконструктивной пластины, в случае образования костного дефекта нижней челюсти, фиксирующие винты должны располагаться\:{
	~В пределах наружного кортикального слоя
	~В пределах наружного кортикального слоя и губчатого вещества
	~В пределах обеих кортикальных пластинок
	=Проходить через все слои кости и выходить за пределы внутренней кортикальной пластинки на 1-2мм
}

// question: 4124118 name: Признак, при котором, в случае надавливания чуть ниже скуловой дуги, у ...
::Признак, при котором, в случае надавливания чуть ниже скуловой дуги, у ...::[html]Признак, при котором, в случае надавливания чуть ниже скуловой дуги, у пациента поднимаются плечи и сгибаются руки в локтевом суставе, описывается как\:{
	~Симптом Кернига
	=Симптом Брудзинского
	~Симптом Бабинского
	~Симптом Биттля?
}

// question: 4124084 name: Причина возникновения диплопии при переломе скуловой кости
::Причина возникновения диплопии при переломе скуловой кости::[html]Причина возникновения диплопии при переломе скуловой кости{
	~травма глазного яблока
	~воспалительная реакция
	=смещение глазного яблока
	~травма зрительного нерва
	~интраорбитальная гематома
}

// question: 4124045 name: Причина ограничения открывания рта при переломе скуловой кости:
::Причина ограничения открывания рта при переломе скуловой кости\:::[html]Причина ограничения открывания рта при переломе скуловой кости\:{
	~Травма жевательных мышц
	=Смещение отломков
	~Гематома в мягких тканях
	~Воспалительная контрактура
}

// question: 4123943 name: Причиной переднего вывиха нижней челюсти может являться:
::Причиной переднего вывиха нижней челюсти может являться\:::[html]Причиной переднего вывиха нижней челюсти может являться\:{
	=Травматичное удаление зубов
	~Удар в область угла нижней челюсти
	~Наличие постоянной микротравмы
	~Завышение прикуса при протезировании
}

// question: 4123954 name: Противостолбнячные анатоксин и сыворотка вводятся при:
::Противостолбнячные анатоксин и сыворотка вводятся при\:::[html]Противостолбнячные анатоксин и сыворотка вводятся при\:{
	~гематомах лица,
	~ссадинах,
	~закрытых переломах костей лица,
	=ранах, загрязненных землей, пылью
}

// question: 4123921 name: Профилактика аспирационной асфиксии у раненых в челюстно-лицевую область на ...
::Профилактика аспирационной асфиксии у раненых в челюстно-лицевую область на ...::[html]Профилактика аспирационной асфиксии у раненых в челюстно-лицевую область на поле боя заключается\:{
	~В трахеотомии
	~В введении воздуховода
	~В удалении инородного тела
	~В восстановлении анатомического положения органа
	=В очистке полости рта, придания раненому положения, обеспечивающего свободное дыхание
}

// question: 4123951 name: Ранним осложнением ранения области лица является:
::Ранним осложнением ранения области лица является\:::[html]Ранним осложнением ранения области лица является\:{
	=Клапанная асфиксия
	~Пародонтит
	~Потеря сознания
	~Неврит лицевого нерва
}

// question: 4123945 name: Ранняя первичная хирургическая обработка ран лица проводится после ранения в ...
::Ранняя первичная хирургическая обработка ран лица проводится после ранения в ...::[html]Ранняя первичная хирургическая обработка ран лица проводится после ранения в течение\:{
	=24 часов
	~8-12 часов
	~первого часа
	~48 часов
}

// question: 4124123 name: Рвота при черепно-мозговой травме:
::Рвота при черепно-мозговой травме\:::[html]Рвота при черепно-мозговой травме\:{
	~Возникает перед приемом пищи
	~Возникает после приема определенных видов пищи
	~Возникает после приема любых видов пищи
	=Не связана с приемом пищи
}

// question: 4124074 name: Репозиция костей носа при западении отломков производистся:
::Репозиция костей носа при западении отломков производистся\:::[html]Репозиция костей носа при западении отломков производистся\:{
	~Носовым зеркалом
	~Крючком Лимберга
	~Прямым элеватором
	=Элеватором Волкова
}

// question: 4124075 name: Репозиция костей носа при смещении отломков вбок производится:
::Репозиция костей носа при смещении отломков вбок производится\:::[html]Репозиция костей носа при смещении отломков вбок производится\:{
	=Мануально
	~Крючком Лимберга
	~Прямым элеватором
	~Элеватором Леклюза
}

// question: 4138045 name: Репонирующий аппарат Катца является:
::Репонирующий аппарат Катца является\:::[html]Репонирующий аппарат Катца является\:{
	~Внутриротовым
	~Внеротовым
	=Внутри-внеротовым
	~Зубодесневым
}

// question: 4138037 name: Ретенированный, дистопированный зуб в области угла нижней челюсти при ...
::Ретенированный, дистопированный зуб в области угла нижней челюсти при ...::[html]Ретенированный, дистопированный зуб в области угла нижней челюсти при переломе следует\:{

=Удалить сразу
~Удалить после наложения шины
~Удалить после снятия шины
~Не удалять
}

// question: 4124115 name: Ретроградная амнезия это:
::Ретроградная амнезия это\:::[html]Ретроградная амнезия это\:{
=Пациент не может вспомнить события, происходившие с ним до момента травмы
~Пациент не может вспомнить события, происходившие с ним после момента травмы
~Пациент не может вспомнить сам момент травмы и соответствующий ему промежуток времени
~Пациент утрачивает ориентацию во времени и пространстве
}

// question: 4138034 name: Решающим признаком полного перелома нижней челюсти является:
::Решающим признаком полного перелома нижней челюсти является\:::[html]Решающим признаком полного перелома нижней челюсти является\:{
=Костная крепитация
~Неправильный прикус
~Нарушение функции жевания
~Нарушение функции дыхания
}

// question: 4123924 name: Свободное дыхание после экстубации обеспечивается:
::Свободное дыхание после экстубации обеспечивается\:::[html]Свободное дыхание после экстубации обеспечивается\:{
~Трахеостомией
=Введением воздуховода
~Прошиванием и выведением языка
~Все ответы верны
}

// question: 4124104 name: Сдавление головного мозга - это:
::Сдавление головного мозга - это\:::[html]Сдавление головного мозга - это\:{
~Закрытое механическое повреждение, которое характеризуется нарушением функций мозга без явно выраженных морфологических изменений
~закрытое механическое повреждение головного мозга, характеризующееся возникновением очага (очагов) деструкции его ткани и проявляющееся

неврологической и (или) психопатологической симптоматикой соответственно локализации очага (очагов)

=Обусловлено внутричерепными гематомами (субдуральными, эпидуральными, внутримозговыми), вдавленными переломами костей мозгового черепа, нарастающим отеком мозга

~Все ответы верны

}

// question: 4138046 name: Симптом «очков» это:

::Симптом «очков» это\:::[html]Симптом «очков» это\:{

=Симптом перелома основания черепа

~Симптом ликвореи

~Симптом перелома нижней челюсти в области мыщелкового отростка

~Симптом кровточения

}

// question: 4124124 name: Симптом Гуревича-Манна (усиление головных болей при надавливании на глазные ...

::Симптом Гуревича-Манна (усиление головных болей при надавливании на глазные ...::[html]Симптом Гуревича-Манна (усиление головных болей при надавливании на глазные яблоки) может наблюдаться при\:{

=Сотрясении головного мозга

~Изолированном переломе дна орбиты

~Переломе скуловой кости

~Переломе верхней челюсти по среднему или верхнему типу?

}

// question: 4124114 name: Симптом Кернига это:

::Симптом Кернига это\:::[html]Симптом Кернига это\:{

=После того, как ногу пациента, лежащего на спине, согнуть в коленном и тазобедренном суставах, разогнуть ее становится невозможно из-за повышенного тонуса мышц-сгибателей

~После того, как ногу пациента, лежащего на спине, согнуть в коленном и тазобедренном суставах, вторая нога подтягивается к животу

~Если надавить на лобковую область, ноги пациента будут подтягиваться к животу

~Если надавить чуть ниже скуловой дуги, у пациента поднимаются плечи и сгибаются руки в локтевом суставе?

}

// question: 4124037 name: Симптом нагрузки при переломах верхней челюсти определяется путем давления ...

::Симптом нагрузки при переломах верхней челюсти определяется путем давления ...::[html]Симптом нагрузки при переломах верхней челюсти определяется путем давления снизу вверх на\:{
	=Крючок крыловидного отростка
	~Скуловые кости
	~Подбородок при сомкнутых зубах
	~Подбородок при полуоткрытом рте
}

// question: 4123973 name: Симптом нагрузки при переломе нижней челюсти определяется давлением на:
::Симптом нагрузки при переломе нижней челюсти определяется давлением на\:::[html]Симптом нагрузки при переломе нижней челюсти определяется давлением на\:{
	=Подбородок
	~Резцы нижней челюсти
	~Ментальное отверстие
	~Венечные отростки
}

// question: 4124078 name: Слизистая латеральной стенки носа иннервируется
::Слизистая латеральной стенки носа иннервируется::[html]Слизистая латеральной стенки носа иннервируется{
	~Передним клиновидным нервом
	~Носо-небным нервом
	=Парасимпатическими волокнами крылонебного узла
	~Все ответы верны
}

// question: 4124049 name: Смещение глазного яблока при переломе скуло-носо-орбитального комплекса ...
::Смещение глазного яблока при переломе скуло-носо-орбитального комплекса ...::[html]Смещение глазного яблока при переломе скуло-носо-орбитального комплекса происходит чаще всего\:{
	~Кверху
	~Медиально
	~Кпереди
	=Вниз
}

// question: 4124100 name: Согласно международной классификации, принятой на III съезде нейрохирургов ...

::Согласно международной классификации, принятой на III съезде нейрохирургов ...::[html]Согласно международной классификации, принятой на III съезде нейрохирургов (Таллинн, 1982), все черепно - мозговые травмы (ЧМТ) делятся на\:{
=3 формы
~4 формы
~2 формы
~5 форм
}

// question: 4124107 name: Сопорозное состояние сознания больного характеризуется
::Сопорозное состояние сознания больного характеризуется::[html]Сопорозное состояние сознания больного характеризуется{
~Оцепенением, застыванием конечностей и туловища в любом положении, часто очень неудобном
~Бессознательным состоянием с утратой рефлексов
~Состоянием оглушения, рефлексы сохранены, на вопросы отвечает, дезориентацией в пространстве и времени
=Состоянием оглушения с короткими периодами "просветления", сохранением рефлексов и реакцией на болевые раздражители
~Отсутствием реакции на речь, обращенную к нему
}

// question: 4124102 name: Сотрясение головного мозга - это:
::Сотрясение головного мозга - это\:::[html]Сотрясение головного мозга - это\:{
=Закрытое механическое повреждение, которое характеризуется нарушением функций мозга без явно выраженных морфологических изменений
~закрытое механическое повреждение головного мозга, характеризующееся возникновением очага (очагов) деструкции его ткани и проявляющееся неврологической и (или) психопатологической симптоматикой соответственно локализации очага (очагов)
~Обусловлено внутричерепными гематомами (субдуральными, эпидуральными, внутримозговыми), вдавленными переломами костей мозгового черепа, нарастающим отеком мозга
~Все ответы верны
}

// question: 4124097 name: Сочетанная травма:
::Сочетанная травма\:::[html]Сочетанная травма\:{
=Одновременное повреждение двух и более анатомических областей одним или несколькими поражающими факторами
~Повреждение, которое возникает в результате воздействия разных травмирующих факторов
~Оба ответа верны
~Оба ответа неверны

}

// question: 4124096 name: Способ устранения деформации скуловой области без функциональных нарушений ...
::Способ устранения деформации скуловой области без функциональных нарушений ...::[html]Способ устранения деформации скуловой области без функциональных нарушений после застарелого перелома скуловой кости{
	=контурная пластика
	~остеотомия скуловой кости
	~радикальная гайморотомия с репозицией отломков
}

// question: 4124047 name: Способ устранения посттравматической деформации скуловой области без ...
::Способ устранения посттравматической деформации скуловой области без ...::[html]Способ устранения посттравматической деформации скуловой области без функциональных нарушений после застрарелого перелома скуловой кости\:{
	~Радикальная верхнечелюстная синусотомия с репозицией отломков
	=Контурная пластика
	~Проведение спиц Киршнера по методу Макиенко
	~Остеотомия скуловой кости
}

// question: 4138033 name: Сроки первичной отсроченной хирургической обработки ран мягких тканей лица с ...
::Сроки первичной отсроченной хирургической обработки ран мягких тканей лица с ...::[html]Сроки первичной отсроченной хирургической обработки ран мягких тканей лица с наложением глухого шва\:{
	~24 часа
	~До 36 часов
	~До 48 часов
	=До 72 часов
}

// question: 4124110 name: Срочное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме ...
::Срочное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме ...::[html]Срочное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме заключается\:{
	~В остановке кровотечения, улучшении функции внешнего дыхания
	~В лечении осложнений воспалительного характера, окончательной иммобилизации переломов костей лица

=В первичной хирургической обработке раны, временной или окончательной иммобилизации переломов костей лица
~Все ответы верны
}

// question: 4124130 name: Стартовым препаратом для проведения инфузионной терапии у пациента с ...
::Стартовым препаратом для проведения инфузионной терапии у пациента с ...::[html]Стартовым препаратом для проведения инфузионной терапии у пациента с сочетанной черепно-лицевой травмой является\:{
=Раствор Рингера
~Полиглюкин
~Реополиглюкин
~Гемодез
}

// question: 4124099 name: Степени тяжести черепно-мозговой травмы:
::Степени тяжести черепно-мозговой травмы\:::[html]Степени тяжести черепно-мозговой травмы\:{
~Легкая
~Средней тяжести
~Тяжелая
=Все ответы верны
}

// question: 4124004 name: Суббазальным переломом называют:
::Суббазальным переломом называют\:::[html]Суббазальным переломом называют\:{
~Перелом скуло-носо-орбитального комплекса с одной стороны
=Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор III
~Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор I
~Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор II
}

// question: 4124003 name: Суборбитальным переломом называют:
::Суборбитальным переломом называют\:::[html]Суборбитальным переломом называют\:{
~Перелом скуло-носо-орбитального комплекса с одной стороны
~Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор III
~Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор I
=Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор II
}

// question: 4123939 name: Суставной диск при опускании и поднимании нижней челюсти:
::Суставной диск при опускании и поднимании нижней челюсти\:::[html]Суставной диск при опускании и поднимании нижней челюсти\:{
	=Двигается вместе с головкой
	~Вращается вокруг вертикальной оси
	~Остается неподвижным
	~Вращается вокруг горизонтальной оси
}

// question: 4123963 name: Удельный вес переломов костей лица среди травм с повреждением костей скелета ...
::Удельный вес переломов костей лица среди травм с повреждением костей скелета ...::[html]Удельный вес переломов костей лица среди травм с повреждением костей скелета составляет\:{
	~1.5 – 2.5%;
	=3.2 – 45;
	~12 – 16;
}

// question: 4124009 name: Удлинение и уплощение средней зоны лица встречается при переломах:
::Удлинение и уплощение средней зоны лица встречается при переломах\:::[html]Удлинение и уплощение средней зоны лица встречается при переломах\:{
	=Верхней челюсти
	~Нижней челюсти
	~Скуловых костей с обеих сторон
	~Все ответы верны
}

// question: 4124026 name: Удлинение и уплощение средней зоны лица свидетельствует о переломе верхней ...
::Удлинение и уплощение средней зоны лица свидетельствует о переломе верхней ...::[html]Удлинение и уплощение средней зоны лица свидетельствует о переломе верхней челюсти\:{
	=Суббазальном
	~Суборбитальном
	~Субназальном
	~Субантральном
}

// question: 4124081 name: Укажите для какого перелома характерно нарушение чувствительности ...
::Укажите для какого перелома характерно нарушение чувствительности ...::[html]Укажите для какого перелома характерно нарушение чувствительности подглазничной области\:{
	~Перелом скуловой кости без смещения
	=Перелом скуловой кости со смещением
	~Перелом костей носа
	~Перелом нижней челюсти
}

// question: 4124050 name: Укладка головы для рентгенографии скуловой кости:
::Укладка головы для рентгенографии скуловой кости\:::[html]Укладка головы для рентгенографии скуловой кости\:{
	=Носоподбородочная
	~Прямая нижней челюсти
	~Задняя полуаксиальная
	~Боковая нижней челюсти
}

// question: 4124103 name: Ушиб (контузия) головного мозга - это:
::Ушиб (контузия) головного мозга - это\:::[html]Ушиб (контузия) головного мозга - это\:{
	~Закрытое механическое повреждение, которое характеризуется нарушением функций мозга без явно выраженных морфологических изменений
	=закрытое механическое повреждение головного мозга, характеризующееся возникновением очага (очагов) деструкции его ткани и проявляющееся неврологической и (или) психопатологической симптоматикой соответственно локализации очага (очагов)
	~Обусловлено внутричерепными гематомами (субдуральными, эпидуральными, внутримозговыми), вдавленными переломами костей мозгового черепа, нарастающим отеком мозга
	~Все ответы верны
}

// question: 4124007 name: Фиксация верхней челюсти после репозиции отломков при переломе по типу Ле Фор...
::Фиксация верхней челюсти после репозиции отломков при переломе по типу Ле Фор...::[html]Фиксация верхней челюсти после репозиции отломков при переломе по типу Ле Фор I проводится в области\:{
	=Грушевидного отверстия, скулоальвеолярного гребня
	~Бугров
	~Скулоальвеолярного гребня с двух сторон
	~Все ответы верны
}

// question: 4124055 name: Фиксация скуловой кости после ее репозиции элеватором Карапетяна осуществляется:
::Фиксация скуловой кости после ее репозиции элеватором Карапетяна осуществляется\:::[html]Фиксация скуловой кости после ее репозиции элеватором Карапетяна осуществляется\:{
	~Наружными швами
	~Пластмассовым вкладышем
	=Тампоном, пропитанным йодоформом
	~Коллодийной повязкой
}

// question: 4124056 name: Фиксация скуловой кости после репозиции крючком Лимберга осуществляется:
::Фиксация скуловой кости после репозиции крючком Лимберга осуществляется\:::[html]Фиксация скуловой кости после репозиции крючком Лимберга осуществляется\:{
	~Пластмассовым вкладышем
	=Заклиниванием между отломками
	~Наружными швами
	~Тампоном, пропитанным йодоформом
}

// question: 4124083 name: Фиксация скуловой кости после репозиции проводится пластинами из:
::Фиксация скуловой кости после репозиции проводится пластинами из\:::[html]Фиксация скуловой кости после репозиции проводится пластинами из\:{
	~Вибраниума
	=Титана
	~Алюминия
	~Стронция
}

// question: 4124065 name: Фиксация фрагментов при переломе костей носа со смещением заключается в ...
::Фиксация фрагментов при переломе костей носа со смещением заключается в ...::[html]Фиксация фрагментов при переломе костей носа со смещением заключается в наложении\:{
	=Гипсовой повязки
	~Титановых пластин
	~Пращевидной повязки
	~Индивидуальной шины
}

// question: 4124001 name: Характерный симптом для перелома верхней челюсти по типу Ле Фор I:
::Характерный симптом для перелома верхней челюсти по типу Ле Фор I\:::[html]Характерный симптом для перелома верхней челюсти по типу Ле Фор I\:{
	~Разрыв слизистой оболочки в области альвеолярного отростка
	=Патологическая подвижность верхнечелюстных костей
	~Носовое кровотечение
	~Ограничение открывания рта
}

// question: 4123974 name: Характерным симптомом при двустороннем переломе мыщелковых отростков со ...
::Характерным симптомом при двустороннем переломе мыщелковых отростков со ...::[html]Характерным симптомом при двустороннем переломе мыщелковых отростков со смещением является\:{
	=Открытый прикус
	~Разрыв слизистой альвеолярного отростка
	~Невозможность открыть рот
	~Смещение центральной линии в сторону
}

// question: 4124033 name: Хирургические методы иммобилизации переломов верхней челюсти
::Хирургические методы иммобилизации переломов верхней челюсти::[html]Хирургические методы иммобилизации переломов верхней челюсти{
	~Дуга Энгля
	~Метод Адамса
	=Остеосинтез по Макиенко
	~Наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
}

// question: 4124034 name: Хирургические методы иммобилизации переломов верхней челюсти
::Хирургические методы иммобилизации переломов верхней челюсти::[html]Хирургические методы иммобилизации переломов верхней челюсти{
	~Дуга Энгля
	~Метод Адамса
	=Металлостеосинтез
	~Наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
}

// question: 4124052 name: Хирургическим методом лечения при изолированном переломе скуловой кости со ...
::Хирургическим методом лечения при изолированном переломе скуловой кости со ...::[html]Хирургическим методом лечения при изолированном переломе скуловой кости со смещением является\:{
	=Репозиция скуловой кости
	~Остеотомия верхней челюсти
	~Верхнечелюстная синусотомия с репозицией отломков
	~Все ответы верны
}

// question: 4138047 name: Хирургическим методом лечения, показанным при переломе нижней челюсти, ...
::Хирургическим методом лечения, показанным при переломе нижней челюсти, ...::[html]Хирургическим методом лечения, показанным при переломе нижней челюсти, осложнившемся нагноением костной раны, является\:{
	~Трансочаговый остеосинтез
	=Внеочаговый остеосинтез
	~Внутрикостный шов
	~Остеосинтез накостными пластинами
}

// question: 4124032 name: Хирургическо-ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:
::Хирургическо-ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти\:::[html]Хирургическо-ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти\:{
	~Дуга Энгля
	~Остеосинтез
	=Метод Адамса
	~Наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
}

// question: 4124066 name: Чаще всего ломается и дает трещины при травме стенка глазницы:
::Чаще всего ломается и дает трещины при травме стенка глазницы\:::[html]Чаще всего ломается и дает трещины при травме стенка глазницы\:{
	~Нижняя
	~Верхняя
	~Латеральная
	=Медиальная
}

// question: 4124079 name: Через год после перелома деформацию костей носа устраняют
::Через год после перелома деформацию костей носа устраняют::[html]Через год после перелома деформацию костей носа устраняют{
	~Мануальным вправлением
	=Остеотомией костей носа
	~Тампонадой с одномоментным наложением повязки из коллодия
	~Элеватором Карапетяна
}

// question: 4124093 name: Через год после перелома деформацию костей носа устраняют
::Через год после перелома деформацию костей носа устраняют::[html]Через год после перелома деформацию костей носа устраняют{
	~мануальным вправлением
	~остеотомией костей носа
	=тампонадой с одномоментным наложением повязки из коллодия
}

// question: 4124094 name: Через год после перелома деформацию костей носа устраняют
::Через год после перелома деформацию костей носа устраняют::[html]Через год после перелома деформацию костей носа устраняют{
	=контурной пластикой
	~мануальным вправлением
	~тампонадой с одномоментным наложением повязки из коллодия
}

// question: 4124005 name: Черепно-челюстно-лицевое разъединение происходит при переломе верхней челюсти...
::Черепно-челюстно-лицевое разъединение происходит при переломе верхней челюсти...::[html]Черепно-челюстно-лицевое разъединение происходит при переломе верхней челюсти по типу\:{
	~Ле Фор I
	~Ле Фор II
	=Ле Фор III
	~Все ответы верны
}

// question: 4138043 name: Шина Ванкевича фиксируется:
::Шина Ванкевича фиксируется\:::[html]Шина Ванкевича фиксируется\:{
	~На зубах верхней челюсти
	~На зубах нижней челюсти

=На зубах и десне верхней челюсти
~На зубах и десне нижней челюсти
}

// question: 4138031 name: Шину Тигерштедта устанавливают на:
::Шину Тигерштедта устанавливают на\:::[html]Шину Тигерштедта устанавливают на\:{
~2 недели
=4 недели
~6 недель
~8 недель
}

// question: 4124109 name: Экстренное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме ...
::Экстренное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме ...::[html]Экстренное специализированное лечение повреждений лица при сочетанной травме заключается\:{
=В остановке кровотечения, улучшении функции внешнего дыхания
~В лечении осложнений воспалительного характера,
окончательной иммобилизации переломов костей лица
~В первичной хирургической обработке раны, временной или окончательной иммобилизации переломов костей лица
~Все ответы верны
}

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021/Реконструктивно-восстановительная хирургия
$CATEGORY: $course$/top/2021/Реконструктивно-восстановительная хирургия

// question: 4137476 name: Авторы предложившие модификации сагиттальной межкортикальной остеотомии ...
::Авторы предложившие модификации сагиттальной межкортикальной остеотомии ...::[html]Авторы предложившие модификации сагиттальной межкортикальной остеотомии нижней челюсти по H. Obwegeser\:{
~Dal Pont.
~Bell
~Epker
=все ответы верны
}

// question: 4137423 name: Аллотрансплантат – материал, взятый у:

::Аллотрансплантат – материал, взятый у\:::[html]Аллотрансплантат – материал, взятый у\:{
	~пациента
	~животного
	=другого индивида
	~однояйцевого близнеца
}

// question: 4137430 name: Анатомическое нарушение верхней челюсти при верхней макрогнатии:
::Анатомическое нарушение верхней челюсти при верхней макрогнатии\:::[html]Анатомическое нарушение верхней челюсти при верхней макрогнатии\:{
	=Чрезмерное развитие
	~Недоразвитие
	~Смещение кзади
	~Несимметричная деформация
}

// question: 4137431 name: Анатомическое нарушение верхней челюсти при верхней микрогнатии:
::Анатомическое нарушение верхней челюсти при верхней микрогнатии\: ::[html]Анатомическое нарушение верхней челюсти при верхней микрогнатии\: {
	~Чрезмерное развитие
	=Недоразвитие
	~Смещение кзади
	~Несимметричная деформация
}

// question: 4137483 name: Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава бывает:
::Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава бывает\:::[html]Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава бывает\:{
	=Костным
	~Атрофическим
	~Катаральным
	~Гнойным
}

// question: 4137484 name: Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава бывает:
::Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава бывает\:::[html]Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава бывает\:{
	=Фиброзным

~Атрофическим
~Катаральным
~Гнойным
}

// question: 4137413 name: Артеризированный лоскут на питающей ножке состоит из следующих тканей:
::Артеризированный лоскут на питающей ножке состоит из следующих тканей\:::[html]Артеризированный лоскут на питающей ножке состоит из следующих тканей\:{
=Кожи, подкожной клетчатки и сосудистого пучка
~Кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышцы и кости
~Кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышцы
~Кожи и подкожно-жировой клетчатки
}

// question: 4137422 name: аутотрансплантат – материал, взятый у:
::аутотрансплантат – материал, взятый у\:::[html]аутотрансплантат – материал, взятый у\:{
=пациента
~животного
~другого индивида
~однояйцевого близнеца
}

// question: 4137420 name: аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут из:
::аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут из\:::[html]аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут из\:{
=ребра
~ключицы
~костей стопы
~бедренной кости
}

// question: 4137421 name: аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут из:
::аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут из\:::[html]аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут из\:{
=гребня подвздошной кости
~ключицы
~костей стопы
~бедренной кости

}

// question: 4137452 name: В каком году в США была выполнена первая ортогнатическая операция?
::В каком году в США была выполнена первая ортогнатическая операция?::[html]В каком году в США была выполнена первая ортогнатическая операция?{
	~1900
	~1863
	=1848
	~1914
}

// question: 4137480 name: В течение какого периода времени пациентам необходимо носить резиновые ...
::В течение какого периода времени пациентам необходимо носить резиновые ...::[html]В течение какого периода времени пациентам необходимо носить резиновые эластики для фиксации прикуса в послеоперационном периоде\:{
	=1 месяц
	~6 месяцев
	~2 недели
	~3 месяца
}

// question: 4138061 name: В чем состоит способ устранения деформации скуловой области без ...
::В чем состоит способ устранения деформации скуловой области без ...::[html]В чем состоит способ устранения деформации скуловой области без функциональных нарушений после застарелого перелома скуловой кости\:{
	=контурной пластики
	~остеотомии скуловой кости
	~радикальной гайморотомии с репозицией отломков
	~бимаксилярном шинировании
}

// question: 4137485 name: Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является:
::Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является\:::[html]Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является\:{
	=Ограничение открывания рта
	~Шум в ушах
	~Боль при глотании
	~Диплопия
}

// question: 4137492 name: Ведущим симптомом при контрактуре нижней челюсти является:
::Ведущим симптомом при контрактуре нижней челюсти является\:::[html]Ведущим симптомом при контрактуре нижней челюсти является\:{
	=Ограничение подвижности
	~Укорочение ветвей
	~Снижение высоты прикуса
	~Верхняя макрогнатия
}

// question: 4137475 name: Возможно ли проведение ортогнатической операции при частичной вторичной адентии:
::Возможно ли проведение ортогнатической операции при частичной вторичной адентии\:::[html]Возможно ли проведение ортогнатической операции при частичной вторичной адентии\:{
	~нет
	~да, без необходимости восполнения дефектов зубного ряда
	~возможно, но только у пациентов в возрасте до 45 лет
	=возможно, но при замещении дефектов зубного ряда дентальными имплантатами или ортопедическими конструкциями
}

// question: 4137472 name: Возможное осложнение после проведения ортогнатической операции:
::Возможное осложнение после проведения ортогнатической операции\:::[html]Возможное осложнение после проведения ортогнатической операции\:{
	~травма лицевого нерва
	~все варианты верны
	=травма инфраорбитального нерва
}

// question: 4137471 name: Возможное осложнение после проведения ортогнатической операции:
::Возможное осложнение после проведения ортогнатической операции\:::[html]Возможное осложнение после проведения ортогнатической операции\:{
	~травма лицевого нерва
	=травма нижнеальвеолярного нерва
	~все варианты верны
}

// question: 4137473 name: Возможные осложнения после проведения ортогнатической операции:
::Возможные осложнения после проведения ортогнатической операции\:::[html]Возможные осложнения после проведения ортогнатической операции\:{
	~несостоятельность фиксирующей металлоконструкции
	~нагноение костной раны
	~рецидив положения челюстей
	=все ответы верны
}

// question: 4137456 name: Выберете правильную последовательность этапов остеотомии верхней челюсти на ...
::Выберете правильную последовательность этапов остеотомии верхней челюсти на ...::[html]Выберете правильную последовательность этапов остеотомии верхней челюсти на уровне Ле-Фор 1 с фрагментацией\:{
	=Разрез, остеотомия, мобилизация ВЧ, фрагментация ВЧ, сопоставление зубных рядов, остеосинтез ВЧ, ушивание послеоперационной раны
	~Разрез, фрагментация ВЧ, мобилизация ВЧ, ушивание послеоперационной раны
	~Разрез, сопоставление зубных рядов, фрагментация ВЧ, остеосинтез ВЧ, ушивание послеоперационной раны.
	~Разрез, остеосинтез ВЧ, сопоставление зубных рядов, фрагментация ВЧ, мобилизация ВЧ.
}

// question: 4137463 name: Выберете правильную последовательность этапов сагиттальной межкортикальной ...
::Выберете правильную последовательность этапов сагиттальной межкортикальной ...::[html]Выберете правильную последовательность этапов сагиттальной межкортикальной остеотомии нижней челюсти\:{
	=Разрез слизистой, скелетирование ветви НЧ, собственно остеотомия, расщепление ветви НЧ, сопоставление зубных рядов, остеосинтез НЧ титановыми пластинами, ушивание послеоперационной раны
	~Разрез слизистой, расщепление ветви НЧ, скелетирование ветви НЧ, ушивание послеоперационной раны
	~Разрез слизистой, сопоставление зубных рядов, собственно остеотомия, остеосинтез НЧ, ушивание послеоперационной раны
	~Разрез слизистой, остеосинтез НЧ, сопоставление зубных рядов, скелетирование ветви НЧ, расщепление ветви НЧ
}

// question: 4137469 name: Где чаще всего выполняются линии остеотомии при сегментации верхней челюсти:

::Где чаще всего выполняются линии остеотомии при сегментации верхней челюсти\:::[html]Где чаще всего выполняются линии остеотомии при сегментации верхней челюсти\:{
~между зубами 1.3-1.4, 2.3-2.4
=между зубами 1.2-1.3, 2.2-2.3
~между зубами 1.4-1.5, 2.5-2.4
~между зубами 1.2-1.1, 2.2-2.1
}

// question: 4137488 name: Для двустороннего костного анкилоза ВНЧС характерен следующий внешний вид ...
::Для двустороннего костного анкилоза ВНЧС характерен следующий внешний вид ...::[html]Для двустороннего костного анкилоза ВНЧС характерен следующий внешний вид пациента\:{
=“Птичий профиль”
~Нижняя макрогнатия
~Верхняя ретрогнатия
~Верхняя микрогнатия
}

// question: 4137478 name: Для какой цели используются хирургические шаблоны (ортогнатические сплинты):
::Для какой цели используются хирургические шаблоны (ортогнатические сплинты)\:::[html]Для какой цели используются хирургические шаблоны (ортогнатические сплинты)\:{
~Для определения линии проведения остеотомии
=Для установки остеотомированных челюстей в правильное положение сообразно расчетам на дооперационном этапе
~Для определения прикуса
~Для остановки кровотечения в ходе оперативного вмешательства
}

// question: 4137489 name: Для одностороннего костного анкилоза ВНЧС характерен следующий внешний вид ...
::Для одностороннего костного анкилоза ВНЧС характерен следующий внешний вид ...::[html]Для одностороннего костного анкилоза ВНЧС характерен следующий внешний вид пациента\:{
=Укорочение тела и ветви нижней челюсти на больной стороне
~Нижняя макрогнатия
~Верхняя ретрогнатия
~Верхняя микрогнатия
}

// question: 4138071 name: ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПОКАЗАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТ ЧЕЛЮСТИ ...
::ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПОКАЗАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПОКАЗАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ{
	~периостита
	~секвестрэктомии
	~склерозирующей терапии
	=удаления доброкачественных опухолей
}

// question: 4137466 name: Для чего выполняется операция SARME?
::Для чего выполняется операция SARME?::[html]Для чего выполняется операция SARME?{
	=расширение верхней челюсти
	~перемещение нижней челюсти
	~выдвижение верхней челюсти вперед
	~ни один из предложенных вариантов не является верным
}

// question: 4137449 name: Для чего необходим костный расширитель Смита?
::Для чего необходим костный расширитель Смита?::[html]Для чего необходим костный расширитель Смита?{
	=Для разведения ветви нижней челюсти после проведения сагиттального распила
	~Для расширения твердого неба.
	~Для расширения альвеолярного отростка верхней челюсти.
	~Все ответы неверны.
}

// question: 4137443 name: Для чего применяется ретрактор Obwegeser (типа «птица»):
::Для чего применяется ретрактор Obwegeser (типа «птица»)\:::[html]Для чего применяется ретрактор Obwegeser (типа «птица»)\:{
	=Для мягких тканей в области ветви нижней челюсти
	~Для мягких тканей в области тела нижней челюсти
	~Для разведения ветви нижней челюсти после проведения сагиттальной остеотомии
	~Все ответы неверны
}

// question: 4137487 name: Дополнительным методом диагностики анкилоза ВНЧС является:

::Дополнительным методом диагностики анкилоза ВНЧС является\:::[html]Дополнительным методом диагностики анкилоза ВНЧС является\:{
	=Компьютерная томография
	~ЭОД
	~Миография
	~Аудиометрия
}

// question: 4137477 name: Из какого материала изготавливаются хирургические шаблоны (ортогнатические ...
::Из какого материала изготавливаются хирургические шаблоны (ортогнатические ...::[html]Из какого материала изготавливаются хирургические шаблоны (ортогнатические сплины)\:{
	=Быстротвердеющая пластмасса
	~Ортопедический воск
	~КХС
	~Альгинатная масса
}

// question: 4138072 name: К АНАТОМИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИИ ОТНОСЯТ:
::К АНАТОМИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИИ ОТНОСЯТ\:::[html]К АНАТОМИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИИ ОТНОСЯТ\:{
	~недоразвитие
	=смещение кзади
	~чрезмерное развитие
	~несимметричная деформация
}

// question: 4138063 name: К каким принципам пластической хирургии челюстно-лицевой области и шеи можно ...
::К каким принципам пластической хирургии челюстно-лицевой области и шеи можно ...::[html]К каким принципам пластической хирургии челюстно-лицевой области и шеи можно отнести\: определение сроков проведения и способа оперативного вмешательства?{
	~к биологическим
	=принципам планирования
	~оперативно-техническим
	~к диагностическим
}

// question: 4138068 name: К какому разделу пластической хирургии можно отнести устранение деформаций ...
::К какому разделу пластической хирургии можно отнести устранение деформаций ...::[html]К какому разделу пластической хирургии можно отнести устранение деформаций лица и шеи, воссоздание частично или полностью утраченных органов или тканей челюстно-лицевой области?{
	~Травматология
	~реконструктивная
	~эстетическая
	=восстановительная
}

// question: 4137465 name: К порокам развития челюстных костей относятся (выберите один или несколько ...
::К порокам развития челюстных костей относятся (выберите один или несколько ...::[html]К порокам развития челюстных костей относятся (выберите один или несколько правильных ответов)\:{
	=макрогнатия
	~микрогнатия
	~прогнатия
	~ретрогнатия
}

// question: 4138062 name: Как называются в пластической хирургии челюстно-лицевой области оперативные ...
::Как называются в пластической хирургии челюстно-лицевой области оперативные ...::[html]Как называются в пластической хирургии челюстно-лицевой области оперативные вмешательства, улучшающие эстетические и функциональные результаты предшествующего восстановительного хирургического лечения?{
	~Подготовительные
	~замещающие
	=корригирующие
	~реконструктивные
}

// question: 4137448 name: Как проводится двухстороняя остеотомия ветвей НЧ по Э.А. Рауэру?
::Как проводится двухстороняя остеотомия ветвей НЧ по Э.А. Рауэру?::[html]Как проводится двухстороняя остеотомия ветвей НЧ по Э.А. Рауэру?{
	=Проводится наружным доступом впереди мочки уха. Остеотомия на уровне средней трети ветвей с сохранением сосудисто-нервного пучка
	~Проводится внутри ротовым доступом. Остеотомия на уровне верхней трети ветвей с сохранением сосудисто-нервного пучка.

~Наружный доступ. Поперечная остеотомия под углом, для увеличения площади контакта фрагментов.
~Все ответы неверны.
}

// question: 4137446 name: Как проводится остеотомия ветвей НЧ по Babcock при открытом прикусе?
::Как проводится остеотомия ветвей НЧ по Babcock при открытом прикусе?::[html]Как проводится остеотомия ветвей НЧ по Babcock при открытом прикусе?{
~Проводится в поперечном направлении на уровне средней трети со смещением зубосодержащего фрагмента в требуемое положение
=Проводится в поперечном направлении на уровне верхней трети со смещением зубосодержащего фрагмента в требуемое положение
~Проводится в поперечном направлении дугообразным распилом на уровне нижней трети
~Все ответы неверны
}

// question: 4137450 name: Как проводится остеотомия мыщелковых отростков НЧ по Smith и Johnson?
::Как проводится остеотомия мыщелковых отростков НЧ по Smith и Johnson?::[html]Как проводится остеотомия мыщелковых отростков НЧ по Smith и Johnson?{
=Наружный доступ. Вертикальный распил параллельно заднему краю НЧ
~Проводиться в поперечном направлении на уровне нижней трети со смещением зубосодержащего фрагмента в требуемое положение
~Наружный доступ. Углообразный распил
~Все ответы неверны
}

// question: 4137438 name: Какая из приведенных ниже классификаций по хирургическим вмешательствам на ...
::Какая из приведенных ниже классификаций по хирургическим вмешательствам на ...::[html]Какая из приведенных ниже классификаций по хирургическим вмешательствам на челюстях является верной\:{
~Операции в области угла и ветвей НЧ
~Операции в области мыщелковых отростков
~Операции на НЧ в пределах зубного ряда
=Все ответы верны
}

// question: 4137474 name: Какая манипуляция проводится на 1-2 сутки после ортогнатической операции:

::Какая манипуляция проводится на 1-2 сутки после ортогнатической операции\:::[html]Какая манипуляция проводится на 1-2 сутки после ортогнатической операции\:{
	~снятие бреккет-системы
	=фиксация прикуса при помощи резиновых эластиков
	~снятие послеоперациооных швов
	~все ответы верны
}

// question: 4137435 name: Какие из приведенных ниже данных о частоте встречаемости аномалий, деформации...
::Какие из приведенных ниже данных о частоте встречаемости аномалий, деформации...::[html]Какие из приведенных ниже данных о частоте встречаемости аномалий, деформации ЧЛО и зубных дуг являются верными\:{
	~У 20 % детей старшего возраста
	~У 80 % детей до 5 лет
	=У 70 % детей до 3 лет
	~У 40 % детей старшего возраста
}

// question: 4137442 name: Какие из приведенных оперативных вмешательств выполняют в области угла и ...
::Какие из приведенных оперативных вмешательств выполняют в области угла и ...::[html]Какие из приведенных оперативных вмешательств выполняют в области угла и ветвей нижней челюсти\:{
	=Двусторонняя остеотомия по Lane
	~Остеотомия по Kole
	~Плоскостная овальная остеотомия по Сукачеву
	~Сагиттальная межкортикальная остеотомия по Dal Pont
}

// question: 4137441 name: Какие из приведенных оперативных вмешательств выполняют на теле нижней челюсти:
::Какие из приведенных оперативных вмешательств выполняют на теле нижней челюсти\:::[html]Какие из приведенных оперативных вмешательств выполняют на теле нижней челюсти\:{
	=Резекция в области премоляров при макрогнатии по Blair
	~L- образная резекция в области моляров при макрогнатии по Plichler
	~Остеотомия по Ле-Фор 1 с фрагментацией
	~Двусторонняя остеотомия по Babcock при открытом прикусе
}

// question: 4137455 name: Какие из приведенных хирургических вмешательств выполняют на верхней челюсти ...
::Какие из приведенных хирургических вмешательств выполняют на верхней челюсти ...::[html]Какие из приведенных хирургических вмешательств выполняют на верхней челюсти в настоящее время\:{
	~Остеотомия верхней челюсти на уровне Ле-Фор 1 моноблоком
	~Остеотомия верхней челюсти на уровне Ле-Фор 1 с фрагментацией
	~Операции на верхней челюсти по ее расширению
	=Все ответы верны
}

// question: 4137453 name: Какие инструменты применяются при межкортикальной сагиттальной остеотомии ...
::Какие инструменты применяются при межкортикальной сагиттальной остеотомии ...::[html]Какие инструменты применяются при межкортикальной сагиттальной остеотомии нижней челюсти\:{
	~Ретракторы Обвегезера
	~Набор долот и молотки
	~Ретрактор языка
	=Все ответы верны
}

// question: 4137445 name: Какие операции проводят в области мыщелковых отростков?
::Какие операции проводят в области мыщелковых отростков?::[html]Какие операции проводят в области мыщелковых отростков?{
	=Двусторонняя продольная остеотомия ветвей НЧ по Robinson
	~Двусторонняя остеотомия ветвей НЧ по Wassmund
	~Двусторонняя остеотомия ветвей НЧ по Lane
	~Остеотомия тела НЧ в форме двойной ступени по Toman
}

// question: 4137444 name: Какие операции проводят в области угла и ветвей НЧ?
::Какие операции проводят в области угла и ветвей НЧ?::[html]Какие операции проводят в области угла и ветвей НЧ?{
	=Сагиттальная межкортикальная остеотомия по Dal Pont
	~Клиновидная резекция по S. Hullian
	~Остеотомия НЧ по Kole
	~Плоскостная овальная остеотомия по Сукачеву
}

// question: 4137439 name: Какие операции проводят на НЧ в пределах зубного ряда?

::Какие операции проводят на НЧ в пределах зубного ряда?::[html]Какие операции проводят на НЧ в пределах зубного ряда?{
	=Ступенчатая остеотомия тела НЧ при макрогнатии по Э.А. Рауэр
	~Остеотомия мыщелковых отростков НЧ по Smith и Johnson
	~Косая остеотомия ветвей НЧ по Рудько
	~Двусторонняя остеотомия ветвей НЧ по Cryer
}

// question: 4137462 name: Какие цели преследует прехирургический ортодонтический этап:
::Какие цели преследует прехирургический ортодонтический этап\:::[html]Какие цели преследует прехирургический ортодонтический этап\:{
	~нормализация положения зубов
	~нормализация наклона зубов
	~выравнивание окклюзионной кривой
	~координация размеров верхнего и нижнего зубных рядов
	=все ответы верны
}

// question: 4137437 name: Какие этапы лечения выделяют в ортогнатической хирургии?
::Какие этапы лечения выделяют в ортогнатической хирургии?::[html]Какие этапы лечения выделяют в ортогнатической хирургии?{
	~Прехирургический ортодонтический
	~Хирургический
	~Постхирургический ортодонтический
	=Все ответы верны
}

// question: 4137479 name: Каковы примерные сроки ношения брекет-системы на послеоперационном ...
::Каковы примерные сроки ношения брекет-системы на послеоперационном ...::[html]Каковы примерные сроки ношения брекет-системы на послеоперационном (ретенционном) периоде\:{
	=6-12 месяцев
	~2-3 года
	~1 месяц
	~Использование брекет-системы после оперативного вмешательства не требуется
}

// question: 4137433 name: Какое из приведенных ниже нарушений прикуса по данным ВОЗ (1984) встречается ...

::Какое из приведенных ниже нарушений прикуса по данным ВОЗ (1984) встречается ...::[html]Какое из приведенных ниже нарушений прикуса по данным ВОЗ (1984) встречается наиболее часто\:{
	=Нижняя прогнатия
	~нижняя ретрогнатия
	~глубокий прикус
	~сочетанные формы
}

// question: 4137436 name: Какое из приведенных ниже определений наиболее полно описывает понятие ...
::Какое из приведенных ниже определений наиболее полно описывает понятие ...::[html]Какое из приведенных ниже определений наиболее полно описывает понятие «Ортогнатическая хирургия»\:{
	=Это комплекс реконструктивных операций на челюстях по их перемещению и изменению размеров
	~Это остеотомия верхней челюсти и ее перемещение
	~Это остеотомия нижней челюсти и ее перемещение
	~Это остеотомия верхней челюсти и выдвижение ее вперед, остеотомия нижней челюсти и задвижение ее назад
}

// question: 4137454 name: Какое из приведенных оперативных вмешательств выполняют на верхней челюсти:
::Какое из приведенных оперативных вмешательств выполняют на верхней челюсти\:::[html]Какое из приведенных оперативных вмешательств выполняют на верхней челюсти\:{
	=Остеотомия по Мазанову
	~Остеотомия по Kole
	~Олоскостная овальная остеотомия по Сукачеву
}

// question: 4137458 name: Какое программное обеспечение чаще всего используют для планирования ...
::Какое программное обеспечение чаще всего используют для планирования ...::[html]Какое программное обеспечение чаще всего используют для планирования ортогнатических операций?{
	=Dolphin imaging
	~Virtual Surgery
	~3DMAx
	~DICOM
}

// question: 4138066 name: Какой из отечественных хирургов предложил использование плоского ...
::Какой из отечественных хирургов предложил использование плоского ...::[html]Какой из отечественных хирургов предложил использование плоского эпителизированного кожного лоскута ?{
	~А. А. Лимберг
	~Ю. К. Шимановский
	=О.П.Чудаков
	~В. П. Филатов
}

// question: 4138065 name: Какой из отечественных хирургов предложил пластику встречными треугольными ...
::Какой из отечественных хирургов предложил пластику встречными треугольными ...::[html]Какой из отечественных хирургов предложил пластику встречными треугольными лоскутами?{
	~Ю. К. Шимановский
	~Ю. И. Бернадский
	=А. А. Лимберг
	~Н. М. Александров
}

// question: 4137447 name: Какой инструмент применяется для защиты нижнечелюстного нерва?
::Какой инструмент применяется для защиты нижнечелюстного нерва?::[html]Какой инструмент применяется для защиты нижнечелюстного нерва?{
	=Ретрактор Obwegeser для защиты нижнечелюстного нерва
	~Ретрактор Буяльского для защиты нижнечелюстного нерва
	~Ретрактор Сукачева для защиты нижнечелюстного нерва
	~Все ответы неверны
}

// question: 4137481 name: Какой процент аномалии прикуса, требующей хирургической коррекции, ...
::Какой процент аномалии прикуса, требующей хирургической коррекции, ...::[html]Какой процент аномалии прикуса, требующей хирургической коррекции, наблюдается у взрослых по данным Сукачева В.А. (1984)\:{
	~2,0%
	~13,5%
	~27,6%
	=4,45%
}

// question: 4137482 name: Какой процент рецидивов был отмечен при исследовании результатов остеотомии ...
::Какой процент рецидивов был отмечен при исследовании результатов остеотомии ...::[html]Какой процент рецидивов был отмечен при исследовании результатов остеотомии по Kole\:{
	~31,8%
	~11,5%
	~15,6%
	=32,0%
}

// question: 4138069 name: Какой раздел пластической хирургии включает «перестройку» органов и ...
::Какой раздел пластической хирургии включает «перестройку» органов и ...::[html]Какой раздел пластической хирургии включает «перестройку» органов и функциональных систем челюстно-лицевой области, созданных природой?{
	~восстановительная
	=реконструктивная
	~эстетическая
	~травматология
}

// question: 4137457 name: Какой этап включает в себя предхирургическая подготовка в ортогнатической ...
::Какой этап включает в себя предхирургическая подготовка в ортогнатической ...::[html]Какой этап включает в себя предхирургическая подготовка в ортогнатической хирургии\:{
	=ортодонтическая подготовка
	~остеотомия верхней и нижней челюстей
	~все ответы верны
}

// question: 4137424 name: Ксенотрансплантат – материал, взятый у:
::Ксенотрансплантат – материал, взятый у\:::[html]Ксенотрансплантат – материал, взятый у\:{
	~пациента
	~животного
	~другого индивида
	=однояйцевого близнеца
}

// question: 4137440 name: Кто провел первую ортогнатическую операцию?

::Кто провел первую ортогнатическую операцию?::[html]Кто провел первую ортогнатическую операцию?{
	=S.G. Hullian
	~А.А. Кулаков
	~Э.А. Рауэр
	~H. Obwegeser
}

// question: 4138067 name: Кто является автором труда «Операции на поверхности человеческого тела» по ...
::Кто является автором труда «Операции на поверхности человеческого тела» по ...::[html]Кто является автором труда «Операции на поверхности человеческого тела» по пластической хирургии?{
	~А. А. Лимберг
	~В. П. Филатов
	=Ю. К. Шимановский
	~Н. М. Александров
}

// question: 4137497 name: Лечение костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в:
::Лечение костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в\:::[html]Лечение костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в\:{
	=Артропластике
	~Остеотомии нижней челюсти
	~Редрессации
	~Динамическом наблюдении
}

// question: 4137496 name: Лечение фиброзного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в:
::Лечение фиброзного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в\:::[html]Лечение фиброзного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава заключается в\:{
	=Редрессации
	~Остеотомии нижней челюсти
	~Физиотерапии
	~Динамическом наблюдении
}

// question: 4137418 name: Лучшим костно-пластическим материалом является кость:

::Лучшим костно-пластическим материалом является кость\:::[html]Лучшим костно-пластическим материалом является кость\:{
	=Аутогенная губчатая
	~Аллогенная кортикальная
	~Депротеинизированная
	~Ксеногенная
}

// question: 4137416 name: Местное осложнение после формирования филатовского стебля:
::Местное осложнение после формирования филатовского стебля\:::[html]Местное осложнение после формирования филатовского стебля\:{
	=Гематома
	~Отёк
	~Парестезия
	~Гиперпигментация
}

// question: 4137417 name: Местным ранним осложнением свободной пересадки кожи является:
::Местным ранним осложнением свободной пересадки кожи является\:::[html]Местным ранним осложнением свободной пересадки кожи является\:{
	=Некроз лоскута
	~Гиперпигментация
	~Рубцовая трансформация
	~Остеонекроз
}

// question: 4137412 name: Наиболее простой вид пластики местными тканями:
::Наиболее простой вид пластики местными тканями\:::[html]Наиболее простой вид пластики местными тканями\:{
	=Мобилизация краев раны
	~Лоскутами на ножке
	~Треугольными лоскутами
	~Пересадка свободной кожи
}

// question: 4137494 name: Нестойкая контрактура нижней челюсти обусловлена:
::Нестойкая контрактура нижней челюсти обусловлена\:::[html]Нестойкая контрактура нижней челюсти обусловлена\:{
	~наличием рубцов в околочелюстных тканях
	~параличом мимической мускулатуры

=ослаблением жевательных мышц
~применением ботулотоксина
}

// question: 4137426 name: Нижняя треть лица у больных с нижней макрогнатией:
::Нижняя треть лица у больных с нижней макрогнатией\:::[html]Нижняя треть лица у больных с нижней макрогнатией\:{
=Увеличена
~Уплощена
~Уменьшена
~Несимметрична
}

// question: 4137427 name: Нижняя треть лица у больных с нижней микрогнатией:
::Нижняя треть лица у больных с нижней микрогнатией\:::[html]Нижняя треть лица у больных с нижней микрогнатией\:{
~Увеличена
~Уплощена
=Уменьшена
~Несимметрична
}

// question: 4137432 name: Основной жалобой при нижней макрогнатии является:
::Основной жалобой при нижней макрогнатии является\:::[html]Основной жалобой при нижней макрогнатии является\:{
=Затрудненное откусывание пищи
~Увеличение языка
~Затрудненное дыхание
~Болезненное глотание
}

// question: 4137495 name: Основной метод лечения больных с костным анкилозом:
::Основной метод лечения больных с костным анкилозом\:::[html]Основной метод лечения больных с костным анкилозом\:{
=Хирургический
~Физиотерапия
~Консервативный
~Ортопедический
}

// question: 4137498 name: Основным методом лечения контрактуры нижней челюсти является:

::Основным методом лечения контрактуры нижней челюсти является\:::[html]Основным методом лечения контрактуры нижней челюсти является\:{
	~Редрессация
	~Остеотомия нижней челюсти
	=Физиотерапия
	~Динамическое наблюдение
}

// question: 4138064 name: Основным показанием к проведению пластических восстановительных и ...
::Основным показанием к проведению пластических восстановительных и ...::[html]Основным показанием к проведению пластических восстановительных и реконструктивных операций в челюстно- лицевой области является\:{
	~наличие воспалительных заболеваний лица и шеи
	~наличие переломов костей лицевого скелета
	~наличие опухоли челюстно-лицевой области
	=наличие дефектов и деформаций лица и шеи
}

// question: 4137409 name: Пластику встречными треугольными лоскутами по Лимбергу используют при:
::Пластику встречными треугольными лоскутами по Лимбергу используют при\:::[html]Пластику встречными треугольными лоскутами по Лимбергу используют при\:{
	=Короткой уздечке языка
	~Атрофических рубцах
	~Обширных дефектах мягких тканей
	~Закрытии рецессий
}

// question: 4137411 name: Пластику встречными треугольными лоскутами по Лимбергу используют при:
::Пластику встречными треугольными лоскутами по Лимбергу используют при\:::[html]Пластику встречными треугольными лоскутами по Лимбергу используют при\:{
	=Рубцовых выворотах век
	~Атрофических рубцах
	~Обширных дефектах мягких тканей
	~Закрытии рецессий
}

// question: 4137464 name: По классификации Энгля выделяют:
::По классификации Энгля выделяют\:::[html]По классификации Энгля выделяют\:{

~1 класс, 2 подкласса
=3 класса, 2 подкласса
~3 класса
~2 класса
}

// question: 4138073 name: Поздним клиническим симптомом родовой травмы может быть:
::Поздним клиническим симптомом родовой травмы может быть\:::[html]Поздним клиническим симптомом родовой травмы может быть\:{
=Недоразвитие нижней челюсти
~Рубец на коже лица
~Ринолалия
~Короткая уздечка языка
}

// question: 4137491 name: При развитии в детстве костного анкилоза ВНЧС деформация нижней челюсти ...
::При развитии в детстве костного анкилоза ВНЧС деформация нижней челюсти ...::[html]При развитии в детстве костного анкилоза ВНЧС деформация нижней челюсти начинает проявляться\:{
=С началом интенсивного роста костей лица
~Через 6 месяцев от начала заболевания
~Через один год после начала заболевания
~С достижением совершеннолетия
}

// question: 4137470 name: Противопоказания к ортогнатической операции:
::Противопоказания к ортогнатической операции\:::[html]Противопоказания к ортогнатической операции\:{
~ретенция, дистопия третьих моляров
=возраст пациента до 18 лет
~наличие ортопедических конструкций в полости рта
~Все ответы верны
}

// question: 4137425 name: расчёт смещения челюстей при проведении ортогнатических операций ведут по:
::расчёт смещения челюстей при проведении ортогнатических операций ведут по\:::[html]расчёт смещения челюстей при проведении ортогнатических операций ведут по\:{
=ТРГ
~ОПТГ

~КТ
~Все ответы верны
}

// question: 4137490 name: Рентгенологическая картина костного анкилоза ВНЧС:
::Рентгенологическая картина костного анкилоза ВНЧС\:::[html]Рентгенологическая картина костного анкилоза ВНЧС\:{
=Костный конгломерат
~Расширение суставной щели
~Прерывистая суставная щель
~Все ответы верны
}

// question: 4137486 name: Симптомом двустороннего костного анкилоза ВНЧС является:
::Симптомом двустороннего костного анкилоза ВНЧС является\:::[html]Симптомом двустороннего костного анкилоза ВНЧС является\:{
=Полное отсутствие движений нижней челюсти
~Тугоподвижность по утрам
~Гипертрофия жевательных мышц на больной стороне
~Смещение нижней челюсти в здоровую сторону
}

// question: 4137460 name: Сколько хирургических шаблонов используется при оперативном вмешательстве в ...
::Сколько хирургических шаблонов используется при оперативном вмешательстве в ...::[html]Сколько хирургических шаблонов используется при оперативном вмешательстве в объеме «Остеотомия верхней челюсти на уровне Ле-Фор 1 моноблоком, двусторонняя сагиттальная остеотомия нижней челюсти»\:{
~один
=два
~три
~четыре
}

// question: 4137461 name: Сколько хирургических шаблонов используется при оперативном вмешательстве в ...
::Сколько хирургических шаблонов используется при оперативном вмешательстве в ...::[html]Сколько хирургических шаблонов используется при оперативном вмешательстве в объеме «Остеотомия верхней челюсти на уровне Ле-Фор 1 с фрагментацией, двусторонняя сагиттальная остеотомия нижней челюсти»\:{
=один
~два

~три
~четыре
}

// question: 4137428 name: Средняя треть лица у больных с верхней микрогнатией:
::Средняя треть лица у больных с верхней микрогнатией\:::[html]Средняя треть лица у больных с верхней микрогнатией\:{
~Увеличена
~Уплощена
=Уменьшена
~Несимметрична
}

// question: 4137429 name: Средняя треть лица у больных с верхней ретрогнатией:
::Средняя треть лица у больных с верхней ретрогнатией\:::[html]Средняя треть лица у больных с верхней ретрогнатией\:{
~Увеличена
=Уплощена
~Уменьшена
~Несимметрична
}

// question: 4137419 name: Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены:
::Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены\:::[html]Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены\:{
=Завершением формирования рубцов
~восстановлением иннервации
~степенью восстановления функции челюстей
~началом формирования сосудов
}

// question: 4137493 name: Стойкая контрактура нижней челюсти обусловлена:
::Стойкая контрактура нижней челюсти обусловлена\:::[html]Стойкая контрактура нижней челюсти обусловлена\:{
=наличием рубцов в околочелюстных тканях
~параличом мимической мускулатуры
~ослаблением жевательных мышц
~применением ботулотоксина
}

// question: 4137414 name: Филатовский стебель, одномоментно формируемый и подшиваемый к месту дефекта, ...
::Филатовский стебель, одномоментно формируемый и подшиваемый к месту дефекта, ...::[html]Филатовский стебель, одномоментно формируемый и подшиваемый к месту дефекта, называется\:{
	=Острым
	~Шагающим
	~Ускоренным
	~Классическим
}

// question: 4137415 name: Филатовский стебель, одномоментно формируемый и подшиваемый на предплечье, ...
::Филатовский стебель, одномоментно формируемый и подшиваемый на предплечье, ...::[html]Филатовский стебель, одномоментно формируемый и подшиваемый на предплечье, называется\:{
	~Острым
	~Шагающим
	=Ускоренным
	~Классическим
}

// question: 4137410 name: Филатовский стебель, формируемый и поэтапно переносимый к месту дефекта, ...
::Филатовский стебель, формируемый и поэтапно переносимый к месту дефекта, ...::[html]Филатовский стебель, формируемый и поэтапно переносимый к месту дефекта, называется\:{
	=Классическим
	~Острым
	~Шагающим
	~Ускоренным
}

// question: 4137468 name: Что включает в себя этап компьютерного моделирования:
::Что включает в себя этап компьютерного моделирования\:::[html]Что включает в себя этап компьютерного моделирования\:{
	=оцифровка рентгенологических снимков по ортодонтическим точкам
	~фотодокументирование пациента
	~проведение компьютерной томографии
	~создание ортогнатических сплинтов
}

// question: 4137467 name: Что включает в себя этап модельной хирургии:

::Что включает в себя этап модельной хирургии\:::[html]Что включает в себя этап модельной хирургии\:{
	=проведение перемещения челюстей в соответствии с полученными параметрами при компьютерном планировании с точностью до 0,2 мм
	~рентгенологическое обследование
	~компьютерное моделирование
	~оцифровка ТРГ по точкам
}

// question: 4137434 name: Что входит в первый этап ортогнатической операции?
::Что входит в первый этап ортогнатической операции?::[html]Что входит в первый этап ортогнатической операции?{
	=Лабораторное планирование и 3D моделирование операции
	~Двухстороняя сагиттальная остеотомия нижней челюсти
	~Послеоперационное ортодонтическое ведение
	~Остеотомия верхней челюсти на уровне Ле-Фор I моноблоком
}

// question: 4137451 name: Что входит во второй этап ортогнатического лечения?
::Что входит во второй этап ортогнатического лечения?::[html]Что входит во второй этап ортогнатического лечения?{
	=Оперативное лечение
	~Лабораторное планирование и 3D моделирование.
	~Ортодонтическая подготовка в двучелюстной операции – постановка зубов верхней и нижней челюсти в правильное положение, создание промежутков для фрагментации.
	~Все ответы верны
}

// question: 4138070 name: Что относится к местным противопоказаниям для проведения пластических ...
::Что относится к местным противопоказаниям для проведения пластических ...::[html]Что относится к местным противопоказаниям для проведения пластических операций в челюстно-лицевой области?{
	~травматический неврит подглазничного нерва
	=острый лимфаденит регионарного лимфоузла
	~артроз височно-нижнечелюстного сустава
	~хронический атрофический ринит
}

// question: 4137459 name: Что помимо предоперационного обследования, дополнительных методов ...

::Что помимо предоперационного обследования, дополнительных методов ...::[html]Что помимо предоперационного обследования, дополнительных методов обследования, планирования оперативного вмешательства и непосредственно ортодонтического лечения необходимо проводить пациентам?{
	=Фотопротоколирование на всех этапах лечения (абсолютно всем пациентам)
	~Консультация эндокринолога (абсолютно всем пациентам)
	~Анализ крови на онкомаркеры (абсолютно всем пациентам)
	~Одонтопародонтограмма по Курляндскому (абсолютно всем пациентам)
}

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021/ВНЧС
$CATEGORY: $course$/top/2021/ВНЧС

// question: 4137764 name: «Золотым стандартом» диагностики внутренних нарушений ВНЧС является:
::«Золотым стандартом» диагностики внутренних нарушений ВНЧС является\:::[html]«Золотым стандартом» диагностики внутренних нарушений ВНЧС является\:{
	=МРТ
	~КТ
	~УЗИ
	~ТРГ
}

// question: 4137776 name: Анкилоз ВНЧС это:
::Анкилоз ВНЧС это\:::[html]Анкилоз ВНЧС это\:{
	=Стойкое сведение челюстей, характеризующееся значительным ограничением или полным отсутствием движений в ВНЧС
	~Стойкий болевой синдром, характеризующийся богатой иррадиацией болей
	~Длительно существующий подвывих головки нижней челюсти
	~Длительно существующие «заклинивание челюстей», характеризубшееся суставными шумами
}

// question: 4137791 name: Биламинарная зона располагается:
::Биламинарная зона располагается\:::[html]Биламинарная зона располагается\:{
	=От суставного диска кзади
	~От суставного диска кпереди
	~По бокам от суставного диска
	~Сверху от суставного диска
}

// question: 4137813 name: Болевой синдром ВНЧС является клиническим признаком
::Болевой синдром ВНЧС является клиническим признаком::[html]Болевой синдром ВНЧС является клиническим признаком{
	~Врожденной аплазии мыщелкого отростка
	~Вторичного деформирующего остеоартроза
	~Костного анкилоза ВНЧС
	=Хронического артрита на фоне привычного вывиха
}

// question: 4137751 name: Болевой синдром ВНЧС возникает вследствие:
::Болевой синдром ВНЧС возникает вследствие\:::[html]Болевой синдром ВНЧС возникает вследствие\:{
	=Сдавления сосудисто-нервного пучка биламинарной зоны
	~Анкилоза ВНЧС
	~Избыточного «трения» двух суставных поверхностей
	~Неправильного прикуса
}

// question: 4137803 name: Большие пальцы рук при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливаются:
::Большие пальцы рук при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливаются\:::[html]Большие пальцы рук при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливаются\:{
	~На углы нижней челюсти
	~На фронтальную группу зубов
	~На подбородок
	=На правые и левые моляры нижней челюсти
}

// question: 4137753 name: Бруксизм – заболевание, характеризующееся:
::Бруксизм – заболевание, характеризующееся\:::[html]Бруксизм – заболевание, характеризующееся\:{
	~Постоянными щелчками и хрустами в ВНЧС
	~Ограничением открывания рта
	=Гипертонусом жевательной мускулатуры
	~Болевым синдромом ВНЧС
}

// question: 4137814 name: В каком возрасте суставной бугорок отсутствует:
::В каком возрасте суставной бугорок отсутствует\:::[html]В каком возрасте суставной бугорок отсутствует\:{
	~До 10 летнего возраста
	~До 2 летнего возраста

~До 5 летнего возраста
=У новорожденных
}

// question: 4137789 name: В норме при аускультации ВНЧС определяется:
::В норме при аускультации ВНЧС определяется\:::[html]В норме при аускультации ВНЧС определяется\:{
~Щелчок
=Не определятся никаких звуковых явлений
~Хруст
~Крепитация
}

// question: 4137790 name: В норме суставной диск имеет форму:
::В норме суставной диск имеет форму\:::[html]В норме суставной диск имеет форму\:{
~Двояковыпуклую
~Круглую
~Плоскую
=Двояковогнутую
}

// question: 4137777 name: В пожилом возрасте высота суставного бугорка:
::В пожилом возрасте высота суставного бугорка\:::[html]В пожилом возрасте высота суставного бугорка\:{
=Снижается
~Не меняется
~Увеличивается
~Немного увеличивается
}

// question: 4137788 name: Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является:
::Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является\:::[html]Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является\:{
~Суставной шум
~Периодонтит зубов
~Болевой синдром
=Ограничение открывания рта
}

// question: 4137759 name: Внутренние нарушения ВНЧС необходимо дифференцировать:

::Внутренние нарушения ВНЧС необходимо дифференцировать\:::[html]Внутренние нарушения ВНЧС необходимо дифференцировать\:{
~С кариесом, пульпитом, периодонтитом зубов
~С офтальмологическими заболеваниями
=С неврологическими заболеваниями
~С заболеваниями иммунной системы
}

// question: 4137782 name: Возраст начала ювенильного артрита:
::Возраст начала ювенильного артрита\:::[html]Возраст начала ювенильного артрита\:{
~Моложе 14 лет
~Моложе 14 лет
=Моложе 16 лет
~Моложе 18 лет
}

// question: 4137802 name: Вправление вывиха нижней челюсти производится:
::Вправление вывиха нижней челюсти производится\:::[html]Вправление вывиха нижней челюсти производится\:{
~Лежа
=Сидя
~Стоя
}

// question: 4137769 name: Вследствие чего возникает щелчок в ВНЧС:
::Вследствие чего возникает щелчок в ВНЧС\:::[html]Вследствие чего возникает щелчок в ВНЧС\:{
~Долгого болевого синдрома
=Движении нижней челюсти кпереди, кзади, при боковых движениях
~Только при движениях нижней челюсти кпереди и кзади
~Только при боковых движениях нижней челюсти
}

// question: 4137771 name: Вторичный деформирующий остеоартроз лечится путем:
::Вторичный деформирующий остеоартроз лечится путем\:::[html]Вторичный деформирующий остеоартроз лечится путем\:{
~Шинотерапия, физиотерапия
~Остеотомия по Ле-Фор 1
=Остеотомия ветвей нижней челюсти с одномоментной костной пластикой
~Остеотомия верхней челюсти по Ле-Фор 1 и остеотомия ветвей нижней челюсти с одномоментной костной пластикой
}

// question: 4137774 name: Девиация нижней челюсти характерна для:
::Девиация нижней челюсти характерна для\:::[html]Девиация нижней челюсти характерна для\:{
	~Болевого синдрома ВНЧС
	~Смещения суставного диска кпереди
	=Смещения суставного диска кнутри
	~Анкилоза
}

// question: 4137815 name: Для обозначения мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава ...
::Для обозначения мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава ...::[html]Для обозначения мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава применяются термин\:{
	~Анкилоз
	~Артроз
	=Синдром Костена
	~синдром Робена
}

// question: 4137765 name: Значительным преимуществом МРТ ВНЧС перед другими исследованиями является:
::Значительным преимуществом МРТ ВНЧС перед другими исследованиями является\:::[html]Значительным преимуществом МРТ ВНЧС перед другими исследованиями является\:{
	~Четкая визуализация структуры суставного диска
	~Возможность оценить неровность суставной поверхности мыщелкового отростка нижней челюсти
	=Четкая визуализация смещения суставного диска в боковые положения
	~Возможность оценить наличие повышения уровня синовиальной жидкости
}

// question: 4137775 name: Избирательное пришлифовывание проводится с целью:
::Избирательное пришлифовывание проводится с целью\:::[html]Избирательное пришлифовывание проводится с целью\:{
	~Достижения плавности движения нижней челюсти при открывании и закрывании
	=Нормализации функциональной окклюзии
	~Снижения окклюзионной высоты
	~Устранения острых краев зубов
}

// question: 4137760 name: К комплексному лечению артрита ВНЧС не относится:
::К комплексному лечению артрита ВНЧС не относится\:::[html]К комплексному лечению артрита ВНЧС не относится\:{
	=Санация полости рта
	~Физиотерапия
	~Местная противовоспалительная терапия
	~Новокаиновые блокады
}

// question: 4137778 name: К первично-костным повреждениям ВНЧС относятся:
::К первично-костным повреждениям ВНЧС относятся\:::[html]К первично-костным повреждениям ВНЧС относятся\:{
	~Артриты
	~Деформирующий юношеский артроз
	=Неоартроз
	~Привычный подвывих
}

// question: 4137785 name: К поверхностным мышцам шеи относятся:
::К поверхностным мышцам шеи относятся\:::[html]К поверхностным мышцам шеи относятся\:{
	~Лестничные мышцы
	~Длинная мышца шеи
	=Подкожная мышца шеи
	~Прямые мышцы головы
}

// question: 4137763 name: К смещению суставного диска ВНЧС кпереди приводит:
::К смещению суставного диска ВНЧС кпереди приводит\:::[html]К смещению суставного диска ВНЧС кпереди приводит\:{
	=Потеря жевательных зубов
	~Сильное психо-эмоциональное потрясение
	~Кариес и пульпит жевательных зубов
	~Физиотерапия
}

// question: 4137783 name: Какие препараты не применяются для лечения остеопороза:
::Какие препараты не применяются для лечения остеопороза\:::[html]Какие препараты не применяются для лечения остеопороза\:{
	~Бифосфонаты
	=Хондропротекторы
	~Препараты кальция

~Витамины группы Д
}

// question: 4137780 name: Какие рентгенологические изменения характерны для ревматоидного артрита:
::Какие рентгенологические изменения характерны для ревматоидного артрита\:::[html]Какие рентгенологические изменения характерны для ревматоидного артрита\:{
~Остеофиты
=Эрозии суставных поверхностей
~Остеосклероз
~Околосуставной остеопороз
}

// question: 4137784 name: Какие симптомы характеры для ревматоидного артрита при поражении ВНЧС:
::Какие симптомы характеры для ревматоидного артрита при поражении ВНЧС\:::[html]Какие симптомы характеры для ревматоидного артрита при поражении ВНЧС\:{
~Болевой синдром
=Скованность движений нижней челюсти
~Гипермобильность головки нижней челюсти
~Контрактура нижней челюсти
}

// question: 4137816 name: Какой слой суставной капсулы вырабатывает синовиальную жидкость:
::Какой слой суставной капсулы вырабатывает синовиальную жидкость\:::[html]Какой слой суставной капсулы вырабатывает синовиальную жидкость\:{
~Наружный
=Внутренний
~Сосудистая оболочка
~Наружный и внутренний
}

// question: 4137817 name: Каменисто-барабанная щель делит нижнечелюстную ямку на две части:
::Каменисто-барабанная щель делит нижнечелюстную ямку на две части\:::[html]Каменисто-барабанная щель делит нижнечелюстную ямку на две части\:{
~Верхнюю и нижнюю
=Переднюю и заднюю
~Внутреннюю и наружную
~Правую и левую

}

// question: 4137796 name: Контрактура это:
::Контрактура это\:::[html]Контрактура это\:{
	~Суставной шум
	=Стойкое ограничение движения в суставе
	~Стойкое отсутствие любых движений в суставе
	~Девиация нижней челюсти
}

// question: 4137757 name: Лечение болевого синдрома включает в себя:
::Лечение болевого синдрома включает в себя\:::[html]Лечение болевого синдрома включает в себя\:{
	~Исправление прикуса
	~Удаление зубов мудрости
	=Местная противовоспалительная терапия на область сустава
	~Шапочка Гиппократа
}

// question: 4137811 name: Лечение при вывихе нижней челюсти заключается:
::Лечение при вывихе нижней челюсти заключается\:::[html]Лечение при вывихе нижней челюсти заключается\:{
	~В иммобилизации
	~В прошивании суставной капсулы
	~В резекции суставного бугорка
	=Во введении суставной головки в суставную впадину
}

// question: 4137754 name: Мышцы поднимающие нижнюю челюсть:
::Мышцы поднимающие нижнюю челюсть\:::[html]Мышцы поднимающие нижнюю челюсть\:{
	=Жевательная, височная, медиально-крыловидная
	~Жевательная, височная, латерально-крыловидная
	~Жевательная, височная, переднее брюшко двубрюшной мыщцы
	~Жевательная, височная, заднее брюшко двубрюшной мыщцы
}

// question: 4137755 name: Мышцы, опускающие нижнюю челюсть:
::Мышцы, опускающие нижнюю челюсть\:::[html]Мышцы, опускающие нижнюю челюсть\:{
	=Переднее брюшко двубрюшной мыщцы, подпородочно-подъязычная, челюстно-подъязычная

~Заднее брюшко двубрюшной мыщцы, подпородочно-подъязычная, челюстно-подъязычная
~Переднее и заднее брюшко двубрюшной мыщцы, подпородочно-подъязычная, челюстно-подъязычная
~Медиально-крыловидная мышца, подпородочно-подъязычная, челюстно-подъязычная
}

// question: 4137826 name: Наиболее часто внутренние нарушения ВНЧС сочетаются с:
::Наиболее часто внутренние нарушения ВНЧС сочетаются с\:::[html]Наиболее часто внутренние нарушения ВНЧС сочетаются с\:{
~Кариозными поражениям зубов
~Некариозными поражениями зубов
=Невралгическими заболеваниями
~Инфекционными заболеваниями
}

// question: 4137779 name: Неоартроз возникает вследствие:
::Неоартроз возникает вследствие\:::[html]Неоартроз возникает вследствие\:{
~Перикоронарита
~Болевой дисфункции ВНЧС
~Нарушения прикуса
=Травмы
}

// question: 4137794 name: Норма открывания рта составляет:
::Норма открывания рта составляет\:::[html]Норма открывания рта составляет\:{
~2,5-3 см
~3-3,5 см
=4 – 4,3 см
~4,5-5 см
}

// question: 4137793 name: Нормальный показатель движения суставной головки при открывании нижней ...
::Нормальный показатель движения суставной головки при открывании нижней ...::[html]Нормальный показатель движения суставной головки при открывании нижней челюсти составляет\:{
~10 мм
=15 мм
~20 мм
~5 мм
}

// question: 4137801 name: Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти:
::Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти\:::[html]Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти\:{
	=Местное
	~Медикаментозная седация
	~Стволовая анестезия
	~Общее обезболивание
}

// question: 4137810 name: Основной причиной вывихов нижней челюсти является:
::Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:::[html]Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:{
	~Артрит ВНЧС
	~Нижняя макрогнатия
	=Слабости суставной капсулы и связочного аппарата ВНЧС
	~Снижение высоты прикуса
}

// question: 4137809 name: Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является:
::Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является\:::[html]Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является\:{
	~Мастоидит
	~Опухоль
	=Остеомиелит нижней челюсти
	~Целлюлит околоушно-жевательной области
}

// question: 4137766 name: Основные принципы лечения переднего смещения суставного диска ВНЧС:
::Основные принципы лечения переднего смещения суставного диска ВНЧС\:::[html]Основные принципы лечения переднего смещения суставного диска ВНЧС\:{
	~Шинотерапия, физиотерапия
	~Шинотерапия, пращевидная повязка
	~Механотерапия, санация полости рта
	=Шинотерапия, артропункции
}

// question: 4137768 name: Основные симптомы смещения суставного диска:
::Основные симптомы смещения суставного диска\:::[html]Основные симптомы смещения суставного диска\:{

~Изменения прикуса, наличие суставных шумов
~Наличие суставных шумов, ограничение открывания рта
=Ограничение открывания рта, суставные шумы, девиация нижней челюсти
~Наличие кариозных зубов в полости рта, девиация нижней челюсти
}

// question: 4137829 name: ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С
::ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С::[html]ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С{
=острым отитом
~острым гайморитом
~околоушным гипергидрозом
~переломом верхней челюсти
}

// question: 4137770 name: Первичным костным повреждением и заболеваниями ВНЧС является:
::Первичным костным повреждением и заболеваниями ВНЧС является\:::[html]Первичным костным повреждением и заболеваниями ВНЧС является\:{
=Остеоартрит
~Привычный вывих
~Деформирующий юношеский остеоартроз
~Болевой синдром
}

// question: 4137762 name: Перерастяжение внутрисуставного связочного аппарата чаще всего развивается ...
::Перерастяжение внутрисуставного связочного аппарата чаще всего развивается ...::[html]Перерастяжение внутрисуставного связочного аппарата чаще всего развивается вследствие\:{
~Длительного болевого синдрома
~Постоянно имеющегося суставного шума
=Длительного пребывания пациента с открытым ртом
~Перекоронарита
}

// question: 4137758 name: Показанием к удалению зуба мудрости не является:
::Показанием к удалению зуба мудрости не является\:::[html]Показанием к удалению зуба мудрости не является\:{
~Ортодонтические показания
~Кариес корня второго моляра
=Артроз ВНЧС

~Перекоронит
}

// question: 4137812 name: Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти:
::Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти\:::[html]Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти\:{
~При привычном вывихе
~При выраженной гиперсаливации
~При подозрении на тромбофлебит угловой вены
=При рефлекторной контрактуре жевательных мышц
}

// question: 4137752 name: Предпосылки болевого синдрома ВНЧС:
::Предпосылки болевого синдрома ВНЧС\:::[html]Предпосылки болевого синдрома ВНЧС\:{
~Неправильный прикус, нерациональное протезирование, перенесенный стресс, хронические заболевания
~Перенесенный стресс, нарушение психо-эмоциональной сферы, аллергические реакции
=Неправильный прикус, нерациональное протезирование, длительное пребывание пациента с открытым ртом
~Неправильныц прикус, нарушение психо-эмоциональной сферы, частичная вторичная адентия, плохая санация полости рта
}

// question: 4137792 name: Преимущество ультразвуковой диагностики перед магнитно-резонансной ...
::Преимущество ультразвуковой диагностики перед магнитно-резонансной ...::[html]Преимущество ультразвуковой диагностики перед магнитно-резонансной томографией ВНЧС\:{
~Быстрота выполнения исследования, четкая визуализация головки нижней челюсти
~Четкая визуализация наличия медиального или латерального смещения суставного диска
~Четкая визуализация наличия переднего и заднего смещения суставного диска
=Быстрота выполнения исследования
}

// question: 4137804 name: При вправлении вывиха нижней челюсти давление на моляры осуществляется в ...

::При вправлении вывиха нижней челюсти давление на моляры осуществляется в ...::[html]При вправлении вывиха нижней челюсти давление на моляры осуществляется в направлении\:{
	~Книзу, вбок, кверху
	=Книзу, назад, кверху
	~Кверху, вперед, книзу
	~Книзу, кзади, вбок
}

// question: 4137818 name: При каком прикусе наибольшая высота суставного бугорка:
::При каком прикусе наибольшая высота суставного бугорка\:::[html]При каком прикусе наибольшая высота суставного бугорка\:{
	=Ортогнатическом
	~Открытом
	~Глубоком
	~Мезиальной окклюзии
}

// question: 4137795 name: Применение компрессов с димексидом при болевом синдроме ВНЧС обусловлено:
::Применение компрессов с димексидом при болевом синдроме ВНЧС обусловлено\:::[html]Применение компрессов с димексидом при болевом синдроме ВНЧС обусловлено\:{
	~Фибринолитическим действием
	=Высокой проникающей способностью через кожные покровы и противовоспалительным эффектом
	~Жаропонижающим действием
	~Антибактериальным действием
}

// question: 4137827 name: Причина возникновения острого артрита ВНЧС:
::Причина возникновения острого артрита ВНЧС\:::[html]Причина возникновения острого артрита ВНЧС\:{
	~Кариозные поражения зубов
	~Некариозные поражения зубов
	=Травмы ЧЛО
	~Ретенция, дистопия ВНЧС
}

// question: 4137828 name: Причина возникновения хронического артрита ВНЧС:
::Причина возникновения хронического артрита ВНЧС\:::[html]Причина возникновения хронического артрита ВНЧС\:{
	~Травма ЧЛО

~Неправильный прикус
=Привычный подвывих суставного диска
~Вывих суставной головки нижней челюсти
}

// question: 4137773 name: Причиной асимметрии лица при вторичном деформирующем остеоартрозе ВНЧС с ...
::Причиной асимметрии лица при вторичном деформирующем остеоартрозе ВНЧС с ...::[html]Причиной асимметрии лица при вторичном деформирующем остеоартрозе ВНЧС с одной стороны является\:{
~Межмышечная гематома
=Недоразвитие половины нижней челюсти
~Недоразвитие всей нижней челюсти
~Парез лицевого нерва
}

// question: 4137806 name: Причиной обострения хроническго неспецифического артрита ВНЧС является:
::Причиной обострения хроническго неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной обострения хроническго неспецифического артрита ВНЧС является\:{
~Актиномикоз
~Околоушный гипергидроз
~Распространение инфекции из окружающих тканей
=Хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4137805 name: Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:
::Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:{
~Актиномикоз
=Острая травма
~Хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
~Околоушный гипергидроз
}

// question: 4137781 name: Причиной разрушения суставных поверхностей при ревматоидном артрите являются:
::Причиной разрушения суставных поверхностей при ревматоидном артрите являются\:::[html]Причиной разрушения суставных поверхностей при ревматоидном артрите являются\:{
~Первичное воспаление в тканях хряща

~Токсичный состав синовиальной жидкости
=Гипертрофированные ворсины синовии и наползающий на хрящ паннус
~Ревматоидные узелки
}

// question: 4137807 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
=Актиномикоз
~Ревматическая атака
~Хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
~Околоушный гипергидроз
}

// question: 4137808 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
=Туберкулез
~Ревматическая атака
~Хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
~Околоушный гипергидроз
}

// question: 4137786 name: Причиной специфического остеоартрита является:
::Причиной специфического остеоартрита является\:::[html]Причиной специфического остеоартрита является\:{
~Привычный подвывих мыщелкового отростка нижней челюсти
=Сифилис
~Родовая травма
~Медиальная дислокация суставного диска с полной репозицией
}

// question: 4137767 name: С какой целью назначается шинотерапия:
::С какой целью назначается шинотерапия\:::[html]С какой целью назначается шинотерапия\:{
=Увеличение расстояния между двумя суставными поверхностями
~Изменение прикуса
~Отбеливание зубов
~Уменьшение расстояния между двумя суставными поверхностями
}

// question: 4137800 name: С чем необходимо дифференцировать болевой синдром ВНЧС:
::С чем необходимо дифференцировать болевой синдром ВНЧС\:::[html]С чем необходимо дифференцировать болевой синдром ВНЧС\:{
	=Невритом лицевого нерва
	~Периоститом
	~Пульпитом
	~Пародонтозом
}

// question: 4137824 name: Симптом «хруста» в момент открывания рта имеет место при:
::Симптом «хруста» в момент открывания рта имеет место при\:::[html]Симптом «хруста» в момент открывания рта имеет место при\:{
	~Анкилозе ВНЧС
	~Остром артрите
	=Хроническом артрите
	~Привычном вывихе суставной головки
}

// question: 4137761 name: Смещение суставного диска ВНЧС бывает:
::Смещение суставного диска ВНЧС бывает\:::[html]Смещение суставного диска ВНЧС бывает\:{
	=Вентральное, медиальное, латеральное, дистальное
	~Вентральное, медиальное, латеральное
	~Вентральное, медиальное
	~Смещение суставного диска всегда только вентральное
}

// question: 4137823 name: Согласно классификации Вилкса 1 стадия представляет из себя:
::Согласно классификации Вилкса 1 стадия представляет из себя\:::[html]Согласно классификации Вилкса 1 стадия представляет из себя\:{
	~Самопроизвольные боли в области ВНЧС,- головные боли, ограничение движений нижней челюсти с периодически возникающим блокированием. Вентральная дислокация суставного диска вплоть до его пролапсА. Выраженные дегенеративные внутрисуставные изменения. Истончение дисталь- ного полюса суставного диска
	~Наличие периодически возникающего болезненного щелчкА. Головные боли. Возможны затруднения движений нижней челюсти. Наличие начальных стадий деформирующих изменений суставной головки и смещённого суставного диска
	=Наличие безболезненного щелчкА. Объём движений НЧ не ограничен. Признаки частичной вентральной дислокации суставного дискА.

~Крайне болезненная функция сочленения. Открывание рта блокировано смещённым суставным диском. Перфорация суставного дискА. Массивные деформации твёрдых тканей и суставного диска внутри сочленения. Выраженные артритические изменения
}

// question: 4137819 name: Согласно классификации Вилкса 2 стадия представляет из себя:
::Согласно классификации Вилкса 2 стадия представляет из себя\:::[html]Согласно классификации Вилкса 2 стадия представляет из себя\:{
~Самопроизвольные боли в области ВНЧС,- головные боли, ограничение движений нижней челюсти с периодически возникающим блокированием. Вентральная дислокация суставного диска вплоть до его пролапсА. Выраженные дегенеративные внутрисуставные изменения. Истончение дисталь- ного полюса суставного диска
=Наличие периодически возникающего болезненного щелчкА. Головные боли. Возможны затруднения движений нижней челюсти. Наличие начальных стадий деформирующих изменений суставной головки и смещённого суставного диска
~Боль приобретает хронический характер, сопровождается выраженным ограничением открывания ртА. Стадия 4 представляет собой более выраженные изменения 3-й стадии, сопровождающиеся явлениями деформации суставной головки, дегенеративными изменениями суставного диска и склеротическими внутрисуставными изменениями
~крайне болезненная функция сочленения. Открывание рта блокировано смещённым суставным диском. Перфорация суставного дискА. Массивные деформации твёрдых тканей и суставного диска внутри сочленения. Выраженные артритические изменения
}

// question: 4137822 name: Согласно классификации Вилкса 3 стадия представляет из себя:
::Согласно классификации Вилкса 3 стадия представляет из себя\:::[html]Согласно классификации Вилкса 3 стадия представляет из себя\:{
=Самопроизвольные боли в области ВНЧС,- головные боли, ограничение движений нижней челюсти с периодически возникающим блокированием. Вентральная дислокация суставного диска вплоть до его пролапсА. Выраженные дегенеративные внутрисуставные изменения. Истончение дисталь- ного полюса суставного диска
~Наличие периодически возникающего болезненного щелчкА. Головные боли. Возможны затруднения движений нижней челюсти. Наличие начальных стадий деформирующих изменений суставной головки и смещённого суставного диска
~Боль приобретает хронический характер, сопровождается выраженным ограничением открывания ртА. Стадия 4 представляет собой более выраженные изменения 3-й стадии, сопровождающиеся явлениями деформации суставной головки,

дегенеративными изменениями суставного диска и склеротическими внутрисуставными изменениями

~крайне болезненная функция сочленения. Открывание рта блокировано смещённым суставным диском. Перфорация суставного дискА. Массивные деформации твёрдых тканей и суставного диска внутри сочленения. Выраженные артритические изменения

}

// question: 4137821 name: Согласно классификации Вилкса 4 стадия представляет из себя:

::Согласно классификации Вилкса 4 стадия представляет из себя\:::[html]Согласно классификации Вилкса 4 стадия представляет из себя\:{

~Самопроизвольные боли в области ВНЧС,- головные боли, ограничение движений нижней челюсти с периодически возникающим блокированием. Вентральная дислокация суставного диска вплоть до его пролапсА. Выраженные дегенеративные внутрисуставные изменения. Истончение дисталь- ного полюса суставного диска

~Наличие периодически возникающего болезненного щелчкА. Головные боли. Возможны затруднения движений нижней челюсти. Наличие начальных стадий деформирующих изменений суставной головки и смещённого суставного диска

=Боль приобретает хронический характер, сопровождается выраженным ограничением открывания ртА. Стадия 4 представляет собой более выраженные изменения 3-й стадии, сопровождающиеся явлениями деформации суставной головки, дегенеративными изменениями суставного диска и склеротическими внутрисуставными изменениями

~крайне болезненная функция сочленения. Открывание рта блокировано смещённым суставным диском. Перфорация суставного дискА. Массивные деформации твёрдых тканей и суставного диска внутри сочленения. Выраженные артритические изменения

}

// question: 4137820 name: Согласно классификации Вилкса 5 стадия представляет из себя:

::Согласно классификации Вилкса 5 стадия представляет из себя\:::[html]Согласно классификации Вилкса 5 стадия представляет из себя\:{

~Самопроизвольные боли в области ВНЧС,- головные боли, ограничение движений нижней челюсти с периодически возникающим блокированием. Вентральная дислокация суставного диска вплоть до его пролапсА. Выраженные дегенеративные внутрисуставные изменения. Истончение дисталь- ного полюса суставного диска

~Наличие периодически возникающего болезненного щелчкА. Головные боли. Возможны затруднения движений нижней челюсти. Наличие начальных стадий деформирующих изменений суставной головки и смещённого суставного диска

~Боль приобретает хронический характер, сопровождается выраженным ограничением открывания ртА. Стадия 4 представляет собой более выраженные

изменения 3-й стадии, сопровождающиеся явлениями деформации суставной головки, дегенеративными изменениями суставного диска и склеротическими внутрисуставными изменениями
=крайне болезненная функция сочленения. Открывание рта блокировано смещённым суставным диском. Перфорация суставного дискА. Массивные деформации твёрдых тканей и суставного диска внутри сочленения. Выраженные артритические изменения
}

// question: 4137797 name: Сроки лечения переднего смещения суставного диска составляют:
::Сроки лечения переднего смещения суставного диска составляют\:::[html]Сроки лечения переднего смещения суставного диска составляют\:{
~3 месяца
~6 месяцев
~9 месяцев
=12 месяцев
}

// question: 4137772 name: Суставная щель на ОПТГ:
::Суставная щель на ОПТГ\:::[html]Суставная щель на ОПТГ\:{
~Представлена ровной линией
=Представлена неровной линией на всем своем протяжении
~Расширяется к заднему краю суставной головки
~Сужается к заднему краю суставной головки
}

// question: 4137798 name: Суставная ямка височной кости спереди ограничена:
::Суставная ямка височной кости спереди ограничена\:::[html]Суставная ямка височной кости спереди ограничена\:{
~Скуловым отростком
=Суставным бугорком
~Бугром верхней челюсти
~Верхним третьим моляром
}

// question: 4137756 name: Суставной диск делит полость ВНЧС на:
::Суставной диск делит полость ВНЧС на\:::[html]Суставной диск делит полость ВНЧС на\:{
=2 отдела
~3 отдела
~5 отделов
~Не делит суставную полость на отделы

}

// question: 4137750 name: Термин внутренние нарушения ВНЧС включает:
::Термин внутренние нарушения ВНЧС включает\:::[html]Термин внутренние нарушения ВНЧС включает\:{
	~Анкилозы ВНЧС
	~Анкилозы и артрозы ВНЧС
	~Только болевой синдром ВНЧС
	=Собирательный термин, включающий в себя все виды заболеваний ВНЧС
}

// question: 4137825 name: Физиотерапию на область ВНЧС назначают с целью:
::Физиотерапию на область ВНЧС назначают с целью\:::[html]Физиотерапию на область ВНЧС назначают с целью\:{
	=Уменьшить болевой синдром
	~Устранить подвывих суставного диска
	~Устранить анкилоз
	~Устранить остеоартроз
}

// question: 4137799 name: Физиотерапия на области ВНЧС показана при:
::Физиотерапия на области ВНЧС показана при\:::[html]Физиотерапия на области ВНЧС показана при\:{
	~Вторичном остеоартрозе
	~Вывихе нижней челюсти
	=Болевом синдроме
	~Подвывихе нижней челюсти
}

// question: 4137787 name: Форма анкилоза ВНЧС:
::Форма анкилоза ВНЧС\:::[html]Форма анкилоза ВНЧС\:{
	=Фиброзный
	~Атрофический
	~Гнойный
	~Катаральный
}

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021/Невропатия
$CATEGORY: $course$/top/2021/Невропатия

// question: 4137860 name: ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ:
::ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ\:::[html]ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ\:{
	~спазм мимической мускулатуры
	=Длительные парестезии
	~длительные ноющие боли
	~кратковременные парестезии
}

// question: 4137861 name: ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ:
::ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ\:::[html]ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ\:{
	~длительные парестезии
	~длительные ноющие боли
	~кратковременные парестезии
	=сильные кратковременные приступообразные боли
}

// question: 4137862 name: ПРИ НЕВРАЛГИИ I ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:
::ПРИ НЕВРАЛГИИ I ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ\:::[html]ПРИ НЕВРАЛГИИ I ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ\:{
	~в нижней трети лица
	~в средней трети лица
	~По всему лицу
	=в верхней трети лица
}

// question: 4137863 name: ПРИ НЕВРАЛГИИ II ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:
::ПРИ НЕВРАЛГИИ II ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ\:::[html]ПРИ НЕВРАЛГИИ II ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ\:{
	~в нижней трети лица
	=в средней трети лица
	~по всему лицу
	~в верхней трети лица
}

// question: 4137864 name: ПРИ НЕВРАЛГИИ III ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:
::ПРИ НЕВРАЛГИИ III ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ\:::[html]ПРИ НЕВРАЛГИИ III ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ\:{
	=в нижней трети лица
	~в средней трети лица
	~по всему лицу
	~в затылочной области
}

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/2021/Разное
$CATEGORY: $course$/top/2021/Разное

// question: 4152074 name: Воспалительный процесс при одонтогенном остеомиелите протекает в следующих ...
:: Воспалительный процесс при одонтогенном остеомиелите протекает в следующих ...::[html] Воспалительный процесс при одонтогенном остеомиелите протекает в следующих фазах\:{
	~Острая
	~Подострая
	~Хроническая
	~Рецидивирующая
	=Все ответы верны
}

// question: 4152433 name: Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...
:: Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...::[html] Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с сочетанными травмами зависит от\:{
	~Степени тяжести сочетанной травмы
	~Стабильности общего состояния и местного течения при сочетанных травмах
	=Все ответы верны
}

// question: 4152069 name: Какая стенка верхнечелюстной пазухи преимущественно поражается при ...
:: Какая стенка верхнечелюстной пазухи преимущественно поражается при ...::[html] Какая стенка верхнечелюстной пазухи преимущественно поражается при одонтогенном остеомиелите?\:{
	~ нижняя и медиальная

= нижняя и наружная
~ наружная и верхняя
~ наружная и медиальная
~ нижняя и верхняя.
}

// question: 4152114 name: Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается:
:: Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:::[html] Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:{
~В некоторых случаях в процесс может вовлекаться жевательная мышца
~Повышение местной температуры
~Ни один из вышеперечисленных симптомов не присутствуют.
=Все ответы верны
}

// question: 4152076 name: Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите ...
:: Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите ...::[html] Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите характеризуется\:{
~При пальпации определяется инфильтрат
~Слизистая оболочка полости рта отечна, гиперемирована
~Пальпация алвеолярных отростков болезненна с язычной и щечной сторон, определяется утолщение надкостницы
=Все ответы верны
}

// question: 4152070 name: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на:
:: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:::[html] При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:{
~Гиперсаливацию
=Тризм
~боль в области верхнечелюстных пазух
}

// question: 4152071 name: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на:
:: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:::[html] При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:{

~Гиперсаливацию
~боль в области верхнечелюстных пазух
=Свищи на коже и слизистой оболочке альвеолярного отростка
}

// question: 4152072 name: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на:
:: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:::[html] При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:{
~Гиперсаливацию
~боль в области верхнечелюстных пазух
=Утолщение надкостницы в области причинного зуба
}

// question: 4152073 name: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на:
:: При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:::[html] При диффузном остеомиелите нижней челюсти больной предъявляет жалобы на\:{
~Гиперсаливацию
~боль в области верхнечелюстных пазух
=Симптом Венсана положительный.
}

// question: 4151974 name: . ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЙОДОФОРМНЫМ ТАМПОНОМ КОНЕЦ ЕГО ВЫВОДИТСЯ ...
::. ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЙОДОФОРМНЫМ ТАМПОНОМ КОНЕЦ ЕГО ВЫВОДИТСЯ ...::[html]. ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЙОДОФОРМНЫМ ТАМПОНОМ КОНЕЦ ЕГО ВЫВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ{
=в области бугра верхней челюсти
~по переходной складке
~в скуловой области
~в области нижнего носового хода
}

// question: 4151898 name: "ТРУБОЧНЫМ" СТОЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ
::"ТРУБОЧНЫМ" СТОЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ::[html]"ТРУБОЧНЫМ" СТОЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ{
=протертое гомогенное питание
~диета при ксеростомии
~диета после резекции желудка
~диета при заболеваниях ЖКТ
}

// question: 4175126 name: «Золотой стандарт» хирургического метода лечения кист челюстей большого ...
::«Золотой стандарт» хирургического метода лечения кист челюстей большого ...::[html]«Золотой стандарт» хирургического метода лечения кист челюстей большого размера является\:{
	=Цистотомия
	~Цистэктомия
	~Склерозирование
	~Частичная резекция челюсти
	~Половинная резекция челюсти
}

// question: 4175125 name: «Золотой стандарт» хирургического метода лечения кист челюстей небольшого ...
::«Золотой стандарт» хирургического метода лечения кист челюстей небольшого ...::[html]«Золотой стандарт» хирургического метода лечения кист челюстей небольшого размера является\:{
	=Цистэктомия
	~Криодеструкция
	~Склерозирование
	~Частичная резекция челюсти
	~Половинная резекция челюсти
}

// question: 4175137 name: «Золотой стандарт» хирургического метода лечения неодонтогенных кист челюстей...
::«Золотой стандарт» хирургического метода лечения неодонтогенных кист челюстей...::[html]«Золотой стандарт» хирургического метода лечения неодонтогенных кист челюстей является\:{
	=Цистэктомия
	~Цистотомия
	~Склерозирование
	~Частичная резекция челюсти
	~Половинная резекция челюсти
}

// question: 4151713 name: «СИМПТОМ ВЕНСАНА» У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ...
::«СИМПТОМ ВЕНСАНА» У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ...::[html]«СИМПТОМ ВЕНСАНА» У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ{
	=подбородочного отдела

~тела нижней челюсти соответственно молярам
~угла нижней челюсти
~суставного отростка
}

// question: 4151824 name: НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПРИ
::НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПРИ::[html]НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПРИ{
=суббазальном переломе верхней челюсти
~отрыве альвеолярного отростка
~суборбитальном переломе верхней челюсти
~отрыв альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 4151793 name: НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=кровотечение
~пародонтит
~ОРВЗ
~потеря сознания
}

// question: 4151794 name: НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=шок
~ОРВЗ
~пародонтит
~потеря сознания
}

// question: 4174938 name: S-образными щипцами с шипом на одной из щечек удаляют:
::S-образными щипцами с шипом на одной из щечек удаляют\:::[html]S-образными щипцами с шипом на одной из щечек удаляют\:{
~корни зубов

=моляры верхней челюсти
~моляры нижней челюсти
~премоляры нижней челюсти
~клыки верхней челюсти
}

// question: 4151671 name: Абсолютным симптомом перелома верхней челюсти является:
::Абсолютным симптомом перелома верхней челюсти является\:::[html]Абсолютным симптомом перелома верхней челюсти является\:{
=Патологическая подвижность верхнечелюстных костей
~Нарушение целостности слизистой оболочки альвеолярного отростка
~боли в горле
~экзофтальм
}

// question: 4151693 name: АБСЦЕСС ОТГРАНИЧЕН МЕМБРАНОЙ
::АБСЦЕСС ОТГРАНИЧЕН МЕМБРАНОЙ::[html]АБСЦЕСС ОТГРАНИЧЕН МЕМБРАНОЙ{
=пиогенной
~базальной
~шнейдеровской
~полупроницаемой
}

// question: 4151754 name: АБСЦЕСС ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В
::АБСЦЕСС ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В::[html]АБСЦЕСС ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНОГО ЖЕЛОБКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В{
=клетчаточные пространства дна полости рта
~клетчаточное пространство поднижнечелюстного треугольника
~толщу языка
~зачелюстную ямку
}

// question: 4152101 name: Абсцесс это:
::Абсцесс это\:::[html]Абсцесс это\:{
~это разлитой процесс в костной ткани
~воспалительный разлитой процесс межмышечных и паренхиматозных органах
=гнойное локализованное, ограниченное воспаление
~воспалительный процесс тканей
~ни одно определение не подходит.
}

// question: 4152607 name: Аденокистозная карцинома слюнных желез метастазирует преимущественно:
::Аденокистозная карцинома слюнных желез метастазирует преимущественно\:::[html]Аденокистозная карцинома слюнных желез метастазирует преимущественно\:{
	=Лимфогенным путем
	~Гематогенным путем
	~Смешанным путем
	~Комплексно
	~Не дает метастазов
}

// question: 4175044 name: Аденома сальных желез кожи - это:
::Аденома сальных желез кожи - это\:::[html]Аденома сальных желез кожи - это\:{
	~доброкачественное новообразование, которое развивается из волосяных фолликулов и содержащее железистые кисты
	~доброкачественная опухоль волосяных фолликулов, состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов
	~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
	=доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
}

// question: 4152257 name: Аденофлегмона   это:
::Аденофлегмона   это\:::[html]Аденофлегмона   это\:{
	~ серозное воспаление лимфатического узла
	~ гнойное воспаление лимфатического узла
	~ серозная инфильтрация тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел
	=гнойное воспаление тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел.
	~ гнойное воспаление тканей, окружающих серозно воспаленный лимфатический узел.
}

// question: 4175096 name: Айсберг-опухолями называются плеоморфные аденомы локализующиеся в:
::Айсберг-опухолями называются плеоморфные аденомы локализующиеся в\:::[html]Айсберг-опухолями называются плеоморфные аденомы локализующиеся в\:{
	~Околоушной области
	=Позадичелюстной области

~Подбородочной области
~Области твердого неба
~Поднижнечелюстной области
}

// question: 4157664 name: Аллотрансплантатом называется материал, донором которого является:
::Аллотрансплантатом называется материал, донором которого является\:::[html]Аллотрансплантатом называется материал, донором которого является\:{
~Сам пациент
~Животное
=Другой пациент
~Трупный материал
}

// question: 4151672 name: Альтернативное название перелома верхней челюсти по Ле Фор 2:
::Альтернативное название перелома верхней челюсти по Ле Фор 2\:::[html]Альтернативное название перелома верхней челюсти по Ле Фор 2\:{
~Парасагиттальный
~Перелом Герена
~суббазальный
=суборбитальный
}

// question: 4151673 name: Альтернативное название перелома верхней челюсти по Ле Фор 3:
::Альтернативное название перелома верхней челюсти по Ле Фор 3\:::[html]Альтернативное название перелома верхней челюсти по Ле Фор 3\:{
~субальвеолярный
~Перелом Герена
=суббазальный
~суборбитальный
}

// question: 4152570 name: Амелобластома чаще встречается:
::Амелобластома чаще встречается\:::[html]Амелобластома чаще встречается\:{
~У мужчин
=У женщин
~Одинаково часто у мужчин и женщин
~У детей
~У стариков

}

// question: 4152051 name: Ампутация зуба   это:
::Ампутация зуба   это\:::[html]Ампутация зуба   это\:{
	~ удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью зуба
	= удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба
	~ пересадка удаленного зуба в его же альвеолу
	~ рассечение зуба на две части (применяется при лечении моляров) в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведением кюретажа и покрытием коронкой.
	~частичное удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба
}

// question: 4151891 name: АНАТОМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИИ
::АНАТОМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИИ::[html]АНАТОМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИИ{
	=смещение кзади
	~недоразвитие
	~без нарушений
	~чрезмерное развитие
}

// question: 4175037 name: Ангиофиброма кожи состоит из:
::Ангиофиброма кожи состоит из\:::[html]Ангиофиброма кожи состоит из\:{
	~веретенообразных клеток типа фибробластов или фиброцитов и большого количества коллагеновых волокон
	~волокнистой соединительной и жировой ткани
	=волокнистой соединительной и сосудистой ткани
	~коллагеновых волокон, фибробластов, фиброцитов и гистиоцитов
}

// question: 4151840 name: АСФИКСИЯ ОТ НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ВДЫХАНИЕМ ЖИДКОГО ...
::АСФИКСИЯ ОТ НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ВДЫХАНИЕМ ЖИДКОГО ...::[html]АСФИКСИЯ ОТ НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ВДЫХАНИЕМ ЖИДКОГО РАНЕВОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ РВОТНЫХ МАСС{
	=аспирационная
	~стенотическая
	~обтурационная
	~дислокационная
}

// question: 4151839 name: АСФИКСИЯ ОТ НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ СМЕЩЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕННЫМИ...
::АСФИКСИЯ ОТ НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ СМЕЩЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕННЫМИ...::[html]АСФИКСИЯ ОТ НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ СМЕЩЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕННЫМИ ОРГАНАМИ{
	=дислокационная
	~стенотическая
	~обтурационная
	~аспирационная
}

// question: 4151837 name: АСФИКСИЯ ОТ ЗАКУПОРКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ
::АСФИКСИЯ ОТ ЗАКУПОРКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ::[html]АСФИКСИЯ ОТ ЗАКУПОРКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ{
	=обтурационная
	~стенотическая
	~клапанная
	~аспирационная
}

// question: 4151838 name: АСФИКСИЯ ОТ СДАВЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ
::АСФИКСИЯ ОТ СДАВЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ::[html]АСФИКСИЯ ОТ СДАВЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ{
	=стенотическая
	~клапанная
	~обтурационная
	~аспирационная
}

// question: 4151841 name: АСФИКСИЯ ОТ ЧАСТИЧНОГО И ПЕРИОДИЧНОГО ЗАКРЫТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ...
::АСФИКСИЯ ОТ ЧАСТИЧНОГО И ПЕРИОДИЧНОГО ЗАКРЫТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ...::[html]АСФИКСИЯ ОТ ЧАСТИЧНОГО И ПЕРИОДИЧНОГО ЗАКРЫТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОВРЕЖДЕННЫМИ ТКАНЯМИ С ЗАТРУДНЕНИЕМ ВДОХА ИЛИ ВЫДОХА{
	=клапанная
	~стенотическая
	~обтурационная
	~аспирационная
}

// question: 4151968 name: АУТОТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ЧЕЛЮСТЕЙ БЕРУТ ИЗ
::АУТОТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ЧЕЛЮСТЕЙ БЕРУТ ИЗ::[html]АУТОТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ЧЕЛЮСТЕЙ БЕРУТ ИЗ{
	=гребешка подвздошной кости
	~костей стопы
	~бедренной кости
	~ключицы
}

// question: 4151988 name: АУТОТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЕРУТ ИЗ
::АУТОТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЕРУТ ИЗ::[html]АУТОТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЕРУТ ИЗ{
	=малой берцовой кости
	~бедренной кости
	~точка стопы
	~ключицы
}

// question: 4157663 name: Аутотрансплантатом называется материал, донором которого является:
::Аутотрансплантатом называется материал, донором которого является\:::[html]Аутотрансплантатом называется материал, донором которого является\:{
	=Сам пациент
	~Животное
	~Другой пациент
	~Трупный материал
}

// question: 4151711 name: БАЗАЛИОМА - ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ К
::БАЗАЛИОМА - ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ К::[html]БАЗАЛИОМА - ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ К{
	=злокачественным новообразованиям
	~доброкачественным новообразованиям
	~опухолеподобным заболеваниям
	~предраковым заболеваниям
}

// question: 4152536 name: Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования ...
::Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования ...::[html]Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования и выявления\:{
	=Злокачественных опухолей
	~Воспалительных процессов
	~Любой патологии в челюстно лицевой области
}

// question: 4152537 name: Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования ...
::Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования ...::[html]Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования и выявления\:{
	=Доброкачественных опухолей
	~Воспалительных процессов
	~Любой патологии в челюстно лицевой области
}

// question: 4152538 name: Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования ...
::Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования ...::[html]Биопсия проводится для получения материала для гистологического обследования и выявления\:{
	=Подозрительных патологических процессов
	~Воспалительных процессов
	~Любой патологии в челюстно лицевой области
}

// question: 4175070 name: Боковая киста шеи локализуется в :
::Боковая киста шеи локализуется в \:::[html]Боковая киста шеи локализуется в \:{
	=средней трети шеи
	~надключичной области
	~поднижнечелюстной области
	~сонном треугольнике
	~области яремной вырезки
}

// question: 4152573 name: Боковую кисту шеи дифференцируют с:
::Боковую кисту шеи дифференцируют с\:::[html]Боковую кисту шеи дифференцируют с\:{
	~Острым лимфаденитом

~Хроническим лимфаденитом
~Специфическим лимфаденитом
~Липомой
=Со всеми перечисленными заболеваниями
}

// question: 4152276 name: Болезненный инфильтрат в виде ≪тяжа≫ наблюдается при:
::Болезненный инфильтрат в виде ≪тяжа≫ наблюдается при\:::[html]Болезненный инфильтрат в виде ≪тяжа≫ наблюдается при\:{
~ фурункуле
~ карбункуле
= тромбофлебите угловой вены
~ рожистом воспалении
~ номе.
}

// question: 4175017 name: Болезнь Боуэна - это:
::Болезнь Боуэна - это\:::[html]Болезнь Боуэна - это\:{
~своеобразная разновидность старческой кератомы
=внутриэпидермальный кожный рак
~внутриэпителиальный рак слизистой оболочки
~псевдокарциноматозный моллюск
}

// question: 4175051 name: Болезнь Боуэна проявляется в виде
::Болезнь Боуэна проявляется в виде::[html]Болезнь Боуэна проявляется в виде{
~бляшки с возвышающимся краем, поверхность которой уплощена вследствие атрофии и рубцевания, покрыта корками
=гиперемированной, отечной области вследствие воспаления
~некровоточащих эрозий неправильной формы с гладкой поверхностью
~групповые пузырьки в области отечного пятна
~многочисленные вертикальные трещины в области красной каймы губ
}

// question: 4152046 name: Боли при остром гнойном периодонтите:
::Боли при остром гнойном периодонтите\:::[html]Боли при остром гнойном периодонтите\:{
~ ноющие, нерезко выраженные, не иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, усиливаются при накусывании
= острые, пульсирующие, иррадиируют, усиливаются в горизонтальном положении и физической нагрузке, а также при накусывании, зуб как бы вырос

~ острые, пульсирующие, не иррадиируют, усиливаются по ночам, накусывание на зуб безболезненное.

~острые, пульсирующие, иррадиируют, не усиливаются в горизонтальном положении и физической нагрузке, и при накусывании

~ ноющие, не иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, усиливаются при накусывании и в горизонтальном положении

}

// question: 4152045 name: Боли при остром серозном периодонтите:

::Боли при остром серозном периодонтите\:::[html]Боли при остром серозном периодонтите\:{

= ноющие, нерезко выраженные, не иррадиируют, усиливаются при накусывании

~ноющие, резко выраженные, иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, усиливаются при накусывании

~острые, резко выраженные, иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, не усиливаются при накусывании, увеличиваются по ночам

~острые, пульсирующие, иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, не усиливаются при накусывании, не увеличиваются по ночам

~ноющие,не иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, усиливаются при накусывании, ощущение „высокого зуба”

}

// question: 4152608 name: Больные с облигатным предраком кожи лица находятся на диспансерном наблюдении у:

::Больные с облигатным предраком кожи лица находятся на диспансерном наблюдении у\:::[html]Больные с облигатным предраком кожи лица находятся на диспансерном наблюдении у\:{

~Дерматолога

~Стоматолога хирурга

=Онколога

~Химиотерапевта

~Радиолога

}

// question: 4152010 name: БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ РУК ВРАЧ ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УСТАНАВЛИВАЕТ НА

::БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ РУК ВРАЧ ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УСТАНАВЛИВАЕТ НА::[html]БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ РУК ВРАЧ ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УСТАНАВЛИВАЕТ НА{

=моляры справа и слева или альвеолярные отростки

~углы нижней челюсти

~фронтальную группу зубов

~моляры верхней челюсти

}

// question: 4174962 name: Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает:
::Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает\:::[html]Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает\:{
	~на углы нижней челюсти
	~на фронтальную группу зубов
	=на моляры справа и слева или альвеолярные отростки
}

// question: 4174984 name: Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает:
::Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает\:::[html]Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает\:{
	~на углы нижней челюсти
	~на фронтальную группу зубов
	=на моляры справа и слева или альвеолярные отростки
	~на область внчс
}

// question: 4175095 name: Бугристость плеоморфной аденомы слюнной железы является:
::Бугристость плеоморфной аденомы слюнной железы является\:::[html]Бугристость плеоморфной аденомы слюнной железы является\:{
	=Клиническим признаком опухоли
	~Признаком разрыва капсулы
	~Признаком рецидирования
	~Признаком озлокачествления
	~Все ответы верны
}

// question: 4174994 name: В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней ...
::В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней ...::[html]В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней челюсти могут быть\:{
	~односторонние и двусторонние
	~острые и застарелые
	=полный и неполный
	~травматические, привычные, патологические

}

// question: 4174996 name: В зависимости от локализации вывиха они могут быть:
::В зависимости от локализации вывиха они могут быть\:::[html]В зависимости от локализации вывиха они могут быть\:{
	=односторонние и двусторонние
	~острые и застарелые
	~полный и неполный
	~травматические, привычные, патологические
}

// question: 4174998 name: В зависимости от направления смещения суставной головки вывихи бывают:
::В зависимости от направления смещения суставной головки вывихи бывают\:::[html]В зависимости от направления смещения суставной головки вывихи бывают\:{
	~односторонние и двусторонние
	~полный и неполный
	~травматические, привычные, патологические
	=передние и задние
}

// question: 4157680 name: В каком возрасте оптимально проводить устранение врожденной расщелины верхней...
::В каком возрасте оптимально проводить устранение врожденной расщелины верхней...::[html]В каком возрасте оптимально проводить устранение врожденной расщелины верхней губы\:{
	~До 1 года
	=5 лет
	~10 лет
	~12 лет
}

// question: 4151679 name: В каком направлении происходит смещение верхней челюсти при суборбитальном ...
::В каком направлении происходит смещение верхней челюсти при суборбитальном ...::[html]В каком направлении происходит смещение верхней челюсти при суборбитальном переломе\:{
	~книзу и кзади
	=кверху и кпереди
	~кнутри и кпереди
	~кнаружи и кзади
}

// question: 4152034 name: В КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕ-ЦИФИЧЕСКОГО АРТРИТА ...
::В КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕ-ЦИФИЧЕСКОГО АРТРИТА ...::[html]В КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕ-ЦИФИЧЕСКОГО АРТРИТА ВНЧС ВХОДЯТ{
	=физиотерапия, нормализация окклюзии, разгрузка и покой ВНЧС
	~химиотерапия, иглотерапия
	~физиотерапия, остеотомия нижней челюсти, иммобилизация
	~физиотерапия, резекция мыщелкового отростка, разгрузка и покой ВНЧС
}

// question: 4174976 name: В комплекс мероприятий при лечении хронического неспецифического артрита ВНЧС...
::В комплекс мероприятий при лечении хронического неспецифического артрита ВНЧС...::[html]В комплекс мероприятий при лечении хронического неспецифического артрита ВНЧС входят\:{
	~химиотерапия, рефлексотерапия
	=физиотерапия, нормализация окклюзии, разгрузка и покой ВНЧС
	~изиотерапия, остеотомия нижней челюсти, иммобилизация
	~физиотерапия, удаление мыщелкового отростка, разгрузка и покой ВНЧС
}

// question: 4151716 name: В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЕТ БОЛЬ
::В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЕТ БОЛЬ::[html]В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЕТ БОЛЬ{
	=постоянная в причинном зубе, соседних зубах и челюсти
	~пароксизмальная
	~кинжальная в области ВНЧС
	~приступообразная в причинном зубе, соседних зубах и челюсти
}

// question: 4151717 name: В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЕТ ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ
::В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЕТ ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ::[html]В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЕТ ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ{
	=причинного и соседних зубов
	~резцов, клыков, премоляров и моляров
	~в пределах половины челюсти
	~только причинного зуба
}

// question: 4151742 name: В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ
::В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ::[html]В ОСТРОЙ СТАДИИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ{
	=хронические одонтогенные очаги
	~секвестры
	~очаги рентгенопрозрачности различного размера
	~очаги остеосклероза
}

// question: 4151692 name: В ПАТОГЕНЕЗЕ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
::В ПАТОГЕНЕЗЕ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ::[html]В ПАТОГЕНЕЗЕ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ{
	=повреждение зубного фолликула
	~порочное развитие зубного фолликула
	~гипоплазия эмали
	~флюороз
}

// question: 4152592 name: В развитии меланомы значение имеют:
::В развитии меланомы значение имеют\:::[html]В развитии меланомы значение имеют\:{
	~Возраст
	~Пол
	~Питание
	=Инсоляция
}

// question: 4152593 name: В развитии меланомы значение имеют:
::В развитии меланомы значение имеют\:::[html]В развитии меланомы значение имеют\:{
	~Возраст
	~Пол
	=Травма
	~Питание
}

// question: 4152345 name: В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть:
::В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:::[html]В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:{
	~Поверхностные (кожа, мышцы)

~Глубокие (кожа, мышцы, железы, слизистая)
~Черепные нервы (тройничный, лицевой, подъязычный и др.)
=Все ответы верны
}

// question: 4152346 name: В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть:
::В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:::[html]В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:{
~Черепные нервы (тройничный, лицевой, подъязычный и др.)
~Ветви наружной сонной артерии
~С дефектом или без дефекта тканей.
=Все ответы верны
}

// question: 4152347 name: В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть:
::В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:::[html]В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:{
~Поверхностные (кожа, мышцы)
~Ветви наружной сонной артерии
~С дефектом или без дефекта тканей.
=Все ответы верны
}

// question: 4152348 name: В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть:
::В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:::[html]В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:{
~Глубокие (кожа, мышцы, железы, слизистая)
~Черепные нервы (тройничный, лицевой, подъязычный и др.)
~С дефектом или без дефекта тканей.
=Все ответы верны
}

// question: 4152349 name: В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть:
::В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:::[html]В ранах ЧЛО пораженные ткани могут быть\:{
~Поверхностные (кожа, мышцы)
~Черепные нервы (тройничный, лицевой, подъязычный и др.)
~Ветви наружной сонной артерии
=Все ответы верны
}

// question: 4175117 name: В результате нарушения развития эмалевого органа в костной ткани челюсти ...
::В результате нарушения развития эмалевого органа в костной ткани челюсти ...::[html]В результате нарушения развития эмалевого органа в костной ткани челюсти образуется киста\:{
	~Кератокиста
	~Радикулярная
	=Фолликурная
	~Ороантральная
	~Резцового канала
}

// question: 4157685 name: В течение какого времени пациенту показано ношение вкладыша в нижнем носовом ...
::В течение какого времени пациенту показано ношение вкладыша в нижнем носовом ...::[html]В течение какого времени пациенту показано ношение вкладыша в нижнем носовом ходе для предупреждения сужения носовых ходов\:{
	~2 недель
	~1 месяца
	=3 месяцев
	~6 месяцев
}

// question: 4157671 name: В чем заключается особенность пластики носа филатовским стеблем по Хитрову:
::В чем заключается особенность пластики носа филатовским стеблем по Хитрову\:::[html]В чем заключается особенность пластики носа филатовским стеблем по Хитрову\:{
	~Продолжительность лечения
	~Одномоментное формирование наружной и внутренней выстилки
	~Одномоментное формирование наружной выстилки и перегородки носа
	=Одномоментное формирование наружной и внутренней выстилки и перегородки носа.
}

// question: 4157586 name: В чем заключается преимущество методов пластики местными тканями:
::В чем заключается преимущество методов пластики местными тканями\:::[html]В чем заключается преимущество методов пластики местными тканями\:{
	~В многоэтапности лечения
	=В сходстве и однотипности тканей по строению в зоне пластики
	~В возможностях проведения большого объема пластических перемещений
	~В простоте выполнения операции
}

// question: 4152367 name: В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие:
::В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие\:::[html]В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие\:{
	=Сила травмирующего фактора
	~Механизм перелома
	~Другие патологические сопутствующие заболевания
}

// question: 4152368 name: В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие:
::В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие\:::[html]В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие\:{
	=Сокращение мышц, прикрепляющихся к ним
	~Механизм перелома
	~Другие патологические сопутствующие заболевания
}

// question: 4152369 name: В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие:
::В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие\:::[html]В число факторов, влияющих на смещение отломков при переломе н/ч есть следующие\:{
	~Механизм перелома
	=Направление линии перелома
	~Другие патологические сопутствующие заболевания
}

// question: 4151869 name: ВНЕШНИЙ ВИД БОЛЬНОГО С ДВУХСТОРОННИМ КОСТНЫМ АНКИЛОЗОМ ВНЧС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::ВНЕШНИЙ ВИД БОЛЬНОГО С ДВУХСТОРОННИМ КОСТНЫМ АНКИЛОЗОМ ВНЧС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]ВНЕШНИЙ ВИД БОЛЬНОГО С ДВУХСТОРОННИМ КОСТНЫМ АНКИЛОЗОМ ВНЧС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
	=профилем "птичьего" лица
	~нижней макрогнатией
	~верхней микрогнатией
	~верхней ретрогнатией
}

// question: 4151649 name: Варианты ортопедической иммобилизации при переломе верхней челюсти:
::Варианты ортопедической иммобилизации при переломе верхней челюсти\:::[html]Варианты ортопедической иммобилизации при переломе верхней челюсти\:{
	~дуга Энгля
	~шины Васильева
	~гладкая шина-скоба
	=наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
}

// question: 4151855 name: ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ ПРИ ВЫВИХЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ ПРИ ВЫВИХЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ ПРИ ВЫВИХЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=невозможность сомкнуть зубы
	~слезотечение
	~снижение высоты прикуса
	~заложенность в ухе
}

// question: 4174981 name: Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти:
::Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти\:::[html]Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти\:{
	~слезотечение
	~снижение высоты прикуса
	=невозможность сомкнуть зубы
	~ограничение подвижности нижней челюсти
}

// question: 4151865 name: ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ
::ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ{
	=резкое ограничение подвижности нижней челюсти
	~нарушение глотания
	~множественный кариес
	~выраженный болевой симптом
}

// question: 4174968 name: Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является:
::Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является\:::[html]Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является\:{
	~шум в ушах
	~нарушение глотания

~выраженный болевой симптом
=резкое ограничение подвижности нижней челюсти
}

// question: 4151857 name: ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ АРТРИТА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ
::ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ АРТРИТА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ АРТРИТА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ{
=стойкое ограничение подвижности нижней челюсти
~шум в ушах
~нарушение глотания
~множественный кариес
}

// question: 4151868 name: Ведущим симптомом клиhики двухсторонhего костhого аhкилоза вhчс является
::Ведущим симптомом клиhики двухсторонhего костhого аhкилоза вhчс является::[html]Ведущим симптомом клиhики двухсторонhего костhого аhкилоза вhчс является{
=полное отсутствие движений нижней челюсти
~шум в ушах
~нарушение глотания
~множественный кариес
}

// question: 4151859 name: ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ КОНТРАКТУРАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ КОНТРАКТУРАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ КОНТРАКТУРАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=ограничение открывание рта
~верхняя макрогнатия
~снижение высоты прикуса
~укорочение ветвей нижней челюсти
}

// question: 4152275 name: Веки могут плотно инфильтрироваться при:
::Веки могут плотно инфильтрироваться при\:::[html]Веки могут плотно инфильтрироваться при\:{
= тромбофлебите лицевых вен
~ рожистом воспалении
~ фурункуле
~ карбункуле
~ сибирской язве.

}

// question: 4157600 name: Величина максимально допустимого угла (в градусах) поворота лоскута на ножке:
::Величина максимально допустимого угла (в градусах) поворота лоскута на ножке\:::[html]Величина максимально допустимого угла (в градусах) поворота лоскута на ножке\:{
	~30
	=90
	~180
	~270
}

// question: 4151725 name: ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ С ВЕНАМИ
::ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ С ВЕНАМИ::[html]ВЕНЫ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ АНАСТОМОЗИРУЮТ С ВЕНАМИ{
	=верхней и нижней венами глазницы
	~верхнего зубного сплетения
	~подвисочной ямки
	~полости носа
}

// question: 4151694 name: ВЕРОЯТНАЯ ОДОНТОГЕННАЯ ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОГО АБСЦЕССА
::ВЕРОЯТНАЯ ОДОНТОГЕННАЯ ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОГО АБСЦЕССА::[html]ВЕРОЯТНАЯ ОДОНТОГЕННАЯ ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОГО АБСЦЕССА{
	=обострившийся гранулирующий периодонтит
	~глубокий кариес
	~острый гнойный пульпит
	~хронический фиброзный периодонтит
}

// question: 4151699 name: ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ МАЛИГНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА ЯВЛЯЕТСЯ
::ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ МАЛИГНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ МАЛИГНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА ЯВЛЯЕТСЯ{
	=однократная или хроническая травма
	~дефицит витамина «В» в организме
	~тяжелая форма сахарного диабета
	~курение

}

// question: 4152400 name: Верхнечелюстная пазуха сообщается с:
::Верхнечелюстная пазуха сообщается с\:::[html]Верхнечелюстная пазуха сообщается с\:{
	=Полостью носа
	~Полостью рта
	~Глазницами
	~Глоткой
	~Подвисочной ямкой.
}

// question: 4152395 name: Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях:
::Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:::[html]Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:{
	~Резонанс
	~Обоняние
	~Дыхание
	=Все ответы верны
}

// question: 4152396 name: Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях:
::Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:::[html]Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:{
	~Дыхание
	~Защитная
	~Уменьшение веса черепа.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152397 name: Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях:
::Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:::[html]Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:{
	~Резонанс
	~Защитная
	~Уменьшение веса черепа.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152398 name: Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях:
::Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:::[html]Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:{

~Резонанс
~Обоняние
~Уменьшение веса черепа.
=Все ответы верны
}

// question: 4152399 name: Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях:
::Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:::[html]Верхнечелюстная пазуха участвуют в следующих функциях\:{
~Обоняние
~Дыхание
~Защитная
=Все ответы верны
}

// question: 4152391 name: Верхняя челюсть образует следующие полости:
::Верхняя челюсть образует следующие полости\:::[html]Верхняя челюсть образует следующие полости\:{
~Глазницы
~Носовую
=Все ответы верны
}

// question: 4152392 name: Верхняя челюсть образует следующие полости:
::Верхняя челюсть образует следующие полости\:::[html]Верхняя челюсть образует следующие полости\:{
~Ротовую
~Верхнечелюстную пазуху.
=Все ответы верны
}

// question: 4152393 name: Верхняя челюсть образует следующие полости:
::Верхняя челюсть образует следующие полости\:::[html]Верхняя челюсть образует следующие полости\:{
~Глазницы
~Ротовую
=Все ответы верны
}

// question: 4152394 name: Верхняя челюсть образует следующие полости:
::Верхняя челюсть образует следующие полости\:::[html]Верхняя челюсть образует следующие полости\:{

~Глазницы
~Верхнечелюстную пазуху.
=Все ответы верны
}

// question: 4151745 name: ВИД АСФИКСИИ, РАЗВИВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЫТИЯ ПРОСВЕТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ...
::ВИД АСФИКСИИ, РАЗВИВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЫТИЯ ПРОСВЕТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ...::[html]ВИД АСФИКСИИ, РАЗВИВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЫТИЯ ПРОСВЕТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ МЯГКОТКАННЫМ ЛОСКУТОМ{
=клапанная
~стенотическая
~дислокационная
~обтурационная
}

// question: 4152023 name: ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=общее (наркоз)
~местное
~нейролептаналгезия
~комбинированное
}

// question: 4152024 name: ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=общее (наркоз)
~комбинированное
~местное
~нейролептаналгезия
}

// question: 4157629 name: Вид обезболивания при формировании Филатовского стебля:
::Вид обезболивания при формировании Филатовского стебля\:::[html]Вид обезболивания при формировании Филатовского стебля\:{
=Инфильтрационная

~ЭТН
~Нейролептаналгезия
~Аппликационная анестезия
}

// question: 4151944 name: ВИД ПЛАСТИКИ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ, ПРИ КОТОРОМ ТКАНИ ПЕРЕНОСЯТ ИЗ ОТДАЛЕННОГО ОТ ...
::ВИД ПЛАСТИКИ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ, ПРИ КОТОРОМ ТКАНИ ПЕРЕНОСЯТ ИЗ ОТДАЛЕННОГО ОТ ...::[html]ВИД ПЛАСТИКИ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ, ПРИ КОТОРОМ ТКАНИ ПЕРЕНОСЯТ ИЗ ОТДАЛЕННОГО ОТ ДЕФЕКТА МЕСТА{
=лоскутами на ножке
~мобилизация краев раны
~треугольными лоскутами
~пересадка свободной кожи
}

// question: 4151812 name: ВИДЫ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ВИДЫ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ВИДЫ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=передний
~средний
~наружный
~прямой
}

// question: 4174955 name: Виды вывихов нижней челюсти:
::Виды вывихов нижней челюсти\:::[html]Виды вывихов нижней челюсти\:{
~средний
=передний
}

// question: 4174956 name: Виды вывихов нижней челюсти:
::Виды вывихов нижней челюсти\:::[html]Виды вывихов нижней челюсти\:{
=задний
~средний
}

// question: 4174957 name: Виды вывихов нижней челюсти:
::Виды вывихов нижней челюсти\:::[html]Виды вывихов нижней челюсти\:{
~средний
=односторонний
}

// question: 4174958 name: Виды вывихов нижней челюсти:
::Виды вывихов нижней челюсти\:::[html]Виды вывихов нижней челюсти\:{
	~средний
	=двусторонний
}

// question: 4175076 name: Виды хондром:
::Виды хондром\:::[html]Виды хондром\:{
	~истинная хондрома
	~ложная хондрома
	=Экхондрома
	~малая хондрома
	~хондросаркома
}

// question: 4152165 name: Внешние признаки флегмоны дна полости рта:
::Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Одутловатая припухлость всего лица
	~Плотный разлитой инфильтрат в подчелюстных и подбородочной областях с двух сторон
	~Ограничение открывания рта, вместе с тем рот полуоткрыт
	=Все ответы верны
}

// question: 4152166 name: Внешние признаки флегмоны дна полости рта:
::Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Ограничение открывания рта, вместе с тем рот полуоткрыт
	~Глотание болезненно, слюна вытекает из полуоткрытого рта
	~ Крепитация при пальпации дна полости рта при анаэробной инфекции.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152167 name: Внешние признаки флегмоны дна полости рта:
::Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Одутловатая припухлость всего лица
	~Глотание болезненно, слюна вытекает из полуоткрытого рта
	~ Крепитация при пальпации дна полости рта при анаэробной инфекции.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152168 name: Внешние признаки флегмоны дна полости рта:
::Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Одутловатая припухлость всего лица
	~Плотный разлитой инфильтрат в подчелюстных и подбородочной областях с двух сторон
	~ Крепитация при пальпации дна полости рта при анаэробной инфекции.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152169 name: Внешние признаки флегмоны дна полости рта:
::Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внешние признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Плотный разлитой инфильтрат в подчелюстных и подбородочной областях с двух сторон
	~Ограничение открывания рта, вместе с тем рот полуоткрыт
	~Глотание болезненно, слюна вытекает из полуоткрытого рта
	=Все ответы верны
}

// question: 4174967 name: Внешний вид больного с двухсторонним костным анкилозом ВНЧС характеризуется:
::Внешний вид больного с двухсторонним костным анкилозом ВНЧС характеризуется\:::[html]Внешний вид больного с двухсторонним костным анкилозом ВНЧС характеризуется\:{
	~нижней макрогнатией
	~верхней микрогнатией
	~верхней ретрогнатией
	=нижней микрогнатией
}

// question: 4174993 name: Внешния вид больного с двухсторонним костным анкилозом ВНЧС характеризуется:
::Внешния вид больного с двухсторонним костным анкилозом ВНЧС характеризуется\:::[html]Внешния вид больного с двухсторонним костным анкилозом ВНЧС характеризуется\:{
	~нижней макрогнатией
	~верхней микрогнатией
	~верхней ретрогнатией
	=профилем «птичьего» лица
}

// question: 4152170 name: Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта:
::Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Подъязычные валики инфильтрированы, выбухают, иногда выше коронок зубов
	~Складки дна полости рта отечны и покрыты фиброзным налётом, видны отпечатки коронок зубов
	~Язык увеличен в размере
	=Все ответы верны
}

// question: 4152171 name: Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта:
::Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Язык увеличен в размере
	~Язык покрыт налётом
	~Движение языка вызывают резкую боль.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152172 name: Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта:
::Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Подъязычные валики инфильтрированы, выбухают, иногда выше коронок зубов
	~Язык покрыт налётом
	~Движение языка вызывают резкую боль.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152173 name: Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта:
::Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Подъязычные валики инфильтрированы, выбухают, иногда выше коронок зубов
	~Складки дна полости рта отечны и покрыты фиброзным налётом, видны отпечатки коронок зубов
	~Движение языка вызывают резкую боль.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152174 name: Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта:

::Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:::[html]Внутриротовые признаки флегмоны дна полости рта\:{
	~Складки дна полости рта отечны и покрыты фиброзным налётом, видны отпечатки коронок зубов
	~Язык увеличен в размере
	~Язык покрыт налётом
	=Все ответы верны
}

// question: 4152149 name: Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может ...
::Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может ...::[html]Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может развиваться\:{
	=Между жевательной мышцей и кожей
	~В области ветви нижней челюсти
	~В околоушной железе.
}

// question: 4152150 name: Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может ...
::Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может ...::[html]Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может развиваться\:{
	=Между жевательной мышцей и челюстью
	~В области ветви нижней челюсти
	~В околоушной железе.
}

// question: 4152151 name: Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может ...
::Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может ...::[html]Воспалительный процесс при абсцессе (флегмоне) жевательной области может развиваться\:{
	=Между наружной и внутренней частью жевательной мышцы
	~В области ветви нижней челюсти
	~В околоушной железе.
}

// question: 4157605 name: Восстановление дефектов губы у женщин выполняется лоскутом:
::Восстановление дефектов губы у женщин выполняется лоскутом\:::[html]Восстановление дефектов губы у женщин выполняется лоскутом\:{

~С шеи
=Лапчинского
~Со щеки
~По Лимбергу
}

// question: 4157604 name: Восстановление дефектов губы у мужчин выполняется лоскутом:
::Восстановление дефектов губы у мужчин выполняется лоскутом\:::[html]Восстановление дефектов губы у мужчин выполняется лоскутом\:{
~С шеи
=Лекстера
~Со щеки
~По Лимбергу
}

// question: 4174961 name: Вправление вывиха нижней челюсти проводится при положении больного:
::Вправление вывиха нижней челюсти проводится при положении больного\:::[html]Вправление вывиха нижней челюсти проводится при положении больного\:{
~лежа
=сидя
~стоя
}

// question: 4174977 name: Временными средствами иммобилизации отломков верхней челюсти не являются:
::Временными средствами иммобилизации отломков верхней челюсти не являются\:::[html]Временными средствами иммобилизации отломков верхней челюсти не являются\:{
~бинтовая подбородочно-теменная повязка
~эластичная подбородочная праща Померанцевой-Урбанской
=шины Тигерштедта
~эластичные резиновые и сетчатые бинты
}

// question: 4152434 name: Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...
::Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...::[html]Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с сочетанными травмами зависит от\:{
~Общего состояния больного

~Степени тяжести травмы лица
=Все ответы верны
}

// question: 4152435 name: Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...
::Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...::[html]Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с сочетанными травмами зависит от\:{
~Общего состояния больного
~Стабильности общего состояния и местного течения при сочетанных травмах
=Все ответы верны
}

// question: 4152436 name: Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...
::Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с ...::[html]Время и объем хирургических вмешательств при травмах у пациентов с сочетанными травмами зависит от\:{
~Степени тяжести травмы лица
~Степени тяжести сочетанной травмы
=Все ответы верны
}

// question: 4151778 name: ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОСТРОМ СИАЛОАДЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
::ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОСТРОМ СИАЛОАДЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТСЯ::[html]ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОСТРОМ СИАЛОАДЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТСЯ{
=только после появления очагов размягчения и флюктуации в области железы
~при развитии инфильтративных изменений в паренхиме железы
~после появления гнойного отделяемого из выводного протока железы
~при развитии прогрессирующей сухости во рту
}

// question: 4151966 name: ВТОРИЧНАЯ КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПОСЛЕ ОСНОВНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ
::ВТОРИЧНАЯ КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПОСЛЕ ОСНОВНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ::[html]ВТОРИЧНАЯ КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПОСЛЕ ОСНОВНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ{
=1-1.5 года
~1-2 месяца
~3-4 месяца

~6-8 месяцев
}

// question: 4151929 name: ВТОРИЧНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РАН ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ ПРИ
::ВТОРИЧНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РАН ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ ПРИ::[html]ВТОРИЧНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РАН ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ ПРИ{
=медленном отторжении некротизированных тканей, длительном течении раневого процесса
~отторжении некротизированных тканей и появлении грануляций
~эпителизации раны
~на 4-5 сутки
}

// question: 4175049 name: Выберите факультативный вид предрака красной каймы губы:
::Выберите факультативный вид предрака красной каймы губы\:::[html]Выберите факультативный вид предрака красной каймы губы\:{
~бородавчатый предрак красной каймы губ
~болезнь Боуэна
~ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ
~эритроплазия Кейра
=хроническая трещина губы
}

// question: 4152401 name: Вывих зуба возникает в результате:
::Вывих зуба возникает в результате\:::[html]Вывих зуба возникает в результате\:{
=Ушиба или частичного разрыва дентоальвеолярной связки
~Перелома верхней или нижней челюсти
~Ни в одной из перечисленных ситуаций.
}

// question: 4152402 name: Вывих зуба возникает в результате:
::Вывих зуба возникает в результате\:::[html]Вывих зуба возникает в результате\:{
=Полного разрыва днетоальвеолярной связки
~Перелома верхней или нижней челюсти
~Ни в одной из перечисленных ситуаций.
}

// question: 4152403 name: Вывих зуба возникает в результате:
::Вывих зуба возникает в результате\:::[html]Вывих зуба возникает в результате\:{

=Перелома альвеолярного отростка
~Перелома верхней или нижней челюсти
~Ни в одной из перечисленных ситуаций.
}

// question: 4152193 name: Выраженный тризм чаще встречается при:
::Выраженный тризм чаще встречается при\:::[html]Выраженный тризм чаще встречается при\:{
~Подбородочной флегмоне
=Флегмоне подвисочной области
~Флегмоне щечной области
}

// question: 4152194 name: Выраженный тризм чаще встречается при:
::Выраженный тризм чаще встречается при\:::[html]Выраженный тризм чаще встречается при\:{
~Подбородочной флегмоне
=Гемифациальной флегмоне
~Флегмоне щечной области
}

// question: 4152195 name: Выраженный тризм чаще встречается при:
::Выраженный тризм чаще встречается при\:::[html]Выраженный тризм чаще встречается при\:{
~Подбородочной флегмоне
=Флегмоне височной области
~Флегмоне щечной области.
}

// question: 4175088 name: Где чаще локализуется амелобластомы?
::Где чаще локализуется амелобластомы?::[html]Где чаще локализуется амелобластомы?{
=на нижней челюсти в области угла
~на верхней челюсти
~на нижней челюсти в области центральных зубов
~на скуловой кости
~на лобной кости
}

// question: 4152050 name: Гемисекция зуба это:
::Гемисекция зуба это\:::[html]Гемисекция зуба это\:{
=удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью зуба

~ удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба
~ пересадка удаленного зуба в его же альвеолу
~ рассечение зуба на две части (применяется при лечении моляров) в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, и покрытием коронкой
~ рассечение зуба на две части (применяется при лечении моляров) в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведением кюретажа и покрытием коронкой
}

// question: 4152337 name: Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи:
::Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи\:::[html]Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи\:{
=Передняя тампонада
~Наложение швов на поврежденные сосуды
~Все перечисленные действия.
}

// question: 4152338 name: Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи:
::Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи\:::[html]Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи\:{
=Резиновыми шариками которые надуваются
~Наложение швов на поврежденные сосуды
~Все перечисленные действия.
}

// question: 4152339 name: Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи:
::Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи\:::[html]Гемостаз в случае кровотечений из носа осуществляется при помощи\:{
=Задняя тампонада
~Наложение швов на поврежденные сосуды
~Все перечисленные действия.
}

// question: 4152508 name: Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи:
::Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи\:::[html]Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи\:{
=Передней тампонады марлевыми тампонами
~Наложение швов на поврежденные сосуды

~Все ответы верны
}

// question: 4152509 name: Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи:
::Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи\:::[html]Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи\:{
=Задней тампонады
~Наложение швов на поврежденные сосуды
~Все ответы верны
}

// question: 4152510 name: Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи:
::Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи\:::[html]Гемостаз в случае носовых кровотечений осуществляется при помощи\:{
=Резиновых шариков, которые надуваются в носовой полости
~Наложение швов на поврежденные сосуды
~Все ответы верны
}

// question: 4152415 name: Гипоестезия в зоне нижнего альвеолярного нерва встречается в случае:
::Гипоестезия в зоне нижнего альвеолярного нерва встречается в случае\:::[html]Гипоестезия в зоне нижнего альвеолярного нерва встречается в случае\:{
~Медиального перелома нижней челюсти
~Парамедиального перелома нижней челюсти
=Перелома нижней челюсти в области тела со смещением
~Перелома суставного отростка нижней челюсти
~Во всех случаях.
}

// question: 4152355 name: Главные формы зубо пародонтального травматизма:
::Главные формы зубо пародонтального травматизма\:::[html]Главные формы зубо пародонтального травматизма\:{
~Контузии зубо пародонтальные
~Перелом коронки
~Перелом корня
=Все ответы верны
}

// question: 4152356 name: Главные формы зубо пародонтального травматизма:
::Главные формы зубо пародонтального травматизма\:::[html]Главные формы зубо пародонтального травматизма\:{
	~Перелом корня
	~Неполный вывих
	~Полный вывих.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152357 name: Главные формы зубо пародонтального травматизма:
::Главные формы зубо пародонтального травматизма\:::[html]Главные формы зубо пародонтального травматизма\:{
	~Контузии зубо пародонтальные
	~Неполный вывих
	~Полный вывих.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152358 name: Главные формы зубо пародонтального травматизма:
::Главные формы зубо пародонтального травматизма\:::[html]Главные формы зубо пародонтального травматизма\:{
	~Контузии зубо пародонтальные
	~Перелом коронки
	~Полный вывих.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152359 name: Главные формы зубо пародонтального травматизма:
::Главные формы зубо пародонтального травматизма\:::[html]Главные формы зубо пародонтального травматизма\:{
	~Контузии зубо пародонтальные
	~Перелом корня
	~Полный вывих
	=Все ответы верны
}

// question: 4152513 name: Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются:
::Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:::[html]Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:{

~Суставной отросток
~Суставная ямка клиновидной кости
=Все ответы верны
}

// question: 4152514 name: Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются:
::Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:::[html]Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:{
~Суставная головка
=Все ответы верны
~Суставной диск
}

// question: 4152515 name: Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются:
::Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:::[html]Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:{
~Суставная ямка клиновидной кости
~Суставная головка
=Все ответы верны
}

// question: 4152516 name: Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются:
::Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:::[html]Главными анатомическими элементами сустава нижней челюсти являются\:{
~Суставной отросток
=Все ответы верны
~Суставной диск
}

// question: 4152037 name: Гнойно воспалительные процессы в челюстно лицевой области возникают в ...
::Гнойно воспалительные процессы в челюстно лицевой области возникают в ...::[html]Гнойно воспалительные процессы в челюстно лицевой области возникают в результате действия бактерий\:{
=анаэробных, аэробных, факультативных
~только аэробных и факультативных
~только анаэробных

}

// question: 4152096 name: Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...
::Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...::[html]Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или зелёного оттенка, состоящей из\:{
	~некротических тканей
	~разрушенных нейтрофилов
	~фибрина
	=Все ответы верны
}

// question: 4152097 name: Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...
::Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...::[html]Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или зелёного оттенка, состоящей из\:{
	~фибрина
	~микроорганизмы, токсины
	~энзимы
	=Все ответы верны
}

// question: 4152098 name: Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...
::Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...::[html]Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или зелёного оттенка, состоящей из\:{
	~некротических тканей
	~микроорганизмы, токсины
	~энзимы
	=Все ответы верны
}

// question: 4152099 name: Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...
::Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...::[html]Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или зелёного оттенка, состоящей из\:{
	~некротических тканей
	~разрушенных нейтрофилов
	~энзимы

=Все ответы верны
}

// question: 4152100 name: Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...
::Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или ...::[html]Гнойное воспаление характеризуется наличием густой жидкости желтого или зелёного оттенка, состоящей из\:{
~разрушенных нейтрофилов
~фибрина
~микроорганизмы, токсины
=Все ответы верны
}

// question: 4152038 name: Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из:
::Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из\:::[html]Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из\:{
=нейтрофилов, плазматических клеток
~эритроцитов
~тромбоцитов
}

// question: 4152039 name: Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из:
::Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из\:::[html]Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из\:{
= лимфоцитов
~эритроцитов
~тромбоцитов
~ моноцитов
}

// question: 4152040 name: Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из:
::Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из\:::[html]Гнойный экссудат при гнойных лимфаденитах и аденофлегмонах состоит из\:{
~эритроцитов
~тромбоцитов
= моноцитов

}

// question: 4152210 name: Границы подвисочной ямки:
::Границы подвисочной ямки\:::[html]Границы подвисочной ямки\:{
	~спереди бугор верхней челюсти и нижний отдел височной поверхности скуловой кости
	~снизу щечно глоточная фасция
	~сзади шиловидный отросток височной кости с отходящими от него мышцами и передняя поверхность мыщелкового отростка нижней челюсти
	~изнутри наружная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости
	~снаружи внутренняя поверхность ветви нижней челюсти.
	=Все ответы верны
}

// question: 4151846 name: ДВУХСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ СКУЛОВЫХ КОСТЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ
::ДВУХСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ СКУЛОВЫХ КОСТЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ::[html]ДВУХСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ СКУЛОВЫХ КОСТЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ{
	=синдроме гемифациальной микросомии
	~синдроме Гольденхара
	~синдроме Франческетти
	~синдром Пьера-Робина
}

// question: 4151776 name: ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ СПОСОБСТВУЕТ
::ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ СПОСОБСТВУЕТ::[html]ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ СПОСОБСТВУЕТ{
	=снижению сенсибилизации организма и повышению защитных сил
	~восстановлению трофических нарушений в костной ткани
	~уменьшению очага поражения в профилактике осложнений
	~формированию секвестров в более ранние сроки
}

// question: 4151902 name: ДЕРМАБРАЗИЮ ПЕРЕСАЖЕННОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА ПРОВОДЯТ ПРИ
::ДЕРМАБРАЗИЮ ПЕРЕСАЖЕННОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА ПРОВОДЯТ ПРИ::[html]ДЕРМАБРАЗИЮ ПЕРЕСАЖЕННОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА ПРОВОДЯТ ПРИ{
	=гиперпигментации
	~грубых рубцовых изменениях
	~рубцовых изменениях слизистой оболочки
	~образовании келлоидного рубца

}

// question: 4175038 name: Дерматофиброма (гистиоцитома) состоит из:
::Дерматофиброма (гистиоцитома) состоит из\:::[html]Дерматофиброма (гистиоцитома) состоит из\:{
	~веретенообразных клеток типа фибробластов или фиброцитов и большого количества коллагеновых волокон
	~волокнистой соединительной и жировой ткани
	~волокнистой соединительной и сосудистой ткани
	=коллагеновых волокон, фибробластов, фиброцитов и гистиоцитов
}

// question: 4151881 name: ДЕФОРМАЦИЯ КОСТНЫХ СУСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЧС НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ ...
::ДЕФОРМАЦИЯ КОСТНЫХ СУСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЧС НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ ...::[html]ДЕФОРМАЦИЯ КОСТНЫХ СУСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЧС НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ{
	=остеоартроза
	~острого неспецифического артрита
	~синдрома болевой дисфункции
	~вывиха ВНЧС
}

// question: 4151813 name: ДИАГНОЗ АРТРИТА ВНЧС СТАВЯТ НА ОСНОВАНИИ
::ДИАГНОЗ АРТРИТА ВНЧС СТАВЯТ НА ОСНОВАНИИ::[html]ДИАГНОЗ АРТРИТА ВНЧС СТАВЯТ НА ОСНОВАНИИ{
	=клинико-рентгенологического исследования
	~данных клинического анализа крови
	~ЭОД
	~кожных проб
}

// question: 4152495 name: Диагноз перелома скулового комплекса ставится по:
::Диагноз перелома скулового комплекса ставится по\:::[html]Диагноз перелома скулового комплекса ставится по\:{
	~Клиническим симптомам
	~Рентген обследованию
	~Функциональным изменениям
	~Данным объективного осмотра
	=Все ответы верны.
}

// question: 4175053 name: Диагноз плоскоклеточный рак ставится на основании:
::Диагноз плоскоклеточный рак ставится на основании\:::[html]Диагноз плоскоклеточный рак ставится на основании\:{
	~ультразвукового исследования
	~рентген исследования
	=патоморфологического исследования
	~эндоскопического исследования
	~жалоб, сбора анамнеза и осмотра
}

// question: 4152444 name: Диагностика переломов верхней челюсти основывается на:
::Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:::[html]Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:{
	~Специфические клинические признаки
	~Риноскопия
	=Все ответы верны
}

// question: 4152445 name: Диагностика переломов верхней челюсти основывается на:
::Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:::[html]Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:{
	~Рентгенологическом исследовании
	~Риноскопия
	=Все ответы верны
}

// question: 4152446 name: Диагностика переломов верхней челюсти основывается на:
::Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:::[html]Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:{
	~Рентгенологическом исследовании
	~Общих клинических признаках всех переломов (боли, синяки, крепитация, гематомы, смещение отломков и т.д.)
	=Все ответы верны
}

// question: 4152447 name: Диагностика переломов верхней челюсти основывается на:
::Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:::[html]Диагностика переломов верхней челюсти основывается на\:{
	~Общих клинических признаках всех переломов (боли, синяки, крепитация, гематомы, смещение отломков и т.д.)
	~Специфические клинические признаки
	=Все ответы верны
}

// question: 4151911 name: ДИЕТА ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
::ДИЕТА ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ::[html]ДИЕТА ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ{
	=стол трубочный
	~стол 1
	~стол 15
	~стол 9
}

// question: 4175148 name: Дифференциальную диагностику «мягкой одонтомы» следует проводить с
::Дифференциальную диагностику «мягкой одонтомы» следует проводить с::[html]Дифференциальную диагностику «мягкой одонтомы» следует проводить с{
	~Гемангиомой
	~Миксомой
	=Амелобластомой
	~Полиморфной аденомой
	~Остеомиелитом челюсти
}

// question: 4175142 name: Дифференциальную диагностику амелобластомы следует проводить с:
::Дифференциальную диагностику амелобластомы следует проводить с\:::[html]Дифференциальную диагностику амелобластомы следует проводить с\:{
	=Радикулярной кистой
	~Хондромой
	~Одонтомой
	~Цементомой
	~Пародонтитом
}

// question: 4151709 name: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ НАГНОИВШЕЙСЯ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ПРОВОДЯТ С
::ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ НАГНОИВШЕЙСЯ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ПРОВОДЯТ С::[html]ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ НАГНОИВШЕЙСЯ ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ПРОВОДЯТ С{
	=острым гнойным периоститом челюсти
	~острым гнойным лимфаденитом
	~обострением хронического пульпита
	~острым перикоронитом
}

// question: 4151806 name: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОСТЕОАРТРОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С
::ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОСТЕОАРТРОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С::[html]ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОСТЕОАРТРОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С{
	=фиброзным анкилозом
	~острым сиалоаденитом околоушной слюнной железы
	~острым специфическим артритом
	~внутрисуставным переломом головки нижней челюсти
}

// question: 4151807 name: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОСТЕОАРТРОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С
::ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОСТЕОАРТРОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С::[html]ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОСТЕОАРТРОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С{
	=хроническим артритом
	~полным передним вывихом ВНЧС
	~внутрисуставным переломом головки нижней челюсти
	~острым сиалоаденитом околоушной слюнной железы
}

// question: 4175121 name: Дифференциальную диагностику фолликулярной кисты необходимо проводить с:
::Дифференциальную диагностику фолликулярной кисты необходимо проводить с\:::[html]Дифференциальную диагностику фолликулярной кисты необходимо проводить с\:{
	~Одонтомой
	~Цементомой
	~Твердой одонтомой
	~Репаративной гранулемой
	=Амелобластомой
}

// question: 4175122 name: Дифференциальную диагностику фолликулярной кисты необходимо проводить с:
::Дифференциальную диагностику фолликулярной кисты необходимо проводить с\:::[html]Дифференциальную диагностику фолликулярной кисты необходимо проводить с\:{
	~Одонтомой
	~Цементомой
	~Твердой одонтомой
	~Репаративной гранулемой

=Радикуляной кистой
}

// question: 4152313 name: Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с:
::Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:::[html]Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:{
~Эпидемическим паротитом.
~Остеомиелитом ветви нижней челюсти.
~Абсцессом околоушной области.
=Все ответы верны
}

// question: 4152314 name: Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с:
::Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:::[html]Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:{
~Абсцессом околоушной области.
~Слюнокаменной болезнью околоушной железы.
~Опухолями околоушной железы.
=Все ответы верны
}

// question: 4152315 name: Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с:
::Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:::[html]Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:{
~Эпидемическим паротитом.
~Слюнокаменной болезнью околоушной железы.
~Опухолями околоушной железы.
=Все ответы верны
}

// question: 4152316 name: Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с:
::Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:::[html]Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:{
~Эпидемическим паротитом.
~Остеомиелитом ветви нижней челюсти.
~Опухолями околоушной железы.
=Все ответы верны
}

// question: 4152317 name: Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с:
::Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:::[html]Дифференциальный диагноз гнойных паротитов проводится с\:{
	~Эпидемическим паротитом.
	~Абсцессом околоушной области.
	~Опухолями околоушной железы.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152520 name: Дифференциальный диагноз неспецифических острых артритов делается с:
::Дифференциальный диагноз неспецифических острых артритов делается с\:::[html]Дифференциальный диагноз неспецифических острых артритов делается с\:{
	~Фурункулом впереди козелка ушной раковины
	=Отомастоидитом
	~Контрактурой челюсти
	~Поднижнечелюстным аденитом
}

// question: 4152521 name: Дифференциальный диагноз неспецифических острых артритов делается с:
::Дифференциальный диагноз неспецифических острых артритов делается с\:::[html]Дифференциальный диагноз неспецифических острых артритов делается с\:{
	~Фурункулом впереди козелка ушной раковины
	=Воспалением лимфатического узла впереди козелка ушной раковины
	~Контрактурой челюсти
	~Поднижнечелюстным аденитом
}

// question: 4152528 name: Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с:
::Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с\:::[html]Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с\:{
	=Переломом суставного отростка
	~Среднесимфизарным переломом
	~Острым гнойным паротидитом
}

// question: 4152529 name: Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с:

::Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с\:::[html]Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с\:{
	=Лицевым параличем
	~Среднесимфизарным переломом
	~Острым гнойным паротидитом
}

// question: 4152530 name: Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с:
::Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с\:::[html]Дифференциальный диагноз односторонних передних вывихов осуществляется с\:{
	~Среднесимфизарным переломом
	~Острым гнойным паротидитом
	=Спастической контрактурой жевательных мышц
}

// question: 4152531 name: Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется:
::Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:::[html]Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:{
	~Перекись водорода 3%
	~Слабый раствор марганцовки
	~Хлорамин
	=Все ответы верны
}

// question: 4152532 name: Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется:
::Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:::[html]Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:{
	~Хлорамин
	~Хлоргексидин
	~Раствор пищевой соды
	=Все ответы верны
}

// question: 4152533 name: Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется:
::Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:::[html]Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:{
	~Перекись водорода 3%

~Хлоргексидин
~Раствор пищевой соды
=Все ответы верны
}

// question: 4152534 name: Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется:
::Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:::[html]Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:{
~Перекись водорода 3%
~Слабый раствор марганцовки
~Раствор пищевой соды
=Все ответы верны
}

// question: 4152535 name: Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется:
::Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:::[html]Для асептической обработки полости рта при травмах ЧЛО используется\:{
~Слабый раствор марганцовки
~Хлорамин
~Хлоргексидин
=Все ответы верны
}

// question: 4151738 name: ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО{
=наличие соединительнотканной капсулы
~инфильтративный рост
~наличие деаркационного вала
~быстрое распространение патологического процесса
}

// question: 4151959 name: ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА БРОВЕЙ ЛОСКУТ НА НОЖКЕ ФОРМИРУЮТ
::ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА БРОВЕЙ ЛОСКУТ НА НОЖКЕ ФОРМИРУЮТ::[html]ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА БРОВЕЙ ЛОСКУТ НА НОЖКЕ ФОРМИРУЮТ{
=на волосистой части головы
~в заушной области
~в лобной области
~в области губо-щечной складки

}

// question: 4151729 name: ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ ТЕЛА, УГЛОВ, ВЕТВИ И ...
::ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ ТЕЛА, УГЛОВ, ВЕТВИ И ...::[html]ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ ТЕЛА, УГЛОВ, ВЕТВИ И МЫЩЕЛКОВЫХ ОТРОСТКОВ ХАРАКТЕРНО СМЕЩЕНИЕ СРЕДНЕГО ОТЛОМКА В НАПРАВЛЕНИИ{
	=вниз и кзади
	~вниз и кпереди
	~вверх и кзади
	~вверх и кпереди
}

// question: 4151993 name: ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА
::ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА::[html]ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА{
	=Порта
	~Ванкевич
	~Тигерштедта
	~Збаржа
}

// question: 4151994 name: ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ПРИ БЕЗЗУБОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА
::ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ПРИ БЕЗЗУБОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА::[html]ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ПРИ БЕЗЗУБОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА{
	=Порта
	~Ванкевич
	~Тигерштедта
	~Збаржа
}

// question: 4151772 name: ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА
::ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА::[html]ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА{
	=Тигерштедта
	~Порта
	~Ванкевич

~гладкая шина-скоба
}

// question: 4151965 name: ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
::ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ::[html]ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ{
=мышцы
~кость
~хрящ
~титановые минипластины
}

// question: 4152259 name: Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы:
::Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы\:::[html]Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы\:{
=плотный болезненный или малоболезненный ограниченный инфильтрат в околоушной области,
~ гиперемия кожи, наличие уплотнения
~ обычно цвет кожи не изменен, из околоушного протока гнойное отделяемое с наличием плотного узла
}

// question: 4152260 name: Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы:
::Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы\:::[html]Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы\:{
= слюноотделение не нарушено
~ гиперемия кожи, наличие уплотнения
~ обычно цвет кожи не изменен, из околоушного протока гнойное отделяемое с наличием плотного узла
}

// question: 4152261 name: Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы:
::Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы\:::[html]Для ложного паротита Герценберга характерны симптомы\:{
~ гиперемия кожи, наличие уплотнения
~ обычно цвет кожи не изменен, из околоушного протока гнойное отделяемое с наличием плотного узла
= из околоушного протока выделяется прозрачная слюна.
}

// question: 4174950 name: Для определения соотношения суставной головки к суставному бугорку в ВНЧС ...

::Для определения соотношения суставной головки к суставному бугорку в ВНЧС ...::[html]Для определения соотношения суставной головки к суставному бугорку в ВНЧС проводится рентгенография\:{
=по Парма с открытым ртом
~томограмма с закрытым ртом
~нижней челюсти в боковой проекции
~лицевого черепа в боковой проекции
}

// question: 4152092 name: Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей характерно:
::Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей характерно\:::[html]Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей характерно\:{
= высокая температура тела, общее состояние больного тяжелое, подвижность причинного и соседних зубов, асимметрия лица
~ субфебрильная температура тела, общее состояние не нарушено
~ жалобы на интенсивные боли в челюсти, боли возникают приступообразно
~ жалобы на периодические ноющие боли в зубе
}

// question: 4152093 name: Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей характерно:
::Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей характерно\:::[html]Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей характерно\:{
~ субфебрильная температура тела, общее состояние не нарушено
~ жалобы на интенсивные боли в челюсти, боли возникают приступообразно
~ жалобы на периодические ноющие боли в зубе
= парестезия нижнего альвеолярного нерва в случае поражения нижней челюсти.
}

// question: 4151731 name: ДЛЯ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ ХАРАКТЕРНА СЛЕДУЮЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА
::ДЛЯ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ ХАРАКТЕРНА СЛЕДУЮЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА::[html]ДЛЯ ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ ХАРАКТЕРНА СЛЕДУЮЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА{
=боль в причинном зубе, увеличение регионарных лимфатических узлов, отек мягких тканей лица, сглаженность переходной складки, гиперемия слизистой оболочки на уровне причинного зуба
~безболезненная деформация тела нижней челюсти, при пальпации определяются плотные, безболезненные участки
~наличие секвестров на рентгенограмме и свищей в полости рта
~цианотичность кожи на стороне поражения, множественные свищевые ходы
}

// question: 4151899 name: ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ
::ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ::[html]ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ{
	=физиотерапию
	~массаж
	~СВЧ гипертермию
	~криотерапию
}

// question: 4151919 name: ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ
::ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ::[html]ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ{
	=дермабразию
	~массаж
	~СВЧ гипертермию
	~криотерапию
}

// question: 4151879 name: ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВНУТРИКОСТНАЯ ГЕМАНГИОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ» ...
::ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВНУТРИКОСТНАЯ ГЕМАНГИОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ» ...::[html]ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВНУТРИКОСТНАЯ ГЕМАНГИОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ{
	=компьютерная томография
	~цитологическое
	~радиоизотопное
	~биохимическое
}

// question: 4151808 name: ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА» ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ...
::ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА» ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ...::[html]ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА» ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ{
	=гистологическое
	~радиоизотопное
	~реакция Вассермана
	~динамика тимоловой пробы
}

// question: 4151809 name: ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА» ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ...
::ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА» ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ...::[html]ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА» ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ{
	=компьютерная томография
	~радиоизотопное
	~реакция Вассермана
	~биохимический анализ крови
}

// question: 4175114 name: Для подтверждения диагноза «Боковая киста шеи» проводится исследование:
::Для подтверждения диагноза «Боковая киста шеи» проводится исследование\:::[html]Для подтверждения диагноза «Боковая киста шеи» проводится исследование\:{
	~Биохимическое
	=Цитологическое
	~Радиоизотопное
	~Реакция Вассермана
	~Динамика тимоловой пробы
}

// question: 4175115 name: Для подтверждения диагноза «Боковой свищ шеи» проводится исследование:
::Для подтверждения диагноза «Боковой свищ шеи» проводится исследование\:::[html]Для подтверждения диагноза «Боковой свищ шеи» проводится исследование\:{
	~Цитологическое
	~Радиоизотопное
	~Реакция Вассермана
	~Динамика тимоловой пробы
	=Контрастная фистулография
}

// question: 4152031 name: ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ ТКАНЕЙ ДНА ...
::ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ ТКАНЕЙ ДНА ...::[html]ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ ТКАНЕЙ ДНА ПОЛОСТИ РТА ПРОВОДЯТ{
	=наложение трахеостомы
	~введение воздуховода
	~наложение бимаксиллярных шин

~прошивание и выведение языка
}

// question: 4152022 name: ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ
::ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ::[html]ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ{
=на границе задней и средней трети
~в передней трети
~по средней линии
~у корня
}

// question: 4152021 name: ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ
::ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ::[html]ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСФИКСИИ ЯЗЫК ПРОШИВАЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ{
=горизонтально
~под углом к средней линии
~вертикально по средней линии
~под углом к боковой поверхности языка
}

// question: 4151880 name: ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ХАРАКТЕРНА КАРТИНА
::ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ХАРАКТЕРНА КАРТИНА::[html]ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ХАРАКТЕРНА КАРТИНА{
=очаг затемнения с нечеткими границами в области образования
~в виде "тающего сахара"
~в виде нескольких полостей с четкими контурами
~с четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов
}

// question: 4175120 name: Для рентгенологической картины радикулярной кисты характерны изменения в ...
::Для рентгенологической картины радикулярной кисты характерны изменения в ...::[html]Для рентгенологической картины радикулярной кисты характерны изменения в костной ткани\:{
~В виде «тающего сахара»
~С нечеткими границами в области образования
~В виде нескольких полостей с четкими контурами
=С четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов
~Возможны все варианты

}

// question: 4175123 name: Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерны изменения в ...
::Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерны изменения в ...::[html]Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерны изменения в костной ткани\:{
	~В виде «тающего сахара»
	~С нечеткими границами в области образования
	~В виде нескольких полостей с четкими контурами
	~С четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов
	=С четкими контурами и тенью зуба в полости
}

// question: 4151996 name: ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ ПРИМЕНЯЮТ
::ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ ПРИМЕНЯЮТ::[html]ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ ПРИМЕНЯЮТ{
	=крючок Лимберга
	~распатор
	~зажим Кохера
	~крючок Фарабефа
}

// question: 4152030 name: ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ ПРИМЕНЯЮТ
::ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ ПРИМЕНЯЮТ::[html]ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ ПРИМЕНЯЮТ{
	=элеватор Карапетяна
	~распатор
	~зажим Кохера
	~крючок Фарабефа
}

// question: 4152575 name: Для склерозирования гемангиом применяют:
::Для склерозирования гемангиом применяют\:::[html]Для склерозирования гемангиом применяют\:{
	~Резорцин
	~Формалин
	=Спирт
	~Трипсин
	~Ни один
}

// question: 4151903 name: ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИЖИВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ...
::ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИЖИВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ...::[html]ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИЖИВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРОВОДИТСЯ{
	=ГБО-терапия
	~криотерапия
	~гидромассаж
	~электрокоагуляция
}

// question: 4151904 name: ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИЖИВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ...
::ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИЖИВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ...::[html]ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРИЖИВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРОВОДИТСЯ{
	=физиотерапия
	~гидромассаж
	~криотерапия
	~химиотерапия
}

// question: 4151906 name: ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НАЗНАЧАЮТ
::ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НАЗНАЧАЮТ::[html]ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НАЗНАЧАЮТ{
	=ГБО-терапию
	~криотерапию
	~химиотерапию
	~дезтоксинационную терапию
}

// question: 4151909 name: ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ЧЕЛЮСТЕЙ НАЗНАЧАЮТ
::ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ЧЕЛЮСТЕЙ НАЗНАЧАЮТ::[html]ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ЧЕЛЮСТЕЙ НАЗНАЧАЮТ{
	=ГБО-терапию
	~криотерапию
	~гормонотерапию
	~химиотерапию

}

// question: 4175093 name: Для уточнения диагностики злокачественных опухолей используется:
::Для уточнения диагностики злокачественных опухолей используется\:::[html]Для уточнения диагностики злокачественных опухолей используется\:{
	~компьютерная томография
	~магнито-резонансное исследование
	=ангиография
	~ультразвуковое исследование
	~гистологическое исследование
}

// question: 4152572 name: Для уточнения направления хода свищей шеи применяют:
::Для уточнения направления хода свищей шеи применяют\:::[html]Для уточнения направления хода свищей шеи применяют\:{
	~Цитологический метод
	~Радиоизотопный метод
	~Ультразвуковой метод
	=Контрастную фистулографию
	~Контрастную ангиографию
}

// question: 4152227 name: Для флегмоны глазницы характерно:
::Для флегмоны глазницы характерно\:::[html]Для флегмоны глазницы характерно\:{
	~ диплопия
	~ экзофтальм
	=Все ответы верны
}

// question: 4152228 name: Для флегмоны глазницы характерно:
::Для флегмоны глазницы характерно\:::[html]Для флегмоны глазницы характерно\:{
	~ отечность век
	~ боль при надавливании на глазное яблоко
	=Все ответы верны
}

// question: 4152229 name: Для флегмоны глазницы характерно:
::Для флегмоны глазницы характерно\:::[html]Для флегмоны глазницы характерно\:{
	~ диплопия
	~ боль при надавливании на глазное яблоко
	=Все ответы верны

}

// question: 4152230 name: Для флегмоны глазницы характерно:
::Для флегмоны глазницы характерно\:::[html]Для флегмоны глазницы характерно\:{
	~ диплопия
	~ отечность век
	=Все ответы верны
}

// question: 4152220 name: Для флегмоны корня языка характерно:
::Для флегмоны корня языка характерно\:::[html]Для флегмоны корня языка характерно\:{
	=резкие боли, острое начало, рот полуоткрыт
	~ ограничение открывания рта
	~ куполообразное выпячивание боковой стенки глотки.
}

// question: 4152221 name: Для флегмоны корня языка характерно:
::Для флегмоны корня языка характерно\:::[html]Для флегмоны корня языка характерно\:{
	=высокая температура, увеличение размеров языка
	~ограничение открывания рта
	~куполообразное выпячивание боковой стенки глотки.
}

// question: 4152222 name: Для флегмоны корня языка характерно:
::Для флегмоны корня языка характерно\:::[html]Для флегмоны корня языка характерно\:{
	=ограничение подвижности языка, затруднены глотание и дыхание
	~ограничение открывания рта
	~куполообразное выпячивание боковой стенки глотки.
}

// question: 4152214 name: Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно:
::Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно\:::[html]Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно\:{
	=боль при глотании, высокая температура
	~субфебрильная температура, медленное начало заболевания
	~отечность в нижних отделах височной области.
}

// question: 4152215 name: Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно:
::Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно\:::[html]Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно\:{
	=острое начало заболевания, воспалительная контрактура нижней челюсти
	~субфебрильная температура, медленное начало заболевания
	~отечность в нижних отделах височной области.
}

// question: 4152216 name: Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно:
::Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно\:::[html]Для флегмоны мягких тканей дна полости рта характерно\:{
	= припухлость и болезненность поднижнечелюстных областей
	~субфебрильная температура, медленное начало заболевания
	~отечность в нижних отделах височной области.
}

// question: 4152233 name: Для флегмоны щеки характерно:
::Для флегмоны щеки характерно\:::[html]Для флегмоны щеки характерно\:{
	= разлитая отечность мягких тканей щеки
	~ открывание рта свободное
	~ затруднение носового дыхания с одной стороны.
}

// question: 4152234 name: Для флегмоны щеки характерно:
::Для флегмоны щеки характерно\:::[html]Для флегмоны щеки характерно\:{
	= сглаженность носогубной складки
	~ открывание рта свободное
	~ затруднение носового дыхания с одной стороны.
}

// question: 4152235 name: Для флегмоны щеки характерно:
::Для флегмоны щеки характерно\:::[html]Для флегмоны щеки характерно\:{
	= открывание рта болезненное
	~ открывание рта свободное
	~ затруднение носового дыхания с одной стороны.
}

// question: 4152089 name: Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно:
::Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно\:::[html]Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно\:{
	= уменьшение количества лейкоцитов до верхней границы нормы
	~ появление юных нейтрофильных лейкоцитов

~ появление белка в моче.
}

// question: 4152090 name: Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно:
::Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно\:::[html]Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно\:{
=нормализация количества палочкоядерных клеток
~ появление юных нейтрофильных лейкоцитов
~ появление белка в моче.
}

// question: 4152091 name: Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно:
::Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно\:::[html]Для хронического одонтогенного остеомиелита характерно\:{
=уменьшение СОЭ
~ появление юных нейтрофильных лейкоцитов
~ появление белка в моче.
}

// question: 4152489 name: Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...
::Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...::[html]Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и дуги\:{
~Для уточнения локализации перелома
~Для выявления смещения фрагмента
=Все ответы верны.
}

// question: 4152490 name: Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...
::Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...::[html]Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и дуги\:{
~Для выявления перелома
~Для выявления смещения фрагмента
=Все ответы верны.
}

// question: 4152491 name: Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...

::Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...::[html]Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и дуги\:{
	~Для выявления перелома
	~Для уточнения диагноза
	=Все ответы верны.
}

// question: 4152492 name: Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...
::Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и...::[html]Для чего нужно рентгенологическое обследование при переломах скуловой кости и дуги\:{
	~Для уточнения диагноза
	~Для уточнения локализации перелома
	=Все ответы верны.
}

// question: 4151740 name: ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СКЛОННОСТЬЮ К РОСТУ
::ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СКЛОННОСТЬЮ К РОСТУ::[html]ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СКЛОННОСТЬЮ К РОСТУ{
	=экспансивному
	~инвазивному
	~медленному
	~быстрому
}

// question: 4157601 name: Донорская зона для забора лоскута на ножке при Индийской ринопластике:
::Донорская зона для забора лоскута на ножке при Индийской ринопластике\:::[html]Донорская зона для забора лоскута на ножке при Индийской ринопластике\:{
	~Передняя поверхность шеи
	=Лобная область
	~Щечная область
	~Височная область
}

// question: 4157627 name: Донорская зона для формирования классического филатовского стебля:

::Донорская зона для формирования классического филатовского стебля\:::[html]Донорская зона для формирования классического филатовского стебля\:{
	=Передне-боковая поверхность живота
	~Внутренняя поверхность бедра
	~Внутренняя поверхность плеча
	~Предплечье
}

// question: 4157628 name: Донорская зона для формирования острого филатовского стебля:
::Донорская зона для формирования острого филатовского стебля\:::[html]Донорская зона для формирования острого филатовского стебля\:{
	=Внутренняя поверхность плеча
	~Внутренняя поверхность бедра
	~Передне-боковая поверхность живота
	~Предплечье
}

// question: 4151874 name: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=рентгенография
	~биопсия
	~ЭОД
	~радиоизотопное
}

// question: 4151878 name: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ
::ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ::[html]ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ{
	=рентгенография
	~биопсия
	~ЭОД
	~радиоизотопное
}

// question: 4151811 name: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ

::ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ{
=компьютерная томография
~миография
~аудиометрия
~биохимия крови
}

// question: 4151818 name: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ
::ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ{
=тугоподвижность в суставе, выраженная по утрам
~шум в ушах
~нарушение глотания
~множественный кариес
}

// question: 4151866 name: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ
::ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ{
=смещение нижней челюсти в здоровую сторону
~нарушение глотания
~множественный кариес
~выраженный болевой симптом
}

// question: 4151867 name: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ
::ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ КЛИНИКИ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ{
=гипертрофия жевательных мышц на больной стороне
~нарушение глотания
~множественный кариес
~выраженный болевой симптом
}

// question: 4174992 name: Дополнительным методом исследования при диагностике анкилоза ВНЧС является:
::Дополнительным методом исследования при диагностике анкилоза ВНЧС является\:::[html]Дополнительным методом исследования при диагностике анкилоза ВНЧС является\:{
	~миография
	~аудиометрия
	~биохимия крови
	=компьютерная томография
}

// question: 4174966 name: Дополнительным методом исследования при диагностике костного анкилоза ВНЧС ...
::Дополнительным методом исследования при диагностике костного анкилоза ВНЧС ...::[html]Дополнительным методом исследования при диагностике костного анкилоза ВНЧС является\:{
	~миография
	~аудиометрия
	~биохимия крови
	=компьютерная томография
}

// question: 4151986 name: ДОСТУП ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ДОСТУП ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ДОСТУП ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=внутриротовой
	~по Евдокимову
	~по Рудько
	~по Диффенбаху
}

// question: 4151998 name: ДОСТУП ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА
::ДОСТУП ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА::[html]ДОСТУП ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА{
	=внеротовой
	~внутриротовой
	~наружный
	~внуртенний
}

// question: 4151997 name: ДОСТУП ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЭЛЕВАТОРОМ КАРАПЕТЯНА
::ДОСТУП ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЭЛЕВАТОРОМ КАРАПЕТЯНА::[html]ДОСТУП ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЭЛЕВАТОРОМ КАРАПЕТЯНА{
	=внутриротовой
	~внеротовой
	~наружный
	~внутренний
}

// question: 4174935 name: Дренирование абсцесса полости рта проводится
::Дренирование абсцесса полости рта проводится::[html]Дренирование абсцесса полости рта проводится{
	=резиновыми полосками
	~марлевыми полосками
	~ватными тампонами
	~бумажными салфетками
}

// question: 4151777 name: ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА ПРОВОДИТСЯ
::ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА ПРОВОДИТСЯ::[html]ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА ПОЛОСТИ РТА ПРОВОДИТСЯ{
	=резиновыми полосками
	~марлевыми полосками
	~ватными тампонами
	~бумажными салфетками
}

// question: 4151958 name: ДУБЛИРОВАННЫЙ ЛОСКУТ ПО РАУЭРУ ФОРМИРУЕТСЯ НА
::ДУБЛИРОВАННЫЙ ЛОСКУТ ПО РАУЭРУ ФОРМИРУЕТСЯ НА::[html]ДУБЛИРОВАННЫЙ ЛОСКУТ ПО РАУЭРУ ФОРМИРУЕТСЯ НА{
	=плече и груди
	~плече и животе
	~груди и животе
	~груди и шее
}

// question: 4175040 name: Если, по каким-либо причинам, не удается удалить базалиому, то применяют:
::Если, по каким-либо причинам, не удается удалить базалиому, то применяют\:::[html]Если, по каким-либо причинам, не удается удалить базалиому, то применяют\:{

=лучевую терапию
~химиотерапию
~назначают антибиотики
~наблюдают
}

// question: 4151722 name: ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО С ФЛЕГМОНОЙ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
::ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО С ФЛЕГМОНОЙ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА::[html]ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО С ФЛЕГМОНОЙ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА{
=болезненная припухлость в поднижнечелюстной области
~затрудненное открывание рта
~боль в области нижней челюсти
~боль при глотании
}

// question: 4175147 name: Заключительный диагноз «мягкая одонтома» ставится на основании данных:
::Заключительный диагноз «мягкая одонтома» ставится на основании данных\:::[html]Заключительный диагноз «мягкая одонтома» ставится на основании данных\:{
=Гистологии
~Цитологии
~Анализа крови
~Клинико-рентгенологического исследования
~Опроса
}

// question: 4175056 name: Заключительный диагноз при подозрении на опухоль ставится на основании:
::Заключительный диагноз при подозрении на опухоль ставится на основании\:::[html]Заключительный диагноз при подозрении на опухоль ставится на основании\:{
=морфологического исследования послеоперационного материала
~пункционной биопсии
~макроскопии послеоперационного материала
~ультразвукового исследования
~компьютерной томографии
}

// question: 4175074 name: Злокачественная костная опухоль:
::Злокачественная костная опухоль\:::[html]Злокачественная костная опухоль\:{

=Остеосаркома
~Остеома
~остеоид-остеома
~остеобластома
~оссифицирующаяся фиброма
}

// question: 4175057 name: Злокачественной одонтогенной опухолью является:
::Злокачественной одонтогенной опухолью является\:::[html]Злокачественной одонтогенной опухолью является\:{
~амелобластома
~дентинома
~миксома
~цементома
=одонтогенная карцинома
}

// question: 4152409 name: Зона с наименьшей сопротивляемостью при травмах нижней челюсти:
::Зона с наименьшей сопротивляемостью при травмах нижней челюсти\:::[html]Зона с наименьшей сопротивляемостью при травмах нижней челюсти\:{
~Угол
~На уровне клыка
~Между корнями премоляров
~Подбородочный симфиз
=Шейка суставного отростка.
}

// question: 4151920 name: ИДЕНТИЧНОСТЬ ЦВЕТА ПЕРЕСАЖЕННОЙ КОЖИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ КОЖИ ЛИЦА ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ...
::ИДЕНТИЧНОСТЬ ЦВЕТА ПЕРЕСАЖЕННОЙ КОЖИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ КОЖИ ЛИЦА ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ...::[html]ИДЕНТИЧНОСТЬ ЦВЕТА ПЕРЕСАЖЕННОЙ КОЖИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ КОЖИ ЛИЦА ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ{
=деэпидермизации
~гидромассажа
~физиотерапия
~криотерапии
}

// question: 4152553 name: Из дополнительных методов исследования больных остеобластокластомой челюсти ...

::Из дополнительных методов исследования больных остеобластокластомой челюсти ...::[html]Из дополнительных методов исследования больных остеобластокластомой челюсти наиболее информативным является\:{
	=Рентгенография
	~Компьютерная томография
	~Ультразвуковое исследование
	~Цитологическое исследование
}

// question: 4152554 name: Из дополнительных методов исследования больных остеобластокластомой челюсти ...
::Из дополнительных методов исследования больных остеобластокластомой челюсти ...::[html]Из дополнительных методов исследования больных остеобластокластомой челюсти наиболее информативным является\:{
	~Компьютерная томография
	~Ультразвуковое исследование
	~Цитологическое исследование
	=Патогистологическое исследование
}

// question: 4152602 name: Из злокачественных опухолей верхней челюсти наиболее часто встречается:
::Из злокачественных опухолей верхней челюсти наиболее часто встречается\:::[html]Из злокачественных опухолей верхней челюсти наиболее часто встречается\:{
	=Рак
	~Остеосаркома
	~Хондросаркома
	~Фибросаркома
	~Все вместе
}

// question: 4152565 name: Из злокачественных опухолей нижней челюсти чаще встречается:
::Из злокачественных опухолей нижней челюсти чаще встречается\:::[html]Из злокачественных опухолей нижней челюсти чаще встречается\:{
	~Остеосаркома
	~Амелобластома
	=Рак
	~Хондросаркома
	~Липома
}

// question: 4152561 name: Из злокачественных эпителиальных опухолей кожи лица наиболее часто встречается:
::Из злокачественных эпителиальных опухолей кожи лица наиболее часто встречается\:::[html]Из злокачественных эпителиальных опухолей кожи лица наиболее часто встречается\:{
	~Плоскоклеточный ороговевающий рак
	~Плоскоклеточный неороговевающий рак
	=Базальноклеточный рак
	~Аденокарцинома
	~Базалиом
}

// question: 4157607 name: Из каких тканей состоит артеризированный лоскут на питающей ножке:
::Из каких тканей состоит артеризированный лоскут на питающей ножке\:::[html]Из каких тканей состоит артеризированный лоскут на питающей ножке\:{
	~Кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы и кости
	=Кожа, подкожно-жировая клетчатка и сосудистый пучок
	~Расщепленная кожа
	~Кожа, подкожно-жировая клетчатка и мышцы
}

// question: 4157606 name: Из каких тканей состоит лоскут на питающей ножке:
::Из каких тканей состоит лоскут на питающей ножке\:::[html]Из каких тканей состоит лоскут на питающей ножке\:{
	~Слизистая оболочка
	=Кожа и подкожно-жировая клетчатка
	~Расщепленная кожа
	~Кожа, подкожно-жировая клетчатка и мышцы
}

// question: 4152036 name: Из числа острых одонтогенных воспалительных заболеваний челюстей следует ...
::Из числа острых одонтогенных воспалительных заболеваний челюстей следует ...::[html]Из числа острых одонтогенных воспалительных заболеваний челюстей следует выделять\:{
	~только остеомиелит
	~периодонтит и остеомиелит
	=периодонтит, периостит и остеомиелит
	~периостит и остеомиелит
	~периостит
}

// question: 4152603 name: Из эпителиальных опухолей больших слюнных желез чаще встречается:
::Из эпителиальных опухолей больших слюнных желез чаще встречается\:::[html]Из эпителиальных опухолей больших слюнных желез чаще встречается\:{
	~Киста
	~Мономорфная аденома
	=Плеоморфная аденома
	~Аденокарцинома
	~Аденокистозная карцинома
}

// question: 4151654 name: Инструмент для репозиции скуловой кости при ее переломе:
::Инструмент для репозиции скуловой кости при ее переломе\:::[html]Инструмент для репозиции скуловой кости при ее переломе\:{
	~шпатель
	~распатор
	~зажим Кохера
	~крючок Фарабефа
	=элеватор Карапетяна
}

// question: 4151655 name: Инструмент для репозиции скуловой кости при ее переломе:
::Инструмент для репозиции скуловой кости при ее переломе\:::[html]Инструмент для репозиции скуловой кости при ее переломе\:{
	~шпатель
	~распатор
	~зажим Кохера
	~крючок Фарабефа
	=крючок Лимберга.
}

// question: 4152283 name: Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из:
::Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:::[html]Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:{
	~Назначение антибиотиков широкого спектра действия
	~Иммунотерапия (гамоглобулины, антистафилоккоковая сыворотка)
	~Дезинтоксикация (Гемодез, р ор Рингера, р ор Глюкозы 5%)
	=Все ответы верны
}

// question: 4152284 name: Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из:
::Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:::[html]Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:{
	~Дезинтоксикация (Гемодез, р ор Рингера, р ор Глюкозы 5%)
	~Гепарин 2.500 5000 ЕД через каждые 4 6 часов
	~Десенсибилизирующие средства (Димедрол, Кальций Глюконат, Тавегил, Супрастин).
	=Все ответы верны
}

// question: 4152285 name: Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из:
::Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:::[html]Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:{
	~Назначение антибиотиков широкого спектра действия
	~Гепарин 2.500 5000 ЕД через каждые 4 6 часов
	~Десенсибилизирующие средства (Димедрол, Кальций Глюконат, Тавегил, Супрастин).
	=Все ответы верны
}

// question: 4152286 name: Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из:
::Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:::[html]Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:{
	~Назначение антибиотиков широкого спектра действия
	~Иммунотерапия (гамоглобулины, антистафилоккоковая сыворотка)
	~Десенсибилизирующие средства (Димедрол, Кальций Глюконат, Тавегил, Супрастин).
	=Все ответы верны
}

// question: 4152287 name: Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из:
::Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:::[html]Интенсивное лечение тромбофлебита лицевых вен состоит из\:{
	~Назначение антибиотиков широкого спектра действия
	~Дезинтоксикация (Гемодез, р ор Рингера, р ор Глюкозы 5%)
	~Гепарин 2.500 5000 ЕД через каждые 4 6 часов
	=Все ответы верны
}

// question: 4151756 name: ИНФИЦИРОВАНИЕ ПОЗАДИЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОИСХОДИТ
::ИНФИЦИРОВАНИЕ ПОЗАДИЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОИСХОДИТ::[html]ИНФИЦИРОВАНИЕ ПОЗАДИЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОИСХОДИТ{
	=при распространении процесса из окологлоточного и крыловиднонижнечелюстного пространства
	~от нижних зубов мудрости
	~от верхних зубов мудрости
	~при распространении воспалительного процесса из подвисочной и крылонебной ямки
}

// question: 4151873 name: ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ...
::ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ...::[html]ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНИ{
	=ангиография
	~магнитно-ядерная томография
	~сцинтиграфия
	~компьютерная томография
}

// question: 4175078 name: К видам остеомы относится:
::К видам остеомы относится\:::[html]К видам остеомы относится\:{
	~периферическая, центральная
	=губчатая,компактная
	~кистозная,полостная
	~ячистая,литическая
	~секвестирующая, несеквестирующая
}

// question: 4151810 name: К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АРТРОЗА ВНЧС ОТНОСИТСЯ
::К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АРТРОЗА ВНЧС ОТНОСИТСЯ::[html]К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АРТРОЗА ВНЧС ОТНОСИТСЯ{
	=томография ВНЧС
	~миография
	~аудиометрия
	~биохимия крови
}

// question: 4175109 name: К дополнительным методам исследования проводимым для верификации ...
::К дополнительным методам исследования проводимым для верификации ...::[html]К дополнительным методам исследования проводимым для верификации «онкологического диагноза челюстно-лицевой области» относится\:{
	~Физикальный
	~Биохимический
	=Цитологический
	~Иммунологический
	~Ангиографический
}

// question: 4175110 name: К дополнительным методам исследования проводимым для верификации ...
::К дополнительным методам исследования проводимым для верификации ...::[html]К дополнительным методам исследования проводимым для верификации «онкологического диагноза челюстно-лицевой области» относится\:{
	~Физикальный
	~Биохимический
	=Гистологический
	~Иммунологический
	~Ангиографический
}

// question: 4152599 name: К запущенным стадиям рака языка относятся стадии:
::К запущенным стадиям рака языка относятся стадии\:::[html]К запущенным стадиям рака языка относятся стадии\:{
	~1
	~2
	=4
	~5
}

// question: 4152600 name: К запущенным стадиям рака языка относятся стадии:
::К запущенным стадиям рака языка относятся стадии\:::[html]К запущенным стадиям рака языка относятся стадии\:{
	~1
	~2
	~3
	=5
}

// question: 4151746 name: К ИЗВЕСТНЫМ ВИДАМ АСФИКСИЙ ОТНОСЯТ ВСЕ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ, КРОМЕ
::К ИЗВЕСТНЫМ ВИДАМ АСФИКСИЙ ОТНОСЯТ ВСЕ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ, КРОМЕ::[html]К ИЗВЕСТНЫМ ВИДАМ АСФИКСИЙ ОТНОСЯТ ВСЕ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ, КРОМЕ{
	=спастической
	~клапанной
	~дислокационной
	~обтурационной
}

// question: 4151704 name: К ИНВАЗИВНОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЛО ОТНОСИТСЯ
::К ИНВАЗИВНОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЛО ОТНОСИТСЯ::[html]К ИНВАЗИВНОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЛО ОТНОСИТСЯ{
	=цитологическое исследование кисты путем пункции
	~цитологическое исследование язвы языка путем отпечатка
	~УЗ – исследование опухоли
	~компьютерная томография
}

// question: 4174936 name: К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относятся
::К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относятся::[html]К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относятся{
	~кислотный некроз
	~клиновидный дефект
	=флюороз
	~эрозия эмали
	~очаговая деминерализация эмали
}

// question: 4175133 name: К неодонтогенным кистам по происхождению относится:
::К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:::[html]К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:{
	=Носо-небного канала
	~Кератокиста
	~Радикулярная
	~Фолликулярная
	~Все выше перечисленные
}

// question: 4175134 name: К неодонтогенным кистам по происхождению относится:
::К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:::[html]К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:{
	=Шаровидно-верхнечелюстная
	~Кератокиста
	~Радикулярная
	~Фолликулярная
	~Все выше перечисленные
}

// question: 4175135 name: К неодонтогенным кистам по происхождению относится:
::К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:::[html]К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:{
	=Шаровидно-верхнечелюстная
	~Кератокиста
	~Радикулярная
	~Фолликулярная
	~Все выше перечисленные
}

// question: 4175136 name: К неодонтогенным кистам по происхождению относится:
::К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:::[html]К неодонтогенным кистам по происхождению относится\:{
	=Носо-губная
	~Кератокиста
	~Радикулярная
	~Фолликулярная
	~Все выше перечисленные
}

// question: 4152588 name: К облигатному предраку кожи лица относится:
::К облигатному предраку кожи лица относится\:::[html]К облигатному предраку кожи лица относится\:{
	=Болезнь Боуэна, пигментированная ксеродерма
	~Красный плоский лишай
	~Туберкулёзная волчанка
	~Красная волчанка
	~Кератоакантома
}

// question: 4175048 name: К облигатным предракам красной каймы губ относится:
::К облигатным предракам красной каймы губ относится\:::[html]К облигатным предракам красной каймы губ относится\:{

~лейкоплакия и папилломатоз
~папилломатоз и кератоакантома
~кожный рог и болезнь Боуэна
=ограниченный гиперкератоз и бородавчатый предрак
~кератоакантома и кожный рог
}

// question: 4151706 name: К ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ЧЕЛЮСТЕЙ ОТНОСЯТСЯ
::К ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ЧЕЛЮСТЕЙ ОТНОСЯТСЯ::[html]К ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ЧЕЛЮСТЕЙ ОТНОСЯТСЯ{
=амелобластомы
~гемангиомы челюстей
~остеобластокластомы
~фибромы
}

// question: 4152579 name: К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится:
::К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится\:::[html]К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится\:{
=Хирургический
~Паллиативный
~Симптоматический
}

// question: 4152580 name: К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится:
::К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится\:::[html]К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится\:{
=Лучевой
~Паллиативный
~Симптоматический
}

// question: 4152581 name: К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится:
::К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится\:::[html]К основным методам лечения больных со злокачественными опухолями относится\:{
=Лекарственный

~Паллиативный
~Симптоматический
}

// question: 4151724 name: К РАННИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ДВУСТОРОННЕГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА ...
::К РАННИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ДВУСТОРОННЕГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА ...::[html]К РАННИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ДВУСТОРОННЕГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА ТЕЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ{
=кровотечение из щелей перелома челюсти
~анкилоз ВНЧС
~ложный сустав
~нагноение костной раны
}

// question: 4151814 name: К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЯМ ВНЧС ОТНОСИТСЯ
::К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЯМ ВНЧС ОТНОСИТСЯ::[html]К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЯМ ВНЧС ОТНОСИТСЯ{
=туберкулез
~болезнь Дауна
~болезнь Менкельсона-Розенталя
~болезнь Бехтерева
}

// question: 4151849 name: К увеличению объема скуловой кости может привести
::К увеличению объема скуловой кости может привести::[html]К увеличению объема скуловой кости может привести{
=саркома
~травматическое поражение
~радикулярная киста
~капиллярная гемангиома
}

// question: 4151850 name: К УМЕНЬШЕНИЮ ОБЬЕМА СКУЛОВОЙ КОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
::К УМЕНЬШЕНИЮ ОБЬЕМА СКУЛОВОЙ КОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ::[html]К УМЕНЬШЕНИЮ ОБЬЕМА СКУЛОВОЙ КОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ{
=травматическое поражение
~микрогения
~радикулярная киста
~капиллярная гемангиома
}

// question: 4152589 name: К факультативному предраку кожи лица относится:
::К факультативному предраку кожи лица относится\:::[html]К факультативному предраку кожи лица относится\:{
	~Дерматит
	=Папиллома
	~Псориаз
	~Радиоэпидермит
	~Болезнь Боуэна
}

// question: 4157625 name: Как выполняется перенос филатовского стебля к месту дефекта:
::Как выполняется перенос филатовского стебля к месту дефекта\:::[html]Как выполняется перенос филатовского стебля к месту дефекта\:{
	=«Гусеничный шаг»
	~Свободная пересадка
	~Ксеногенная трансплантация
	~Аллогенная трансплантация
}

// question: 4157626 name: Как выполняется перенос филатовского стебля к месту дефекта:
::Как выполняется перенос филатовского стебля к месту дефекта\:::[html]Как выполняется перенос филатовского стебля к месту дефекта\:{
	=Через предплечье
	~Свободная пересадка
	~Ксеногенная трансплантация
	~Аллогенная трансплантация
}

// question: 4152083 name: Как долго продолжается хроническая стадия одонтогенного остеомиелита нижней ...
::Как долго продолжается хроническая стадия одонтогенного остеомиелита нижней ...::[html]Как долго продолжается хроническая стадия одонтогенного остеомиелита нижней челюсти в области ветви?\:{
	~ 1 2 недели
	~ 3 4 недели
	~ не более 4 6 недель
	~ 1 месяц
	=4 6 недель, а иногда несколько месяцев и даже лет.
}

// question: 4151648 name: Как иначе можно назвать тип перелома верхней челюсти по ФОР 1:
::Как иначе можно назвать тип перелома верхней челюсти по ФОР 1\:::[html]Как иначе можно назвать тип перелома верхней челюсти по ФОР 1\:{
	~суббазальный
	~суборбитальный
	=отрыв альвеолярного отростка
	~субдорсальный
}

// question: 4151670 name: Как интерпретировать положительную пробу «двойного пятна»:
::Как интерпретировать положительную пробу «двойного пятна»\:::[html]Как интерпретировать положительную пробу «двойного пятна»\:{
	=Наличие ликвореи на фоне кровотечения
	~Наличие ликвореи на фоне ринореи
	~Наличие ликвореи на фоне лимфореи
}

// question: 4157641 name: Как называется свободный кожный лоскут по Блеру-Брауну:
::Как называется свободный кожный лоскут по Блеру-Брауну\:::[html]Как называется свободный кожный лоскут по Блеру-Брауну\:{
	=Расщепленный
	~В три четверти толщины
	~Полнослойный
	~Тонкий дермоэпителиальный
}

// question: 4157642 name: Как называется свободный кожный лоскут по Педжету:
::Как называется свободный кожный лоскут по Педжету\:::[html]Как называется свободный кожный лоскут по Педжету\:{
	~Расщепленный
	=В три четверти толщины
	~Полнослойный
	~Тонкий дермоэпителиальный
}

// question: 4157640 name: Как называется свободный кожный лоскут по Тиршу:
::Как называется свободный кожный лоскут по Тиршу\:::[html]Как называется свободный кожный лоскут по Тиршу\:{
	~Расщепленный
	~В три четверти толщины

~Полнослойный
=Тонкий дермоэпителиальный
}

// question: 4151657 name: Как называется симптом, характеризующийся болью по ходу щели перелома верхней...
::Как называется симптом, характеризующийся болью по ходу щели перелома верхней...::[html]Как называется симптом, характеризующийся болью по ходу щели перелома верхней челюсти при надавливании указательным пальцем на крючки крыловидных отростков клиновидной кости\:{
~симптом Венсана
=симптом Герена
~симптом Петрова
~симптом Валле
}

// question: 4157615 name: Как называется Филатовский стебель, который одномоментно формируется и ...
::Как называется Филатовский стебель, который одномоментно формируется и ...::[html]Как называется Филатовский стебель, который одномоментно формируется и подшивается к месту дефекта\:{
~Одномоментный
=Острый
~Быстрый
~Традиционный
}

// question: 4157616 name: Как называется Филатовский стебель, который одномоментно формируется и ...
::Как называется Филатовский стебель, который одномоментно формируется и ...::[html]Как называется Филатовский стебель, который одномоментно формируется и подшивается на предплечье\:{
~Острый
=Ускоренный
~Быстрый
~Традиционный
}

// question: 4157618 name: Как называется Филатовский стебель, который переносится к месту дефекта по ...
::Как называется Филатовский стебель, который переносится к месту дефекта по ...::[html]Как называется Филатовский стебель, который переносится к месту дефекта по поверхности тела пациента\:{

~Острый
=Шагающий
~Быстрый
~Традиционный
}

// question: 4157617 name: Как называется Филатовский стебель, который формируется и поэтапно ...
::Как называется Филатовский стебель, который формируется и поэтапно ...::[html]Как называется Филатовский стебель, который формируется и поэтапно переносится к месту дефекта\:{
~Острый
=Классический
~Быстрый
~Традиционный
}

// question: 4152474 name: Как накладывается лигатура на язык при дислокационной асфиксии:
::Как накладывается лигатура на язык при дислокационной асфиксии\:::[html]Как накладывается лигатура на язык при дислокационной асфиксии\:{
~Вертикально
=Горизонтально
~На кончике языка
~На середине языка.
}

// question: 4152475 name: Как накладывается лигатура на язык при дислокационной асфиксии:
::Как накладывается лигатура на язык при дислокационной асфиксии\:::[html]Как накладывается лигатура на язык при дислокационной асфиксии\:{
~Вертикально
=В передней трети языка
~На кончике языка
~На середине языка.
}

// question: 4157589 name: Как по автору называется методика пластики встречными треугольными лоскутами:
::Как по автору называется методика пластики встречными треугольными лоскутами\:::[html]Как по автору называется методика пластики встречными треугольными лоскутами\:{
~Аббе

=Лимберга
~Мокиенко
~Донскому
}

// question: 4175099 name: Какая из аденом называется опухолью Уортина?:
::Какая из аденом называется опухолью Уортина?\:::[html]Какая из аденом называется опухолью Уортина?\:{
~Плеоморфная аденома
~Светлоклеточная аденома
=Аденолимфома
~Базальноклеточная аденома
~Миоэпителиальная аденома
}

// question: 4151710 name: КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФОРМ ЛЕЙКОПЛАКИИ ОТНОСИТСЯ К ОБЛИГАТНОМУ ПРЕДРАКУ
::КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФОРМ ЛЕЙКОПЛАКИИ ОТНОСИТСЯ К ОБЛИГАТНОМУ ПРЕДРАКУ::[html]КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФОРМ ЛЕЙКОПЛАКИИ ОТНОСИТСЯ К ОБЛИГАТНОМУ ПРЕДРАКУ{
=эрозивно-язвенная
~Таппейнера
~плоская
~мягкая
}

// question: 4157679 name: Какая методика пластики выполняется с целью устранения частичных дефектов ...
::Какая методика пластики выполняется с целью устранения частичных дефектов ...::[html]Какая методика пластики выполняется с целью устранения частичных дефектов нижней губы\:{
~Крайля
=Шимановского
~Аббе
~Свободная пересадка тканей
}

// question: 4157675 name: Какая операция выполняется с целью пластики деформации верхней губы при ...
::Какая операция выполняется с целью пластики деформации верхней губы при ...::[html]Какая операция выполняется с целью пластики деформации верхней губы при врожденной расщелине\:{
~Крайля

~Лексера
~Седилло
=Лимберга
}

// question: 4157674 name: Какая операция выполняется с целью пластики несквозных дефектов губ у мужчин:
::Какая операция выполняется с целью пластики несквозных дефектов губ у мужчин\:::[html]Какая операция выполняется с целью пластики несквозных дефектов губ у мужчин\:{
~По Аббе
~Крайля
=Лексера
}

// question: 4157687 name: Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы:
::Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы\:::[html]Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы\:{
~Аббе
~Рауэра
=Диффенбаха
~Евдокимова
}

// question: 4157688 name: Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы:
::Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы\:::[html]Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы\:{
~Аббе
=Брунса
~Рауэра
~Евдокимова
}

// question: 4157689 name: Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы:
::Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы\:::[html]Какая операция выполняется с целью пластики тотального дефекта нижней губы\:{
~Аббе

~Брунса
~Седилло
~Евдокимова
}

// question: 4157686 name: Какая операция выполняется с целью пластики уплощенной верхней губы:
::Какая операция выполняется с целью пластики уплощенной верхней губы\:::[html]Какая операция выполняется с целью пластики уплощенной верхней губы\:{
=Аббе
~Брунса
~Седилло
~Диффенбаха
}

// question: 4152522 name: Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита ...
::Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита ...::[html]Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита нижнечелюстного сустава\:{
=Суставная капсула
~Суставной отросток
~Суставная полость
}

// question: 4152523 name: Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита ...
::Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита ...::[html]Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита нижнечелюстного сустава{
=Суставные связки
~Суставной отросток
~Суставная полость
}

// question: 4152524 name: Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита ...
::Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита ...::[html]Какие анатомические элементы затронуты в подострой фазе артрита нижнечелюстного сустава\:{
=Суставный мениск
~Суставной отросток

~Суставная полость
}

// question: 4157596 name: Какие дефекты являются показанием для пластики местными тканями при помощи ...
::Какие дефекты являются показанием для пластики местными тканями при помощи ...::[html]Какие дефекты являются показанием для пластики местными тканями при помощи мобилизации краев раны\:{
~Обширные
=Линейные с небольшим дефицитом
~Сквозные больших размеров
~Линейные с большим дефицитом
}

// question: 4152303 name: Какие из нижеперечисленных симптомов присутствуют при хроническом сообщении ...
::Какие из нижеперечисленных симптомов присутствуют при хроническом сообщении ...::[html]Какие из нижеперечисленных симптомов присутствуют при хроническом сообщении верхнечелюстной пазухи с полостью рта\:{
=В пазуху можно попасть через лунку при помощи тупого инструмента
~Симптом Валсалва отрицательный .
~Рентгенологически, верхнечелюстная пазуха в норме.
~Можно выявить рентгенологически сообщение верхнечелюстной пазухи с полостью рта.
}

// question: 4152304 name: Какие из нижеперечисленных симптомов присутствуют при хроническом сообщении ...
::Какие из нижеперечисленных симптомов присутствуют при хроническом сообщении ...::[html]Какие из нижеперечисленных симптомов присутствуют при хроническом сообщении верхнечелюстной пазухи с полостью рта\:{
~Симптом Валсалва отрицательный .
~Рентгенологически, верхнечелюстная пазуха в норме.
~Можно выявить рентгенологически сообщение верхнечелюстной пазухи с полостью рта.
= Жидкость попадает из полости рта в нос.
}

// question: 4152256 name: Какие клинические формы лимфаденитов подвержены консервативному лечению.
::Какие клинические формы лимфаденитов подвержены консервативному лечению.::[html]Какие клинические формы лимфаденитов подвержены консервативному лечению.{

~Острый гнойный лимфаденит.
~Специфические лимфадениты.
=Острый серозный лимфаденит .
~Травматический лимфаденит.
~Все формы лимфаденитов.
}

// question: 4151661 name: Какие методы дополнительного исследования рекомендованы для диагностики ...
::Какие методы дополнительного исследования рекомендованы для диагностики ...::[html]Какие методы дополнительного исследования рекомендованы для диагностики переломов верхней челюсти\:{
~УЗ-исследование
~МРТ-исследование
=Рентгенологическое исследование
~Эндоскопическое исследование
}

// question: 4152440 name: Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?
::Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?::[html]Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?{
~Лигатура не должна травмировать зуб
~Концы лигатуры длиной 5 7 мм и загибаются к центру и окклюзионной линии
=Все ответы верны
}

// question: 4152441 name: Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?
::Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?::[html]Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?{
~Шина фиксируется проволокой на каждый зуб или через зуб
~Концы лигатуры длиной 5 7 мм и загибаются к центру и окклюзионной линии
=Все ответы верны
}

// question: 4152442 name: Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?
::Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?::[html]Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?{

~Шина фиксируется проволокой на каждый зуб или через зуб
~Лигатура располагается у шейки зуба
=Все ответы верны
}

// question: 4152443 name: Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?
::Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?::[html]Какие основные правила наложения лигатур для фиксации шин на зубные ряды?{
~Лигатура располагается у шейки зуба
~Лигатура не должна травмировать зуб
=Все ответы верны
}

// question: 4152064 name: Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?
::Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?::[html]Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?{
=гнойное расплавление тромбов
~снижение свертываемости крови
~асептическое воспаление
~кортикальная пластинка без изменений
}

// question: 4152065 name: Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?
::Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?::[html]Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?{
~снижение свертываемости крови
~асептическое воспаление
~кортикальная пластинка без изменений
=участки кровоизлияния
}

// question: 4152066 name: Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?
::Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?::[html]Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?{
~снижение свертываемости крови

~асептическое воспаление
~кортикальная пластинка без изменений
=участки остеонекроза
}

// question: 4152062 name: Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?
::Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?::[html]Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?{
=гнойная инфильтрация костного мозга
~снижение свертываемости крови
~асептическое воспаление
~кортикальная пластинка без изменений
}

// question: 4152063 name: Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?
::Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?::[html]Какие патоморфологические изменения наблюдаются при одонтогенном остеомиелите?{
=тромбоз сосудов
~снижение свертываемости крови
~асептическое воспаление
~кортикальная пластинка без изменений
}

// question: 4152310 name: Какие признаки появляются при гнойных паротитах:
::Какие признаки появляются при гнойных паротитах\:::[html]Какие признаки появляются при гнойных паротитах\:{
~Отёк перед козелком уха.
~Отечность устья выводного протока околоушной железы , при надавливании на железу появляется гной.
=Все ответы верны
}

// question: 4152311 name: Какие признаки появляются при гнойных паротитах:
::Какие признаки появляются при гнойных паротитах\:::[html]Какие признаки появляются при гнойных паротитах\:{
~Кожные покровы в области околоушной железы гиперемированны.
~Ограничение открывания рта
=Все ответы верны
}

// question: 4152312 name: Какие признаки появляются при гнойных паротитах:
::Какие признаки появляются при гнойных паротитах\:::[html]Какие признаки появляются при гнойных паротитах\:{
	~Отёк перед козелком уха.
	~Ограничение открывания рта
	=Все ответы верны
}

// question: 4152517 name: Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите:
::Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите\:::[html]Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите\:{
	~Смещение подбородка
	=Спонтанные иррадиирущие боли
	~Все ответы верны
}

// question: 4152518 name: Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите:
::Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите\:::[html]Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите\:{
	~Смещение подбородка
	=Отечность впереди козелка ушной раковины
	~Все ответы верны
}

// question: 4152519 name: Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите:
::Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите\:::[html]Какие симптомы присутствуют при остром неспецифическом артрите\:{
	~Смещение подбородка
	=Ограничение движений челюсти
	~Все ответы верны
}

// question: 4175024 name: Какие формы лейкоплакий следует отнести к предраковым заболеваниям:
::Какие формы лейкоплакий следует отнести к предраковым заболеваниям\:::[html]Какие формы лейкоплакий следует отнести к предраковым заболеваниям\:{
	~лейкоплакия Таппейнера

~плоская лейкоплакия
~эрозивно-язвенная и плоская лейкоплакия
=эрозивно-язвенная и веррукозная лейкоплакия
}

// question: 4152128 name: Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области:
::Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:::[html]Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:{
~Гнойные процессы от нижних резцов и клыков
~Гнойные подбородочные лимфадениты
~Фурункул нижней губы или подбородка
=Все ответы верны
}

// question: 4152129 name: Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области:
::Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:::[html]Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:{
~Фурункул нижней губы или подбородка
~Распространение из соседних областей (подъязычной, поднижнечелюстной)
~Остеомиелит в области подбородка.
=Все ответы верны
}

// question: 4152130 name: Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области:
::Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:::[html]Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:{
~Гнойные подбородочные лимфадениты
~Фурункул нижней губы или подбородка
~Распространение из соседних областей (подъязычной, поднижнечелюстной)
=Все ответы верны
}

// question: 4152131 name: Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области:
::Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:::[html]Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:{

~Гнойные процессы от нижних резцов и клыков
~Распространение из соседних областей (подъязычной, поднижнечелюстной)
~Остеомиелит в области подбородка.
=Все ответы верны
}

// question: 4152132 name: Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области:
::Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:::[html]Какие этиологические факторы абсцесса, флегмоны подбородочной области\:{
~Гнойные процессы от нижних резцов и клыков
~Гнойные подбородочные лимфадениты
~Остеомиелит в области подбородка.
=Все ответы верны
}

// question: 4157599 name: Каким должно быть соотношение ширины к длине при выкраивании лоскута на ножке:
::Каким должно быть соотношение ширины к длине при выкраивании лоскута на ножке\:::[html]Каким должно быть соотношение ширины к длине при выкраивании лоскута на ножке\:{
~1\:2
=1\:3
~1\:4
~1\:5
}

// question: 4152059 name: Каким методом вскрывают поднадкостничный абсцесс на твёрдом нёбе?
::Каким методом вскрывают поднадкостничный абсцесс на твёрдом нёбе?::[html]Каким методом вскрывают поднадкостничный абсцесс на твёрдом нёбе?{
~ линейный разрез параллельно альвеолярному краю
=иссечение небольшого участка мягких тканей треугольной формы
~ линейный разрез перпендикулярно срединному нёбному шву
~ линейный разрез параллельно срединному нёбному шву
}

// question: 4152060 name: Каким методом вскрывают поднадкостничный абсцесс на твёрдом нёбе?
::Каким методом вскрывают поднадкостничный абсцесс на твёрдом нёбе?::[html]Каким методом вскрывают поднадкостничный абсцесс на твёрдом нёбе?{
~ линейный разрез параллельно альвеолярному краю

~ линейный разрез перпендикулярно срединному нёбному шву
=иссечение небольшого участка мягких тканей ввиде „лимонной дольки”
~ линейный разрез параллельно срединному нёбному шву
}

// question: 4152292 name: Каким эпителием выстлана верхнечелюстная пазуха у взрослых?:
::Каким эпителием выстлана верхнечелюстная пазуха у взрослых?\:::[html]Каким эпителием выстлана верхнечелюстная пазуха у взрослых?\:{
~ плоским неороговевающим
~ плоским ороговевшим
= многослойным мерцательным
~ цилиндрическим
~ кубическим.
}

// question: 4152382 name: Какова главная причина того, что ЧЛО более подвержена травматизму:
::Какова главная причина того, что ЧЛО более подвержена травматизму\:::[html]Какова главная причина того, что ЧЛО более подвержена травматизму\:{
~Богата кровеносными сосудами, нервами, лимфоузлами и др.
~В этой области локализованы важные органы (глаза, уши, нос, слюнные железы и др.)
=Незащищена (все травмирующие агенты чаще направлены в сторону лица), предрасположена, хрупкая
~Тонкая кожа, соединительная жировая ткань практически отсутствует
~Все ответы верны.
}

// question: 4152412 name: Какова роль временной иммобилизации:
::Какова роль временной иммобилизации\:::[html]Какова роль временной иммобилизации\:{
~Привести отломки в нормальную анатомическую позицию
=Уменьшить боль
~Предотвратить инфицирование
}

// question: 4152413 name: Какова роль временной иммобилизации:
::Какова роль временной иммобилизации\:::[html]Какова роль временной иммобилизации\:{
~Привести отломки в нормальную анатомическую позицию
~Предотвратить инфицирование
=Уменьшить риск асфиксии

}

// question: 4152414 name: Какова роль временной иммобилизации:
::Какова роль временной иммобилизации\:::[html]Какова роль временной иммобилизации\:{
	~Привести отломки в нормальную анатомическую позицию
	~Предотвратить инфицирование
	=Уменьшить кровотечение.
}

// question: 4175006 name: Какое из заболеваний относится к облигатному предраку красной каймы губ:
::Какое из заболеваний относится к облигатному предраку красной каймы губ\:::[html]Какое из заболеваний относится к облигатному предраку красной каймы губ\:{
	~лейкоплакия
	~кератоакантома
	~кожный рог
	=бородавчатый предрак
}

// question: 4175005 name: Какое из заболеваний относится к облигатным предракам:
::Какое из заболеваний относится к облигатным предракам\:::[html]Какое из заболеваний относится к облигатным предракам\:{
	~Лейкоплакия
	=болезнь Боуэна
	~Папилломатоз
	~постлучевой стоматит
}

// question: 4175007 name: Какое из заболеваний следует отнести к облигатному предраку красной каймы губ:
::Какое из заболеваний следует отнести к облигатному предраку красной каймы губ\:::[html]Какое из заболеваний следует отнести к облигатному предраку красной каймы губ\:{
	~лейкоплакия
	~кератоакантома
	~кожный рог
	=ограниченный гиперкератоз
}

// question: 4175008 name: Какое из заболеваний следует отнести к облигатному предраку красной каймы губ:
::Какое из заболеваний следует отнести к облигатному предраку красной каймы губ\:::[html]Какое из заболеваний следует отнести к облигатному предраку красной каймы губ\:{
	~кератоакантома
	~кожный рог
	~постлучевой стоматит
	=хейлит Манганотти
}

// question: 4175009 name: Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку красной каймы...
::Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку красной каймы...::[html]Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку красной каймы губ\:{
	=лейкоплакия
	~бородавчатый предрак
	~ограниченный гиперкератоз
	~хейлит Манганотти
}

// question: 4175010 name: Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку:
::Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку\:::[html]Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку\:{
	=кератоакантома
	~бородавчатый предрак
	~ограниченный гиперкератоз
	~хейлит Манганотти
}

// question: 4175011 name: Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку:
::Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку\:::[html]Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку\:{
	=кожный рог
	~бородавчатый предрак
	~ограниченный гиперкератоз
	~хейлит Манганотти
}

// question: 4152085 name: Какое лечение проводится в период формирования секвестров?:
::Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:::[html]Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:{
	~ мероприятия направлены на борьбу с инфекцией
	~ улучшение микроциркуляции
	~ снижения сосудистой проницаемости
	=Все ответы верны
}

// question: 4152086 name: Какое лечение проводится в период формирования секвестров?:
::Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:::[html]Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:{
	~ мероприятия направлены на борьбу с инфекцией
	~ улучшение микроциркуляции
	~секвестрэктомия
	=Все ответы верны
}

// question: 4152087 name: Какое лечение проводится в период формирования секвестров?:
::Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:::[html]Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:{
	~ снижения сосудистой проницаемости
	~секвестрэктомия
	~повышение иммунитета
	=Все ответы верны
}

// question: 4152088 name: Какое лечение проводится в период формирования секвестров?:
::Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:::[html]Какое лечение проводится в период формирования секвестров?\:{
	~ улучшение микроциркуляции
	~секвестрэктомия
	~повышение иммунитета
	=Все ответы верны
}

// question: 4157613 name: Какое лечение проводится в послеоперационном периоде при выявлении нарушения ...

::Какое лечение проводится в послеоперационном периоде при выявлении нарушения ...::[html]Какое лечение проводится в послеоперационном периоде при выявлении нарушения микроциркуляции в лоскуте\:{
	~Электрокоагуляция
	=Холод местно
	~Криотерапия
	~Антибиотикотерапия
}

// question: 4157614 name: Какое лечение проводится в послеоперационном периоде при выявлении нарушения ...
::Какое лечение проводится в послеоперационном периоде при выявлении нарушения ...::[html]Какое лечение проводится в послеоперационном периоде при выявлении нарушения микроциркуляции в лоскуте\:{
	~Электрокоагуляция
	=ГБО-терапия
	~Криотерапия
	~Антибиотикотерапия
}

// question: 4157608 name: Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке:
::Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке\:::[html]Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке\:{
	~Неврит
	=Некроз
	~Миозит
	~Невропатия
}

// question: 4157609 name: Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке:
::Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке\:::[html]Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке\:{
	~Неврит
	=Гематома
	~Миозит
	~Диплопия
}

// question: 4157610 name: Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке:
::Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке\:::[html]Какое местное осложнение может возникать при пластике лоскутами на ножке\:{
	~Неврит
	=Гнойное воспаление
	~Миозит
	~Диплопия
}

// question: 4157597 name: Какое правило пластики местными тканями является основным:
::Какое правило пластики местными тканями является основным\:::[html]Какое правило пластики местными тканями является основным\:{
	~Недопустима мобилизация тканей
	=Отсутствие натяжения в краях раны
	~Не ушивать рану наглухо
}

// question: 4157621 name: Какое соотношение ширины к длине кожно-жировой ленты не должно быть превышено...
::Какое соотношение ширины к длине кожно-жировой ленты не должно быть превышено...::[html]Какое соотношение ширины к длине кожно-жировой ленты не должно быть превышено при формировании Филатовского лоскута на двух ножках\:{
	~1\:1
	~1\:2
	~2\:3
	=1\:3
}

// question: 4157595 name: Какой вид пластики местными тканями заключается в переносе тканей из ...
::Какой вид пластики местными тканями заключается в переносе тканей из ...::[html]Какой вид пластики местными тканями заключается в переносе тканей из отдалённого от дефекта места\:{
	~Пластика треугольными лоскутами
	=Пластика лоскутом на ножке
	~Свободным кожным лоскутом
	~Мобилизация краев раны
}

// question: 4157594 name: Какой вид пластики местными тканями приводит к увеличению объема тканей в ...
::Какой вид пластики местными тканями приводит к увеличению объема тканей в ...::[html]Какой вид пластики местными тканями приводит к увеличению объема тканей в направлении основного разреза\:{
	=Пластика треугольными лоскутами
	~Мобилизация краев раны
	~Свободным кожным лоскутом
	~Пластика стебельчатым лоскутом
}

// question: 4157593 name: Какой вид пластики местными тканями считается наиболее простым:
::Какой вид пластики местными тканями считается наиболее простым\:::[html]Какой вид пластики местными тканями считается наиболее простым\:{
	~Пластика треугольными лоскутами
	=Мобилизация краев раны
	~Свободным кожным лоскутом
	~Пластика стебельчатым лоскутом
}

// question: 4157633 name: Какой вид чувствительности восстанавливается первым при устранении дефекта ...
::Какой вид чувствительности восстанавливается первым при устранении дефекта ...::[html]Какой вид чувствительности восстанавливается первым при устранении дефекта тканей филатовским стеблем\:{
	=Тактильная
	~Болевая
	~Температурная
}

// question: 4157634 name: Какой вид чувствительности восстанавливается последним при устранении дефекта...
::Какой вид чувствительности восстанавливается последним при устранении дефекта...::[html]Какой вид чувствительности восстанавливается последним при устранении дефекта тканей филатовским стеблем\:{
	=Температурная
	~Болевая
	~Тактильная
}

// question: 4152471 name: Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости ...

::Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости ...::[html]Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости со смещением\:{
	=Диплопия
	~Нарушение прикуса фронтальной группы зубов
	~Симметрия лица не нарушена.
}

// question: 4152472 name: Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости ...
::Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости ...::[html]Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости со смещением\:{
	=Инфраорбитальная гипоэстезия
	~Нарушение прикуса фронтальной группы зубов
	~Симметрия лица не нарушена.
}

// question: 4152473 name: Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости ...
::Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости ...::[html]Какой из следующих симптомов может встречаться при переломах скуловой кости со смещением\:{
	~Нарушение прикуса фронтальной группы зубов
	=Кровотечение из гайморовой пазухи через полость носа
	~Симметрия лица не нарушена.
}

// question: 4157603 name: Какой лоскут используется для восстановления отсутствующей брови:
::Какой лоскут используется для восстановления отсутствующей брови\:::[html]Какой лоскут используется для восстановления отсутствующей брови\:{
	~Удвоенный по Рауэру
	=На скрытой сосудистой ножке
	~Из височной области
	~Мостовидный
}

// question: 4157602 name: Какой лоскут используется при пластике сквозного дефекта щеки:
::Какой лоскут используется при пластике сквозного дефекта щеки\:::[html]Какой лоскут используется при пластике сквозного дефекта щеки\:{
	~Встречный треугольный

=Удвоенный по Рауэру
~Опрокидывающий
~Мостовидный
}

// question: 4152249 name: Какой микроорганизм наиболее часто является возбудителем острых лимфаденитов ...
::Какой микроорганизм наиболее часто является возбудителем острых лимфаденитов ...::[html]Какой микроорганизм наиболее часто является возбудителем острых лимфаденитов лица и шеи?\:{
= золотистый стафилококк
~ стрептококк
~ кишечная палочка
~ протей
~ актиномицеты.
}

// question: 4152327 name: Какой препарат и в какой дозировке назначается для стимуляции слюноотделения ...
::Какой препарат и в какой дозировке назначается для стимуляции слюноотделения ...::[html]Какой препарат и в какой дозировке назначается для стимуляции слюноотделения при сиалоденитах\:{
~3 4 раза в день по 20 30 капель 1% го р ра пилокарпина.
~5 6 капель 1% го р ра пилокарпина.
~8 10 раз в день по 10 15 капель 1% го р ра пилокарпина.
~Перед едой назначается по 0,5 мл 1% го р ра пилокарпина.
=2 3 раза в день по 4 6 капель 1% го р ра пилокарпина (не более 10 дней).
}

// question: 4152127 name: Какой разрез проводится для дренирования абсцесса поднижнечелюстной области:
::Какой разрез проводится для дренирования абсцесса поднижнечелюстной области\:::[html]Какой разрез проводится для дренирования абсцесса поднижнечелюстной области\:{
~Разрез по переходной складке
~Разрез позади бугра верхней челюсти
~Позадичелюстной разрез
~Разрез в области челюстно язычного желобка
=Линейный разрез (6 8 см) параллельно нижнему краю тела нижней челюсти и на 1,5 2 см. ниже края.
}

// question: 4152152 name: Какой симптом выражен сильнее при абсцессе жевательной области:
::Какой симптом выражен сильнее при абсцессе жевательной области\:::[html]Какой симптом выражен сильнее при абсцессе жевательной области\:{
	~Гиперсаливация
	~Диспноэ (отдышка)
	=Тризм
	~Тахикардия
	~Дисфагия.
}

// question: 4175022 name: Какой симптом не является признаком озлокачествления предраковых заболеваний:
::Какой симптом не является признаком озлокачествления предраковых заболеваний\:::[html]Какой симптом не является признаком озлокачествления предраковых заболеваний\:{
	~уплотнение у основания эрозии
	~кровоточивость
	~усиление ороговения патологического образования
	=эрозии покрываются гнойным налетом
}

// question: 4151656 name: Какой симптом свидетельствует о наличии ликвореи:
::Какой симптом свидетельствует о наличии ликвореи\:::[html]Какой симптом свидетельствует о наличии ликвореи\:{
	~симптом Венсана
	~симптом Герена
	=положительный тест двойного пятна
	~снижение количества альбуминов в крови
	~наличие крепитации в области сосцевидных отростков
}

// question: 4175023 name: Какой симптом является морфологическим признаком кератоакантомы:
::Какой симптом является морфологическим признаком кератоакантомы\:::[html]Какой симптом является морфологическим признаком кератоакантомы\:{
	~многоядерные клетки со светлыми ядрами
	=дефект кожи заполненный роговыми массами
	~явление паракератоза
	~полиморфизм клеток
}

// question: 4157611 name: Какой этап является первым при пластической операции:

::Какой этап является первым при пластической операции\:::[html]Какой этап является первым при пластической операции\:{
	~Определение показаний
	=Обезболивание
	~Планирование вмешательства
	~Разрез
}

// question: 4175020 name: Кератоакантома - это:
::Кератоакантома - это\:::[html]Кератоакантома - это\:{
	~своеобразная разновидность старческой кератомы
	~внутриэпидермальный кожный рак
	~внутриэпителиальный рак слизистой оболочки
	=псевдокарциноматозный моллюск
}

// question: 4151707 name: КИСТЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ОТНОСЯТСЯ К
::КИСТЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ОТНОСЯТСЯ К::[html]КИСТЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ОТНОСЯТСЯ К{
	=опухолеподобным образованиям
	~опухолям
	~воспалительным заболеваниям
	~специфическим воспалительным заболеваниям
}

// question: 4152340 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Время, прошедшее после происшествия (острая, хроническая, нагноившаяся)
	~Травмирующий агент (агрессия, дорожное происшествие, трудовая)
	~Топографическая область (подбородочная и др.)
	=Все ответы верны
}

// question: 4152341 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Топографическая область (подбородочная и др.)
	~Пораженные ткани
	~Анатомо патологическая форма.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152342 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Время, прошедшее после происшествия (острая, хроническая, нагноившаяся)
	~Пораженные ткани
	~Анатомо патологическая форма.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152343 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Время, прошедшее после происшествия (острая, хроническая, нагноившаяся)
	~Травмирующий агент (агрессия, дорожное происшествие, трудовая)
	~Анатомо патологическая форма.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152344 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Травмирующий агент (агрессия, дорожное происшествие, трудовая)
	~Топографическая область (подбородочная и др.)
	~Пораженные ткани
	=Все ответы верны
}

// question: 4152383 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Временем, прошедшим после происшествия (острая, хроническая, реинфицированная)
	~Травмирующим агентом (агрессия, дорожное происшествие, трудовая)
	~Топографической областью (подбородочная и др.)
	=Все ответы верны
}

// question: 4152384 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Топографической областью (подбородочная и др.)
	~Пораженными тканями
	~Анатомо патологической формой.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152385 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Временем, прошедшим после происшествия (острая, хроническая, реинфицированная)
	~Пораженными тканями
	~Анатомо патологической формой.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152386 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Временем, прошедшим после происшествия (острая, хроническая, реинфицированная)
	~Травмирующим агентом (агрессия, дорожное происшествие, трудовая)
	~Анатомо патологической формой.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152387 name: Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с:
::Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:::[html]Классификация ран мягких тканей ЧЛО проводится в соответствии с\:{
	~Травмирующим агентом (агрессия, дорожное происшествие, трудовая)
	~Топографической областью (подбородочная и др.)
	~Пораженными тканями
	=Все ответы верны
}

// question: 4151870 name: КЛАССИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА

::КЛАССИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА::[html]КЛАССИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА{
	=синий лоскут
	~красный лоскут
	~розовый лоскут
	~черный лоскут
}

// question: 4151845 name: КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ
::КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ::[html]КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ{
	=деформации в области скуловой кости
	~уплотнения кожи
	~болей спастического характера
	~гиперемия кожи
}

// question: 4152373 name: Клиническая картина Le For II:
::Клиническая картина Le For II\:::[html]Клиническая картина Le For II\:{
	=Выраженная припухлость лица
	~Окклюзия не изменена
	~Все ответы верны
}

// question: 4152374 name: Клиническая картина Le For II:
::Клиническая картина Le For II\:::[html]Клиническая картина Le For II\:{
	=Нарушения чувствительности
	~Окклюзия не изменена
	~Все ответы верны
}

// question: 4152375 name: Клиническая картина Le For II:
::Клиническая картина Le For II\:::[html]Клиническая картина Le For II\:{
	~Окклюзия не изменена
	=Кровоизлияние век
	~Все ответы верны
}

// question: 4152113 name: Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается:

::Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:::[html]Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:{
	~Отеком, гиперемией кожных покровов скуловой области
	~Отек может распространятся в близлежащие области (височная, подглазничная, околоушная)
	~В некоторых случаях в процесс может вовлекаться жевательная мышца
	=Все ответы верны
}

// question: 4152115 name: Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается:
::Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:::[html]Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:{
	~Отеком, гиперемией кожных покровов скуловой области
	~Отек может распространятся в близлежащие области (височная, подглазничная, околоушная)
	~Повышение местной температуры
	=Все ответы верны
}

// question: 4152116 name: Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается:
::Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:::[html]Клиническая картина абсцесса скуловой области выражается\:{
	~Отеком, гиперемией кожных покровов скуловой области
	~Отек может распространятся в близлежащие области (височная, подглазничная, околоушная)
	=Все ответы верны
}

// question: 4152480 name: Клиническая картина перелома Le Fort I включает:
::Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:::[html]Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:{
	~Боли при надавливании
	~ Нарушения прикуса
	=Все ответы верны
}

// question: 4152481 name: Клиническая картина перелома Le Fort I включает:
::Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:::[html]Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:{
	~Трансверсальная подвижность отломка
	~ Нарушения прикуса

=Все ответы верны
}

// question: 4152482 name: Клиническая картина перелома Le Fort I включает:
::Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:::[html]Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:{
~Трансверсальная подвижность отломка
~Кровоподтёки в области губы и щеки
=Все ответы верны
}

// question: 4152483 name: Клиническая картина перелома Le Fort I включает:
::Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:::[html]Клиническая картина перелома Le Fort I включает\:{
~Кровоподтёки в области губы и щеки
~Боли при надавливании
=Все ответы верны
}

// question: 4152379 name: Клиническая картина перелома Le Fort I является:
::Клиническая картина перелома Le Fort I является\:::[html]Клиническая картина перелома Le Fort I является\:{
~Подвижность альвеолярного отростка
~Кровоподтёк губы и щёки
=Все ответы верны
}

// question: 4152380 name: Клиническая картина перелома Le Fort I является:
::Клиническая картина перелома Le Fort I является\:::[html]Клиническая картина перелома Le Fort I является\:{
~Боли при надавливании
~ Нарушения прикуса
=Все ответы верны
}

// question: 4152381 name: Клиническая картина перелома Le Fort I является:
::Клиническая картина перелома Le Fort I является\:::[html]Клиническая картина перелома Le Fort I является\:{
~Подвижность альвеолярного отростка
~ Нарушения прикуса
=Все ответы верны
}

// question: 4152455 name: Клиническая картина перелома по Le Fort I:
::Клиническая картина перелома по Le Fort I\:::[html]Клиническая картина перелома по Le Fort I\:{
	~Боли при нажатии на верхнюю челюсть
	~Изменения окклюзии
	=Все ответы верны
}

// question: 4152456 name: Клиническая картина перелома по Le Fort I:
::Клиническая картина перелома по Le Fort I\:::[html]Клиническая картина перелома по Le Fort I\:{
	~Подвижность отломка в горизонтальном направлении
	~Изменения окклюзии
	=Все ответы верны
}

// question: 4152457 name: Клиническая картина перелома по Le Fort I:
::Клиническая картина перелома по Le Fort I\:::[html]Клиническая картина перелома по Le Fort I\:{
	~Подвижность отломка в горизонтальном направлении
	~Гематомы губ по переходной складке
	=Все ответы верны
}

// question: 4152458 name: Клиническая картина перелома по Le Fort I:
::Клиническая картина перелома по Le Fort I\:::[html]Клиническая картина перелома по Le Fort I\:{
	~Гематомы губ по переходной складке
	~Боли при нажатии на верхнюю челюсть
	=Все ответы верны
}

// question: 4152293 name: Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита:
::Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:::[html]Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:{
	~ гноевыделение из соответствующей половины носа
	~ чувство тяжести в половине головы
	~ повышение температуры тела
	=Все ответы верны

}

// question: 4152294 name: Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита:
::Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:::[html]Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:{
	~ повышение температуры тела
	~ нарушение сна
	~ слабость.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152295 name: Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита:
::Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:::[html]Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:{
	~ гноевыделение из соответствующей половины носа
	~ нарушение сна
	~ слабость.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152296 name: Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита:
::Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:::[html]Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:{
	~ гноевыделение из соответствующей половины носа
	~ чувство тяжести в половине головы
	~ слабость.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152297 name: Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита:
::Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:::[html]Клиническая симптоматика обострившегося хронического одонтогенного гайморита\:{
	~ гноевыделение из соответствующей половины носа
	~ повышение температуры тела
	~ слабость.

=Все ответы верны
}

// question: 4174933 name: Клиническая симптоматика острого гнойного периостита нижней челюсти
::Клиническая симптоматика острого гнойного периостита нижней челюсти::[html]Клиническая симптоматика острого гнойного периостита нижней челюсти{
=Боль, инфильтрат по переходной складке, в центре положительный симптом флюктуации, гиперемия и отек в области краевой десны, болезненность при перкуссии причинного зуба
~Отек, инфильтрат без флюктуации, болезненность при перкуссии причинного зуба
~Ограничение открывание рта до В.5 см, боль при открывание рта, девиация при открывание рта, нарушение прикуса, положительный симптом “ступеньки”, положительный симптом “нагрузки”
~Плотный воспалительный инфильтрат у основания волоса, в центре гнойно-некротический стержень,
}

// question: 4152422 name: Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти:
::Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти\:::[html]Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти\:{
=Фронтальная инклюзия
~Подбородок смещен к низу и вперед
~Наличие в околоушной области ассиметрии, как результат выхода суставной головки из сустава.
}

// question: 4152423 name: Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти:
::Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти\:::[html]Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти\:{
=Кровотечение из ушной раковины
~Подбородок смещен к низу и вперед
~Наличие в околоушной области ассиметрии, как результат выхода суставной головки из сустава.
}

// question: 4152424 name: Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти:
::Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти\:::[html]Клинические признаки заднего вывиха нижней челюсти\:{
~Подбородок смещен к низу и вперед
=Полуоткрытый рот

~Наличие в околоушной области ассиметрии, как результат выхода суставной головки из сустава.
}

// question: 4175068 name: Клинические признаки невуса сходны с:
::Клинические признаки невуса сходны с\:::[html]Клинические признаки невуса сходны с\:{
~папилломой
~Фибромой
=капиллярной гемангиомой
~гиперемией кожи
~Липомой
}

// question: 4152211 name: Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны:
::Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны\:::[html]Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны\:{
~ высокая температура тела после переохлаждения
~ резкое ограничение открывания рта
=наличие разрушенного моляра на нижней челюсти
}

// question: 4152212 name: Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны:
::Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны\:::[html]Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны\:{
~ высокая температура тела после переохлаждения
~ резкое ограничение открывания рта
=гиперемия кожи, отечность мягких тканей поднижнечелюстной области
}

// question: 4152213 name: Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны:
::Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны\:::[html]Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны\:{
~ высокая температура тела после переохлаждения
~ резкое ограничение открывания рта
=болезненность и припухлость мягких тканей поднижнечелюстной области.
}

// question: 4152503 name: Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают:
::Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:::[html]Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:{
	~Патологическая подвижность костных отломков
	~При риноскопии носовых ходов выявляются сгустки крови
	~Кровоподтёки
	=Все ответы верны
}

// question: 4152504 name: Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают:
::Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:::[html]Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:{
	~Кровоподтёки
	~ Смещение и углубление перегородки носа
	~Нарушения глотания
	=Все ответы верны
}

// question: 4152505 name: Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают:
::Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:::[html]Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:{
	~Патологическая подвижность костных отломков
	~ Смещение и углубление перегородки носа
	~Нарушения глотания
	=Все ответы верны
}

// question: 4152506 name: Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают:
::Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:::[html]Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:{
	~Патологическая подвижность костных отломков
	~При риноскопии носовых ходов выявляются сгустки крови
	~Нарушения глотания
	=Все ответы верны

}

// question: 4152507 name: Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают:
::Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:::[html]Клинические симптомы при переломах носовой пирамиды включают\:{
	~При риноскопии носовых ходов выявляются сгустки крови
	~Кровоподтёки
	~ Смещение и углубление перегородки носа
	=Все ответы верны
}

// question: 4152180 name: Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются:
::Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:::[html]Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:{
	~Кожные покровы сероватого цвета
	~Болезненность при пальпации
	=Все ответы верны
}

// question: 4152181 name: Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются:
::Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:::[html]Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:{
	~Газовые крепитации
	~Общее токсико септическое состояние
	=Все ответы верны
}

// question: 4152182 name: Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются:
::Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:::[html]Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:{
	~Болезненность при пальпации
	~Газовые крепитации
	=Все ответы верны
}

// question: 4152183 name: Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются:
::Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:::[html]Клиническими признаками анаэробной разлитой флегмоны дна полости рта являются\:{
	~Кожные покровы сероватого цвета
	~Общее токсико септическое состояние.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152108 name: Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются:
::Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:::[html]Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:{
	~Отек подглазничной области, нижнего века
	~Отек верхний губы и сглаживание носогубной складки
	~Отклонение крыла носа в здоровую сторону
	=Все ответы верны
}

// question: 4152109 name: Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются:
::Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:::[html]Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:{
	~Отклонение крыла носа в здоровую сторону
	~Незначительное онемение верхней губы
	~Отечность по переходной складке в области преддверия полости рта.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152110 name: Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются:
::Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:::[html]Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:{
	~Отек подглазничной области, нижнего века
	~Незначительное онемение верхней губы
	~Отечность по переходной складке в области преддверия полости рта.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152111 name: Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются:
::Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:::[html]Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:{
	~Отек подглазничной области, нижнего века
	~Отек верхний губы и сглаживание носогубной складки
	~Отечность по переходной складке в области преддверия полости рта.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152112 name: Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются:
::Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:::[html]Клиническими симптомами абсцесса (флегмоны) подглазничной области являются\:{
	~Отек верхний губы и сглаживание носогубной складки
	~Отклонение крыла носа в здоровую сторону
	~Незначительное онемение верхней губы
	=Все ответы верны
}

// question: 4152082 name: Когда выявляются при помощи рентгенографии первые костные изменения ...
::Когда выявляются при помощи рентгенографии первые костные изменения ...::[html]Когда выявляются при помощи рентгенографии первые костные изменения одонтогенного остеомиелита\:{
	~ на 2 5 сутки после начала заболевания
	~ на 6 10 сутки после начала заболевания
	= на 10 14 сутки после начала заболевания
	~ через 3 4 недели
	~ не ранее, чем через месяц после начала заболевания.
}

// question: 4175018 name: Кожный рог - это:
::Кожный рог - это\:::[html]Кожный рог - это\:{
	=своеобразная разновидность старческой кератомы
	~внутриэпидермальный кожный рак
	~внутриэпителиальный рак слизистой оболочки
	~псевдокарциноматозный моллюск
}

// question: 4152241 name: Компрессионный синдром это:
::Компрессионный синдром это\:::[html]Компрессионный синдром это\:{
~ боль при надавливании на грудь
~ боль при поколачивании по грудине
= усиление боли в области средостения при поколачивании по пяткам вытянутых ног в горизонтальном положении больного
~ усиление загрудинной боли при пассивных смещениях трахеи
~ одышка и дисфагия при пассивных смещениях трахеи.
}

// question: 4151875 name: КОНТРОЛЬ КРОВОСНАБЖЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА В ПЕРВЫЕ 3-5 ...
::КОНТРОЛЬ КРОВОСНАБЖЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА В ПЕРВЫЕ 3-5 ...::[html]КОНТРОЛЬ КРОВОСНАБЖЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА В ПЕРВЫЕ 3-5 СУТОК ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ{
=доплерографии
~компьютерной томографии
~ангиографии
~сиалографии
}

// question: 4151951 name: КОРРЕГИРУЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ И УПЛОЩЕНИИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ...
::КОРРЕГИРУЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ И УПЛОЩЕНИИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ...::[html]КОРРЕГИРУЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ И УПЛОЩЕНИИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕТОДИКЕ{
=Аббе
~Миларда
~Лапчинского
~Шимановского
}

// question: 4157681 name: Коррегирующая операция при врожденной расщелине верхней губы проводится по ...
::Коррегирующая операция при врожденной расщелине верхней губы проводится по ...::[html]Коррегирующая операция при врожденной расщелине верхней губы проводится по методике\:{
~Седилло
=Миларда
~Лапчинского
~Шимановского
}

// question: 4151890 name: КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ МАКРОГНАТИИ
::КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ МАКРОГНАТИИ::[html]КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ МАКРОГНАТИИ{
	=чрезмерное развитие
	~смещение кзади
	~недоразвитие
	~несимметрична
}

// question: 4151889 name: КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИИ
::КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИИ::[html]КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИИ{
	=недоразвитие
	~смещение кзади
	~чрезмерное развитие
	~несимметрична
}

// question: 4175073 name: Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных ...
::Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных ...::[html]Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных опухолей челюстей является\:{
	~размеры опухоли
	~характер метастазирования
	~вид первичной опухоли
	~большой дефект
	=отсутствие рецидива
}

// question: 4152033 name: КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ...
::КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ...::[html]КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=отсутствие рецидива
	~обьем опухоли
	~вид первичной опухоли
	~характер метастазирования

}

// question: 4157661 name: Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных ...
::Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных ...::[html]Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных новообразований челюсти является\:{
	~Объем опухоли
	=Отсутствие рецидива
	~Органоспецифичность опухоли
	~Характер метастазирования
}

// question: 4157665 name: Ксенотрансплантатом называется материал, донором которого является:
::Ксенотрансплантатом называется материал, донором которого является\:::[html]Ксенотрансплантатом называется материал, донором которого является\:{
	~Сам пациент
	=Животное
	~Другой пациент
	~Трупный материал
}

// question: 4151760 name: КСЕНОТРАНСПЛАНТАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛ, ВЗЯТЫЙ У
::КСЕНОТРАНСПЛАНТАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛ, ВЗЯТЫЙ У::[html]КСЕНОТРАНСПЛАНТАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛ, ВЗЯТЫЙ У{
	=животного
	~близкого родственника
	~самого пациента
	~трупа
}

// question: 4152016 name: ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУР НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУР НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУР НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=комплексное
	~хирургическое
	~консервативное
	~физиотерапевтическое
}

// question: 4152028 name: ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АРТРИТА ВНЧС ВКЛЮЧАЕТ
::ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АРТРИТА ВНЧС ВКЛЮЧАЕТ::[html]ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АРТРИТА ВНЧС ВКЛЮЧАЕТ{
	=физиотерапию
	~редрессацию
	~артропластику
	~создание ложного сустава
}

// question: 4151990 name: ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
::ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В::[html]ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОЗНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
	=артропластике
	~редрессации
	~остеотомии нижней челюсти
	~создании ложного сустава
}

// question: 4152019 name: ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ АСФИКСИИ
::ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ АСФИКСИИ::[html]ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ АСФИКСИИ{
	=восстановление анатомического положения органа
	~введение воздуховода
	~удаление инородного тела
	~трахеотомия
}

// question: 4152018 name: ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СТЕНОТИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ
::ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СТЕНОТИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ::[html]ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СТЕНОТИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ{
	=трахеотомия
	~введение воздуховода
	~удаление инородного тела
	~восстановление анатомического положения органа
}

// question: 4151747 name: ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ
::ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ::[html]ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ{

=вскрытие поднадкостничного абсцесса, удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

~пункции поднадкостничного абсцесса, создания оттока экссудата через корневые каналы причинного зуба, ротовых ванн

~вскрытие поднадкостничного абсцесса, назначение антибиотиков, ротовых ванн, УВЧ

~удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

}

// question: 4151744 name: ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ АСФИКСИИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

::ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ АСФИКСИИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С::[html]ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ АСФИКСИИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С{

=восстановления правильного анатомического положения органа

~трахеотомии

~удаления инородного тела

~коникотомии

}

// question: 4152288 name: Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает:

::Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:::[html]Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:{

~Применение препаратов, содержащих йод (р р Люголя).

~Антибиотики и сульфаниламиды в больших дозах.

=Все ответы верны

}

// question: 4152289 name: Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает:

::Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:::[html]Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:{

~Иммунотерапя актинолизатом.

~Хирургическое вскрытие абсцесса.

=Все ответы верны

}

// question: 4152290 name: Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает:

::Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:::[html]Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:{
	~Применение препаратов, содержащих йод (р р Люголя).
	~Хирургическое вскрытие абсцесса.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152291 name: Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает:
::Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:::[html]Лечение актиномикоза комплексное, продолжительное (30 40 дней) и включает\:{
	~Антибиотики и сульфаниламиды в больших дозах.
	~Иммунотерапя актинолизатом.
	=Все ответы верны
}

// question: 4175063 name: Лечение кист челюстей большого размера заключается в :
::Лечение кист челюстей большого размера заключается в \:::[html]Лечение кист челюстей большого размера заключается в \:{
	~цистоэктомии
	~частичной резекции челюсти
	~криодеструкции
	=цистотомии
	~полной резекции челюсти
}

// question: 4151761 name: ЛЕЧЕНИЕ КОСТНОГО АНКИЛОЗА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
::ЛЕЧЕНИЕ КОСТНОГО АНКИЛОЗА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В::[html]ЛЕЧЕНИЕ КОСТНОГО АНКИЛОЗА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
	=артропластике
	~физиотерапии
	~лечебной физкультуре
	~редрессации
}

// question: 4175033 name: Лечение меланомы кожи:
::Лечение меланомы кожи\:::[html]Лечение меланомы кожи\:{
	~хирургическое
	~консервативное

=комбинированное (вначале лучевое, а затем хирургическое)
~Химиотерапия
}

// question: 4152298 name: Лечение острого гнойного одонтогенного гайморита:
::Лечение острого гнойного одонтогенного гайморита\:::[html]Лечение острого гнойного одонтогенного гайморита\:{
~ только консервативное лечение
=удаление причинного зуба, симптоматическое лечение
~ гайморотомия
~ удаление причинного зуба, назначение сосудосуживающих и физиотерапевтических средств.
}

// question: 4152299 name: Лечение острого гнойного одонтогенного гайморита:
::Лечение острого гнойного одонтогенного гайморита\:::[html]Лечение острого гнойного одонтогенного гайморита\:{
~ только консервативное лечение
~ гайморотомия
~ удаление причинного зуба, назначение сосудосуживающих и физиотерапевтических средств.
= пункция (если нет сообщения после удаления зуба) и промывание верхнечелюстной пазухи.
}

// question: 4175052 name: Лечение плоскоклеточной папилломы заключается:
::Лечение плоскоклеточной папилломы заключается\:::[html]Лечение плоскоклеточной папилломы заключается\:{
~в комплексной антибактериальной, противовоспалительной терапии
~в многократной антисептической обработке
~лечение не требуется
=в иссечении в пределах здоровых тканей
~в физиотерапевтическим лечении
}

// question: 4152596 name: Лечение предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта преимущественно
::Лечение предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта преимущественно::[html]Лечение предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта преимущественно{
~Консервативное
~Лучевое
~Химиолучевое

=Хирургическое
~Паллиативное
}

// question: 4174959 name: Лечение при вывихе нижней челюсти заключается:
::Лечение при вывихе нижней челюсти заключается\:::[html]Лечение при вывихе нижней челюсти заключается\:{
~в иммобилизации
~в резекции суставного бугорка
~в прошивании суставной капсулы
~в резекции мыщелковых отростков нижней челюсти
=во введении суставной головки в суставную впадину
}

// question: 4174982 name: Лечение при вывихе нижней челюсти заключается:
::Лечение при вывихе нижней челюсти заключается\:::[html]Лечение при вывихе нижней челюсти заключается\:{
~в иммобилизации
~в прошивании суставной капсулы
~в резекции мыщелковых отростков нижней челюсти
=во введении суставной головки в суставную впадину
}

// question: 4152598 name: Лечение рака слизистой оболочки полости рта преимущественно:
::Лечение рака слизистой оболочки полости рта преимущественно\:::[html]Лечение рака слизистой оболочки полости рта преимущественно\:{
~лучевое
~хирургическое
=комбинированное
~химиотерапевтическое (лекарственное)
~паллиативное
}

// question: 4157662 name: Лиофилизация костных трансплантатов – это процесс, направленный на:
::Лиофилизация костных трансплантатов – это процесс, направленный на\:::[html]Лиофилизация костных трансплантатов – это процесс, направленный на\:{
~Увеличение прочности
~Увеличение сроков хранения
=Снижение антигенных свойств
~Усиление остеоиндуктивных свойств
}

// question: 4175100 name: Липома, расположенная под капсулой слюнной железы:
::Липома, расположенная под капсулой слюнной железы\:::[html]Липома, расположенная под капсулой слюнной железы\:{
	~Не имеет четких границ
	~Может быть с собственной капсулой и без нее
	=Имеет собственную капсулу
	~Прорастает в толщу железы
	~Имеет одну капсулу с железой
}

// question: 4152258 name: Ложный паротит Герценберга   это:
::Ложный паротит Герценберга   это\:::[html]Ложный паротит Герценберга   это\:{
	~лимфогенный паротит
	~острый паротит
	~контактный паротит
	~актиномикоз околоушной железы
	=острый серозный лимфаденит внутрижелезистых лимфоузлов околоушной области.
}

// question: 4151712 name: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЮЩАЯСЯ ...
::ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЮЩАЯСЯ ...::[html]ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЮЩАЯСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ{
	=тело нижней челюсти
	~мыщелковый отросток
	~венечный отросток
	~ветвь нижней челюсти
}

// question: 4151763 name: ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ СОСТОИТ ИЗ
::ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ СОСТОИТ ИЗ::[html]ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ СОСТОИТ ИЗ{
	=кожи и подкожно-жировой клетчатки
	~расщепленной кожи
	~кожи и мышцы
	~кожи, мышцы и кости
}

// question: 4152586 name: Лучевое лечение прекращают при появлении у онкологических больных:
::Лучевое лечение прекращают при появлении у онкологических больных\:::[html]Лучевое лечение прекращают при появлении у онкологических больных\:{
	~Лейкоцитоза
	=Лейкопении (3.103 тыс.)
	~Эритроцитоза
	~Эпителита
}

// question: 4152587 name: Лучевое лечение прекращают при появлении у онкологических больных:
::Лучевое лечение прекращают при появлении у онкологических больных\:::[html]Лучевое лечение прекращают при появлении у онкологических больных\:{
	~Лейкоцитоза
	~Эритроцитоза
	=Влажного эпидермита
	~Эпителита
}

// question: 4151701 name: МАКРОПРЕПАРАТ (ИССЕЧЕННУЮ ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ) ФИКСИРУЮТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ...
::МАКРОПРЕПАРАТ (ИССЕЧЕННУЮ ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ) ФИКСИРУЮТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ...::[html]МАКРОПРЕПАРАТ (ИССЕЧЕННУЮ ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ) ФИКСИРУЮТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В{
	=10% растворе формалина
	~70% растворе этилового спирта
	~5% растворе хлоргексидина
	~1% растворе формалина
}

// question: 4151964 name: МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СВОБОДНОГО КОСТНОГО АУТОТРАНСПАЛНТАТА СОСТАВЛЯТ НЕ БОЛЕЕ
::МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СВОБОДНОГО КОСТНОГО АУТОТРАНСПАЛНТАТА СОСТАВЛЯТ НЕ БОЛЕЕ::[html]МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СВОБОДНОГО КОСТНОГО АУТОТРАНСПАЛНТАТА СОСТАВЛЯТ НЕ БОЛЕЕ{
	=6 см
	~3 см
	~4 см
	~2 см
}

// question: 4151653 name: Материал из которого изготавливаются минипластины для остеосинтеза челюстей:
::Материал из которого изготавливаются минипластины для остеосинтеза челюстей\:::[html]Материал из которого изготавливаются минипластины для остеосинтеза челюстей\:{
	~сталь
	~бронза
	=титан
	~алюминий
	~палладий
}

// question: 4152175 name: Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении:
::Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:::[html]Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:{
	~Антибиотиков широкого спектра действия
	~Дезинтоксикационных растворов
	~Антигистаминных препаратов
	=Все ответы верны
}

// question: 4152176 name: Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении:
::Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:::[html]Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:{
	~Антигистаминных препаратов
	~Анальгетических средств
	~Препаратов, стимулирующих процессы иммунитет
	=Все ответы верны
}

// question: 4152177 name: Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении:
::Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:::[html]Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:{
	~Антибиотиков широкого спектра действия
	~Анальгетических средств
	~Препаратов, стимулирующих процессы иммунитет
	=Все ответы верны

}

// question: 4152178 name: Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении:
::Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:::[html]Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:{
	~Антибиотиков широкого спектра действия
	~Дезинтоксикационных растворов
	~Препаратов, стимулирующих процессы иммунитет
	=Все ответы верны
}

// question: 4152179 name: Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении:
::Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:::[html]Медикаментозное лечение флегмоны дна полости рта состоит в назначении\:{
	~Дезинтоксикационных растворов
	~Антигистаминных препаратов
	~Анальгетических средств
	=Все ответы верны
}

// question: 4175029 name: Меланома - это:
::Меланома - это\:::[html]Меланома - это\:{
	=злокачественная опухоль, которая развивается из пигментообразующих клеток
	~доброкачественная опухоль, которая развивается из пигментообразующих клеток
	~врожденный порок развития кожи
	~опухолеподобное образование
}

// question: 4175031 name: Меланома не развивается на фоне:
::Меланома не развивается на фоне\:::[html]Меланома не развивается на фоне\:{
	~пигментного невуса
	~внешне неизмененной кожи
	=роговой кератомы
	~меланоза Дюбрея
}

// question: 4152594 name: Меланомы кожи лица метастазируют:

::Меланомы кожи лица метастазируют\:::[html]Меланомы кожи лица метастазируют\:{
	~Лимфогенным путём
	=Гематогенным путём
	~Ни одним из перечисленных
	~Не метастазирует
	~Являются радио и физиорезистентными
}

// question: 4152075 name: Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите ...
::Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите ...::[html]Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите характеризуется\:{
	~Выраженным отёком, гиперемией тканей, напряжением кожных покровов
	~При пальпации определяется инфильтрат
	~Слизистая оболочка полости рта отечна, гиперемирована
	=Все ответы верны
}

// question: 4152077 name: Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите ...
::Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите ...::[html]Местная клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите характеризуется\:{
	~Выраженным отёком, гиперемией тканей, напряжением кожных покровов
	~При пальпации определяется инфильтрат
	~Болезненность зубов при перкуссии, подвижность зубов, покрытых гипертрофированными межзубными сосочками.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152153 name: Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется:
::Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:::[html]Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:{
	=Отек и припухлость в области угла нижней челюсти
	~Ретрогения
	~Макроглосия.
}

// question: 4152154 name: Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется:

::Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:::[html]Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:{
=Слизистая оболочка крыловидно нижнечелюстной складки гиперемирована, сглажена и напряженна
~Ретрогения
~Макроглосия.
}

// question: 4152155 name: Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется:
::Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:::[html]Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:{
= Тризм
~Ретрогения
~Макроглосия.
}

// question: 4152156 name: Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется:
::Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:::[html]Местная симптоматика абсцесса крыловидно нижнечелюстной области характеризуется\:{
=Болезненность при глотании
~Ретрогения
~Макроглосия.
}

// question: 4152157 name: Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является:
::Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:::[html]Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:{
=Отек в области грудино ключично сосцевидной мышцы
~При пальпации под углом нижней челюсти определяется отек и флюктуация
~Гиперемия кожи щечной области
}

// question: 4152158 name: Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является:

::Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:::[html]Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:{
	=Тризм
	~При пальпации под углом нижней челюсти определяется отек и флюктуация
	~Гиперемия кожи щечной области
}

// question: 4152159 name: Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является:
::Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:::[html]Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:{
	=Выбухание к средней линии боковой стенки глотки
	~При пальпации под углом нижней челюсти определяется отек и флюктуация
	~Гиперемия кожи щечной области
}

// question: 4152160 name: Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является:
::Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:::[html]Местной симптоматикой абсцесса (флегмоны) окологлоточногоvпространства является\:{
	=Гиперемия и отечность небных дужек и язычка
	~При пальпации под углом нижней челюсти определяется отек и флюктуация
	~Гиперемия кожи щечной области
}

// question: 4152277 name: Местные клинические симптомы тромбофлебита лицевых вен:
::Местные клинические симптомы тромбофлебита лицевых вен\:::[html]Местные клинические симптомы тромбофлебита лицевых вен\:{
	~выраженная отёчность по траектории лицевых и угловых сосудов
	~пальпаторно определяется твёрдый болезненный инфильтрат
	~гиперемия кожи в области сосудов
	~по протяженности сосудов определяются микроабсцесы
	=все ответы верны
}

// question: 4152133 name: Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются:

::Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:::[html]Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:{
	~Отек передней части дна полости рта
	~Гиперемия и выбухание слизистой
	~Подъязычная складка покрыта фиброзным налетом, симптом «Петушиного гребешка»
	=Все ответы верны
}

// question: 4152134 name: Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются:
::Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:::[html]Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:{
	~Подъязычная складка покрыта фиброзным налетом, симптом «Петушиного гребешка»
	~Язык отодвинут в здоровую сторону
	~Болезненность при пальпации, флюктуация.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152135 name: Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются:
::Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:::[html]Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:{
	~Отек передней части дна полости рта
	~Язык отодвинут в здоровую сторону
	~Болезненность при пальпации, флюктуация.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152136 name: Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются:
::Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:::[html]Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:{
	~Отек передней части дна полости рта
	~Гиперемия и выбухание слизистой
	~Болезненность при пальпации, флюктуация.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152137 name: Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются:
::Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:::[html]Местными клиническими симптомами подъязычного абсцесса являются\:{
	~Гиперемия и выбухание слизистой
	~Подъязычная складка покрыта фиброзным налетом, симптом «Петушиного гребешка»
	~Язык отодвинут в здоровую сторону
	=Все ответы верны
}

// question: 4152203 name: Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются:
::Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:::[html]Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:{
	~Отечность близлежащих областей
	~Тризм
	~В полости рта отек в области бугра верхней челюсти, слизистая гиперемирована, натянута
	=Все ответы верны
}

// question: 4152204 name: Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются:
::Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:::[html]Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:{
	~Отек над и подскуловой области (симптом песочных часов)
	~Отечность близлежащих областей
	~Функциональные нарушения (жевания, глотания, речи).
	=Все ответы верны
}

// question: 4152205 name: Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются:
::Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:::[html]Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:{
	~Отек над и подскуловой области (симптом песочных часов)
	~В полости рта отек в области бугра верхней челюсти, слизистая гиперемирована, натянута

~Функциональные нарушения (жевания, глотания, речи).
=Все ответы верны
}

// question: 4152206 name: Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются:
::Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:::[html]Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:{
~Тризм
~В полости рта отек в области бугра верхней челюсти, слизистая гиперемирована, натянута
~Функциональные нарушения (жевания, глотания, речи).
=Все ответы верны
}

// question: 4152207 name: Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются:
::Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:::[html]Местными симптомами абсцесса (флегмоны) подвисочной области являются\:{
~Отек над и подскуловой области (симптом песочных часов)
~Отечность близлежащих областей
~Тризм
=Все ответы верны
}

// question: 4151737 name: МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ – ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ...
::МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ – ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ...::[html]МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ – ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КЛЕТОК ОПУХОЛИ{
=с током лимфы и венозной крови
~путем прорастания капсулы
~по ходу мышечных волокон
~по ходу нервных стволов
}

// question: 4151956 name: МЕТОД ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА СКОЛЬЗЯЩИМ ЛОСКУТОМ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН
::МЕТОД ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА СКОЛЬЗЯЩИМ ЛОСКУТОМ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН::[html]МЕТОД ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА СКОЛЬЗЯЩИМ ЛОСКУТОМ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН{

=Шимановским
~Рауэром
~Диффенбахом
~Лимбергом
}

// question: 4174934 name: Метод лечения пациента с острым гнойным периоститом
::Метод лечения пациента с острым гнойным периоститом::[html]Метод лечения пациента с острым гнойным периоститом{
=Вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса, удаление причинного зуба, назначение антибиотиков и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
~Пункции поднадкостничного абсцесса, создания оттока экссудата через корневые каналы причинного зуба, ротовых ванн
~Назначение антибиотиков, рото¬вых ванн, УВЧ
~Удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
}

// question: 4151872 name: МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ В ...
::МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ В ...::[html]МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РЕЦИПИЕНТНОЙ И ДОНОРСКОЙ ОБЛАСТИ{
=ультразвуковая допплерография
~контрастная ангиография
~ортопантомограмма
~сцинциография
}

// question: 4157587 name: Метод пластики местными тканями при укорочении верхней губы:
::Метод пластики местными тканями при укорочении верхней губы\:::[html]Метод пластики местными тканями при укорочении верхней губы\:{
=Пластика встречными треугольными лоскутами
~Пластика свободным кожным лоскутом
~Индийский метод
~Уранопластика
}

// question: 4157588 name: Метод пластики мягких тканей по Лимбергу называется перемещение лоскутов:

::Метод пластики мягких тканей по Лимбергу называется перемещение лоскутов\:::[html]Метод пластики мягких тканей по Лимбергу называется перемещение лоскутов\:{
	=Встречных треугольных
	~На сосудистом анастомозе
	~На питающей ножке
	~Свободных
}

// question: 4151938 name: МЕТОД УШИВАНИЯ ТКАНЕЙ НА СЕБЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
::МЕТОД УШИВАНИЯ ТКАНЕЙ НА СЕБЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ::[html]МЕТОД УШИВАНИЯ ТКАНЕЙ НА СЕБЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ{
	=послойным ушиванием раны без мобилизации краев
	~мобилизация краев раны с фиксацией пластырем
	~наложение только погружных швов
	~наложение только разгружающих швов
}

// question: 4151896 name: МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСКОРЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЛОМКОВ В ПЕРВЫЕ ...
::МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСКОРЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЛОМКОВ В ПЕРВЫЕ ...::[html]МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСКОРЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЛОМКОВ В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ЧЕЛЮСТИ{
	=ультрафонофарез с метилурацилом
	~парафинотерапия
	~электорофарез с лидазой
	~массаж
}

// question: 4152027 name: МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСКОРЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЛОМКОВ В ПЕРВЫЕ ...
::МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСКОРЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЛОМКОВ В ПЕРВЫЕ ...::[html]МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСКОРЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЛОМКОВ В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ЧЕЛЮСТИ{
	=ультрафонофарез с метилурацилом
	~парафинотерапия
	~электорофарез с лидазой
	~массаж
}

// question: 4151995 name: МЕТОД ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА
::МЕТОД ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА::[html]МЕТОД ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА{

=тампонада носовых ходов и наружная повязка из гипса или коллодия
~пращевидная повязка
~тампонада носовых ходов
~остеосинтез
}

// question: 4157645 name: Метод фиксации свободного кожного лоскута на ране:
::Метод фиксации свободного кожного лоскута на ране\:::[html]Метод фиксации свободного кожного лоскута на ране\:{
~Узловые швы
~Давящая повязка
~Внутрикожные швы
=Узловые швы и давящая повязка
~Пластиночные швы и давящая повязка
}

// question: 4151957 name: МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДУБЛИРОВАННОГО ЛОСКУТА ПРЕДЛОЖЕН
::МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДУБЛИРОВАННОГО ЛОСКУТА ПРЕДЛОЖЕН::[html]МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДУБЛИРОВАННОГО ЛОСКУТА ПРЕДЛОЖЕН{
=Рауэром
~Брунсом
~Диффенбахом
~Лимбергом
}

// question: 4151949 name: МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ НЕСКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ ГУБ У МУЖЧИН
::МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ НЕСКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ ГУБ У МУЖЧИН::[html]МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ НЕСКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ ГУБ У МУЖЧИН{
=Лексера
~Крайля
~Аббе
~Диффенбах
}

// question: 4151934 name: МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ ВСТРЕЧНЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛОСКУТАМИ
::МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ ВСТРЕЧНЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛОСКУТАМИ::[html]МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ ВСТРЕЧНЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛОСКУТАМИ{
=Лимберга
~Миларда
~Седилло

~Аббе
}

// question: 4151950 name: МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ
::МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ::[html]МЕТОДИКА ПЛАСТИКИ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ{
=Лимберга
~Лексера
~Седилло
~Крайля
}

// question: 4157690 name: Методика пластики микростомы:
::Методика пластики микростомы\:::[html]Методика пластики микростомы\:{
~Аббе
~Крайля
~Бильрота
~Евдокимова
}

// question: 4175149 name: Методом выбора для лечения «мягкой одонтомы» является:
::Методом выбора для лечения «мягкой одонтомы» является\:::[html]Методом выбора для лечения «мягкой одонтомы» является\:{
=Резекция челюсти
~Цистэктомия
~Выскабливание оболочки новообразования
~Лучевая терапия
~Химиотерапия
}

// question: 4151933 name: МЕТОДОМ ПЛАСТИКИ ПО ЛИМБЕРГУ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛОСКУТОВ
::МЕТОДОМ ПЛАСТИКИ ПО ЛИМБЕРГУ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛОСКУТОВ::[html]МЕТОДОМ ПЛАСТИКИ ПО ЛИМБЕРГУ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛОСКУТОВ{
=встречных треугольных
~на питающей ножке
~на сосудистом анастомозе
~свободных кожных лоскутов
}

// question: 4151662 name: Механическое повреждение головного мозга закрытого типа, характеризующееся ...
::Механическое повреждение головного мозга закрытого типа, характеризующееся ...::[html]Механическое повреждение головного мозга закрытого типа, характеризующееся нарушением функций без явно выраженной морфологической симптоматики – это{
	~Гематома головного мозга
	=Сотрясение головного мозга
	~Ушиб головного мозга
	~Сдавление головного мозга
}

// question: 4151924 name: МИНИПЛАСТИНЫ К ОТЛОМКАМ ЧЕЛЮСТЕЙ ФИКСИРУЮТ
::МИНИПЛАСТИНЫ К ОТЛОМКАМ ЧЕЛЮСТЕЙ ФИКСИРУЮТ::[html]МИНИПЛАСТИНЫ К ОТЛОМКАМ ЧЕЛЮСТЕЙ ФИКСИРУЮТ{
	=титановыми винтами
	~спицей
	~шурупами
	~проволочной лигатурой
}

// question: 4151770 name: МИНИПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ
::МИНИПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ::[html]МИНИПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ{
	=титана
	~стали
	~бронзы
	~алюминия
}

// question: 4151876 name: МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ ...
::МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ ...::[html]МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ ПО{
	=стериолитографической модели
	~панорамной рентгенограмме
	~ортопантомограмме
	~обзорной рентгенограмме
}

// question: 4151955 name: МОСТОВИДНЫЙ ЛОСКУТ ЛЕКСЕРА ФОРМИРУЮТ ИЗ ТКАНЕЙ
::МОСТОВИДНЫЙ ЛОСКУТ ЛЕКСЕРА ФОРМИРУЮТ ИЗ ТКАНЕЙ::[html]МОСТОВИДНЫЙ ЛОСКУТ ЛЕКСЕРА ФОРМИРУЮТ ИЗ ТКАНЕЙ{
	=теменной области
	~затылочной области
	~подподбородочной области
	~лобной области
}

// question: 4151954 name: МОСТОВИДНЫЙ ЛОСКУТ ПО ЛАПЧИНСКОМУ ФОРМИРУЮТ ИЗ ТКАНЕЙ
::МОСТОВИДНЫЙ ЛОСКУТ ПО ЛАПЧИНСКОМУ ФОРМИРУЮТ ИЗ ТКАНЕЙ::[html]МОСТОВИДНЫЙ ЛОСКУТ ПО ЛАПЧИНСКОМУ ФОРМИРУЮТ ИЗ ТКАНЕЙ{
	=подподбородочной области
	~теменной области
	~затылочной области
	~лобной области
}

// question: 4175145 name: Мягкая одонтома принадлежит к группе:
::Мягкая одонтома принадлежит к группе\:::[html]Мягкая одонтома принадлежит к группе\:{
	=Доброкачественных одонтогенных опухолей
	~Предраков
	~Воспалительных заболеваний
	~Опухолеподобных заболеваний
	~Злокачественных одонтогенных заболеваний
}

// question: 4175036 name: Мягкая фиброма кожи состоит из:
::Мягкая фиброма кожи состоит из\:::[html]Мягкая фиброма кожи состоит из\:{
	~веретенообразных клеток типа фибробластов или фиброцитов и большого количества коллагеновых волокон
	=волокнистой соединительной и жировой ткани
	~волокнистой соединительной и сосудистой ткани
	~коллагеновых волокон, фибробластов, фиброцитов и гистиоцитов
}

// question: 4175032 name: На внешне неизмененной коже лица больного полгода назад появилось втянутое ...

::На внешне неизмененной коже лица больного полгода назад появилось втянутое ...::[html]На внешне неизмененной коже лица больного полгода назад появилось втянутое вовнутрь кожи пятно темно-бурого (почти черного) цвета размером до 1,5 см, которое постепенно увеличивается и приобретает округлую форму. Пятно не выступает над поверхностью здоровой кожи. Через 2 месяца пятно уплотнилось, а месяц назад превратилось в бляшку черного цвета с блестящей поверхностью. Регионарные лимфоузлы увеличены, безболезненные. Какая опухоль развилась у больного\:{

~внутриэпидермальный рак

~ботриомикома

=меланома

~сосочковая голая эпителиома

}

// question: 4152439 name: На сколько времени оставляют пластинку при остеосинтезе на уровне угла н.ч.:

::На сколько времени оставляют пластинку при остеосинтезе на уровне угла н.ч.\:::[html]На сколько времени оставляют пластинку при остеосинтезе на уровне угла н.ч.\:{

~Она будет там постоянно и после сращения отломков

~Удаляется после формирования костной мозоли

~Удаляется в случае нагноения в месте перелома

=От случая к случаю изменяется, в зависимости от толерантности больного

~Удаление пластинки для остеосинтеза обязательно.

}

// question: 4175034 name: На сколько сантиметров от края меланомы нужно отступить при ее удалении:

::На сколько сантиметров от края меланомы нужно отступить при ее удалении\:::[html]На сколько сантиметров от края меланомы нужно отступить при ее удалении\:{

~по краю опухоли делается разрез

~отступают на 0,5 см от края опухоли

~отступают на 1 см от края опухоли

=отступают на 3 см от края опухоли

}

// question: 4151730 name: НАЗАЛЬНАЯ ЛИКВОРЕЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ЛЕ ФОР II ОБУСЛОВЛЕНО...

::НАЗАЛЬНАЯ ЛИКВОРЕЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ЛЕ ФОР II ОБУСЛОВЛЕНО...::[html]НАЗАЛЬНАЯ ЛИКВОРЕЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ЛЕ ФОР II ОБУСЛОВЛЕНО СООБЩЕНИЕМ С{

=передней черепной ямкой

~переломом пирамиды височной кости

~средней черепной ямкой

~задней черепной ямкой
}

// question: 4157624 name: Назовите количество этапов пластики тотального дефекта носа по Хитрову без ...
::Назовите количество этапов пластики тотального дефекта носа по Хитрову без ...::[html]Назовите количество этапов пластики тотального дефекта носа по Хитрову без учета коррегирующих операций\:{
~1
~2
~3
=4
~5
~6
}

// question: 4157630 name: Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля:
::Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля\:::[html]Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля\:{
=Гнойное воспаление лоскута
~Отек мягких тканей
~Миозит
~Парестезия
}

// question: 4157631 name: Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля:
::Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля\:::[html]Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля\:{
=Некроз лоскута
~Отек мягких тканей
~Миозит
~Парестезия
}

// question: 4157632 name: Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля:
::Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля\:::[html]Назовите местные осложнения после формирования Филатовского стебля\:{

=Гематома
~Отек мягких тканей
~Миозит
~Парестезия
}

// question: 4157648 name: Назовите местные поздние осложнения после свободной пересадки кожи:
::Назовите местные поздние осложнения после свободной пересадки кожи\:::[html]Назовите местные поздние осложнения после свободной пересадки кожи\:{
=Рубцовая трансформация
~Гиперпигментация
~Кровотечение из лоскута
~Некроз лоскута
}

// question: 4157646 name: Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи:
::Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи\:::[html]Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи\:{
=Некроз лоскута
~Гиперпигментация
~Кровотечение из лоскута
~Рубцовая деформация
}

// question: 4157647 name: Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи:
::Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи\:::[html]Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи\:{
=Гематома
~Рубцовая деформация
~Кровотечение из лоскута
~Гиперпигментация
}

// question: 4157649 name: Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи:

::Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи\:::[html]Назовите местные ранние осложнения после свободной пересадки кожи\:{
	=Гиперпигментация
	~Некроз лоскута
	~Кровотечение из лоскута
	~Рубцовая деформация
}

// question: 4157635 name: Назовите показания к использованию свободной пересадки кожи:
::Назовите показания к использованию свободной пересадки кожи\:::[html]Назовите показания к использованию свободной пересадки кожи\:{
	=Послеоперационные дефекты кожи
	~Сквозные дефекты кожи
	~Незаживающие дефекты на фоне лучевой терапии
	~Дефекты тканей, дно которых выполнено костью
}

// question: 4157676 name: Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ:
::Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ\:::[html]Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ\:{
	=Некроз лоскутов
	~Рубцовая деформация
	~Неврит лицевого нерва
	~Гиперпигментация
}

// question: 4157677 name: Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ:
::Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ\:::[html]Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ\:{
	=Гематома
	~Рубцовая деформация
	~Неврит лицевого нерва
	~Гиперпигментация
}

// question: 4157678 name: Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ:
::Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ\:::[html]Назовите ранние местные осложнения после пластики дефекта губ\:{

=Заживление вторичным натяжением
~Рубцовая деформация
~Неврит лицевого нерва
~Гиперпигментация
}

// question: 4151683 name: Назовите специальный инструмент для репозиции костей носа
::Назовите специальный инструмент для репозиции костей носа::[html]Назовите специальный инструмент для репозиции костей носа{
~Элеватор Карапетяна
~Ложка Фолькмана
=Элеватор Волкова
~Лопатка Буяльского
}

// question: 4157639 name: Назовите толщину полнослойного свободного кожного лоскута:
::Назовите толщину полнослойного свободного кожного лоскута\:::[html]Назовите толщину полнослойного свободного кожного лоскута\:{
~0,2-0,4 мм
~0,5-0,6 мм
~0,6-0,7 мм
=0,8-1,0 мм
}

// question: 4157637 name: Назовите толщину свободного кожного лоскута по Блеру-Брауну:
::Назовите толщину свободного кожного лоскута по Блеру-Брауну\:::[html]Назовите толщину свободного кожного лоскута по Блеру-Брауну\:{
~0,2-0,4 мм
=0,5-0,6 мм
~0,6-0,7 мм
~0,8-1,0 мм
}

// question: 4157638 name: Назовите толщину свободного кожного лоскута по Педжету:
::Назовите толщину свободного кожного лоскута по Педжету\:::[html]Назовите толщину свободного кожного лоскута по Педжету\:{
~0,2-0,4 мм
~0,5-0,6 мм
=0,6-0,7 мм
~0,8-1,0 мм

}

// question: 4157636 name: Назовите толщину свободного кожного лоскута по Тиршу:
::Назовите толщину свободного кожного лоскута по Тиршу\:::[html]Назовите толщину свободного кожного лоскута по Тиршу\:{
	=0,2-0,4 мм
	~0,4-0,6 мм
	~0,6-0,8 мм
	~0,8-1,0 мм
}

// question: 4174951 name: Наиболее информативная методика для оценки внутренних нарушений ...
::Наиболее информативная методика для оценки внутренних нарушений ...::[html]Наиболее информативная методика для оценки внутренних нарушений височно-нижнечелюстного сустава\:{
	~компьютерная томограмма
	=магнитно-резонансная томограмма
}

// question: 4151703 name: НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРЕЛОМ ...
::НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРЕЛОМ ...::[html]НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРЕЛОМ СКУЛОГЛАЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ{
	=компьютерная томограмма средней зоны лица
	~ортопантомограмма
	~рентгенограмма черепа в боковой проекции
	~рентгенограмма черепа в прямой проекции
}

// question: 4151937 name: НАИБОЛЕЕ МОБИЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПРИ ПЛАСТИКЕ ПО ЛИМБЕРГУ
::НАИБОЛЕЕ МОБИЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПРИ ПЛАСТИКЕ ПО ЛИМБЕРГУ::[html]НАИБОЛЕЕ МОБИЛЬНЫЙ ЛОСКУТ ПРИ ПЛАСТИКЕ ПО ЛИМБЕРГУ{
	=меньший с острым углом
	~меньший с тупым углом
	~больший с тупым углом
	~меньший с прямым углом
}

// question: 4175116 name: Наиболее опасным ятрогенным осложнением после удаления срединных свищей/кист ...
::Наиболее опасным ятрогенным осложнением после удаления срединных свищей/кист ...::[html]Наиболее опасным ятрогенным осложнением после удаления срединных свищей/кист (последних реже) шеи является\:{
	~Парез лицевого нерва
	~Парез голосовых связок
	~Перелом подъязычной кости
	~Травма околоушной слюнной железы
	=Стеноз верхних дыхательных путей
}

// question: 4151969 name: НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМИ ДОНОРСКИМИ МЕСТАМИ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКИ КОЖИ НА ЛИЦО ...
::НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМИ ДОНОРСКИМИ МЕСТАМИ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКИ КОЖИ НА ЛИЦО ...::[html]НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМИ ДОНОРСКИМИ МЕСТАМИ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКИ КОЖИ НА ЛИЦО ЯВЛЯЮТСЯ{
	=внутренняя поверхность плеча
	~передняя поверхность живота
	~задняя поверхность шеи
	~кожа предплечья
}

// question: 4175098 name: Наиболее распространенная локализация рака в полости рта:
::Наиболее распространенная локализация рака в полости рта\:::[html]Наиболее распространенная локализация рака в полости рта\:{
	=Языка
	~Дно полости рта
	~Слизистая оболочка щеки
	~Альвеолярный отросток верхней челюсти
	~Альвеолярный отросток нижней челюсти
}

// question: 4151723 name: НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=угол челюсти
	~венечный отросток
	~подбородочный отдел
	~ветвь в продольном направлении
}

// question: 4175146 name: Наиболее частая локализация мягкой одонтомы является в области:
::Наиболее частая локализация мягкой одонтомы является в области\:::[html]Наиболее частая локализация мягкой одонтомы является в области\:{
	=Нижних премоляров
	~Нижних моляров
	~Верхних моляров
	~Резцов нижней челюсти
	~Резцов верхней челюсти
}

// question: 4152438 name: Наиболее часто встречающиеся поздним осложнением при травмах ЧЛО:
::Наиболее часто встречающиеся поздним осложнением при травмах ЧЛО\:::[html]Наиболее часто встречающиеся поздним осложнением при травмах ЧЛО\:{
	~Обильное кровотечение
	~Сотрясение мозга
	~Асфиксии
	~Травматический шок
	=Инфекционные осложнения.
}

// question: 4152054 name: Наиболее частой причиной возникновения периостита является:
::Наиболее частой причиной возникновения периостита является\:::[html]Наиболее частой причиной возникновения периостита является\:{
	~Хронический верхушечный периодонтит
	~Одонтогенный остеомиелит
	=Обострившейся верхушечный периодонтит
	~Болезни прорезывания зуба мудрости на нижней челюсти
	~Гангренозный пульпит.
}

// question: 4151848 name: НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ СИНДРОМЕ ФРАНЧЕСКЕТТИ ПОДВЕРГАЮТСЯ
::НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ СИНДРОМЕ ФРАНЧЕСКЕТТИ ПОДВЕРГАЮТСЯ::[html]НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ СИНДРОМЕ ФРАНЧЕСКЕТТИ ПОДВЕРГАЮТСЯ{
	=скуловая кость, скуловой отросток и нижняя челюсть
	~скуловая кость
	~скуловая кость и верхняя челюсть

~скуловая кость и нижняя челюсть
}

// question: 4175004 name: Найдите метод вправления нижней челюсти по А.А. Тимофееву:
::Найдите метод вправления нижней челюсти по А.А. Тимофееву\:::[html]Найдите метод вправления нижней челюсти по А.А. Тимофееву\:{
~больной сидит, врач вводит в полость рта большие пальцы обеих рук и накладывает на жевательные поверхности моляров, остальными пальцами обхватывается нижняя челюсть, давит на моляры и приподнимает подбородок снизу вверх, смещает челюсть кзади
~больной сидит, врач в полости рта находит место расположения венечных отростков, указательными пальцами надавливает на них в направлении вниз и кзади
~больной сидит, врач пальпаторно через кожу щек ниже скуловых костей определяет положение верхушек венечных отростков и надавливает на них большими пальцами в направлении вниз и назад
=больной сидит, врач внеротовым путем надавливает большими пальцами в направлении вниз и назад на вывихнутые головки нижней челюсти
}

// question: 4175001 name: Найдите метод вправления нижней челюсти по Блехману:
::Найдите метод вправления нижней челюсти по Блехману\:::[html]Найдите метод вправления нижней челюсти по Блехману\:{
~больной сидит, врач вводит в полость рта большие пальцы обеих рук и накладывает на жевательные поверхности моляров остальными пальцами обхватывается нижняя челюсть, давит на моляры и приподнимает подбородок снизу вверх, смещает челюсть кзади
=больной сидит врач в полости рта находит место расположения венечных отростков, указательными пальцами надавливает на них в направлении вниз и кзади
~больной сидит, врач пальпаторно через кожу щек ниже скуловых костей определяет положение верхушек венечных отростков и надавливает на них большими пальцами в направлении вниз и назад
~больной сидит, врач внеротовым путем надавливает большими пальцами в направлении вниз и назад на вывихнутые головки нижней челюсти
}

// question: 4175000 name: Найдите метод вправления нижней челюсти по Гиппократу:
::Найдите метод вправления нижней челюсти по Гиппократу\:::[html]Найдите метод вправления нижней челюсти по Гиппократу\:{
=больной сидит, врач вводит в полость рта большие пальцы обеих рук и накладывает на жевательные поверхности моляров, остальными пальцами обхватывается нижняя челюсть, давит на моляры и приподнимает подбородок снизу вверх, смещает челюсть кзади

~больной сидит, врач в полости рта находит место расположения венечных отростков указательными пальцами надавливает на них в направлении вниз и кзади

~больной сидит, врач пальпаторно через кожу щек ниже скуловых костей определяет положение верхушек венечных отростков и надавливает на них большими пальцами в направлении вниз и назад

~больной сидит, врач внеротовым путем надавливает большими пальцами в направлении вниз и назад на вывихнутые головки нижней челюсти
}

// question: 4175003 name: Найдите метод вправления нижней челюсти по Попеску:
::Найдите метод вправления нижней челюсти по Попеску\:::[html]Найдите метод вправления нижней челюсти по Попеску\:{

~больной сидит, врач вводит в полость рта большие пальцы обеих рук и накладывает на жевательные поверхности моляров, остальными пальцами обхватывается нижняя челюсть, давит на моляры и приподнимает подбородок снизу вверх, смещает челюсть кзади

~больной сидит, врач в полости рта находит место расположения венечных отростков, указательными пальцами надавливает на них в направлении вниз и кзади

~больной сидит, врач пальпаторно через кожу щек ниже скуловых костей определяет положение верхушек венечных отростков и надавливает на них большими пальцами в направлении вниз и назад

=больной лежит, врач между молярами вводит тугой марлевый валик, давит на подбородок снизу вверх, а затем спереди назад
}

// question: 4175002 name: Найдите метод вправления нижней челюсти по Хватовой-Гершуни:
::Найдите метод вправления нижней челюсти по Хватовой-Гершуни\:::[html]Найдите метод вправления нижней челюсти по Хватовой-Гершуни\:{

~больной сидит врач вводит в полость рта большие пальцы обеих рук и накладывает на жевательные поверхности моляров, остальными пальцами обхватывается нижняя челюсть, давит на моляры и приподнимает подбородок снизу вверх, смещает челюсть кзади

~больной сидит, врач в полости рта находит место расположения венечных отростков, указательными пальцами надавливает на них в направлении вниз и кзади

=больной сидит, врач пальпаторно через кожу щек ниже скуловых костей определяет положение верхушек венечных отростков и надавливает на них большими пальцами в направлении вниз и назад

~больной сидит врач внеротовым путем надавливает большими пальцами в направлении вниз и назад на вывихнутые головки нижней челюсти
}

// question: 4175012 name: Найдите описание клинической картины абразивного хейлита Манганотти:

::Найдите описание клинической картины абразивного хейлита Манганотти\:::[html]Найдите описание клинической картины абразивного хейлита Манганотти\:{

=на красной кайме губы имеется одна эрозия овальной формы размером около 1 см с гладким красноватым дном, некровоточащая и безболезненная, по краям эрозии эпителий приподнят в виде валика

~множественное появление пузырей на слизистой оболочке губ и рта, а также коже губ, положительный симптом Никольского, наличие в мазках-отпечатках клеток Тцанка

~имеется появление папул на слизистой оболочке полости рта в виде кружевных белесоватых налетов, а на их фоне образуются отдельные эрозии и длительно незаживающие язвы

~эрозия располагается на фоне белесоватой поверхности шероховатой на ощупь, слегка возвышающейся над уровнем неизменной красной каймы

}

// question: 4175015 name: Найдите описание клинической картины эрозивной лейкоплакии:

::Найдите описание клинической картины эрозивной лейкоплакии\:::[html]Найдите описание клинической картины эрозивной лейкоплакии\:{

~на красной кайме губы имеется одна эрозия овальной формы размером около 1 см, с гладким красноватым дном некровоточащая и безболезненная, по краям эрозии эпителий приподнят в виде валика

~множественное появление пузырей на слизистой оболочке губ и рта, а также коже губ, положительный симптом Никольского, наличие в мазках-отпечатках клеток Тцанка

~имеется появление папул на слизистой оболочке полости рта в виде кружевных белесоватых налетов, а на их фоне образуются отдельные эрозии и длительно незаживающие язвы

=эрозия располагается на фоне белесоватой поверхности, шероховатой на ощупь, слегка возвышающейся над уровнем неизменной красной каймы

}

// question: 4175014 name: Найдите описание клинической картины, которая соответствует эрозивно-язвенной...

::Найдите описание клинической картины, которая соответствует эрозивно-язвенной...::[html]Найдите описание клинической картины, которая соответствует эрозивно-язвенной форме красного плоского лишая\:{

~на красной кайме губы имеется одна эрозия овальной формы размером около 1 см, с гладким красноватым дном, некровоточащая и безболезненная, по краям эрозии эпителий приподнят в виде валика

~множественное появление пузырей на слизистой оболочке губ и рта, а также коже губ, положительный симптом Никольского, наличие в мазках-отпечатках клеток Тцанка

=имеется появление папул на слизистой оболочке полости рта в виде кружевных белесоватых налетов, а на их фоне образуются отдельные эрозии и длительно незаживающие язвы

~эрозия располагается на фоне белесоватой поверхности шероховатой на ощупь, слегка возвышающейся над уровнем неизменной красной каймы
}

// question: 4175013 name: Найдите описание клинической картины, которая характерна для пузырчатки:
::Найдите описание клинической картины, которая характерна для пузырчатки\:::[html]Найдите описание клинической картины, которая характерна для пузырчатки\:{

~на красной кайме губы имеется одна эрозия овальной формы размером около 1см, с гладким красноватым дном, некровоточащая и безболезненная, по краям эрозии эпителии приподнят в виде валика

=множественное появление пузырей на слизистой оболочке губ и рта, а также коже губ, положительный симптом Никольского, наличие в мазках-отпечатках клеток Тцанка

~имеется появление папул на слизистой оболочке полости рта в виде кружевных белесоватых налетов, а на их фоне образуются отдельные эрозии и длительно незаживающие язвы

~эрозия располагается на фоне белесоватой поверхности, шероховатой на ощупь, слегка возвышающейся над уровнем неизменной красной каймы
}

// question: 4151733 name: НАЛИЧИЕ У ПОСТРАДАВШЕГО СИМПТОМА «ЛИЦА ПАНДЫ» (ОТЕКА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА В ...
::НАЛИЧИЕ У ПОСТРАДАВШЕГО СИМПТОМА «ЛИЦА ПАНДЫ» (ОТЕКА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА В ...::[html]НАЛИЧИЕ У ПОСТРАДАВШЕГО СИМПТОМА «ЛИЦА ПАНДЫ» (ОТЕКА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА В СОЧЕТАНИИ С КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ В ПАРАОРБИТАЛЬНУЮ КЛЕТЧАТКУ С ОБЕИХ СТОРОН) ХАРАКТЕРНО ДЛЯ{

=перелома верхней челюсти

~перелома скулоорбитального комплекса

~изолированного перелома костей дна орбиты «взрывного типа»

~двустороннего повреждения височно-нижнечелюстных суставов
}

// question: 4151674 name: Нарушение целостности костей основания черепа чаще всего происходит при ...
::Нарушение целостности костей основания черепа чаще всего происходит при ...::[html]Нарушение целостности костей основания черепа чаще всего происходит при переломе\:{

=суббазальном

~костей носа

~нижнего края орбиты
~альвеолярного отростка
}

// question: 4151718 name: НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ...
::НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ...::[html]НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НОСА, ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ{
=подглазничного нерва
~мягких тканей
~лицевого нерва
~третьей ветви тройничного нерва
}

// question: 4151734 name: НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОДБОРОДОЧНОГО НЕРВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...
::НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОДБОРОДОЧНОГО НЕРВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОДБОРОДОЧНОГО НЕРВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОБУСЛОВЛЕНО{
=ущемлением нижнелуночкового нерва
~отеком костного мозга
~сдавлением нерва гематомой
~развитием травматического шока
}

// question: 4175103 name: Не существует следующей карциномы:
::Не существует следующей карциномы\:::[html]Не существует следующей карциномы\:{
~Аденокарциномы
=Солидной
~Эпидермоидной
~Недифференцированной
~В плеоморфной аденоме
}

// question: 4152511 name: Некоторые переломы носа не нуждаются в хирургическом лечении, а именно:
::Некоторые переломы носа не нуждаются в хирургическом лечении, а именно\:::[html]Некоторые переломы носа не нуждаются в хирургическом лечении, а именно\:{
=Переломы без смещения отломков

~Переломы со смещением
~Вдавленный перелом
~Все переломы пирамиды носа
}

// question: 4152512 name: Некоторые переломы носа не нуждаются в хирургическом лечении, а именно:
::Некоторые переломы носа не нуждаются в хирургическом лечении, а именно\:::[html]Некоторые переломы носа не нуждаются в хирургическом лечении, а именно\:{
~Переломы со смещением
=Переломы хряща
~Вдавленный перелом
~Все переломы пирамиды носа
}

// question: 4175047 name: Некротизирующая (обызвествленная) эпителиома Малерба - это:
::Некротизирующая (обызвествленная) эпителиома Малерба - это\:::[html]Некротизирующая (обызвествленная) эпителиома Малерба - это\:{
~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
~доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
~доброкачественная опухоль сложного строения, развивающаяся из придатков кожи, характеризуется дольчатым строением и содержит полости
=доброкачественное новообразование гистогенетически исходящее из волосяного матрикса
}

// question: 4175055 name: Неодонтогенную этиологию имеет:
::Неодонтогенную этиологию имеет\:::[html]Неодонтогенную этиологию имеет\:{
~Цементома
~одонтома мягкая
~одонтома твердая
~фолликуряная киста
=мукоэпидермоидная опухоль
}

// question: 4152429 name: Неотложная помощь при сочетанных травмах включает:
::Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:::[html]Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:{
~Наложение асептической повязки и временная иммобилизация отломков

~Неотложную помощь при шоке
=Все ответы верны
}

// question: 4152430 name: Неотложная помощь при сочетанных травмах включает:
::Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:::[html]Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:{
~Остановку кровотечения
~Поддержки жизненно важных систем
=Все ответы верны
}

// question: 4152431 name: Неотложная помощь при сочетанных травмах включает:
::Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:::[html]Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:{
~Наложение асептической повязки и временная иммобилизация отломков
~Поддержки жизненно важных систем
=Все ответы верны
}

// question: 4152432 name: Неотложная помощь при сочетанных травмах включает:
::Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:::[html]Неотложная помощь при сочетанных травмах включает\:{
~Неотложную помощь при шоке
~Остановку кровотечения
=Все ответы верны
}

// question: 4151767 name: НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=повреждение нижнеальвеолярной артерии
~слюнной свищ
~ишемия тканей операционной области
~парез маргинальной ветви лицевого нерва
}

// question: 4151720 name: НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С НИЖНЕЙ МАКРОГНАТИЕЙ

::НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С НИЖНЕЙ МАКРОГНАТИЕЙ::[html]НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С НИЖНЕЙ МАКРОГНАТИЕЙ{
	=увеличена
	~уплощена
	~уменьшена
	~смещена
}

// question: 4152405 name: Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств:
::Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:::[html]Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:{
	~Удаление сверхкомплектных зубов
	~Травматическое удаление зубов мудрости
	=Все ответы верны
}

// question: 4152406 name: Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств:
::Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:::[html]Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:{
	~Удаление опухолей
	~Ортогнатические операции
	=Все ответы верны
}

// question: 4152407 name: Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств:
::Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:::[html]Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:{
	~Травматическое удаление зубов мудрости
	~Удаление опухолей
	=Все ответы верны
}

// question: 4152408 name: Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств:
::Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:::[html]Нижняя челюсть может быть сломана во время некоторых хирургических вмешательств\:{

~Удаление сверхкомплектных зубов
~Ортогнатические операции
=Все ответы верны
}

// question: 4175084 name: Носогубная киста по другому называется:
::Носогубная киста по другому называется\:::[html]Носогубная киста по другому называется\:{
~киста резцового канала
~носонебная киста
~радикулярная киста
~фолликулярная киста
=носоальвеолярная киста
}

// question: 4151871 name: О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ...
::О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ...::[html]О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ{
=положительный тест двойного пятна
~положительная реакция Вассермана
~симптом Малевича
~снижение количества альбуминов в крови
}

// question: 4151719 name: О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ...
::О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ...::[html]О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ{
=положительный тест двойного пятна
~повышение СОЭ в крови
~положительная реакция Вассермана
~снижение количества альбуминов в крови
}

// question: 4151668 name: О чем свидетельствует положительный симптом «очков»:
::О чем свидетельствует положительный симптом «очков»\:::[html]О чем свидетельствует положительный симптом «очков»\:{
~Перелом костей носа
~перелом нижней челюсти
~перелом венечного отростка

=перелом основания черепа
}

// question: 4152025 name: ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=по Дубову
~наркоз
~нейролептаналгезия
~сочетанное
}

// question: 4174960 name: Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти:
::Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти\:::[html]Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти\:{
~наркоз
=местное
~нейролептаналгезия
~стволовая анестезия
}

// question: 4174983 name: Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти:
::Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти\:::[html]Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти\:{
~наркоз
=местное
~нейролептаналгезия
~стволовая анестезия
}

// question: 4152122 name: Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...
::Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...::[html]Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области характеризуется\:{
~Временной потерей трудоспособности
~Головной болью, бессонницей, потерей аппетита
=Все ответы верны
}

// question: 4152123 name: Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...
::Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...::[html]Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области характеризуется\:{
	~Повышением температуры тела, ознобом
	~Головной болью, бессонницей, потерей аппетита
	=Все ответы верны
}

// question: 4152124 name: Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...
::Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...::[html]Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области характеризуется\:{
	~Повышением температуры тела, ознобом
	~Септическим состоянием
	=Все ответы верны
}

// question: 4152125 name: Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...
::Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области ...::[html]Общая клиническая картина при абсцессе (флегмоне) околоушной области характеризуется\:{
	~Септическим состоянием
	~Временной потерей трудоспособности
	=Все ответы верны
}

// question: 4152184 name: Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...
::Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...::[html]Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) характеризуется\:{
	~Нарушение общего состояния
	~Больной адинамичный или беспокойный
	~Признаки глубокой интоксикации
	=Все ответы верны
}

// question: 4152185 name: Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...

::Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...::[html]Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) характеризуется\:{
~Признаки глубокой интоксикации
~Повышение температуры (39 40°С), озноб
~Сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
=Все ответы верны
}

// question: 4152186 name: Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...
::Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...::[html]Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) характеризуется\:{
~Нарушение общего состояния
~Повышение температуры (39 40°С), озноб
~Сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
=Все ответы верны
}

// question: 4152187 name: Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...
::Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...::[html]Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) характеризуется\:{
~Нарушение общего состояния
~Больной адинамичный или беспокойный
~Сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
=Все ответы верны
}

// question: 4152188 name: Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...
::Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) ...::[html]Общая симптоматика при диффузной гемифациальной флегмоне (половины лица) характеризуется\:{
~Больной адинамичный или беспокойный
~Признаки глубокой интоксикации
~Повышение температуры (39 40°С), озноб
=Все ответы верны
}

// question: 4152201 name: Общая симптоматология флегмон шеи является:

::Общая симптоматология флегмон шеи является\:::[html]Общая симптоматология флегмон шеи является\:{
	~Температура (38,9 400С), озноб
	~Сдвиг лейкоцитарной формулы влево
	~Нарушение общего состояния организма
	=Все ответы верны
}

// question: 4152202 name: Общая симптоматология флегмон шеи является:
::Общая симптоматология флегмон шеи является\:::[html]Общая симптоматология флегмон шеи является\:{
	~Температура (38,9 400С), озноб
	~Сдвиг лейкоцитарной формулы влево
	~Бледность кожных покровов.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152410 name: Общие признаки для всех переломов н/ч:
::Общие признаки для всех переломов н/ч\:::[html]Общие признаки для всех переломов н/ч\:{
	=Боль
	~Нарушение фонетики
	~Нарушение прикуса
	~Нарушение чувствительности в области нижнечелюстного нерва.
}

// question: 4152411 name: Общие признаки для всех переломов н/ч:
::Общие признаки для всех переломов н/ч\:::[html]Общие признаки для всех переломов н/ч\:{
	~Нарушение фонетики
	=Патологическая подвижность
	~Нарушение прикуса
	~Нарушение чувствительности в области нижнечелюстного нерва.
}

// question: 4152350 name: Общие признаки ран ЧЛО могут быть:
::Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:::[html]Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:{
	~Боль
	~Кровотечение
	~Нарушение дыхания
	=Все ответы верны
}

// question: 4152351 name: Общие признаки ран ЧЛО могут быть:
::Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:::[html]Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:{
	~Нарушение дыхания
	~Нарушение глотания, жевания
	~Нарушения фонетики.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152352 name: Общие признаки ран ЧЛО могут быть:
::Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:::[html]Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:{
	~Боль
	~Нарушение глотания, жевания
	~Нарушения фонетики.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152353 name: Общие признаки ран ЧЛО могут быть:
::Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:::[html]Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:{
	~Боль
	~Кровотечение
	~Нарушения фонетики.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152354 name: Общие признаки ран ЧЛО могут быть:
::Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:::[html]Общие признаки ран ЧЛО могут быть\:{
	~Боль
	~Нарушение дыхания
	~Нарушения фонетики.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152003 name: ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ...
::ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ...::[html]ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАН ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ{
	=противостолбнячная сыворотка
	~антирабическая сыворотка
	~стафилококковый анатоксин
	~гамма-глобулин
}

// question: 4151825 name: ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ{
	=ликворея
	~кровотечение из носа
	~патологическая подвижность нижней челюсти
	~патологическая подвижность верхней челюсти
}

// question: 4152009 name: ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРИ ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТТЯГИВАНИЕ
::ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРИ ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТТЯГИВАНИЕ::[html]ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРИ ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТТЯГИВАНИЕ{
	=челюсти книзу
	~челюсти в сторону
	~челюсти вверх
	~челюсти в сторону вывиха
}

// question: 4152248 name: Одним из важных признаков при медиастините является увеличение средостения, ...
::Одним из важных признаков при медиастините является увеличение средостения, ...::[html]Одним из важных признаков при медиастините является увеличение средостения, которое может быть определено\:{
	~Визуально
	~Пальпаторно
	~Аускультативно
	=Рентгенологически
	~Спирометрически.
}

// question: 4151700 name: ОДНИМ ИЗ КАНЦЕРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОДНИМ ИЗ КАНЦЕРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОДНИМ ИЗ КАНЦЕРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=ультрафиолетовое излучение
	~сенсибилизация организма
	~интоксикация организма
	~длительная гипоксия тканей
}

// question: 4151863 name: ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА ВНЧС ...
::ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА ВНЧС ...::[html]ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА ВНЧС ЯВЛЯЕТСЯ{
	=затруднение открывания рта, боль в суставе, усиливающаяся при движениях нижней челюсти
	~парез мимической мускулатуры
	~покраснение и припухлость в околоушно-жевательной области
	~невозможность открыть рот
}

// question: 4151847 name: ОДНОСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ
::ОДНОСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ::[html]ОДНОСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ{
	=синдроме Гольденхара
	~тетраде Фалло
	~синдром Пьера-Робина
	~врожденный черепно-ключичный дизостоз
}

// question: 4152539 name: Одонтома:
::Одонтома\:::[html]Одонтома\:{
	~опухоль костной структуры
	=опухоль зубной структуры
	~злокачественная опухоль
}

// question: 4152540 name: Одонтома:
::Одонтома\:::[html]Одонтома\:{
	~опухоль костной структуры
	=доброкачественная опухоль
	~злокачественная опухоль
}

// question: 4152541 name: Одонтома:
::Одонтома\:::[html]Одонтома\:{
	~опухоль костной структуры
	~злокачественная опухоль
	=формируется из зубных тканей

}

// question: 4152466 name: Окончательное лечение переломов верхней челюсти чаще осуществляется с помощью:
::Окончательное лечение переломов верхней челюсти чаще осуществляется с помощью\:::[html]Окончательное лечение переломов верхней челюсти чаще осуществляется с помощью\:{
	~Хирургических методов
	=Ортопедических методов
	~Комбинированных методов
	~Теменно подбородочной повязки
	~Подбородочной пращи.
}

// question: 4175141 name: Окончательный диагноз «Амелобластома» ставится на основании данных:
::Окончательный диагноз «Амелобластома» ставится на основании данных\:::[html]Окончательный диагноз «Амелобластома» ставится на основании данных\:{
	=Гистологии
	~Цитологии
	~Анализа крови
	~Опроса
	~Клинико-рентгенологического исследования
}

// question: 4152609 name: Окончательный диагноз предрака губы устанавливается после исследования:
::Окончательный диагноз предрака губы устанавливается после исследования\:::[html]Окончательный диагноз предрака губы устанавливается после исследования\:{
	~Цитологического
	~Гематологического
	=Патогистологического
	~Бактериологического
	~Биохимического
}

// question: 4151930 name: ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ
::ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ::[html]ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ{

=репозиция скуловой кости
~остеотомия верхней челюсти
~верхнечелюстная синусотомия с репозицией отломков
~радикальная верхнечелюстная синусотомия с репозицией отломков
}

// question: 4151926 name: ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ЕЕ В ...
::ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ЕЕ В ...::[html]ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ЕЕ В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНУЮ ПАЗУХУ{
=радикальная гайморотомия с репозицией отломков
~остеотомия верхней челюсти
~гайморотомия с репозицией отломков
~радикальная гайморотомия
}

// question: 4151975 name: ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СРЕДИННОЙ РАСЩЕЛИНЕ НОСА ПРОВОДИТСЯ НА
::ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СРЕДИННОЙ РАСЩЕЛИНЕ НОСА ПРОВОДИТСЯ НА::[html]ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СРЕДИННОЙ РАСЩЕЛИНЕ НОСА ПРОВОДИТСЯ НА{
=костно-хрящевой части носа
~кожной части носа
~хрящевой части носа
~костной части носа
}

// question: 4152231 name: Оперативные доступы при вскрытии флегмоны глазницы:
::Оперативные доступы при вскрытии флегмоны глазницы\:::[html]Оперативные доступы при вскрытии флегмоны глазницы\:{
~ поднижнечелюстной разрез
~ у внутреннего края глазницы
= по нижнему и верхнему краю глазницы
~ у внешнего края глазницы.
}

// question: 4152232 name: Оперативные доступы при вскрытии флегмоны глазницы:
::Оперативные доступы при вскрытии флегмоны глазницы\:::[html]Оперативные доступы при вскрытии флегмоны глазницы\:{
~ поднижнечелюстной разрез
~ у внутреннего края глазницы
~ доступ через верхнечелюстную пазуху

= у внешнего края глазницы.
}

// question: 4152223 name: Оперативный доступ вскрытия флегмоны корня языка:
::Оперативный доступ вскрытия флегмоны корня языка\:::[html]Оперативный доступ вскрытия флегмоны корня языка\:{
~ внутриротовой
=срединный разрез
~ воротникообразный разрез
~ поднижнечелюстной разрез
}

// question: 4152224 name: Оперативный доступ вскрытия флегмоны корня языка:
::Оперативный доступ вскрытия флегмоны корня языка\:::[html]Оперативный доступ вскрытия флегмоны корня языка\:{
~ внутриротовой
~ воротникообразный разрез
~ поднижнечелюстной разрез
= внеротовой.
}

// question: 4151779 name: ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
::ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА::[html]ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССА КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА{
=разрез слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке
~разрез параллельно внутренней поверхности нижней челюсти на уровне моляров
~разрез со стороны кожи, окаймляющий угол нижней челюсти
~разрез со стороны кожи в поднижнечелюстной области
}

// question: 4151977 name: ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЕДЛОВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НОСА
::ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЕДЛОВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НОСА::[html]ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЕДЛОВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НОСА{
=наружный разрез в области боковых отделов носа с двух сторон
~наружный разрез на кончике носа
~поперечный разрез у основания спинки носа
~разрез в виде «ласточкиного хвоста»
}

// question: 4152217 name: Оперативный доступ при поднижнечелюстной флегмоне:
::Оперативный доступ при поднижнечелюстной флегмоне\:::[html]Оперативный доступ при поднижнечелюстной флегмоне\:{
	~срединный (в подбородочной области)
	=внеротовой
	~воротникообразный
	~в поднижнечелюстной области, перпендикулярно к телу челюсти.
}

// question: 4152218 name: Оперативный доступ при поднижнечелюстной флегмоне:
::Оперативный доступ при поднижнечелюстной флегмоне\:::[html]Оперативный доступ при поднижнечелюстной флегмоне\:{
	~срединный (в подбородочной области)
	~воротникообразный
	=в поднижнечелюстной области, параллельно к телу нижней челюсти
	~в поднижнечелюстной области, перпендикулярно к телу челюсти.
}

// question: 4151735 name: ОПУХОЛЬ - ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ
::ОПУХОЛЬ - ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ::[html]ОПУХОЛЬ - ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ{
	=пролиферацией собственных клеток организма
	~некрозом тканей пораженного органа
	~секвестрацией костной ткани
	~образованием гнойных метастазов
}

// question: 4151991 name: ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
	~остеосинтез
	~аппарат Збаржа
	~дуга Энгля
}

// question: 4151940 name: ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ПЛАСТИКИ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ

::ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ПЛАСТИКИ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ::[html]ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ПЛАСТИКИ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ{
=отсутствие натяжения в краях раны
~недопустима мобилизация тканей
~длина разреза должна быть минимальной
~хороший гемостаз
}

// question: 4151853 name: ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=слабость суставной капсулы и связочного аппарата ВНЧС
~артрит ВНЧС
~нижняя макрогнатия
~снижение высоты прикуса
}

// question: 4151854 name: ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=снижение высоты суставного бугорка
~артрит ВНЧС
~нижняя макрогнатия
~снижение высоты прикуса
}

// question: 4151826 name: ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА
::ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА::[html]ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА{
=патологическая подвижность костей носа, деформация
~подкожная эмфизема, кровотечение
~затруднение носового дыхания, гематома
~деформация носа, гематома
}

// question: 4151851 name: ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА
::ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА::[html]ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА{
=смещение костей спинки носа
~подкожная эмфизема
~затруднение носового дыхания

~гематома
}

// question: 4152020 name: ОСНОВНОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ТРАХЕОТОМИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
::ОСНОВНОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ТРАХЕОТОМИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В::[html]ОСНОВНОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ТРАХЕОТОМИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
=иссечении участка колец трахеи
~разведении колец трахеи
~раздвижении мягких тканей над трахеей
~рассечение кожи над трахеей
}

// question: 4151885 name: ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=нарушение прикуса, боль, припухлость
~боль, сухость во рту, кровоподтеки
~резкая светобоязнь, боль, снижение слуха
~общее недомогание, головная боль
}

// question: 4151884 name: ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=нарушение прикуса, боль, припухлость
~боль, сухость во рту, кровоподтеки
~резкая светобоязнь, боль, снижение слуха
~общее недомогание, головная боль
}

// question: 4151827 name: ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ
::ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ::[html]ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ{
=уплощение скуловой области, диплопия
~гематома скуловой области
~кровоизлияние в нижнее веко
~кровотечение из носа, головокружение
}

// question: 4151828 name: ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ

::ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ::[html]ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ{
	="симптом ступени", диплопия
	~деформация носа, гематома
	~гематома скуловой области
	~кровоизлияние в нижнее веко
}

// question: 4151829 name: ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ
::ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ::[html]ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ{
	=симптом "ступени", затрудненное открывание рта
	~деформация носа, гематома
	~кровоизлияние в нижнее веко
	~кровотечение из носа, головокружение
}

// question: 4151802 name: ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В ТЕЧЕНИИ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ СКУЛОВОЙ ...
::ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В ТЕЧЕНИИ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ СКУЛОВОЙ ...::[html]ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В ТЕЧЕНИИ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=очаговое нарушение костеобразования
	~острый пульпит
	~перелом челюсти
	~рецидив кисты
}

// question: 4151820 name: ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=патологическая подвижность нижней челюсти
	~носовое кровотечение
	~головная боль
	~патологическая подвижность верхнечелюстных костей
}

// question: 4151819 name: ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=патологическая подвижность верхнечелюстных костей

~головная боль
~носовое кровотечение
~патологическая подвижность нижней челюсти
}

// question: 4151989 name: ОСНОВНЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВОЙ КОНТРАКТУРЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...
::ОСНОВНЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВОЙ КОНТРАКТУРЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ...::[html]ОСНОВНЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВОЙ КОНТРАКТУРЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
=рассечение и иссечение рубцов с последующей пластикой операционных дефектов
~иссечении рубцов
~рассечении рубцов
~вертикальной остеотомии ветвей нижней челюсти
}

// question: 4151952 name: ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПЛАСТИКИ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ ...
::ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПЛАСТИКИ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ ...::[html]ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПЛАСТИКИ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ{
=дефекта губы и деформации крыла носа
~рубцовой деформации
~искривления перегородки носа
~выворота крыла носа
}

// question: 4151787 name: ОСЛОЖНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ
::ОСЛОЖНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ::[html]ОСЛОЖНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ{
=посттравматический остеомиелит
~фурункулез
~рожистое воспаление
~периостит
}

// question: 4151762 name: ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ПЛАСТИКИ ПРИ РАБОТЕ НА МЯГКИХ ТКАНЯХ
::ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ПЛАСТИКИ ПРИ РАБОТЕ НА МЯГКИХ ТКАНЯХ::[html]ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ПЛАСТИКИ ПРИ РАБОТЕ НА МЯГКИХ ТКАНЯХ{

=исключить натяжение перемещенных тканей
~не ушивать рану наглухо
~не выполнять мобилизацию тканей
~минимизировать длину разреза
}

// question: 4151687 name: ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОГЛАЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОГЛАЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОГЛАЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ{
=кровотечение из носового хода на стороне поражения
~нарушение смыкания зубных рядов
~возникновение периодических приступов головокружения и тошноты
~двоение в глазах при взгляде в сторону
}

// question: 4175082 name: Основной метод лечения гигантоклеточной опухоли больших ...
::Основной метод лечения гигантоклеточной опухоли больших ...::[html]Основной метод лечения гигантоклеточной опухоли больших размеров\:{
~криодеструкция
~химиотерапия
=резекция челюсти
~антибактериальная терапия
~комбинированное лечение
}

// question: 4175061 name: Основной метод лечения гигантоклеточной опухоли является:
::Основной метод лечения гигантоклеточной опухоли является\:::[html]Основной метод лечения гигантоклеточной опухоли является\:{
~комбинированное лечение
~химиотерапия
~криодеструкция
~антибактериальная терапия
=удаление опухоли в пределах здоровых тканей
}

// question: 4174953 name: Основной причиной вывихов нижней челюсти является:
::Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:::[html]Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:{

~артрит ВНЧС
~нижняя макрогнатия
~снижение высоты прикуса
~глубокое резцовое перекрытие
=слабость суставной капсулы и связочного аппарата ВНЧС
}

// question: 4174954 name: Основной причиной вывихов нижней челюсти является:
::Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:::[html]Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:{
~артрит ВНЧС
~нижняя макрогнатия
~снижение высоты прикуса
~глубокое резцовое перекрытие
=снижение высоты суставного бугорка
}

// question: 4174979 name: Основной причиной вывихов нижней челюсти является:
::Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:::[html]Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:{
~артрит ВНЧС
~нижняя макрогнатия
~снижение высоты прикуса
=слабость суставной капсулы и связочного аппарата ВНЧС
}

// question: 4174980 name: Основной причиной вывихов нижней челюсти является:
::Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:::[html]Основной причиной вывихов нижней челюсти является\:{
~артрит ВНЧС
~нижняя макрогнатия
~снижение высоты прикуса
=снижение высоты суставного бугорка
}

// question: 4174969 name: Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является:
::Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является\:::[html]Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является\:{
=артрит
~опухоль
~мастоидит
~околоушный гипергидроз
}

// question: 4152239 name: Основной симптом медиастинита могут быть:
::Основной симптом медиастинита могут быть\:::[html]Основной симптом медиастинита могут быть\:{
	~Кашель
	~Нарушение глотания
	=Отдышка с частотой дыхания 45 50
	~Тошнота, рвота
	~Температура, озноб.
}

// question: 4151864 name: ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА ВНЧС
::ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА ВНЧС::[html]ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА ВНЧС{
	=ограничение открывания рта, девиация, хруст в суставе
	~боль, припухлость
	~полное отсутствие движений в суставе
	~деформация лица
}

// question: 4152255 name: Основным в лечении острых гнойных лимфаденитов является:
::Основным в лечении острых гнойных лимфаденитов является\:::[html]Основным в лечении острых гнойных лимфаденитов является\:{
	~Консервативное лечение.
	~Антибиотикотерапия.
	=Хирургическое вмешательство (вскрытие гнойного очага)
	~Компрессы, повязки с мазями.
	~Физиотерапия.
}

// question: 4152208 name: Основным источником инфицирования щечной области является патологические ...
::Основным источником инфицирования щечной области является патологические ...::[html]Основным источником инфицирования щечной области является патологические процессы, возникающие в\:{
	~резцах, клыках, премолярах и молярах верхней челюсти
	~премолярах и молярах верхней челюсти
	~премолярах и молярах нижней челюсти
	=премолярах верхней и нижней челюстей
}

// question: 4152209 name: Основным источником инфицирования щечной области является патологические ...
::Основным источником инфицирования щечной области является патологические ...::[html]Основным источником инфицирования щечной области является патологические процессы, возникающие в\:{
	~резцах, клыках, премолярах и молярах верхней челюсти
	~премолярах и молярах верхней челюсти
	~премолярах и молярах нижней челюсти
	=молярах верхней и нижней челюстей.
}

// question: 4175118 name: Основным клиническим симптомом кисты на нижней челюсти является:
::Основным клиническим симптомом кисты на нижней челюсти является\:::[html]Основным клиническим симптомом кисты на нижней челюсти является\:{
	=Изменение конфигурации за счет деформации
	~Болевой синдром
	~Симптом Венсана
	~Нарушение глотания
	~Плотное обизвествленное образование
}

// question: 4152459 name: Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются:
::Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:::[html]Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:{
	~Восстановление нормальной конфигурации лица
	~Получение нормального окклюзионного взаимоотношения
	~Правильное сопоставление и удерживание фрагментов до их сращения.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152460 name: Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются:
::Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:::[html]Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:{
	~Исчезновение диплопии и нарушений со стороны глазного нерва
	~Получение нормального окклюзионного взаимоотношения
	~Правильное сопоставление и удерживание фрагментов до их сращения.
	=Все ответы верны

}

// question: 4152461 name: Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются:
::Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:::[html]Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:{
	~Исчезновение диплопии и нарушений со стороны глазного нерва
	~Исчезновение ступенчатости по линии перелома
	~Правильное сопоставление и удерживание фрагментов до их сращения.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152462 name: Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются:
::Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:::[html]Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:{
	~Исчезновение диплопии и нарушений со стороны глазного нерва
	~Исчезновение ступенчатости по линии перелома
	~Восстановление нормальной конфигурации лица
	=Все ответы верны
}

// question: 4152463 name: Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются:
::Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:::[html]Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:{
	~Исчезновение ступенчатости по линии перелома
	~Получение нормального окклюзионного взаимоотношения
	~Правильное сопоставление и удерживание фрагментов до их сращения.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152464 name: Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются:
::Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:::[html]Основным критерием сопоставления отломков верхней челюсти являются\:{
	~Исчезновение ступенчатости по линии перелома
	~Восстановление нормальной конфигурации лица
	~Правильное сопоставление и удерживание фрагментов до их сращения.

=Все ответы верны
}

// question: 4175138 name: Основным методом лечением липомы является:
::Основным методом лечением липомы является\:::[html]Основным методом лечением липомы является\:{
~Химиотерапия
~Криодиструкция
~Комбинированное
~Лучевая терапия
=Иссечение вместе с капсулой
}

// question: 4175144 name: Основным методом лечения амелобластомы у пациентов пожилого возраста и (или) ...
::Основным методом лечения амелобластомы у пациентов пожилого возраста и (или) ...::[html]Основным методом лечения амелобластомы у пациентов пожилого возраста и (или) с тяжелой сопутствующей патологией является\:{
~Резекция челюсти
~Выскабливание оболочки новообразования
~Лучевая терапия
~Химиотерапия
=Декомпрессионная цистотомия
}

// question: 4175143 name: Основным методом лечения амелобластомы является:
::Основным методом лечения амелобластомы является\:::[html]Основным методом лечения амелобластомы является\:{
=Резекция челюсти
~Выскабливание оболочки новообразования
~Лучевая терапия
~Химиотерапия
~Цистэктомия
}

// question: 4152336 name: Основным методом лечения врожденных свищей шеи является:
::Основным методом лечения врожденных свищей шеи является\:::[html]Основным методом лечения врожденных свищей шеи является\:{
~Склерозирование
~Криодеструкция
~Лазерокоагуляция
~Перевязка

= Иссечение.
}

// question: 4175054 name: Основным методом лечения врожденных свищей является:
::Основным методом лечения врожденных свищей является\:::[html]Основным методом лечения врожденных свищей является\:{
~Лазерокоагуляция
~Электрокоагуляция
~Криодиструкция
=Иссечение
~Склерозирование
}

// question: 4152566 name: Основным методом лечения рака нижней челюсти является:
::Основным методом лечения рака нижней челюсти является\:::[html]Основным методом лечения рака нижней челюсти является\:{
~Хирургический
~Лучевой
=Комбинированный
~Химиотерапевтический
~Электрохирургический
}

// question: 4151690 name: ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=патологическая подвижность верхнечелюстных костей
~носовое кровотечение
~ограничение открывания рта
~разрыв слизистой оболочки в области альвеолярного отростка
}

// question: 4151714 name: ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ ДУГИ СО СМЕЩЕНИЕМ ...
::ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ ДУГИ СО СМЕЩЕНИЕМ ...::[html]ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ ДУГИ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ ЯВЛЯЕТСЯ{
=западение в области скуловой дуги
~деформация носа
~ограничение боковых движений нижней челюсти
~нарушение кожной чувствительности в подглазничной области

}

// question: 4152247 name: Основным симптомом при медиастините может быть:
::Основным симптомом при медиастините может быть\:::[html]Основным симптомом при медиастините может быть\:{
	~Слезотечение
	~Головокружение
	=Вынужденное положение пациента
	~Отёчность в височной области
	~Отёчность подглазничной области.
}

// question: 4152250 name: Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются:
::Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:::[html]Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:{
	~Ухудшение общего состояния.
	~Температура до 38 39,50.
	~Боли.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152251 name: Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются:
::Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:::[html]Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:{
	~Боли.
	~Признаки интоксикации.
	~Изменения крови.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152252 name: Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются:
::Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:::[html]Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:{
	~Ухудшение общего состояния.
	~Признаки интоксикации.
	~Изменения крови.
	=Все ответы верны

}

// question: 4152253 name: Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются:
::Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:::[html]Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:{
	~Ухудшение общего состояния.
	~Температура до 38 39,50.
	~Изменения крови.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152254 name: Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются:
::Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:::[html]Основными клиническими симптомами при аденофлегмонах являются\:{
	~Ухудшение общего состояния.
	~Боли.
	~Изменения крови.
	=Все ответы верны
}

// question: 4151691 name: ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ
::ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ::[html]ОСНОВНЫМИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДРАКА ЯВЛЯЮТСЯ{
	=хроническая травма слизистой оболочки полости рта и вредные привычки
	~вторичная адентия и несостоятельные ортопедические конструкции
	~острые воспалительные процессы мягких тканей лица
	~острые воспалительные процессы костей лицевого скелет
}

// question: 4151785 name: ОСОБЕННОСТИ ОЖОГОВ ЛИЦА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В
::ОСОБЕННОСТИ ОЖОГОВ ЛИЦА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В::[html]ОСОБЕННОСТИ ОЖОГОВ ЛИЦА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В{
	=неравномерном поражении кожи лица
	~значительной аутоинтоксикации
	~течении раневого процесса
	~быстром развитии гнойно-септических осложнений
}

// question: 4175065 name: Особенностью удаления плеоморфной аденомы является:
::Особенностью удаления плеоморфной аденомы является\:::[html]Особенностью удаления плеоморфной аденомы является\:{
	~перевязка слюнного протока
	~перевязка наружной сонной артерии
	=выделение ветвей лицевого нерва
	~тотальной резекция
	~замещение образовавшегося дефекта
}

// question: 4175069 name: Особенный вид диагностики при лечении свищей лица и шеи:
::Особенный вид диагностики при лечении свищей лица и шеи\:::[html]Особенный вид диагностики при лечении свищей лица и шеи\:{
	=фистулография
	~биопсия
	~ультразвуковое исследование
	~Рентгенография
	~Эндоскопия
}

// question: 4152542 name: Остеома:
::Остеома\:::[html]Остеома\:{
	=доброкачественная опухоль
	~злокачественная опухоль
	~сформирована из костной недиференцированой ткани
	~быстрый рост
}

// question: 4152543 name: Остеома:
::Остеома\:::[html]Остеома\:{
	~злокачественная опухоль
	=сформирована из костной диференцированой ткани
	~сформирована из костной недиференцированой ткани
	~быстрый рост
}

// question: 4152061 name: Остеомиелит – это:
::Остеомиелит – это\:::[html]Остеомиелит – это\:{
	~ воспалительный процесс, поражающий ткани периодонта и распространяющийся на прилежащие к нему костные структуры

~ заболевание, характеризующееся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти

~ воспалительный процесс в костной ткани челюсти

= инфекционно аллергический, гнойно некротический процесс, который развивается в кости под воздействием внешних или внутренних факторов.

~ чаще поражает верхнюю челюсть.

}

// question: 4152068 name: Остеомиелит нижней челюсти, в отличие от аналогичного поражения верхней ...

::Остеомиелит нижней челюсти, в отличие от аналогичного поражения верхней ...::[html]Остеомиелит нижней челюсти, в отличие от аналогичного поражения верхней челюсти, характеризуется\:{

~ более легким течением, менее частыми и разнообразными осложнениями, небольшими секвестрами

= более тяжелым течением, более частыми и разнообразными осложнениями, обширной секвестрацией

~ аналогичное течение на обеих челюстях

~ без особенностей на обеих челюстях

~ парестезия нижнечелюстного нерва на здоровой стороне челюсти

}

// question: 4175062 name: Остеомой называют:

::Остеомой называют\:::[html]Остеомой называют\:{

~участки склероза костной ткани

~доброкачественная опухоль из соединительной ткани

~злокачественная опухоль из костной ткани

~доброкачественную опухоль из зрелой сформированной костной ткани

=порок развития зубных тканей

}

// question: 4175075 name: Остеомой называют:

::Остеомой называют\:::[html]Остеомой называют\:{

=доброкачественную опухоль из зрелой костной ткани

~злокачественную опухоль из зрелой костной ткани

~участки зрелой костной ткани

~начальную форму остеобластокластомы

~доброкачественную опухоль из эпителиальной ткани

}

// question: 4175086 name: Остеосаркома рано метастазирует в:

::Остеосаркома рано метастазирует в\:::[html]Остеосаркома рано метастазирует в\:{

~печень

~селезенку
~сердце
=легкие
~почки
}

// question: 4175085 name: Остеосаркома при пальпации:
::Остеосаркома при пальпации\:::[html]Остеосаркома при пальпации\:{
~определяется симптом флюктуации
~безболезненная
=болезненная
~определяется симптом пергаментного хруста
~определяется симптом ступеньки
}

// question: 4151923 name: ОСТЕОСИНТЕЗ ПО МАКИЕНКО ПРОВОДИТСЯ
::ОСТЕОСИНТЕЗ ПО МАКИЕНКО ПРОВОДИТСЯ::[html]ОСТЕОСИНТЕЗ ПО МАКИЕНКО ПРОВОДИТСЯ{
=спицей
~минипластинами
~стальной проволокой
~бронзо-алюминиевой лигатурой
}

// question: 4151769 name: ОСТЕОСИНТЕЗ ПО МАКИЕНКО ПРОВОДИТСЯ
::ОСТЕОСИНТЕЗ ПО МАКИЕНКО ПРОВОДИТСЯ::[html]ОСТЕОСИНТЕЗ ПО МАКИЕНКО ПРОВОДИТСЯ{
=спицей
~минипластинами
~стальной проволокой
~бронзово-алюминиевой лигатурой
}

// question: 4151980 name: ОСТЕОТОМИЮ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЕЕ СУЖЕНИИ ПРОВОДЯТ ПО
::ОСТЕОТОМИЮ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЕЕ СУЖЕНИИ ПРОВОДЯТ ПО::[html]ОСТЕОТОМИЮ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЕЕ СУЖЕНИИ ПРОВОДЯТ ПО{
=ФОР I и срединному шву
~ФОР II
~ФОР III
~ФОР I
}

// question: 4151979 name: ОСТЕОТОМИЮ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДЯТ ПО
::ОСТЕОТОМИЮ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДЯТ ПО::[html]ОСТЕОТОМИЮ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДЯТ ПО{
	=ФОР I
	~ФОР II и срединному шву
	~ФОР III
	~ФОР IV
}

// question: 4151987 name: ОСТЕОТОМИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВНУТРИРОТОВЫМ СПОСОБОМ ПРОВОДИТСЯ ПО
::ОСТЕОТОМИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВНУТРИРОТОВЫМ СПОСОБОМ ПРОВОДИТСЯ ПО::[html]ОСТЕОТОМИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВНУТРИРОТОВЫМ СПОСОБОМ ПРОВОДИТСЯ ПО{
	=Обвегезору
	~Тигершедту
	~Евдокимову
	~Рудько
}

// question: 4175077 name: Остеохондрома в челюстно-лицевой области чаще локализуется на:
::Остеохондрома в челюстно-лицевой области чаще локализуется на\:::[html]Остеохондрома в челюстно-лицевой области чаще локализуется на\:{
	=уставной головке нижней челюсти
	~ветви нижней челюсти
	~лобном отростке верхней челюсти
	~скуловом отростке лобной кости
	~сосцевидном отростке височной кости
}

// question: 4152094 name: Острая стадия остеомиелита длится:
::Острая стадия остеомиелита длится\:::[html]Острая стадия остеомиелита длится\:{
	~ одну неделю, при обширных костных поражениях до 2 4 недель
	= 2 3 недели, при обширных костных поражениях до 4 недель
	~ 3 4 недели, при обширных костных поражениях до 6 недель
	~– 3 5 дней
	~– до 6 лет, иногда много лет подряд.
}

// question: 4151803 name: ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С

::ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	=острым отитом
	~острым верхнечелюстной синусит
	~околоушным гипергидрозом
	~переломом верхней челюсти
}

// question: 4151804 name: ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	=флегмоной околоушно-жевательной области
	~острым верхнечелюстным синуситом
	~околоушным гипергидрозом
	~переломом верхней челюсти
}

// question: 4151805 name: ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС СЛЕДУЕТ ДИФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
::ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС СЛЕДУЕТ ДИФЕРЕНЦИРОВАТЬ С::[html]ОСТРЫЙ АРТРИТ ВНЧС СЛЕДУЕТ ДИФЕРЕНЦИРОВАТЬ С{
	=контрактурой жевательных мышц
	~остеомиелитом
	~пульпитом
	~переломом тела челюсти
}

// question: 4174949 name: Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать:
::Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать\:::[html]Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать\:{
	=с острым отитом
	~с острым верхнечелюстным синуситом
	~с околоушным гипергидрозом
	~с переломом верхней челюсти
	~с флегмоной поднижнечелюстной области
}

// question: 4174974 name: Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать:
::Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать\:::[html]Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать\:{
	=с острым отитом
	~с острым верхнечелюстным синуситом
	~с околоушным гипергидрозом

~с переломом верхней челюсти
}

// question: 4174975 name: Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать:
::Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать\:::[html]Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать\:{
=с переломом мыщелкового отростка нижней челюсти
~с острым верхнечелюстным синуситом
~с околоушным гипергидрозом
~с переломом верхней челюсти
}

// question: 4151689 name: ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС И СМЕЩЕНИЕ ПОДБОРОДКА КПЕРЕДИ НАБЛЮДАЮТСЯ У БОЛЬНОГО ПРИ
::ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС И СМЕЩЕНИЕ ПОДБОРОДКА КПЕРЕДИ НАБЛЮДАЮТСЯ У БОЛЬНОГО ПРИ::[html]ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС И СМЕЩЕНИЕ ПОДБОРОДКА КПЕРЕДИ НАБЛЮДАЮТСЯ У БОЛЬНОГО ПРИ{
=двустороннем вывихе ВНЧС
~двустороннем переломе мыщелкового отростка
~одностороннем переломе мыщелкового отростка
~двустороннем переломе нижней челюсти в области премоляров
}

// question: 4152262 name: Отличительные особенности сифилитического лимфаденита:
::Отличительные особенности сифилитического лимфаденита\:::[html]Отличительные особенности сифилитического лимфаденита\:{
=в пунктате бледные трепонемы
~ лимфатические узлы спаяны между собой и с окружающими тканями, RW отрицательное
~ лимфоузлы всегда сопровождаются нагноением
~ в пунктате нет бледных трепонем при отрицательной реакции Вассермана.
}

// question: 4152263 name: Отличительные особенности сифилитического лимфаденита:
::Отличительные особенности сифилитического лимфаденита\:::[html]Отличительные особенности сифилитического лимфаденита\:{
=в пунктате бледные трепонемы
~ лимфатические узлы спаяны между собой и с окружающими тканями, RW отрицательное
~ лимфоузлы всегда сопровождаются нагноением
~ в пунктате нет бледных трепонем при отрицательной реакции Вассермана.

}

// question: 4152428 name: Отметьте самое правильное определение сочетанной травмы:
::Отметьте самое правильное определение сочетанной травмы\:::[html]Отметьте самое правильное определение сочетанной травмы\:{
	~Повреждение мягких тканей и костей области лица
	~Раны мягких тканей сопровождающиеся простыми переломами челюстей
	~Раны мягких тканей с множеством переломов и отсутствием тканей
	=Повреждение челюстно лицевой области, областей близлежащих а также отдаленных от этой зоны, возникшие в результате одного и того же травматизма
	~Травма вызванная несколькими агентами (механические, термические, химические и т.д.).
}

// question: 4152002 name: ОТСРОЧЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ...
::ОТСРОЧЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ...::[html]ОТСРОЧЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ТРАВМЫ В ТЕЧЕНИЕ{
	=24-48 часов
	~8-12 часов
	~3 суток
	~8 суток
}

// question: 4151931 name: ОТСРОЧЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ...
::ОТСРОЧЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ...::[html]ОТСРОЧЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
	=лечении осложнений воспалительного характера, окончательной иммобилизации переломов костей лица
	~остановке кровотечения, улучшения функции внешнего дыхания
	~первичной хирургической обработке раны
	~временной или окончательной иммобилизации переломов костей лица
}

// question: 4175091 name: Пальпаторно плеоморфная аденома околоушной железы:
::Пальпаторно плеоморфная аденома околоушной железы\:::[html]Пальпаторно плеоморфная аденома околоушной железы\:{
	~рыхлой консистенции
	~жидкостной консистенции

=плотно-эластичной консистенции
~мягко-эластичной консистенции
~твердая
}

// question: 4175090 name: Папиллома относится к:
::Папиллома относится к\:::[html]Папиллома относится к\:{
~опухоли жировой ткани
~опухоли мышечной ткани
~облигатному предраку
=факультативному предраку
~все ответы верны
}

// question: 4175119 name: Парез мимических мышц – это:
::Парез мимических мышц – это\:::[html]Парез мимических мышц – это\:{
=Уменьшение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц
~Увеличение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц
~Полное отсутствие произвольных движений мышц
~Полное отсутствие произвольных движений мышц с одновременными их гиперкинезами
~Гиперкинезы мышц
}

// question: 4152477 name: Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию ...
::Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию ...::[html]Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию лицевого массива с целью\:{
=Нормализации дыхания
~Нормализации прикуса
~Окончательного гемостаза
}

// question: 4152478 name: Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию ...
::Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию ...::[html]Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию лицевого массива с целью\:{
=Нормализации дыхания
~Нормализации прикуса
~Окончательного гемостаза
}

// question: 4152479 name: Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию ...
::Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию ...::[html]Первая помощь при переломах верхней челюсти предполагает временную фиксацию лицевого массива с целью\:{
	~Нормализации прикуса
	~Окончательного гемостаза
	=Снятия боли.
}

// question: 4152007 name: ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОЖОГА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
::ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОЖОГА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ::[html]ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОЖОГА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ{
	=антисептическую обработку кожи вокруг ожога, удаление крупных пузырей и очищение загрязнения, мазевая повязка
	~антисептическую обработку кожи вокруг ожога
	~иссечение обоженой кожи
	~наложение асептической повязки
}

// question: 4152004 name: ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ
::ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ::[html]ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ{
	=ранней и окончательной
	~частичной и ранней
	~своевременной и частичной
	~частичной и поздней
}

// question: 4152560 name: Первичная диагностика злокачественных новообразований в челюстно лицевой ...
::Первичная диагностика злокачественных новообразований в челюстно лицевой ...::[html]Первичная диагностика злокачественных новообразований в челюстно лицевой области может проводится\:{
	~Стоматалогом терапевтом
	~Стоматологом хирургом
	~Врачом оториноларингологом
	~Дерматологом
	=Всеми указаными специалистами

}

// question: 4152563 name: Первичным элементом начальной стадии рака языка преимущественно является:
::Первичным элементом начальной стадии рака языка преимущественно является\:::[html]Первичным элементом начальной стадии рака языка преимущественно является\:{
	~Пузырек
	~Гиперкератоз
	=Язва
	~Трещина
	~Ранула
}

// question: 4152388 name: Первой помощью при дислокационной асфиксии в случае западения языка является:
::Первой помощью при дислокационной асфиксии в случае западения языка является\:::[html]Первой помощью при дислокационной асфиксии в случае западения языка является\:{
	~Интубация больного
	=Тракция языка нитью, проведенной через переднюю треть языка
	~Иммобилизация нижней челюсти пращей
	~Проведение трахеотомии
	~Все вышеперечисленное.
}

// question: 4152084 name: Первый клинический признак отторжения секвестров при одонтогенном остеомиелите?:
::Первый клинический признак отторжения секвестров при одонтогенном остеомиелите?\:::[html]Первый клинический признак отторжения секвестров при одонтогенном остеомиелите?\:{
	~данные рентгенографии
	~данные анализа крови
	=выпячивание грануляций из свищевого хода
	~ подвижность зубов
	~ появление свищей на альвеолярном отростке челюсти.
}

// question: 4151947 name: ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
::ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ::[html]ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ{
	=планирование
	~разрез

~обезболивание
~определение показаний
}

// question: 4157612 name: Первый этап восстановительного хирургического лечения:
::Первый этап восстановительного хирургического лечения\:::[html]Первый этап восстановительного хирургического лечения\:{
~Обезболивание
=Определение показаний
~Планирование вмешательства
~Разрез
}

// question: 4151946 name: ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
::ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ::[html]ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ{
=обезболивание
~разрез
~определение показаний
~планирование вмешательства
}

// question: 4152583 name: Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов ...
::Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов ...::[html]Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов полости рта необходимо\:{
=Удалить металлические пломбы
~Перелить одногруппную кровь
~Изготовить назубные пластмассовые шины
}

// question: 4152584 name: Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов ...
::Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов ...::[html]Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов полости рта необходимо\:{
=Санировать полость рта
~Перелить одногруппную кровь
~Изготовить назубные пластмассовые шины
}

// question: 4152585 name: Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов ...
::Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов ...::[html]Перед лучевым лечением больных со злокачественными опухолями лица и органов полости рта необходимо{
	=Удалить металлические протезы
	~Перелить одногруппную кровь
	~Изготовить назубные пластмассовые шины
}

// question: 4152493 name: Передние переломы скулового комплекса затрагивают следующие анатомические ...
::Передние переломы скулового комплекса затрагивают следующие анатомические ...::[html]Передние переломы скулового комплекса затрагивают следующие анатомические элементы\:{
	~Верхнюю челюсть
	~Нижне внешнюю стенку орбиты
	~Стенку синуса
	=Скуловую кость
	~Лобную кость.
}

// question: 4151732 name: ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ЛЕ ФОР I (НИЖНИЙ ТИП ПЕРЕЛОМА. ПРОХОДИТ
::ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ЛЕ ФОР I (НИЖНИЙ ТИП ПЕРЕЛОМА. ПРОХОДИТ::[html]ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ЛЕ ФОР I (НИЖНИЙ ТИП ПЕРЕЛОМА. ПРОХОДИТ{
	=от основания грушевидной вырезки, через основание альвеолярной части и бугра верхней челюсти к вершине крыловидных отростков
	~в месте сочленения носовых костей с носовой частью лобной кости, через дно орбиты и нижнеглазничный край, в области скуло-верхнечелюстного шва
	~в месте сочленения носовых костей с носовой частью лобной кости, через дно орбиты и наружный край орбиты в области скуло-лобного шва
	~от резцового возвышения кзади, через твердое и мягкое небо
}

// question: 4151669 name: Перелом основания черепа характеризуется назальной ликвореей, то есть ...
::Перелом основания черепа характеризуется назальной ликвореей, то есть ...::[html]Перелом основания черепа характеризуется назальной ликвореей, то есть истечением ликвора через дефект ТМО в области\:{
	~наружнего слухового прохода
	~дна орбиты
	=клиновидной кости

~задней черепной ямки
}

// question: 4151676 name: Перелом, при котором линия перелом, сообщающаяся с окружающей средой, ...
::Перелом, при котором линия перелом, сообщающаяся с окружающей средой, ...::[html]Перелом, при котором линия перелом, сообщающаяся с окружающей средой, называется\:{
=открытый
~закрытый
~сочетанный
~комбинированный
}

// question: 4152467 name: Переломы Le Fort II имеют сложную линию перелома, идущую:
::Переломы Le Fort II имеют сложную линию перелома, идущую\:::[html]Переломы Le Fort II имеют сложную линию перелома, идущую\:{
~Над альвеолярными отростками, через носовые ходы, клыковую ямку, бугристость верхней челюсти, сошник и носовую перегородку.
~На лобной шов, слезную кость, нижнюю стенку орбиты, крыловидный отросток, сошник, и решетчатая кость
~На медиальную линию, разделяет зубной ряд, низ носа, небная кость и верхнечелюстная кость
=Через лобно носовой шов, слезную кость, подглазничный канал
~Ни один из них.
}

// question: 4151677 name: Переломы классифицируются по количеству костных фрагментов:
::Переломы классифицируются по количеству костных фрагментов\:::[html]Переломы классифицируются по количеству костных фрагментов\:{
=линейные
~фрагментарные
~косые
~осколочные
}

// question: 4151678 name: Переломы классифицируются по количеству костных фрагментов:
::Переломы классифицируются по количеству костных фрагментов\:::[html]Переломы классифицируются по количеству костных фрагментов\:{
=оскольчатые

~фрагментарные
~косые
~осколочные
}

// question: 4152363 name: Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют:
::Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют\:::[html]Переломы
нижней челюсти по количеству классифицируют\:{
~Одиночные
~Двойные
=Все ответы верны
}

// question: 4152364 name: Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют:
::Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют\:::[html]Переломы
нижней челюсти по количеству классифицируют\:{
~Тройные
~Множественные
=Все ответы верны
}

// question: 4152365 name: Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют:
::Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют\:::[html]Переломы
нижней челюсти по количеству классифицируют\:{
~Двойные
~Тройные
=Все ответы верны
}

// question: 4152366 name: Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют:
::Переломы нижней челюсти по количеству классифицируют\:::[html]Переломы
нижней челюсти по количеству классифицируют\:{
~Одиночные
~Множественные
=Все ответы верны
}

// question: 4151932 name: ПЕРЕСАДКУ КОЖИ НА ОЖОГОВУЮ РАНУ ПРОИЗВОДЯТ
::ПЕРЕСАДКУ КОЖИ НА ОЖОГОВУЮ РАНУ ПРОИЗВОДЯТ::[html]ПЕРЕСАДКУ КОЖИ НА
ОЖОГОВУЮ РАНУ ПРОИЗВОДЯТ{
=после отторжения струпа и развития грануляций
~как можно раньше

~на 5 сутки после ожога
~с момента эпителизации
}

// question: 4174939 name: Периодонтит - это …
::Периодонтит - это …::[html]Периодонтит - это …{
=Воспаление в тканях периодонта
~Воспаление лимфатического узла
~Воспаление волосяного фолликула
~Процесс деминерализации зуба
}

// question: 4152043 name: Периодонтит в подавляющем большинстве случаев имеет происхождение:
::Периодонтит в подавляющем большинстве случаев имеет происхождение\:::[html]Периодонтит в подавляющем большинстве случаев имеет происхождение\:{
=медикаментозное
~ нервно трофическое
~ аллергическое
}

// question: 4152044 name: Периодонтит в подавляющем большинстве случаев имеет происхождение:
::Периодонтит в подавляющем большинстве случаев имеет происхождение\:::[html]Периодонтит в подавляющем большинстве случаев имеет происхождение\:{
=инфекционное
~нервно трофическое
~ аллергическое
}

// question: 4152041 name: Периодонтит это:
::Периодонтит это\:::[html]Периодонтит это\:{
~ воспалительный процесс, поражающий ткани только периодонта
=воспалительный процесс, поражающий ткани периодонта и распространяющийся на прилежащие к нему костные структуры
~ заболевание, характеризующееся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти.
}

// question: 4152042 name: Периодонтит это:

::Периодонтит это\:::[html]Периодонтит это\:{
	~ воспалительный процесс, поражающий ткани только периодонта
	=одонтогенное заболевание, которое встречается в острой и хронической форме
	~гнойное воспаление, которые затрагивают периодонт и надкостницу.
}

// question: 4152053 name: Периостит это:
::Периостит это\:::[html]Периостит это\:{
	~ инфекционно аллергический, гнойно некротический процесс, который развивается в кости
	=заболевание, характеризующееся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти
	~ воспалительный процесс, поражающий ткани периодонта и распространяющийся на прилежащие к нему костные структуры.
	~ инфекционно аллергический, гнойно некротический процесс, который поражает ткани периодонта.
	~ инфекционно аллергический, гнойно некротический процесс, который поражает ткани периодонта, и распространяются на мягкие ткани.
}

// question: 4152302 name: Перфорация гайморовой пазухи может быть в момент удаления:
::Перфорация гайморовой пазухи может быть в момент удаления\:::[html]Перфорация гайморовой пазухи может быть в момент удаления\:{
	~Всех зубов верхней челюстей
	~Верхних резцов и клыков
	=Верхних моляров и премоляров
	~Нижних моляров и премоляров
	~Не зависит от расположения удалённого зуба.
}

// question: 4152300 name: Перфорация гайморовой пазухи появляются чаще всего при удалении зубов:
::Перфорация гайморовой пазухи появляются чаще всего при удалении зубов\:::[html]Перфорация гайморовой пазухи появляются чаще всего при удалении зубов\:{
	~Третьего верхнего моляра
	=Первого верхнего моляра
	~Второго верхнего премоляра
	~Верхнего клыка.
}

// question: 4152301 name: Перфорация гайморовой пазухи появляются чаще всего при удалении зубов:
::Перфорация гайморовой пазухи появляются чаще всего при удалении зубов\:::[html]Перфорация гайморовой пазухи появляются чаще всего при удалении зубов\:{
	~Третьего верхнего моляра
	=Второго верхнего моляра
	~Второго верхнего премоляра
	~Верхнего клыка.
}

// question: 4175028 name: Пиогенная гранулема - это:
::Пиогенная гранулема - это\:::[html]Пиогенная гранулема - это\:{
	=опухолеподобное образование кожи
	~доброкачественная опухоль кожи с экспансивным ростом
	~доброкачественное новообразование с местным деструирующим ростом
	~злокачественная опухоль кожи
}

// question: 4151907 name: ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=трубочный стол
	~15 стол
	~9 стол
	~1 стол
}

// question: 4151910 name: ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАЗНАЧАЮТ
::ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАЗНАЧАЮТ::[html]ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАЗНАЧАЮТ{
	=стол - трубочный
	~стол - 15
	~стол - 9
	~стол - 2-ой челюстной
}

// question: 4152578 name: План лечения больного со злокачественной опухолью в челюстно лицевой области ...

::План лечения больного со злокачественной опухолью в челюстно лицевой области ...::[html]План лечения больного со злокачественной опухолью в челюстно лицевой области составляется\:{
	~Онкологом
	~Радиологом
	~Химиотерапевтом
	=Тремя вышеназванными специалистами
	~Четырьмя специалистами
}

// question: 4151939 name: ПЛАСТИКУ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ГУБ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛОСКУТАМИ С НОСОГУБНЫХ ...
::ПЛАСТИКУ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ГУБ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛОСКУТАМИ С НОСОГУБНЫХ ...::[html]ПЛАСТИКУ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ГУБ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛОСКУТАМИ С НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК ИСПОЛЬЗУЮТ ПО МЕТОДУ{
	=Иозефа
	~Суслова
	~Рауэра
	~Лимберга
}

// question: 4152544 name: Плеоморфная аденома (смешанная опухоль):
::Плеоморфная аденома (смешанная опухоль)\:::[html]Плеоморфная аденома (смешанная опухоль)\:{
	~редкая опухоль
	~чаще встречается в малых слюнных железах
	~проявляется в диффузной форме
	=проявляется в узловой форме
	~чаще встречается в подъязычной железе
}

// question: 4152590 name: Плоскоклеточный рак кожи лица дифференцируют с:
::Плоскоклеточный рак кожи лица дифференцируют с\:::[html]Плоскоклеточный рак кожи лица дифференцируют с\:{
	~Папилломой
	=Болезнью Боуэна
	~Атеромой
	~Дермойдной кистой
}

// question: 4152591 name: Плоскоклеточный рак кожи лица дифференцируют с:
::Плоскоклеточный рак кожи лица дифференцируют с\:::[html]Плоскоклеточный рак кожи лица дифференцируют с\:{

~Папилломой
=Базалиомой
~Атеромой
~Дермойдной кистой
}

// question: 4152484 name: По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...
::По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...::[html]По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва (анестезии, гипостезии, парестезии)\:{
~Вдавливание скуловой кости
~Повреждение нерва во время удара
=Все ответы верны
}

// question: 4152485 name: По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...
::По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...::[html]По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва (анестезии, гипостезии, парестезии)\:{
~Переломы нижней стенки орбиты со смещением
~Повреждение нерва во время удара
=Все ответы верны
}

// question: 4152486 name: По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...
::По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...::[html]По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва (анестезии, гипостезии, парестезии)\:{
~Переломы нижней стенки орбиты со смещением
~Смещение скуловой кости
=Все ответы верны
}

// question: 4152487 name: По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...
::По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...::[html]По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва (анестезии, гипостезии, парестезии)\:{
~Смещение скуловой кости
~Повреждение нерва во время удара

=Все ответы верны
}

// question: 4152488 name: По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...
::По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва ...::[html]По каким причинам появляются изменения проводимости инфраорбитального нерва (анестезии, гипостезии, парестезии)\:{
~Переломы нижней стенки орбиты со смещением
~Вдавливание скуловой кости
=Все ответы верны
}

// question: 4174997 name: По механизму возникновению вывихи нижней челюсти различают:
::По механизму возникновению вывихи нижней челюсти различают\:::[html]По механизму возникновению вывихи нижней челюсти различают\:{
~односторонние и двусторонние
~острые и застарелые
~полный и неполный
=травматические, привычные, патологические
}

// question: 4152067 name: По характеру клинического течения различают остеомиелит:
::По характеру клинического течения различают остеомиелит\:::[html]По характеру клинического течения различают остеомиелит\:{
= острый, подострый, хронический и обострившийся
~ ограниченный, очаговый и разлитой
~ легкой, средней тяжести и тяжелая форма
~ литическая и секвестрирующая форма
~ одонтогенной и травматической этиологии.
}

// question: 4175064 name: По частоте поражения встречается плеоморфная аденома:
::По частоте поражения встречается плеоморфная аденома\:::[html]По частоте поражения встречается плеоморфная аденома\:{
~поднижнечелюстная слюнная железа
~подъязычная
~железы щеки
=околоушная слюнная железа
~трубной железы
}

// question: 4175111 name: Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание ...
::Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание ...::[html]Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание злокачественных новообразований\:{
	=Ранних симптомов
	~Препаратов для лечения
	~Профессиональных вредностей
	~Принципов здорового образа жизни
	~Допустимых доз лучевой нагрузки
}

// question: 4175112 name: Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание ...
::Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание ...::[html]Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание злокачественных новообразований\:{
	=Специальных методов обследования, ранней диагностики
	~Препаратов для лечения
	~Профессиональных вредностей
	~Принципов здорового образа жизни
	~Допустимых доз лучевой нагрузки
}

// question: 4175113 name: Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание ...
::Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание ...::[html]Под «онконастороженностью» в медицинском сообществе понимают знание злокачественных новообразований\:{
	=Системы организации помощи онкологическим больным
	~Препаратов для лечения
	~Профессиональных вредностей
	~Принципов здорового образа жизни
	~Допустимых доз лучевой нагрузки
}

// question: 4151781 name: ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ АНГУЛЯРНОМ ...
::ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ АНГУЛЯРНОМ ...::[html]ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ АНГУЛЯРНОМ ПЕРЕЛОМЕ ПРОИСХОДИТ{
	=медиально и вперед

~кверху и вперед
~книзу и кзади
~латерально и кверху
}

// question: 4151782 name: ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ...
::ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ...::[html]ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ АНГУЛЯРНОМ ПЕРЕЛОМЕ ПРОИСХОДИТ{
=книзу и кзади
~кверху и вперед
~медиально и вперед
~латерально и кверху
}

// question: 4151780 name: ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ...
::ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ...::[html]ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ СУБОРБИТАЛЬНОМ ПЕРЕЛОМЕ ПРОИСХОДИТ{
=книзу и кзади
~кверху и вперед
~медиально и вперед
~латерально и кверху
}

// question: 4151728 name: ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ...
::ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ...::[html]ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ СУБОРБИТАЛЬНОМ ПЕРЕЛОМЕ ПРОИСХОДИТ В НАПРАВЛЕНИИ{
=книзу и кзади
~кверху и вперед
~медиально и вперед
~латерально и кверху
}

// question: 4152390 name: Подвижная кость лицевого скелета это:
::Подвижная кость лицевого скелета это\:::[html]Подвижная кость лицевого скелета это\:{
~Верхняя челюсть
=Нижняя челюсть

~Скуловая кость
~Кости носа
~Небная кость.
}

// question: 4174999 name: Подвывих - это:
::Подвывих - это\:::[html]Подвывих - это\:{
~полный вывих
=неполный вывих
~переломовывих
~застарелый вывих
}

// question: 4175131 name: Подготовка к операции цистотомии включает пломбирование:
::Подготовка к операции цистотомии включает пломбирование\:::[html]Подготовка к операции цистотомии включает пломбирование\:{
~Всех зубов, корни которых обращены в полость кисты
=«Причинного» зуба
~Всех зубов челюсти
~Зубов - антагонистов
~Операция не предполагает данной процедуры
}

// question: 4175130 name: Подготовка к операции цистоэктомии включает пломбирование:
::Подготовка к операции цистоэктомии включает пломбирование\:::[html]Подготовка к операции цистоэктомии включает пломбирование\:{
=Всех зубов, корни которых обращены в полость кисты
~«Причинного» зуба
~Всех зубов челюсти
~Зубов - антагонистов
~Операция не предполагает данной процедуры
}

// question: 4152141 name: Подъязычный абсцесс дифференцируется с:
::Подъязычный абсцесс дифференцируется с\:::[html]Подъязычный абсцесс дифференцируется с\:{
=Абсцессом подчелюстной области
~Поддесневым абсцессом
~Ранулой и дермоидной кистой дна полости рта
~Остеомиелитом челюсти
~Переломом нижней челюсти.

}

// question: 4152142 name: Подъязычный абсцесс дифференцируется с:
::Подъязычный абсцесс дифференцируется с\:::[html]Подъязычный абсцесс дифференцируется с\:{
	=Поддесневым абсцессом
	~Остеомиелитом челюсти
	~Переломом нижней челюсти.
}

// question: 4152143 name: Подъязычный абсцесс дифференцируется с:
::Подъязычный абсцесс дифференцируется с\:::[html]Подъязычный абсцесс дифференцируется с\:{
	=Ранулой и дермоидной кистой дна полости рта
	~Остеомиелитом челюсти
	~Переломом нижней челюсти.
}

// question: 4151791 name: ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ
::ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ::[html]ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ{
	=травматический остеомиелит
	~фурункулез
	~рожистое воспаление
	~периостит
}

// question: 4152014 name: ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, КОСТЕЙ НОСА И СКУЛОВОЙ ДУГИ
::ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, КОСТЕЙ НОСА И СКУЛОВОЙ ДУГИ::[html]ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, КОСТЕЙ НОСА И СКУЛОВОЙ ДУГИ{
	=вторичные деформации лицевого скелета
	~гипосаливация
	~телеангиоэктазии
	~парез ветвей лицевого нерва
}

// question: 4151792 name: ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, КОСТЕЙ НОСА И СКУЛОВОЙ ДУГИ

::ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, КОСТЕЙ НОСА И СКУЛОВОЙ ДУГИ::[html]ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, КОСТЕЙ НОСА И СКУЛОВОЙ ДУГИ{
=вторичные деформации лицевого скелета
~гипосаливация
~телеангиоэктазии
~парез ветвей лицевого нерва
}

// question: 4151928 name: ПОЗДНИЙ ВТОРИЧНЫЙ ШОВ ПРИ ТРАВМАХ ЛИЦА НАКЛАДЫВАЮТ
::ПОЗДНИЙ ВТОРИЧНЫЙ ШОВ ПРИ ТРАВМАХ ЛИЦА НАКЛАДЫВАЮТ::[html]ПОЗДНИЙ ВТОРИЧНЫЙ ШОВ ПРИ ТРАВМАХ ЛИЦА НАКЛАДЫВАЮТ{
=с началом формирования рубца
~после эпителизации раны
~на 4-5 сутки
~после отторжения некротизированных тканей и появления грануляций
}

// question: 4151795 name: ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=травматический остеомиелит
~асфиксия
~ОРВЗ
~потеря сознания
}

// question: 4151796 name: ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
=диплопия
~ОРВЗ
~Асфиксия
~потеря сознания
}

// question: 4151797 name: ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

::ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=слюнные свищи
	~асфиксия
	~ОРВЗ
	~потеря сознания
}

// question: 4151798 name: ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=анкилоз височно-нижнечелюстного сустава
	~асфиксия
	~ОРВЗ
	~потеря сознания
}

// question: 4151799 name: ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=рубцовая контрактура
	~асфиксия
	~ОРВЗ
	~потеря сознания
}

// question: 4151800 name: ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=ложный сустав
	~асфиксия
	~ОРВЗ
	~потеря сознания
}

// question: 4151801 name: ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=травматический верхнечелюстной синусит
	~асфиксия
	~ОРВЗ
	~потеря сознания
}

// question: 4151927 name: ПОЗДНЯЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ
::ПОЗДНЯЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ::[html]ПОЗДНЯЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ{
	=48 часов
	~24 часа
	~8-12 часов
	~8 суток
}

// question: 4152448 name: Поздние осложнения переломов верхней челюсти:
::Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:::[html]Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:{
	~Асимметрия лица
	~Изменения функции жевания и произношения
	~Неправильное сращение
	=Все ответы верны
}

// question: 4152449 name: Поздние осложнения переломов верхней челюсти:
::Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:::[html]Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:{
	~Неправильное сращение
	~Гнойные выделения из синуса или щеки
	~Сообщение синуса с полостью рта.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152450 name: Поздние осложнения переломов верхней челюсти:
::Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:::[html]Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:{

~Асимметрия лица
~Гнойные выделения из синуса или щеки
~Сообщение синуса с полостью рта.
=Все ответы верны
}

// question: 4152451 name: Поздние осложнения переломов верхней челюсти:
::Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:::[html]Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:{
~Асимметрия лица
~Изменения функции жевания и произношения
~Сообщение синуса с полостью рта.
=Все ответы верны
}

// question: 4152452 name: Поздние осложнения переломов верхней челюсти:
::Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:::[html]Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:{
~Изменения функции жевания и произношения
~Неправильное сращение
~Гнойные выделения из синуса или щеки
=Все ответы верны
}

// question: 4152453 name: Поздние осложнения переломов верхней челюсти:
::Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:::[html]Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:{
~Асимметрия лица
~Неправильное сращение
~Гнойные выделения из синуса или щеки
=Все ответы верны
}

// question: 4152454 name: Поздние осложнения переломов верхней челюсти:
::Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:::[html]Поздние осложнения переломов верхней челюсти\:{
=Асимметрия лица
~Изменения функции жевания и произношения
~Неправильное сращение
~Гнойные выделения из синуса или щеки
~Сообщение синуса с полостью рта.
}

// question: 4152026 name: ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРКОЗА ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРКОЗА ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРКОЗА ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{
	=рефлекторная контрактура жевательных мышц
	~привычный вывих
	~выраженная гиперсаливация
	~деформация ветви челюсти
}

// question: 4157643 name: Показание для дермабразии пересаженного кожного лоскута:
::Показание для дермабразии пересаженного кожного лоскута\:::[html]Показание для дермабразии пересаженного кожного лоскута\:{
	=Гиперпигментация
	~Грубые рубцовые изменения
	~Рубцовые изменения слизистой оболочки
}

// question: 4157658 name: Показанием для проведения вторичной костной пластики является:
::Показанием для проведения вторичной костной пластики является\:::[html]Показанием для проведения вторичной костной пластики является\:{
	~Секвестрэктомия
	~Врожденная деформация челюстей
	~Удаление доброкачественных новообразований челюстей
	=Удаление злочественных новообразований челюстей
}

// question: 4157657 name: Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти ...
::Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти ...::[html]Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти после\:{
	~Периостита
	~Секвестрэктомии
	~Постлучевой некроэктомии
	=Удаления доброкачественных новообразований
}

// question: 4175128 name: Показанием для удаления радикулярной кисты челюсти методом цистотомии является:
::Показанием для удаления радикулярной кисты челюсти методом цистотомии является\:::[html]Показанием для удаления радикулярной кисты челюсти методом цистотомии является\:{
	=Прорастание кисты в полость носа
	~Она имеет небольшие размеры (до 3-х зубов в полости)
	~Прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху
	~Одиночная киста с одним корнем в полости
	~Деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти
}

// question: 4175127 name: Показанием для удаления радикулярной кисты челюсти методом цистэктомии является:
::Показанием для удаления радикулярной кисты челюсти методом цистэктомии является\:::[html]Показанием для удаления радикулярной кисты челюсти методом цистэктомии является\:{
	~Прорастание кисты в полость носа
	=Одиночная киста с одним корнем в полости
	~Прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху
	~Большие размеры
	~Деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти
}

// question: 4174965 name: Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти:
::Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти\:::[html]Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти\:{
	~при привычном вывихе
	~при выраженной гиперсаливации
	~при подозрении на тромбофлебит угловой вены
	=при рефлекторной контрактуре жевательных мышц
}

// question: 4174986 name: Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти:
::Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти\:::[html]Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти\:{
	~при привычном вывихе
	~при выраженной гиперсаливации
	~при подозрении на тромбофлебит угловой вены
	=при рефлекторной контрактуре жевательных мышц

}

// question: 4151963 name: ПОЛНОСЛОЙНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ БЕРУТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С ПОВЕРХНОСТИ
::ПОЛНОСЛОЙНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ БЕРУТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С ПОВЕРХНОСТИ::[html]ПОЛНОСЛОЙНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ БЕРУТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С ПОВЕРХНОСТИ{
	=боковой шеи
	~тыла стопы
	~наружной бедра
	~передней живота
}

// question: 4152577 name: Понятие «предрак» применяется для характеристики предопухолевых изменений:
::Понятие «предрак» применяется для характеристики предопухолевых изменений\:::[html]Понятие «предрак» применяется для характеристики предопухолевых изменений\:{
	~Соединительной ткани
	~Нервной ткани
	=Эпителиальной ткани
	~Мышечной ткани
	~Всех перечисленных тканей
}

// question: 4151912 name: ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ БИМАКСИЛЛЯРНЫХ ШИН С ЗАЦЕПНЫМИ ПЕТЛЯМИ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА ...
::ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ БИМАКСИЛЛЯРНЫХ ШИН С ЗАЦЕПНЫМИ ПЕТЛЯМИ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА ...::[html]ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ БИМАКСИЛЛЯРНЫХ ШИН С ЗАЦЕПНЫМИ ПЕТЛЯМИ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА (ТЯГУ) МЕНЯЮТ{
	=1 раз в неделю
	~1 раз в месяц
	~ежедневно
	~3 раза в месяц
}

// question: 4151915 name: ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НАЗНАЧАЮТ ОСТЕОТРОПНЫЕ АНТИБИОТИКИ
::ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НАЗНАЧАЮТ ОСТЕОТРОПНЫЕ АНТИБИОТИКИ::[html]ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ НАЗНАЧАЮТ ОСТЕОТРОПНЫЕ АНТИБИОТИКИ{
	=линкомицин
	~олететрин
	~пенициллин

~тетрациклин
}

// question: 4151999 name: ПОСЛЕ РЕПОЗИЦИИ, ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ СО СМЕЩЕНИЕМ В ...
::ПОСЛЕ РЕПОЗИЦИИ, ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ СО СМЕЩЕНИЕМ В ...::[html]ПОСЛЕ РЕПОЗИЦИИ, ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕЛОМЕ СО СМЕЩЕНИЕМ В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНУЮ ПАЗУХУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ{
=тампоном пропитанным йодоформом
~коллодийной повязкой
~пластмассовым вкладышем
~наружными швами
}

// question: 4152000 name: ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЙОДОФОРМНЫМ ТАМПОНОМ КОНЕЦ ЕГО ВЫВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ...
::ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЙОДОФОРМНЫМ ТАМПОНОМ КОНЕЦ ЕГО ВЫВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ...::[html]ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЙОДОФОРМНЫМ ТАМПОНОМ КОНЕЦ ЕГО ВЫВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ{
=в области нижнего носового хода
~по переходной складке
~в области бугра верхней челюсти
~в скуловой области
}

// question: 4151666 name: Поставьте предварительный диагноз пациенту, у которого в результате травмы ...
::Поставьте предварительный диагноз пациенту, у которого в результате травмы ...::[html]Поставьте предварительный диагноз пациенту, у которого в результате травмы определяется отек правой скуловой области, нарушение тактильной чувствительности верхней губы и крыла носа справа, кровотечение из правого носового хода\:{
~Перелом верхней челюсти справа
~Перелом латерального края правой орбиты
=перелом правой скуловой кости
~перелом костей носа, преимущественно справа
}

// question: 4152416 name: Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие:
::Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие\:::[html]Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие\:{
=Оскольчатого перелома подбородочной области
~Спазматического сужения дыхательных путей

~Ни один ответ не верен.
}

// question: 4152417 name: Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие:
::Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие\:::[html]Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие\:{
~Спазматического сужения дыхательных путей
=Отека гортани при возникновении гематомы
~Ни один ответ не верен.
}

// question: 4152418 name: Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие:
::Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие\:::[html]Посттравматическая асфиксия может возникнуть вследствие\:{
~Спазматического сужения дыхательных путей
=Смещения небной занавески при переломах в.ч.
~Ни один ответ не верен.
}

// question: 4152370 name: Посттравматическая асфиксия может появиться после:
::Посттравматическая асфиксия может появиться после\:::[html]Посттравматическая асфиксия может появиться после\:{
=Многооскольчатого перелома подбородочной области
~Сужения дыхательных путей
~Ни один ответ не верен.
}

// question: 4152371 name: Посттравматическая асфиксия может появиться после:
::Посттравматическая асфиксия может появиться после\:::[html]Посттравматическая асфиксия может появиться после\:{
~Сужения дыхательных путей
=Отека гортани
~Ни один ответ не верен.
}

// question: 4152372 name: Посттравматическая асфиксия может появиться после:
::Посттравматическая асфиксия может появиться после\:::[html]Посттравматическая асфиксия может появиться после\:{
~Сужения дыхательных путей
=Смещения небной занавески при переломах верхней челюсти

~Ни один ответ не верен.
}

// question: 4151877 name: ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОБЕРЦОВОГО ТРАНСПЛАНТАТА ...
::ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОБЕРЦОВОГО ТРАНСПЛАНТАТА ...::[html]ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОБЕРЦОВОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРОВОДИТСЯ ПО{
=компьютерной томограмме
~ортопантомограмме
~панорамной рентгенограмме
~боковой рентгенограмме нижней челюсти
}

// question: 4157651 name: Предпочтительная зона для забора полнослойного кожного лоскута:
::Предпочтительная зона для забора полнослойного кожного лоскута\:::[html]Предпочтительная зона для забора полнослойного кожного лоскута\:{
=Внутренняя поверхность плеча
~Тыльная поверхность стопы
~Наружная поверхность бедра
~Передняя поверхность живота
}

// question: 4157650 name: Предпочтительная зона для забора расщепленного кожного лоскута:
::Предпочтительная зона для забора расщепленного кожного лоскута\:::[html]Предпочтительная зона для забора расщепленного кожного лоскута\:{
=Передняя поверхность живота
~Тыльная поверхность стопы
~Наружная поверхность бедра
~Внутренняя поверхность плеча
}

// question: 4157659 name: Предпочтительная зона для забора свободного костного аутотрансплантата для ...
::Предпочтительная зона для забора свободного костного аутотрансплантата для ...::[html]Предпочтительная зона для забора свободного костного аутотрансплантата для проведения костной пластики челюсти\:{
~Ключица
~Кости стопы
~Лучевая кость
=Гребень подвздошной кости

}

// question: 4157660 name: Предпочтительная зона для забора свободного костного аутотрансплантата для ...
::Предпочтительная зона для забора свободного костного аутотрансплантата для ...::[html]Предпочтительная зона для забора свободного костного аутотрансплантата для проведения костной пластики челюсти\:{
	~Ключица
	~Кости стопы
	~Локтевая кость
	~Рукоятка грудины
	=Ребро
}

// question: 4175080 name: Прежнее название остеокластомы:
::Прежнее название остеокластомы\:::[html]Прежнее название остеокластомы\:{
	~белая опухоль
	~черная опухоль
	~красная опухоль
	=бурая опухоль
	~коричневая опухоль
}

// question: 4151900 name: ПРИ НАРУШЕНИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ЛОСКУТЕ НА НОЖКЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ...
::ПРИ НАРУШЕНИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ЛОСКУТЕ НА НОЖКЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ...::[html]ПРИ НАРУШЕНИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ЛОСКУТЕ НА НОЖКЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРОВОДИТСЯ{
	=физиотерапия
	~криотерапия
	~гидромассаж
	~электрокоагуляция
}

// question: 4151901 name: ПРИ НАРУШЕНИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ЛОСКУТЕ НА НОЖКЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ...
::ПРИ НАРУШЕНИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ЛОСКУТЕ НА НОЖКЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ...::[html]ПРИ НАРУШЕНИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ЛОСКУТЕ НА НОЖКЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРОВОДИТСЯ{
	=ГБО-терапия
	~криотерапия
	~гидромассаж
	~электрокоагуляция

}

// question: 4152126 name: При воспалительном процессе околоушной области разрез для вскрытия очага ...
::При воспалительном процессе околоушной области разрез для вскрытия очага ...::[html]При воспалительном процессе околоушной области разрез для вскрытия очага производится\:{
	~Перед ушной раковиной
	=Окаймляющий угол нижней челюсти
	~Перед грудино ключично сосцевидной мышцой
	~По переднему краю ветви нижней челюсти
	~Любым разрезом из вышеперечисленных.
}

// question: 4174964 name: При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется в ...
::При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется в ...::[html]При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется в направлении\:{
	~вбок
	~вверх
	~книзу
	=вверх и кзади
}

// question: 4174985 name: При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется в ...
::При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется в ...::[html]При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется в направлении\:{
	~вбок
	~вверх
	=книзу
	~снизу верхи кзади
}

// question: 4174963 name: При вправления вывиха нижней челюсти давление на моляры осуществляется в ...
::При вправления вывиха нижней челюсти давление на моляры осуществляется в ...::[html]При вправления вывиха нижней челюсти давление на моляры осуществляется в направлении\:{
	~вверх
	~вбок

=книзу
~снизу вверх
~фронтальной группы зубов
}

// question: 4152011 name: ПРИ ВЫВИХЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОКАЗАНО
::ПРИ ВЫВИХЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОКАЗАНО::[html]ПРИ ВЫВИХЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОКАЗАНО{
=вправление головки в суставную впадину
~иммобилизация
~резекция суставного бугорка
~прошивание суставной капсулы
}

// question: 4151753 name: ПРИ ДВУСТОРОННЕМ МЕНТАЛЬНОМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ ...
::ПРИ ДВУСТОРОННЕМ МЕНТАЛЬНОМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ ...::[html]ПРИ ДВУСТОРОННЕМ МЕНТАЛЬНОМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ{
=дыхания
~жевания
~глотания
~речи
}

// question: 4151790 name: ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ КЛЫКОВ СМЕЩЕНИЕ ФРАГМЕНТА...
::ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ КЛЫКОВ СМЕЩЕНИЕ ФРАГМЕНТА...::[html]ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ КЛЫКОВ СМЕЩЕНИЕ ФРАГМЕНТА ПРОИСХОДИТ{
=книзу
~кверху
~медиально
~латерально
}

// question: 4151985 name: ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПРЕДЕЛАХ ...
::ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПРЕДЕЛАХ ...::[html]ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПРЕДЕЛАХ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТИ ПРОВОДИТСЯ{
=частичная резекция верхней челюсти
~резекция верхней челюсти

~половинная резекция верхней челюсти
~химиотерапия
}

// question: 4152569 name: При доброкачественных опухолях поднижнечелюстной слюной железы:
::При доброкачественных опухолях поднижнечелюстной слюной железы\:::[html]При доброкачественных опухолях поднижнечелюстной слюной железы\:{
~Удаляют опухоль
~Удаляют опухоль с частью железы
~Удаляют опухоль и перевязывают выводной проток
=Удаляют опухоль вместе с железой
~Проводят верхнее фасциально футлярное иссечение шейной клетчатки
}

// question: 4151945 name: ПРИ ИНДИЙСКОЙ РИНОПЛАСТИКЕ ЛОСКУТ НА НОЖКЕ БЕРУТ С
::ПРИ ИНДИЙСКОЙ РИНОПЛАСТИКЕ ЛОСКУТ НА НОЖКЕ БЕРУТ С::[html]ПРИ ИНДИЙСКОЙ РИНОПЛАСТИКЕ ЛОСКУТ НА НОЖКЕ БЕРУТ С{
=лобной области
~шеи
~щечной области
~губо-щечной складки
}

// question: 4151757 name: ПРИ ИНДИЙСКОМ СПОСОБЕ РИНОПЛАСТИКИ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ БЕРУТ
::ПРИ ИНДИЙСКОМ СПОСОБЕ РИНОПЛАСТИКИ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ БЕРУТ::[html]ПРИ ИНДИЙСКОМ СПОСОБЕ РИНОПЛАСТИКИ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ БЕРУТ{
=со лба
~со щеки
~с шеи
~с плеча
}

// question: 4157670 name: При каком дефекте носа показана пластика филатовским стеблем:
::При каком дефекте носа показана пластика филатовским стеблем\:::[html]При каком дефекте носа показана пластика филатовским стеблем\:{
=Тотальным
~Крыла
~Перегородки

}

// question: 4152325 name: При комплексном лечении острого сиалоденита в выводной проток вводят:
::При комплексном лечении острого сиалоденита в выводной проток вводят\:::[html]При комплексном лечении острого сиалоденита в выводной проток вводят\:{
	~Перекись водорода 3%.
	~Липоидол 1 2 мл.
	=Антибиотики и ферменты.
	~Искуственую слюну.
}

// question: 4152326 name: При комплексном лечении острого сиалоденита в выводной проток вводят:
::При комплексном лечении острого сиалоденита в выводной проток вводят\:::[html]При комплексном лечении острого сиалоденита в выводной проток вводят\:{
	~Перекись водорода 3%.
	~Липоидол 1 2 мл.
	=Тёплый раствор фурацилина.
	~Искуственую слюну.
}

// question: 4152562 name: При лечение больных с регионарными метастазами рака губы в излечимых случаях ...
::При лечение больных с регионарными метастазами рака губы в излечимых случаях ...::[html]При лечение больных с регионарными метастазами рака губы в излечимых случаях применяют\:{
	~Лучевой метод
	~Хирургический метод
	~Криохирургию
	=Комбинированный метод
	~Комплексные методы
}

// question: 4152571 name: При лечении амелобластомы используют:
::При лечении амелобластомы используют\:::[html]При лечении амелобластомы используют\:{
	~Выскабливание очага
	~Лучевую терапию
	=Резекцию челюсти
	~Коагуляция лазером

~Консервативное лечение
}

// question: 4152555 name: При лечении ангиом мягких тканей лица применяют:
::При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:::[html]При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:{
~Склерозирование
~Иссечение
~Электрокоагуляцию
=Все ответы верны
}

// question: 4152556 name: При лечении ангиом мягких тканей лица применяют:
::При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:::[html]При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:{
~Электрокоагуляцию
~Криодеструкцию
~Лучевую терапию
=Все ответы верны
}

// question: 4152557 name: При лечении ангиом мягких тканей лица применяют:
::При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:::[html]При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:{
~Склерозирование
~Криодеструкцию
~Лучевую терапию
=Все ответы верны
}

// question: 4152558 name: При лечении ангиом мягких тканей лица применяют:
::При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:::[html]При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:{
~Склерозирование
~Иссечение
~Лучевую терапию
=Все ответы верны
}

// question: 4152559 name: При лечении ангиом мягких тканей лица применяют:
::При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:::[html]При лечении ангиом мягких тканей лица применяют\:{

~Иссечение
~Электрокоагуляцию
~Криодеструкцию
=Все ответы верны
}

// question: 4151897 name: ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ПЕРИОД
::ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ПЕРИОД::[html]ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ПЕРИОД{
=мнимого благополучия
~любой период
~первичных реакций
~восстановительный период
}

// question: 4152305 name: При наличии свища между верхнечелюстной пазухой и полостью рта, осложнённым ...
::При наличии свища между верхнечелюстной пазухой и полостью рта, осложнённым ...::[html]При наличии свища между верхнечелюстной пазухой и полостью рта, осложнённым хроническим синуситом, лечение состоит в\:{
~Удалении причинного зуба под прикрытием антибиотиков.
~Пункции верхнечелюстной пазухи и закрытия сообщения пластическим методом.
=Синусотомия, кюретаж гайморовой пазухи.
}

// question: 4152306 name: При наличии свища между верхнечелюстной пазухой и полостью рта, осложнённым ...
::При наличии свища между верхнечелюстной пазухой и полостью рта, осложнённым ...::[html]При наличии свища между верхнечелюстной пазухой и полостью рта, осложнённым хроническим синуситом, лечение состоит в\:{
~Удалении причинного зуба под прикрытием антибиотиков.
~Пункции верхнечелюстной пазухи и закрытия сообщения пластическим методом.
=Закрытие сообщения путём пластики
}

// question: 4151727 name: ПРИ ОДИНОЧНОМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ НАБЛЮДАЕТСЯ СМЕЩЕНИЕ ...

::ПРИ ОДИНОЧНОМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ НАБЛЮДАЕТСЯ СМЕЩЕНИЕ ...::[html]ПРИ ОДИНОЧНОМ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ НАБЛЮДАЕТСЯ СМЕЩЕНИЕ ОТЛОМКОВ{
=большого - вниз и в сторону перелома, малого – кверху, кпереди и вовнутрь
~большого - вниз и кнаружи, малого – кверху, кзади и вовнутрь
~большого - вверх и в сторону, малого – вниз, кпереди и вовнутрь
~большого - вниз и в сторону перелома, малого – вниз, кзади и кнаружи
}

// question: 4152307 name: При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения:
::При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения\:::[html]При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения\:{
=Остеомиелит верхней челюсти.
~Септицемия.
~Абсцесс мозга.
}

// question: 4152308 name: При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения:
::При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения\:::[html]При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения\:{
=Абсцесс глазницы.
~Септицемия.
~Абсцесс мозга.
}

// question: 4152309 name: При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения:
::При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения\:::[html]При одонтогенном синусите, чаще встречаются следующие осложнения\:{
=Абсцессы и флегмоны щечной области.
~Септицемия.
~Абсцесс мозга.
}

// question: 4151832 name: ПРИ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ
::ПРИ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ::[html]ПРИ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ{
=поверхностный эпидермис
~кожа и подлежащие ткани
~все слои эпидермиса
~поверхностный эпидермис и капилляры
}

// question: 4151833 name: ПРИ ОЖОГЕ II СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ
::ПРИ ОЖОГЕ II СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ::[html]ПРИ ОЖОГЕ II СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ{
	=поверхностный эпидермис и капилляры
	~кожа и подлежащие ткани
	~поверхностный эпидермис
	~все слои эпидермиса
}

// question: 4151834 name: ПРИ ОЖОГЕ III(а) СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ
::ПРИ ОЖОГЕ III(а) СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ::[html]ПРИ ОЖОГЕ III(а) СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ{
	=все слои эпидермиса с сохранением дериватов кожи
	~кожа и подлежащие ткани
	~поверхностный эпидермис
	~поверхностный эпидермис и капилляры
}

// question: 4151835 name: ПРИ ОЖОГЕ III(В. СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ
::ПРИ ОЖОГЕ III(В. СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ::[html]ПРИ ОЖОГЕ III(В. СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ{
	=все слои эпидермиса
	~кожа и подлежащие ткани
	~поверхностный эпидермис
	~поверхностный эпидермис и капилляры
}

// question: 4151836 name: ПРИ ОЖОГЕ IV СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ
::ПРИ ОЖОГЕ IV СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ::[html]ПРИ ОЖОГЕ IV СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ{
	=кожа и подлежащие ткани
	~поверхностный эпидермис
	~поверхностный эпидермис и капилляры
	~все слои эпидермиса с сохранением дериватов кожи
}

// question: 4151882 name: ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ВНЧС РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
::ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ВНЧС РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ::[html]ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ВНЧС РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ{
	=деформация головки мыщелкового отростка
	~смещение суставной головки
	~расширение суставной щели

~отсутствие суставной щели
}

// question: 4151978 name: ПРИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗРЕЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОХОДИТ ОТ
::ПРИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗРЕЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОХОДИТ ОТ::[html]ПРИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАЗРЕЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОХОДИТ ОТ{
=от 1.6 до 2.6
~от 1.3 до 2.3
~от 1.4 до 2.4
~от бугра до 4.5
}

// question: 4151908 name: ПРИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РЕЗИНОВАЯ ТЯГА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ
::ПРИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РЕЗИНОВАЯ ТЯГА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ::[html]ПРИ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РЕЗИНОВАЯ ТЯГА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ{
=несколько часов после операции или на следующий день
~4 дня
~5 дней
~7 дней
}

// question: 4151775 name: ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ПОДВИЖНЫЕ ИНТАКТНЫЕ ЗУБЫ В ОБЛАСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ
::ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ПОДВИЖНЫЕ ИНТАКТНЫЕ ЗУБЫ В ОБЛАСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ::[html]ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ ПОДВИЖНЫЕ ИНТАКТНЫЕ ЗУБЫ В ОБЛАСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ{
=шинированию
~удалению
~депульпированию
~избирательному пришлифовыванию
}

// question: 4152056 name: При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?:
::При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?\:::[html]При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?\:{
~ не изменены
= болезненные
~безболезненные

}

// question: 4152057 name: При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?:
::При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?\:::[html]При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?\:{
	~ не изменены
	= увеличены
	~уменьшены
}

// question: 4152058 name: При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?:
::При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?\:::[html]При остром периостите как изменены регионарные лимфоузлы?\:{
	~ не изменены
	= плотноэластической консистенции
	~мягко-эластической консистенции
}

// question: 4152322 name: При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется:
::При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется\:::[html]При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется\:{
	=Боль в железе.
	~Увеличенная, уплотнённая, но безболезненная железа.
	~Из протока выделяется чистая слюна.
}

// question: 4152323 name: При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется:
::При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется\:::[html]При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется\:{
	=Из протока выделяется гной.
	~Увеличенная, уплотнённая, но безболезненная железа.
	~Из протока выделяется чистая слюна.
}

// question: 4152324 name: При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется:

::При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется\:::[html]При пальпации и массаже слюнной железы при гнойных сиалоаденитах определяется\:{
=Инфильтрат без выраженных контуров.
~Увеличенная, уплотнённая, но безболезненная железа.
~Из протока выделяется чистая слюна.
}

// question: 4152320 name: При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется:
::При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:::[html]При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:{
~Нет изображения протоков IV V порядка.
~В концевых отделах протоков располагаются полости разной величины.
=Все ответы верны
}

// question: 4152321 name: При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется:
::При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:::[html]При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:{
~Паренхима железы видна нечётко.
~Контуры главного протока становятся неровными.
=Все ответы верны
}

// question: 4152318 name: При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется:
::При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:::[html]При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:{
~Паренхима железы видна нечётко.
~Нет изображения протоков IV V порядка.
=Все ответы верны
}

// question: 4152319 name: При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется:
::При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:::[html]При паренхиматозном паротите на сиалограмме определяется\:{
~В концевых отделах протоков располагаются полости разной величины.
~Контуры главного протока становятся неровными.
=Все ответы верны
}

// question: 4151743 name: ПРИ ПЕРЕВЯЗКЕ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ ...
::ПРИ ПЕРЕВЯЗКЕ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ ...::[html]ПРИ ПЕРЕВЯЗКЕ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ АНАТОМИЮ СОСУДИСТОНЕРВНОГО ПУЧКА ШЕИ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ СТРОЕНИЕ{
=снаружи располагается внутренняя яремная вена, кнутри от нее общая сонная артерия, далее – блуждающий нерв
~снаружи располагается общая сонная артерия, кнутри от нее внутренняя яремная вена, далее – блуждающий нерв
~снаружи располагается блуждающий нерв, кнутри от него внутренняя яремная вена, далее – общая сонная артерия
~снаружи располагается блуждающий нерв, кнутри от него общая сонная артерия, далее – внутренняя яремная вена
}

// question: 4152468 name: При переломах скуловой кости линия проходит через:
::При переломах скуловой кости линия проходит через\:::[html]При переломах скуловой кости линия проходит через\:{
=Челюстно скуловой шов
~Внутреннюю стенку орбиты
~Переднюю стенку синуса.
}

// question: 4152469 name: При переломах скуловой кости линия проходит через:
::При переломах скуловой кости линия проходит через\:::[html]При переломах скуловой кости линия проходит через\:{
~Внутреннюю стенку орбиты
=Височно скуловой шов
~Переднюю стенку синуса.
}

// question: 4152470 name: При переломах скуловой кости линия проходит через:
::При переломах скуловой кости линия проходит через\:::[html]При переломах скуловой кости линия проходит через\:{
~Внутреннюю стенку орбиты
=Лобно скуловой шов
~Переднюю стенку синуса.
}

// question: 4151652 name: При переломе беззубых челюстей используется шина:

::При переломе беззубых челюстей используется шина\:::[html]При переломе беззубых челюстей используется шина\:{
=Порта
~Ванкевич
~Тигерштедта
~Васильева
}

// question: 4152419 name: При переломе н.ч.по средней линии :
::При переломе н.ч.по средней линии \:::[html]При переломе н.ч.по средней линии \:{
=Отсутствует вторичное смещение отломков, т.к. мышечная тяга находится в равновесии
~У больного наблюдается гипоестезия в области иннервации нижнечелюстного нерва
~Часто встречается оторагия (кровотечение из уха)
}

// question: 4152420 name: При переломе н.ч.по средней линии :
::При переломе н.ч.по средней линии \:::[html]При переломе н.ч.по средней линии \:{
=При мобилизации н.ч. наблюдается гармоничная окклюзия
~У больного наблюдается гипоестезия в области иннервации нижнечелюстного нерва
~Часто встречается оторагия (кровотечение из уха)
}

// question: 4152421 name: При переломе н.ч.по средней линии :
::При переломе н.ч.по средней линии \:::[html]При переломе н.ч.по средней линии \:{
=У больного наблюдается синюшность или гиперемия по переходной складке (преддверие)
~У больного наблюдается гипоестезия в области иннервации нижнечелюстного нерва
~Часто встречается оторагия (кровотечение из уха)
}

// question: 4151651 name: При переломе скуловой кости основными клиническими сиптомами являются:
::При переломе скуловой кости основными клиническими сиптомами являются\:::[html]При переломе скуловой кости основными клиническими сиптомами являются\:{
~гематома скуловой области
~деформация носа, гематома
~кровоизлияние в нижнее веко
~кровотечение из носа, головокружение

=симптом «ступени», затрудненное открывание рта
}

// question: 4151843 name: ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПАРАСТЕЗИЯ КРЫЛА НОСА И ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ВОЗНИКАЕТ ...
::ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПАРАСТЕЗИЯ КРЫЛА НОСА И ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ВОЗНИКАЕТ ...::[html]ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПАРАСТЕЗИЯ КРЫЛА НОСА И ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ{
=II ветви тройничного нерва
~I ветви тройничного нерва
~III ветви тройничного нерва
~лицевого нерва
}

// question: 4151935 name: ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРОИСХОДИТ
::ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРОИСХОДИТ::[html]ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРОИСХОДИТ{
=смена диагоналей
~смена шовного материала
~смена катетов
~расхождение краев раны
}

// question: 4151936 name: ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРОИСХОДИТ
::ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРОИСХОДИТ::[html]ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ ПРОИСХОДИТ{
=расхождение краев раны
~смена шовного материала
~смена краев раны
~смена катетов
}

// question: 4151953 name: ПРИ ПЛАСТИКЕ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ФИКСАЦИЯ ЛОСКУТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
::ПРИ ПЛАСТИКЕ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ФИКСАЦИЯ ЛОСКУТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ::[html]ПРИ ПЛАСТИКЕ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ФИКСАЦИЯ ЛОСКУТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ{
=узловым швом
~непрерывным швом
~гипсовой повязкой
~разгрузочными швами
}

// question: 4175107 name: При повреждении каких нервов наблюдается нарушение чувствительности кожи ...
::При повреждении каких нервов наблюдается нарушение чувствительности кожи ...::[html]При повреждении каких нервов наблюдается нарушение чувствительности кожи околоушной области и ушной раковины при проведении паротидэктомии?{
	~Большого ушного нерва
	~Ушно-височного нерва
	~Заднего ушного нерва
	=Большого ушного и ушно-височного нервов
	~Большого ушного, заднего ушного и ушно-височного нервов
}

// question: 4175104 name: При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, ...
::При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, ...::[html]При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, наблюдается неврологический дефицит со стороны смыкания век?{
	~Височной
	=Скуловой
	~Щечной
	~Краевой
	~Шейной
}

// question: 4175105 name: При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, ...
::При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, ...::[html]При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, наблюдается неврологический дефицит со стороны движения верхней губы?\:{
	~Височной
	~Скуловой
	=Щечной
	~Краевой
	~Шейной
}

// question: 4175106 name: При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, ...
::При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении паротидэктомии, ...::[html]При повреждении какой ветви лицевого нерва, при проведении

паротидэктомии, наблюдается неврологический дефицит со стороны движения нижней губы?{
	~Височной
	~Скуловой
	~Щечной
	~Краевой
	=Шейной
}

// question: 4157654 name: При помощи какого метода достигается идентичность цвета пересаженной кожи и ...
::При помощи какого метода достигается идентичность цвета пересаженной кожи и ...::[html]При помощи какого метода достигается идентичность цвета пересаженной кожи и окружающей кожи лица\:{
	=Деэпидермизация
	~Электрокоагуляция
	~Физиотерапия
	~Криотерапия
}

// question: 4175124 name: При пункции содержимое радикулярной кисты будет иметь вид:
::При пункции содержимое радикулярной кисты будет иметь вид\:::[html]При пункции содержимое радикулярной кисты будет иметь вид\:{
	=Прозрачной жидкости с кристаллами холестерина
	~Лимфы
	~Крови
	~Мутной жидкости
	~Холестеотомных масс
}

// question: 4151858 name: При развитии ahкилоза вhчс в детстве деформация hижhей челюсти появляется
::При развитии ahкилоза вhчс в детстве деформация hижhей челюсти появляется::[html]При развитии ahкилоза вhчс в детстве деформация hижhей челюсти появляется{
	=с началом интенсивного роста костей лица
	~спустя 6 месяцев от начала заболевания
	~спустя 12 месяцев от начала заболевания
	~после начала лечения
}

// question: 4151982 name: При ретро положении верхней челюсти после ее остеотомии смещение проводят
::При ретро положении верхней челюсти после ее остеотомии смещение проводят::[html]При ретро положении верхней челюсти после ее остеотомии смещение проводят{
	=вперед
	~вверх
	~назад
	~вправо
}

// question: 4151766 name: ПРИ СИММЕТРИЧНОЙ НИЖНЕЙ МАКРОГНАТИИ ОСТЕОТОМИЮ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИЗВОДЯТ В ОБЛАСТИ
::ПРИ СИММЕТРИЧНОЙ НИЖНЕЙ МАКРОГНАТИИ ОСТЕОТОМИЮ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИЗВОДЯТ В ОБЛАСТИ::[html]ПРИ СИММЕТРИЧНОЙ НИЖНЕЙ МАКРОГНАТИИ ОСТЕОТОМИЮ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИЗВОДЯТ В ОБЛАСТИ{
	=ветвей челюсти
	~углов челюсти
	~первых премоляров
	~подбородка
}

// question: 4152278 name: При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения:
::При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:::[html]При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:{
	~Лейкоцитоз
	~Повышение СОЭ
	~Повышается количество фибриногена
	=Все ответы верны
}

// question: 4152279 name: При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения:
::При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:::[html]При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:{
	~Повышается количество фибриногена
	~Повышается фактор XIII в крови
	~Гиперкоагуляция крови.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152280 name: При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения:
::При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:::[html]При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:{
	~Лейкоцитоз
	~Повышается фактор XIII в крови
	~Гиперкоагуляция крови.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152281 name: При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения:
::При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:::[html]При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:{
	~Лейкоцитоз
	~Повышение СОЭ
	~Гиперкоагуляция крови.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152282 name: При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения:
::При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:::[html]При тромбофлебите лицевых вен в крови происходят следующие изменения\:{
	~Лейкоцитоз
	~Повышается количество фибриногена
	~Гиперкоагуляция крови.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152604 name: При удалении опухолей околоушной слюнной железы используется оперативный ...
::При удалении опухолей околоушной слюнной железы используется оперативный ...::[html]При удалении опухолей околоушной слюнной железы используется оперативный доступ по\:{
	~Брунсу
	~Мухину
	~Йовчеву
	=Ковтуновичу
}

// question: 4152605 name: При удалении опухолей околоушной слюнной железы используется оперативный ...
::При удалении опухолей околоушной слюнной железы используется оперативный ...::[html]При удалении опухолей околоушной слюнной железы используется оперативный доступ по\:{
	~Брунсу
	~Мухину
	=Редону
	~Йовчеву
}

// question: 4152144 name: При флегмоне корня языка возникают серьезные функциональные нарушения, но ...
::При флегмоне корня языка возникают серьезные функциональные нарушения, но ...::[html]При флегмоне корня языка возникают серьезные функциональные нарушения, но одна из них ставит жизнь в опасность\:{
	~Нарушения глотания
	~Нарушения жевания
	~Нарушения речи
	=Нарушения дыхания с симптомами асфиксии (удушья)
	~Тризм.
}

// question: 4152219 name: При флегмоне мягких тканей дна полости рта резкому обезвоживанию организма ...
::При флегмоне мягких тканей дна полости рта резкому обезвоживанию организма ...::[html]При флегмоне мягких тканей дна полости рта резкому обезвоживанию организма способствует\:{
	~повышение диуреза
	~почечная недостаточность
	~нарушение электролитного баланса
	=невозможность приема жидкости из за резкого отека и болей в области языка и дна полости рта
	~печёночная недостаточность.
}

// question: 4152117 name: При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется:
::При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:::[html]При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:{
	~Выраженным отеком щеки с гиперемией кожных покровов, напряжением кожных покровов

~Сглаживание носогубных складок
~Выраженный отек тканей щечной области
=Все ответы верны
}

// question: 4152118 name: При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется:
::При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:::[html]При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:{
~Выраженный отек тканей щечной области
~Слизистая оболочка в области щеки гиперемирована, наличие отпечатков зубов покрытых налетом
~Болезненность при пальпации, определяется флюктуация.
=Все ответы верны
}

// question: 4152119 name: При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется:
::При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:::[html]При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:{
~Выраженным отеком щеки с гиперемией кожных покровов, напряжением кожных покровов
~Слизистая оболочка в области щеки гиперемирована, наличие отпечатков зубов покрытых налетом
~Болезненность при пальпации, определяется флюктуация.
=Все ответы верны
}

// question: 4152120 name: При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется:
::При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:::[html]При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:{
~Выраженным отеком щеки с гиперемией кожных покровов, напряжением кожных покровов
~Сглаживание носогубных складок
~Болезненность при пальпации, определяется флюктуация.
=Все ответы верны
}

// question: 4152121 name: При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется:
::При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:::[html]При флегмоне щечной области клиническая картина характеризуется\:{

~Сглаживание носогубных складок
~Выраженный отек тканей щечной области
~Слизистая оболочка в области щеки гиперемирована, наличие отпечатков зубов покрытых налетом
=Все ответы верны
}

// question: 4152145 name: При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как:
::При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:::[html]При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:{
=Распространение в близлежащие области
~Невралгия 1 ветви тройничного нерва
~Анкилоз
~Артрит
}

// question: 4152146 name: При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как:
::При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:::[html]При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:{
=Сепсис
~Невралгия 1 ветви тройничного нерва
~Анкилоз
~Артрит
}

// question: 4152147 name: При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как:
::При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:::[html]При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:{
=Асфиксия
~Невралгия 1 ветви тройничного нерва
~Анкилоз
~Артрит
}

// question: 4152148 name: При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как:
::При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:::[html]При флегмоне языка могут встречаться такие осложнения как\:{
~Невралгия 1 ветви тройничного нерва
~Анкилоз

~Артрит
=Парез языка.
}

// question: 4151981 name: ПРИ ФРАГМЕНТАРНОЙ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УДАЛЯЮТ
::ПРИ ФРАГМЕНТАРНОЙ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УДАЛЯЮТ::[html]ПРИ ФРАГМЕНТАРНОЙ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УДАЛЯЮТ{
=1.5\: 2.5
~1.3\: 2.3
~1.2\: 2.2
~3.5\: 4.5
}

// question: 4151861 name: ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ АРТИТАХ ПРОИСХОДИТ
::ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ АРТИТАХ ПРОИСХОДИТ::[html]ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ АРТИТАХ ПРОИСХОДИТ{
=разволокнение и некроз хряща
~набухание диска
~увеличение синовиальной жидкости
~растяжение капсулы
}

// question: 4174941 name: При хроническом артрите височно-нижнечелюстного сустава выявляют:
::При хроническом артрите височно-нижнечелюстного сустава выявляют\:::[html]При хроническом артрите височно-нижнечелюстного сустава выявляют\:{
~деструктивные изменения, деформацию головки мыщелкового отростка
=склеротические изменения костной структуры
}

// question: 4151721 name: ПРИЗНАК «ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ» НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ФЛЕГМОНЕ ПРОСТРАНСТВА
::ПРИЗНАК «ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ» НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ФЛЕГМОНЕ ПРОСТРАНСТВА::[html]ПРИЗНАК «ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ» НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ФЛЕГМОНЕ ПРОСТРАНСТВА{
=субмассетериального
~поднижнечелюстного
~подподбородочного
~окологлоточного
}

// question: 4152547 name: Признаки озлокачествления плеоморфной аденомы:
::Признаки озлокачествления плеоморфной аденомы\:::[html]Признаки
озлокачествления плеоморфной аденомы\:{
	=спаянность с кожей
	~увеличение региональных лимфоузлов
	~появление тризма
}

// question: 4152548 name: Признаки озлокачествления плеоморфной аденомы:
::Признаки озлокачествления плеоморфной аденомы\:::[html]Признаки
озлокачествления плеоморфной аденомы\:{
	~увеличение региональных лимфоузлов
	~появление тризма
	=дисфункция лицевого нерва (парез)
}

// question: 4152549 name: Признаки озлокачествления плеоморфной аденомы:
::Признаки озлокачествления плеоморфной аденомы\:::[html]Признаки
озлокачествления плеоморфной аденомы\:{
	~увеличение региональных лимфоузлов
	~появление тризма
	=спонтанные боли в области опухоли
}

// question: 4151748 name: ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
::ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В::[html]ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В{
	=вскрытии, дренировании и промывании антисептиками
	~применении местных мазевых повязок и компрессов
	~физиотерапевтическом лечении
	~назначении миогимнастики и механотерапии
}

// question: 4151942 name: ПРИРОСТ ТКАНЕЙ ПРИ НЕРАВНЫХ УГЛАХ ФИГУР
ПРОИСХОДИТ
::ПРИРОСТ ТКАНЕЙ ПРИ НЕРАВНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ::[html]ПРИРОСТ ТКАНЕЙ
ПРИ НЕРАВНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ{
	=у вершины большего угла
	~у основания большего угла
	~у вершины малого угла
	~у основания меньшего угла

}

// question: 4151941 name: ПРИРОСТ ТКАНЕЙ ПРИ РАВНОМЕРНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ
::ПРИРОСТ ТКАНЕЙ ПРИ РАВНОМЕРНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ::[html]ПРИРОСТ ТКАНЕЙ ПРИ РАВНОМЕРНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ{
	=одинаково в обе стороны
	~прирост не происходит
	~равномерно в сторону больших углов
	~равномерно в сторону дополнительных разрезов
}

// question: 4151831 name: ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИПЛОПИИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ
::ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИПЛОПИИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ::[html]ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИПЛОПИИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ{
	=смещение глазного яблока
	~воспалительная реакция
	~травма глазного яблока
	~травма зрительного нерва
}

// question: 4151830 name: ПРИЧИНА ЗАТРУДНЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ РТА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ
::ПРИЧИНА ЗАТРУДНЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ РТА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ::[html]ПРИЧИНА ЗАТРУДНЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ РТА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ{
	=смещение отломков
	~гематома
	~воспалительная реакция
	~травма жевательных мышц
}

// question: 4174932 name: Причина возникновения вывиха нижней челюсти
::Причина возникновения вывиха нижней челюсти::[html]Причина возникновения вывиха нижней челюсти{
	=Слабость суставной капсулы и связочного аппарата височно-нижнечелюстного сустава
	~Артрит височно-нижнечелюстного сустава
	~Нижняя макрогнатия
	~Снижение высоты прикуса
}

// question: 4151695 name: ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА
::ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА::[html]ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА{
	=несоблюдение правил асептики и антисептики во время анестезии
	~высокая доза сосудосуживающего препарата в карпуле
	~наличие метилпарабена в карпуле местного анестетика
	~непереносимость местного анестетика
}

// question: 4151774 name: ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ
::ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ::[html]ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ{
	=удаляют обязательно
	~сохраняют обязательно
	~шинируют
	~депульпируют
}

// question: 4151842 name: ПРИЧИНОЙ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА МОЖЕТ БЫТЬ
::ПРИЧИНОЙ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА МОЖЕТ БЫТЬ{
	=сдавление сосудистой ножки гематомой
	~ранее снятие швов
	~сукровичное отделяемое по дренажу в послеоперационном периоде
	~позднее снятие швов
}

// question: 4151715 name: ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ НОСОВОГО ХОДА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ
::ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ НОСОВОГО ХОДА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ НОСОВОГО ХОДА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ{
	=повреждение стенок верхнечелюстного синуса с разрывом слизистой
	~травма слизистой носового хода
	~повышение внутричерепного давления в результате травмы
	~повреждение лицевой артерии
}

// question: 4174944 name: Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

::Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является\:{
	~актиномикоз
	~околоушной гипергидроз
	=хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174989 name: Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является:
::Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является\:{
	=актиномикоз
	~ревматическая атака
	~околоушный гипергидроз
	~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4151817 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОАРТРОЗА МОЖЕТ БЫТЬ
::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОАРТРОЗА МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОАРТРОЗА МОЖЕТ БЫТЬ{
	=неправильное зубопротезирование
	~сиалоаденит
	~употребление парного молока
	~рубцовые изменения тканей, окружающих нижнюю челюсть
}

// question: 4174942 name: Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:
::Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:{
	~актиномикоз
	=острая травма
	~околоушной гипергидроз
	~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174987 name: Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:
::Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:{
	~актиномикоз

=острая травма
~околоушный гипергидроз
~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174988 name: Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:
::Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является\:{
~актиномикоз
=ревматическая атака
~околоушный гипергидроз
~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4152055 name: Причиной острого одонтогенного периостита челюстей наиболее часто являются:
::Причиной острого одонтогенного периостита челюстей наиболее часто являются\:::[html]Причиной острого одонтогенного периостита челюстей наиболее часто являются\:{
~ резцы центральные
~ резцы боковые
~ клыки
=моляры
~ премоляры
}

// question: 4175132 name: Причиной случаев рецидива возникновения радикулярной кисты челюстей после ...
::Причиной случаев рецидива возникновения радикулярной кисты челюстей после ...::[html]Причиной случаев рецидива возникновения радикулярной кисты челюстей после проведенной цистотомии является\:{
=Ранее закрытие трепанационного отверстия
~Гематома
~Одонтогенная инфекция
~Длительность существования кисты
~Послеоперационные осложнения
}

// question: 4175129 name: Причиной случаев рецидива возникновения радикулярной кисты челюстей является:

::Причиной случаев рецидива возникновения радикулярной кисты челюстей является\:::[html]Причиной случаев рецидива возникновения радикулярной кисты челюстей является\:{
	=Не полностью удаленная оболочка кисты
	~Гематома
	~Одонтогенная инфекция
	~Длительность существования кисты
	~Послеоперационные осложнения
}

// question: 4174945 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
	=актиномикоз
	~ревматическая атака
	~околоушной гипергидроз
	~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174946 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
	=туберкулез
	~ревматическая атака
	~околоушной гипергидроз
	~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174947 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
	=сифилис
	~ревматическая атака
	~околоушной гипергидроз
	~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174972 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
	=сифилис
	~ревматическая атака
	~околоушный гипергидроз

~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174990 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
=туберкулёз
~ревматическая атака
~околоушный гипергидроз
~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174991 name: Причиной специфического артрита ВНЧС является:
::Причиной специфического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной специфического артрита ВНЧС является\:{
=сифилис
~ревматическая атака
~околоушный гипергидроз
~хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4174943 name: Причиной хронического неспецифического артрита ВНЧС является:
::Причиной хронического неспецифического артрита ВНЧС является\:::[html]Причиной хронического неспецифического артрита ВНЧС является\:{
~актиномикоз
~острая травма
~околоушной гипергидроз
=хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
}

// question: 4157620 name: Противопоказанием для проведения пластики носа Филатовским стеблем, является ...
::Противопоказанием для проведения пластики носа Филатовским стеблем, является ...::[html]Противопоказанием для проведения пластики носа Филатовским стеблем, является наличие дефекта\:{
~Спинки носа
=части крыла носа
~тотального
~субтотального
}

// question: 4152242 name: Пульсирующая боль в области груди, иррадиирующая в межлопаточную область, ...
::Пульсирующая боль в области груди, иррадиирующая в межлопаточную область, ...::[html]Пульсирующая боль в области груди, иррадиирующая в межлопаточную область, усиление боли при попытке проглотить пищу или во время глубокого вдоха наблюдается при\:{
	~ флегмоне дна полости рта
	~ сепсисе
	~ переднем медиастините
	= заднем медиастините
	~ воспалении легких.
}

// question: 4151705 name: ПУНКЦИОННУЮ БИОПСИЮ ПРОВОДЯТ
::ПУНКЦИОННУЮ БИОПСИЮ ПРОВОДЯТ::[html]ПУНКЦИОННУЮ БИОПСИЮ ПРОВОДЯТ{
	=при глубоком залегании опухоли
	~при поверхностном расположении опухоли
	~при распаде опухоли
	~в случае риска возникновения кровотечения из опухоли
}

// question: 4152001 name: РАННЯЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ТРАВМЫ...
::РАННЯЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ТРАВМЫ...::[html]РАННЯЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ТРАВМЫ В ТЕЧЕНИЕ{
	=24 часов
	~8-12 часов
	~48 часов
	~72 часов
}

// question: 4151905 name: РАДИОИЗОТОПНОЕ СЦИНЦИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ...
::РАДИОИЗОТОПНОЕ СЦИНЦИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ...::[html]РАДИОИЗОТОПНОЕ СЦИНЦИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТСЯ НА{
	=5-е сутки
	~2-е сутки
	~3-е сутки
	~4-е сутки
}

// question: 4151948 name: РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ЛОСКУТОВ НА НОЖКЕ
::РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ЛОСКУТОВ НА НОЖКЕ::[html]РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ЛОСКУТОВ НА НОЖКЕ{
	=опрокидывающийся
	~на трех питающих ножках
	~деэпидермизированный
	~деваскуляризированный
}

// question: 4152048 name: Размеры гранулемы не превышают:
::Размеры гранулемы не превышают\:::[html]Размеры гранулемы не превышают\:{
	=0,5 cm
	~1,0 cm
	~ 1,5 cm
	~2,0 cm
	~2,5 cm.
}

// question: 4151736 name: РАК - ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ ТКАНИ
::РАК - ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ ТКАНИ::[html]РАК - ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ, ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ ТКАНИ{
	=эпителиальной
	~фиброзной
	~костной
	~жировой
}

// question: 4175067 name: Рак представляет собой злокачественную опухоль происходящую из:
::Рак представляет собой злокачественную опухоль происходящую из\:::[html]Рак представляет собой злокачественную опухоль происходящую из\:{
	=эпителиальной ткани
	~жировой ткани
	~фиброзной ткани
	~мышечной ткани
	~костной ткани
}

// question: 4152597 name: Рак слизистой оболочки полости рта дифференцируют с:
::Рак слизистой оболочки полости рта дифференцируют с\:::[html]Рак слизистой оболочки полости рта дифференцируют с\:{

~Плоской лейкоплакией
=Болезнью Боуэна
~Стоматитом
~Ранулой
~Твердым шанкром
}

// question: 4152601 name: Рак языка метастазирует в лимфоузлы:
::Рак языка метастазирует в лимфоузлы\:::[html]Рак языка метастазирует в лимфоузлы\:{
~Околоушные
~Заушные
=Шейные
~Щечные
~Подчелюстные
}

// question: 4152564 name: Раку верхней челюсти предшествует чаще:
::Раку верхней челюсти предшествует чаще\:::[html]Раку верхней челюсти предшествует чаще\:{
~Хронический гингивит
~Ксеростомия
=Хронический синусит
~Нагноившаяся радикулярная киста
~Хроническии ринит
}

// question: 4175066 name: Ранулой называют кисту:
::Ранулой называют кисту\:::[html]Ранулой называют кисту\:{
~околоушной железы
~подчелюстной железы
=подъязычной железы
~малых слюнных желез
~смешанных слюнных желез
}

// question: 4151913 name: РАСТВОР ДЛЯ ТУАЛЕТА ПОЛОСТИ РТА
::РАСТВОР ДЛЯ ТУАЛЕТА ПОЛОСТИ РТА::[html]РАСТВОР ДЛЯ ТУАЛЕТА ПОЛОСТИ РТА{
=раствор марганцовокислого калия
~40% глюкоза
~раствор Рингера
~альбумин
}

// question: 4151914 name: РАСТВОР ДЛЯ ТУАЛЕТА ПОЛОСТИ РТА
::РАСТВОР ДЛЯ ТУАЛЕТА ПОЛОСТИ РТА::[html]РАСТВОР ДЛЯ ТУАЛЕТА ПОЛОСТИ РТА{
	=раствор диоксидина
	~раствор Рингера
	~40% глюкоза
	~альбумин
}

// question: 4151894 name: РАСЧЕТ СМЕЩЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИХ ОСТЕОТОМИИ ВЕДУТ ПО
::РАСЧЕТ СМЕЩЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИХ ОСТЕОТОМИИ ВЕДУТ ПО::[html]РАСЧЕТ СМЕЩЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИХ ОСТЕОТОМИИ ВЕДУТ ПО{
	=артикулятору и телерентгенограмме
	~ортопантомограмме
	~компьютерной томограмме
	~панорамной рентгенограмме
}

// question: 4151892 name: РАСЧЕТЫ СМЕЩЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИХ ОСТЕОТОМИИ ВЕДУТ ПО
::РАСЧЕТЫ СМЕЩЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИХ ОСТЕОТОМИИ ВЕДУТ ПО::[html]РАСЧЕТЫ СМЕЩЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИХ ОСТЕОТОМИИ ВЕДУТ ПО{
	=телерентгенограмме
	~ортопантомограмме
	~панорамной рентгенограмме
	~компьютерной томограмме
}

// question: 4151893 name: РАСЧЕТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОВОДИТ
::РАСЧЕТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОВОДИТ::[html]РАСЧЕТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОВОДИТ{
	=ортодонт
	~ортопед
	~терапевт
	~хирург
}

// question: 4151895 name: РАСЧЕТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОВОДИТ
::РАСЧЕТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОВОДИТ::[html]РАСЧЕТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОВОДИТ{
	=ортодонт

~ортопед
~челюстно-лицевой хирург
~терапевт
}

// question: 4151883 name: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОСТНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
::РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОСТНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ::[html]РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОСТНОГО АНКИЛОЗА ВНЧС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{
=сплошным костным конгломератом
~прерывистой суставной щелью
~четко контурируемыми элементами суставных структур
~зоной склероза суставной головки
}

// question: 4152574 name: Резекция челюсти показана при:
::Резекция челюсти показана при\:::[html]Резекция челюсти показана при\:{
~Фиброме, фиброматозе
~Липоме, липоматозе
~Лейомиоме, рабдомиоме
=Амелобластоме
~Фиброзном эпулисе
}

// question: 4175083 name: Резидуальной кистой челюсти называется:
::Резидуальной кистой челюсти называется\:::[html]Резидуальной кистой челюсти называется\:{
~фолликулярная киста
=остаточная (неудаленная) киста
~радикулярная киста
~субпериостальная киста
~носогубная киста
}

// question: 4152552 name: Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется
::Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется::[html]Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется{
~Наличием плотной тени
=Преимущественно ячеистыми структурами в виде «пузырей мыльной пены»
~Деструкцией кости с нечеткими контурами
}

// question: 4152550 name: Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется:
::Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется\:::[html]Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется\:{
	=Разрежением кости
	~Наличием плотной тени
	~Деструкцией кости с нечеткими контурами
}

// question: 4152551 name: Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется:
::Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется\:::[html]Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется\:{
	~Наличием плотной тени
	=Четкими контурами
	~Деструкцией кости с нечеткими контурами
}

// question: 4175058 name: Рентгенологическая картина при амелобластоме:
::Рентгенологическая картина при амелобластоме\:::[html]Рентгенологическая картина при амелобластоме\:{
	~определяется ограниченная гомогенная тень, по плотности напоминающая тень коронки зуба и полоской просветления вокруг (капсула)
	=характеризуется деструкцией кости в виде множественных очагов разрежения с четкими границами (поликистозный характер разрежения)
	~гомогенное разрежение костной ткани округлой формы с четкими границами, в полость обращена часть непрорезавшегося зуба
	~диффузные деструктивные изменения, связанные непосредственно с корнями зубов
	~разрежение костной ткани округлой формы с четкими границами, в полость обращен корень причинного зуба.
}

// question: 4174952 name: Рентгенологические симптомы - уплощение головки и бугорка, субхондральный ...
::Рентгенологические симптомы - уплощение головки и бугорка, субхондральный ...::[html]Рентгенологические симптомы - уплощение головки и бугорка, субхондральный склероз, сужение суставной щели, костные разрастания в виде шипов характерны для\:{
	~артрита

~анкилоза
=деформирующего артроза
}

// question: 4152049 name: Реплантация зуба это:
::Реплантация зуба это\:::[html]Реплантация зуба это\:{
= удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью зуба
~удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба
~пересадка удаленного зуба в его же альвеолу
~пересадка зуба в альвеолу другого удаленного зуба
}

// question: 4151925 name: РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА ПРИ ЗАПАДЕНИИ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ
::РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА ПРИ ЗАПАДЕНИИ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ::[html]РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА ПРИ ЗАПАДЕНИИ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ{
=элеватором Волкова
~крючком Лимберга
~прямым элеватором
~носовым зеркалом
}

// question: 4152008 name: РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА ПРИ ЗАПАДЕНИИ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ
::РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА ПРИ ЗАПАДЕНИИ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ::[html]РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА ПРИ ЗАПАДЕНИИ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ{
=элеватором Волкова
~крючком Лимберга
~прямым элеватором
~носовым зеркалом
}

// question: 4152606 name: Ретенционные кисты малых слюнных желез образуется преимущественно в результате:
::Ретенционные кисты малых слюнных желез образуется преимущественно в результате\:::[html]Ретенционные кисты малых слюнных желез образуется преимущественно в результате\:{
~Воспалительного процесса
=Травмы выводного протока
~Аллергической реакции
~Всех перечисленных факторов

~Ни один из перечисленных факторов
}

// question: 4152052 name: Ретенция зуба это:
::Ретенция зуба это\:::[html]Ретенция зуба это\:{
=задержка сроков прорезывания нормально сформировавшегося постоянного зуба
~ неполное прорезывание зуба через костную ткань челюсти или слизистую оболочку
~ неправильное положение в зубном ряду прорезавшегося зуба
~ аномалийное его расположение в челюсти
~ аномалийное его расположение вне челюсти.
}

// question: 4157590 name: С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по ...
::С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по ...::[html]С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по Лимбергу\:{
~С целью устранения обширных дефектов мягких тканей
=С целью устранения короткой уздечки
~С целью пластики твердого неба
~С целью устранения линейных келлоидных рубцов
}

// question: 4157591 name: С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по ...
::С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по ...::[html]С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по Лимбергу\:{
~С целью устранения обширных дефектов мягких тканей
=С целью устранения рубцового выворота век
~С целью пластики твердого неба
~С целью устранения линейных келлоидных рубцов
}

// question: 4157592 name: С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по ...
::С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по ...::[html]С какой целью используется пластика встречными треугольными лоскутами по Лимбергу\:{
~С целью устранения обширных дефектов мягких тканей
=С целью устранения свищевых ходов

~С целью пластики твердого неба
~С целью устранения линейных келлоидных рубцов
}

// question: 4157598 name: С какой целью используются опрокидывающиеся лоскуты:
::С какой целью используются опрокидывающиеся лоскуты\:::[html]С какой целью используются опрокидывающиеся лоскуты\:{
~Устранение дефектов кожи
=Создание внутренней выстилки
~Устранение короткой уздечки
~Закрытие линейных разрезов
}

// question: 4174995 name: С учетом времени, прошедшего от момента травмы, вывихи нижней челюсти делятся...
::С учетом времени, прошедшего от момента травмы, вывихи нижней челюсти делятся...::[html]С учетом времени, прошедшего от момента травмы, вывихи нижней челюсти делятся на\:{
~односторонние и двусторонние
=острые и застарелые
~полный и неполный
~травматический, привычный, патологический
}

// question: 4157684 name: С целью предупреждения сужения носового хода после операции по поводу ...
::С целью предупреждения сужения носового хода после операции по поводу ...::[html]С целью предупреждения сужения носового хода после операции по поводу врожденной расщелины верхней губы используют\:{
~Марлевую турунду
~Коллоидную повязку
~Ватные тампоны
=Пластмассовый или силиконовый вкладыш
}

// question: 4157672 name: С целью профилактики рубцовых деформаций носа, сформированного из тканей ...
::С целью профилактики рубцовых деформаций носа, сформированного из тканей ...::[html]С целью профилактики рубцовых деформаций носа, сформированного из тканей филатовского стебля в послеоперационном периоде используется\:{
~Коллоидная повязка
~Формирующая повязка
~Гипсовая повязка с трубками для носовых ходов

=Формирующая повязка с трубками для носовых ходов
}

// question: 4157652 name: С целью улучшения приживления свободного кожного лоскута рекомендуется ...
::С целью улучшения приживления свободного кожного лоскута рекомендуется ...::[html]С целью улучшения приживления свободного кожного лоскута рекомендуется использовать\:{
=ГБО-терапия
~Электрокоагуляция
~Химиотерапия
~Криотерапия
}

// question: 4157653 name: С целью улучшения приживления свободного кожного лоскута рекомендуется ...
::С целью улучшения приживления свободного кожного лоскута рекомендуется ...::[html]С целью улучшения приживления свободного кожного лоскута рекомендуется использовать\:{
=Физиотерапия
~Электрокоагуляция
~Химиотерапия
~Криотерапия
}

// question: 4157682 name: С целью устранения чего, выполняется пластика при врожденной расщелине ...
::С целью устранения чего, выполняется пластика при врожденной расщелине ...::[html]С целью устранения чего, выполняется пластика при врожденной расщелине верхней губы\:{
~Выворота крыла носа
~Рубцовой деформации
~Искривления перегородки носа
=Дефекта губы и деформации крыла носа
}

// question: 4152376 name: Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей:
::Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей\:::[html]Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей\:{
=Обильные кровотечения
~Нарушения окклюзии
~Флегмоны, острый остеомиелит, синусит.

}

// question: 4152377 name: Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей:
::Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей\:::[html]Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей\:{
	=Сотрясение мозга
	~Нарушения окклюзии
	~Флегмоны, острый остеомиелит, синусит.
}

// question: 4152378 name: Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей:
::Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей\:::[html]Самые тяжёлые общие ранние осложнения перелома челюстей\:{
	~Нарушения окклюзии
	=Травматический шок
	~Флегмоны, острый остеомиелит, синусит.
}

// question: 4152568 name: Саркома костей лица развивается из:
::Саркома костей лица развивается из\:::[html]Саркома костей лица развивается из\:{
	~Эпителия десны
	~Эпителиальных островков Маляссе
	~Дентина
	=Костной ткани
	~Цемента
}

// question: 4152567 name: Саркома мягких тканей челюстно лицевой области развивается из:
::Саркома мягких тканей челюстно лицевой области развивается из\:::[html]Саркома мягких тканей челюстно лицевой области развивается из\:{
	~Сальной железы
	~Потовой железы
	=Глубоких слоев дермы
	~Малой слюнной железы
	~Из жировой ткани
}

// question: 4151759 name: СВЕЖИЙ СКВОЗНОЙ ДЕФЕКТ ЩЕКИ ДО 3,0 СМ В ДИАМЕТРЕ СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

::СВЕЖИЙ СКВОЗНОЙ ДЕФЕКТ ЩЕКИ ДО 3,0 СМ В ДИАМЕТРЕ СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ::[html]СВЕЖИЙ СКВОЗНОЙ ДЕФЕКТ ЩЕКИ ДО 3,0 СМ В ДИАМЕТРЕ СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ{
=обшиванием краев раны
~перемещением свободного расщепленного кожного лоскута
~формированием стебельчатого лоскута Филатова
~пластикой местными тканями с широкой мобилизацией краев и послойным их ушиванием
}

// question: 4152032 name: СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ ПОСЛЕ ЭКСТУБАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
::СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ ПОСЛЕ ЭКСТУБАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ::[html]СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ ПОСЛЕ ЭКСТУБАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ{
=введением воздуховода
~трахеостомией
~прошиванием и выведением языка
~поворотом головы пациента
}

// question: 4151961 name: СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ
::СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ::[html]СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ{
=пересадка кожного аутотрансплантата
~перенос кожи стебельчатого лоскута
~перемещение кожного лоскута на ножке
~перемещение кожного лоскута на микроанастомозе
}

// question: 4151970 name: СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ
::СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ::[html]СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ{
=пересадка кожного аутотрансплантата
~перенос кожи стебельчатого лоскута
~перемещение кожного лоскута на ножке
~перемещение кожного лоскута на микроанастомозе
}

// question: 4151960 name: СВОБОДНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ ПО ПЕДЖЕТУ НАЗЫВАЕТСЯ
::СВОБОДНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ ПО ПЕДЖЕТУ НАЗЫВАЕТСЯ::[html]СВОБОДНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ ПО ПЕДЖЕТУ НАЗЫВАЕТСЯ{
=в три четверти толщины
~расщепленным

~тонким дермоэпителиальным
~полнослойной кожей без клетчатки
}

// question: 4151962 name: СВОБОДНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ ФИКСИРУЮТ НА РАНЕ
::СВОБОДНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ ФИКСИРУЮТ НА РАНЕ::[html]СВОБОДНЫЙ КОЖНЫЙ ЛОСКУТ ФИКСИРУЮТ НА РАНЕ{
=узловыми швами
~давящей повязкой
~узловыми швами и давящей повязкой
~парафиновой повязкой
}

// question: 4151764 name: СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ
::СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ::[html]СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ{
=контурной пластике
~замещении дефектов кожи
~миопластике
~хейлопластике
}

// question: 4157644 name: Свободной пересадкой кожи называется:
::Свободной пересадкой кожи называется\:::[html]Свободной пересадкой кожи называется\:{
~Перенос кожи стебельчатого лоскута
=Пересадка кожного аутотрансплантата
~Перемещение кожного лоскута на ножке
~Перемещение кожного лоскута на микрососудистом анастамозе
}

// question: 4175108 name: Связь с подъязычной костью имеет следующая киста:
::Связь с подъязычной костью имеет следующая киста\:::[html]Связь с подъязычной костью имеет следующая киста\:{
~Бронхогенная киста
=Териоглосальная киста
~Дермоидная киста
~Эпидермоидная киста
~Киста малой слюнной железы
}

// question: 4151750 name: СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ
::СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ{
	=медиастенит
	~паротит
	~парез лицевого нерва
	~нервагематома мягких тканей
}

// question: 4151751 name: СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ
::СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ{
	=тромбоз синусов головного мозга
	~сиалоаденит
	~повреждение второй ветви тройничного нерва
	~гематома мягких тканей
}

// question: 4151821 name: СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР I
::СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР I::[html]СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР I{
	=отрыв альвеолярного отростка
	~суборбитальный
	~суббазальный
	~отрыв альвеолярной части
}

// question: 4151822 name: СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР II
::СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР II::[html]СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР II{
	=суборбитальный
	~суббазальный
	~отрыв альвеолярного отростка
	~отрыв альвеолярной части
}

// question: 4151823 name: СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР III
::СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР III::[html]СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР III{

=суббазальный
~суборбитальный
~отрыв альвеолярного отростка
~отрыв альвеолярной части
}

// question: 4152328 name: Сиалодохит воспалительный процесс локализованный в области:
::Сиалодохит воспалительный процесс локализованный в области\:::[html]Сиалодохит воспалительный процесс локализованный в области\:{
=Вартонов проток
~Большие слюнные железы
~Малые слюнные железы
~Все ответы верны.
}

// question: 4152329 name: Сиалодохит воспалительный процесс локализованный в области:
::Сиалодохит воспалительный процесс локализованный в области\:::[html]Сиалодохит воспалительный процесс локализованный в области\:{
=Стенонов проток
~Большие слюнные железы
~Малые слюнные железы
~Все ответы верны.
}

// question: 4151784 name: СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ НА
::СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ НА::[html]СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ НА{
=подбородок при полуоткрытом рте снизу вверх
~подбородок при сомкнутых зубах снизу вверх
~скуловые кости снизу вверх
~давлением на крючок крыловидного отростка снизу вверх
}

// question: 4151783 name: СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ НА
::СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ НА::[html]СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ НА{
=давлением на крючок крыловидного отростка снизу вверх

~подбородок при сомкнутых зубах снизу вверх
~подбородок при полуоткрытом рте снизу вверх
~скуловые кости снизу вверх
}

// question: 4152494 name: Симптом перелома скуловой дуги характеризируется:
::Симптом перелома скуловой дуги характеризируется\:::[html]Симптом перелома скуловой дуги характеризируется\:{
~Кровотечением из носа
~Гипоэстезия в подглазничной области
~Подкожная эмфизема
~Диплопия
=Блокада движений нижней челюсти.
}

// question: 4174978 name: Симптом, не являющийся характерным для изолированного перелома скуловой кости:
::Симптом, не являющийся характерным для изолированного перелома скуловой кости\:::[html]Симптом, не являющийся характерным для изолированного перелома скуловой кости\:{
~западение мягких тканей скуловой кости
~симптом «ступеньки» в средней части нижнего края глазницы
~онемение кожи подглазничной области
=кровотечение из носа
}

// question: 4152525 name: Симптоматическая триада хронических артритов включают:
::Симптоматическая триада хронических артритов включают\:::[html]Симптоматическая триада хронических артритов включают\:{
=Боль
~Ограничение движений челюсти
~Признаки острого воспаления
}

// question: 4152526 name: Симптоматическая триада хронических артритов включают:
::Симптоматическая триада хронических артритов включают\:::[html]Симптоматическая триада хронических артритов включают\:{
=Хруст
~Ограничение движений челюсти
~Признаки острого воспаления
}

// question: 4152527 name: Симптоматическая триада хронических артритов включают:
::Симптоматическая триада хронических артритов включают\:::[html]Симптоматическая триада хронических артритов включают\:{
	=Механические изменения в суставе
	~Ограничение движений челюсти
	~Признаки острого воспаления
}

// question: 4152240 name: Симптомы Герке, Иванов, Равич Щербо характерны для:
::Симптомы Герке, Иванов, Равич Щербо характерны для\:::[html]Симптомы Герке, Иванов, Равич Щербо характерны для\:{
	~ флегмоны дна полости рта
	~ пневмонии
	= медиастинита
	~ менингита
	~ сепсиса.
}

// question: 4151852 name: СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА
::СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА::[html]СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА{
	=кровотечение из носовых ходов, смещение костей спинки носа
	~подкожная эмфизема, гематома
	~гематома, затруднение носового дыхания
	~кровотечение из носовых ходов, гематома
}

// question: 4152496 name: Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть:
::Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:::[html]Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:{
	=Все ответы верны
	~Блокада движения нижней челюсти
	~Изменения проводимости подглазничного нерва.
}

// question: 4152497 name: Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть:
::Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:::[html]Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:{
	=Все ответы верны
	~Диплопия
	~Изменения проводимости подглазничного нерва.
}

// question: 4152498 name: Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть:
::Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:::[html]Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:{
	=Все ответы верны
	~Диплопия
	~Лицевые асимметрии
}

// question: 4152499 name: Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть:
::Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:::[html]Симптомы переломов скуловой кости со смещением могут быть\:{
	=Все ответы верны
	~Лицевые асимметрии
	~Блокада движения нижней челюсти
}

// question: 4152236 name: Симптомы флегмоны крылонёбной ямки:
::Симптомы флегмоны крылонёбной ямки\:::[html]Симптомы флегмоны крылонёбной ямки\:{
	= болезненное ограничение открывания рта
	~ сухость во рту
	~ боли в области тела нижней челюсти.
}

// question: 4152237 name: Симптомы флегмоны крылонёбной ямки:
::Симптомы флегмоны крылонёбной ямки\:::[html]Симптомы флегмоны крылонёбной ямки\:{
	= отечность и болезненность слизистой оболочки за бугром верхней челюсти
	~ сухость во рту
	~ боли в области тела нижней челюсти.
}

// question: 4152238 name: Симптомы флегмоны крылонёбной ямки:
::Симптомы флегмоны крылонёбной ямки\:::[html]Симптомы флегмоны крылонёбной ямки\:{
	= распирающая головная боль
	~ сухость во рту
	~ боли в области тела нижней челюсти.
}

// question: 4157666 name: Сингенным называется материал, донором которого является:
::Сингенным называется материал, донором которого является\:::[html]Сингенным называется материал, донором которого является\:{
	~Сам пациент
	~Животное
	~Другой пациент
	=Однояйцевый близнец
}

// question: 4152331 name: Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии:
::Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:::[html]Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:{
	~ксеростомия
	~ксерофтальмия
	~ревматойдный артрит
	=Все ответы верны
}

// question: 4152332 name: Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии:
::Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:::[html]Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:{
	~ревматойдный артрит
	~коньюктевит
	~дерматомиозит.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152333 name: Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии:
::Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:::[html]Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:{
	~ксеростомия
	~коньюктевит
	~дерматомиозит.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152334 name: Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии:
::Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:::[html]Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:{
	~ксеростомия
	~ксерофтальмия
	~дерматомиозит.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152335 name: Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии:
::Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:::[html]Синдром Шегрена состоит из специфической симптоматологии\:{
	~ксерофтальмия
	~ревматойдный артрит
	~дерматомиозит.
	=Все ответы верны
}

// question: 4175097 name: Синоним гигантоклеточной опухоли является:
::Синоним гигантоклеточной опухоли является\:::[html]Синоним гигантоклеточной опухоли является\:{
	=Остеокластома
	~Остеолизома
	~Ретенционная киста
	~Цилиндрома
	~Ационозноклеточная опухоль
}

// question: 4175016 name: Синоним кожного рога:
::Синоним кожного рога\:::[html]Синоним кожного рога\:{
	~внутриэпидермальный кожный рак
	=роговая кератома
	~кератоакантома
	~лейкоплакия бородавчатая
}

// question: 4175101 name: Синоним мукоэпидермоидной опухоли:
::Синоним мукоэпидермоидной опухоли\:::[html]Синоним мукоэпидермоидной опухоли\:{
	~Аденокистозная карцинома
	~Аденокарцинома

=Слизеобразующая эпителиома
~Карцинома эпидермоидная
~Ацинозноклеточная опухоль
}

// question: 4175059 name: Синоним мягкой одонтомы:
::Синоним мягкой одонтомы\:::[html]Синоним мягкой одонтомы\:{
~амелобластическая киста
=амелобластическая фиброма
~фиброзная бластома
~цилиндрома
~цементома
}

// question: 4175030 name: Синоним пиогенной гранулемы:
::Синоним пиогенной гранулемы\:::[html]Синоним пиогенной гранулемы\:{
~роговая кератома
=ботриомикома
~старческая кератома
~внутриэпидермальный рак
}

// question: 4175039 name: Синонимом базалиомы не является:
::Синонимом базалиомы не является\:::[html]Синонимом базалиомы не является\:{
~базальноклеточный рак
~базальноклеточная эпителиома
~кожный карциноид
=Ботриомиком
}

// question: 4175089 name: Синонимом остеосаркомы не является:
::Синонимом остеосаркомы не является\:::[html]Синонимом остеосаркомы не является\:{
~остеобластосаркома
~остеобластическая саркома
=хондросаркома
~остеоидсаркома
~остеолитическая саркома
}

// question: 4175045 name: Сирингоаденома - это:
::Сирингоаденома - это\:::[html]Сирингоаденома - это\:{

~доброкачественная опухоль волосяных фолликулов состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов
~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
=доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
~доброкачественное новообразование которое развивается из выводных протоков потовых желез
}

// question: 4152576 name: Система TNM оценивает:
::Система TNM оценивает\:::[html]Система TNM оценивает\:{
~Степень дифференцирования опухоли
~Степень злокачественности опухоли
=Распространенность опухоли
~Прогноз заболевания
~Размеры опухоли
}

// question: 4175092 name: Система TNM оценивает:
::Система TNM оценивает\:::[html]Система TNM оценивает\:{
~степень злокачественности опухоли
=распространенность опухоли
~прогноз заболевания
~степень дифференцировки опухоли
~все ответы верны
}

// question: 4174937 name: Системный характер поражения зубов наблюдается при:
::Системный характер поражения зубов наблюдается при\:::[html]Системный характер поражения зубов наблюдается при\:{
~местной гипоплазии эмали
=флюорозе
~клиновидном дефекте
~эрозии эмали
~кариесе в стадии пятна
}

// question: 4151862 name: СКЛЕРОЗ ГУБЧАТОЙ КОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЧС РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ
::СКЛЕРОЗ ГУБЧАТОЙ КОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЧС РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ::[html]СКЛЕРОЗ ГУБЧАТОЙ КОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЧС РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ{
=синдроме болевой дисфункции ВНЧС

~хроническом артрите
~флегмонах околоушно-жевательной области
~склерозирующем остеоартрозе
}

// question: 4157619 name: Сколько занимает по времени пластика тотального дефекта носа по Хитрову без ...
::Сколько занимает по времени пластика тотального дефекта носа по Хитрову без ...::[html]Сколько занимает по времени пластика тотального дефекта носа по Хитрову без учета коррегирующих операций\:{
~3 недели
~2 месяца
~4 месяца
=6 месяцев
}

// question: 4157673 name: Сколько этапов при пластике губы по Аббе:
::Сколько этапов при пластике губы по Аббе\:::[html]Сколько этапов при пластике губы по Аббе\:{
~1
=2
~3
~3
}

// question: 4151971 name: СКУЛОВУЮ КОСТЬ ФИКСИРУЮТ
::СКУЛОВУЮ КОСТЬ ФИКСИРУЮТ::[html]СКУЛОВУЮ КОСТЬ ФИКСИРУЮТ{
=минипластинами
~винтами
~проволочной лигатурой
~брекетами
}

// question: 4151983 name: СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
=не удаляется
~удаляется частично, в области дна
~удаляется полностью
~удаляется частично, в области медиальной стенки носа
}

// question: 4152330 name: Слюнокаменная болезнь чаще встречается в:
::Слюнокаменная болезнь чаще встречается в\:::[html]Слюнокаменная болезнь чаще встречается в\:{
	~малые слюнные железы
	~Стенонов канал
	~околоушная слюнная железа
	~подъязычная железа
	=Вартонов канал, подчелюстная железа.
}

// question: 4151844 name: СМЕЩЕНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ
::СМЕЩЕНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ::[html]СМЕЩЕНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СКУЛОВОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ{
	=вниз
	~вверх
	~кпереди
	~кзади
}

// question: 4151768 name: СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ДЕСЕН
::СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ДЕСЕН::[html]СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОМАТОЗА ДЕСЕН{
	=иссечение пораженных участков
	~диатермокоагуляция очагов поражения
	~изготовление эластичной капы, завышающей прикус
	~закрытый кюретаж
}

// question: 4157669 name: Способ пластики дефекта кожной части перегородки носа:
::Способ пластики дефекта кожной части перегородки носа\:::[html]Способ пластики дефекта кожной части перегородки носа\:{
	=По Рауэру
	~По Суслову
	~Лоскутом на микроанастомозе
	~Лоскутом на ножке с губо-щечной складки
	~Артеризированным лоскутом височной области
}

// question: 4157668 name: Способ пластики частичного дефекта концевого отдела носа:
::Способ пластики частичного дефекта концевого отдела носа\:::[html]Способ пластики частичного дефекта концевого отдела носа\:{
	~По Рауэру
	~По Суслову
	~Лоскутом на микроанастомозе
	=Лоскутом на ножке с губо-щечной складки
	~Артеризированным лоскутом височной области
}

// question: 4157667 name: Способ пластики частичного дефекта крыла носа:
::Способ пластики частичного дефекта крыла носа\:::[html]Способ пластики частичного дефекта крыла носа\:{
	~По Рауэру
	=По Суслову
	~Лоскутом на микроанастомозе
	~Артеризированным лоскутом височной области
}

// question: 4151918 name: СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ СКУЛОВОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ...
::СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ СКУЛОВОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ...::[html]СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ СКУЛОВОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ЗАСТАРЕЛОГО ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ{
	=контурная пластика
	~остеотомия скуловой кости
	~радикальная гайморотомия
	~репозиция отломков
}

// question: 4151739 name: СПОСОБНОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИМПЛАНТАЦИИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ
::СПОСОБНОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИМПЛАНТАЦИИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ::[html]СПОСОБНОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИМПЛАНТАЦИИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ{
	=злокачественных опухолей
	~опухолеподобных заболеваний
	~доброкачественных опухолей
	~любых опухолей
}

// question: 4175072 name: Способностью к спонтанной регрессии у детей обладает

::Способностью к спонтанной регрессии у детей обладает::[html]Способностью к спонтанной регрессии у детей обладает{
	=Гемангиома
	~лимфангиома
	~липома
	~Фиброма
	~Остеома
}

// question: 4152465 name: Среди переломов среднего этажа (верхней челюсти) чаще встречаются:
::Среди переломов среднего этажа (верхней челюсти) чаще встречаются\:::[html]Среди переломов среднего этажа (верхней челюсти) чаще встречаются\:{
	~Переломы альвеолярного отростка
	=Горизонтальный нижний перелом (Le For I)
	~Горизонтальный средний перелом (Le For II)
	~Высокий горизонтальный перелом (Le For III)
	~Вертикальный черепно лицевой перелом.
}

// question: 4152425 name: Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям ...
::Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям ...::[html]Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям нижнечелюстного сустава, с возникновением вторичных вывихов, отмечаем\:{
	=Постэнцефалитические миоклонические изменения
	~Полиревматизм
	~Переломы суставной головки в анамнезе
}

// question: 4152426 name: Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям ...
::Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям ...::[html]Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям нижнечелюстного сустава, с возникновением вторичных вывихов, отмечаем\:{
	~Полиревматизм
	~Переломы суставной головки в анамнезе
	=Окклюзионно артикулярная дисгармония
}

// question: 4152427 name: Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям ...

::Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям ...::[html]Среди причин, которые приводят к морфофункциональным изменениям нижнечелюстного сустава, с возникновением вторичных вывихов, отмечаем\:{
	~Полиревматизм
	=Атрофия жевательных мышц вследствие полиомиелита
	~Переломы суставной головки в анамнезе
}

// question: 4175060 name: Срединная киста представляет собой:
::Срединная киста представляет собой\:::[html]Срединная киста представляет собой\:{
	~злокачественное новообразование
	~воспаление шейного лимфоузла
	~опухоль мягких тканей
	~воспаление мягких тканей
	=рудимент жаберных дуг
}

// question: 4151887 name: СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МАКРОГНАТИЕЙ
::СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МАКРОГНАТИЕЙ::[html]СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МАКРОГНАТИЕЙ{
	=увеличена
	~уменьшена
	~деформирована
	~несимметрична
}

// question: 4151886 name: СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИЕЙ
::СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИЕЙ::[html]СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИЕЙ{
	=уменьшена
	~деформирована
	~увеличена
	~не изменена
}

// question: 4151888 name: СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИЕЙ
::СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИЕЙ::[html]СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИЕЙ{
	=уплощена
	~уменьшена

~увеличена
~несимметрична
}

// question: 4151967 name: СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ОБУСЛОВЛЕНЫ
::СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ОБУСЛОВЛЕНЫ::[html]СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ОБУСЛОВЛЕНЫ{
=завершением образования костной мозоли
~завершением формирования рубцов
~завершением формирования сосудов
~восстановлением иннервации
}

// question: 4157655 name: Сроки проведения вторичной костной пластики после основной операции:
::Сроки проведения вторичной костной пластики после основной операции\:::[html]Сроки проведения вторичной костной пластики после основной операции\:{
~12 дней
~1-2 месяца
~2-3 месяца
=6-8 месяцев
}

// question: 4152006 name: СРОЧНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ...
::СРОЧНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ...::[html]СРОЧНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
=первичной хирургической обработке раны, временной или окончательной иммобилизации переломов костей лица
~лечении осложнений воспалительного характера
~иммобилизации переломов костей лица
~остановке кровотечения, улучшения функции внешнего дыхания
}

// question: 4175094 name: Стадию злокачественных опухолей ставят на основании:
::Стадию злокачественных опухолей ставят на основании\:::[html]Стадию злокачественных опухолей ставят на основании\:{
~жалоб больного
~жалоб больного и анамнеза заболевания
~объема поражения на рентген картине

=размеров опухоли, наличия региональных и отдаленных метастазов
~все ответы верны
}

// question: 4152029 name: СТИМУЛИРУЕТ ЭПИТЕЛИЗАЦИЮ РАНЫ
::СТИМУЛИРУЕТ ЭПИТЕЛИЗАЦИЮ РАНЫ::[html]СТИМУЛИРУЕТ ЭПИТЕЛИЗАЦИЮ РАНЫ{
=солкосерил
~коргликон
~эмульсия синтомицина
~триметилдифтор параамин
}

// question: 4152582 name: Суммарная очаговая доза при лучевом лечении больных со злокачественными ...
::Суммарная очаговая доза при лучевом лечении больных со злокачественными ...::[html]Суммарная очаговая доза при лучевом лечении больных со злокачественными опухолями лица и органов полости рта составляет\:{
~20 гр
=40 гр
~60 гр
~100 гр
~200 гр
}

// question: 4174940 name: Суставная щель не прослеживается при:
::Суставная щель не прослеживается при\:::[html]Суставная щель не прослеживается при\:{
~хроническом артрите
~артрозах
~фиброзном анкилозе
=костном анкилозе
}

// question: 4151860 name: СУСТАВНОЙ ШУМ – РАННИЙ ПРИЗНАК
::СУСТАВНОЙ ШУМ – РАННИЙ ПРИЗНАК::[html]СУСТАВНОЙ ШУМ – РАННИЙ ПРИЗНАК{
=артроза
~артрита
~мастоидита
~вывиха
}

// question: 4152095 name: Тактика лечения острого одонтогенного остеомиелита:

::Тактика лечения острого одонтогенного остеомиелита\:::[html]Тактика лечения острого одонтогенного остеомиелита\:{
	= удалить зуб, уменьшить "напряжение" тканей и дренировать очаги воспаления, назначить противовоспалительное лечение
	~ предупредить развитие инфекции и образование некроза
	~ снизить сосудистую проницаемость, сохранить зуб
	~ уменьшить общую интоксикацию организма, секвестрэктомия
	~ провести симптоматическое лечение.
}

// question: 4175035 name: Твердая фиброма кожи состоит из:
::Твердая фиброма кожи состоит из\:::[html]Твердая фиброма кожи состоит из\:{
	=веретенообразных клеток типа фибробластов или фиброцитов и большого количества коллагеновых волокон
	~волокнистой соединительной и жировой ткани
	~волокнистой соединительной и сосудистой ткани
	~коллагеновых волокон, фибробластов, фиброцитов и гистиоцитов
}

// question: 4151682 name: Термин «Blow-out» перелом свидетельствует о нарушении:
::Термин «Blow-out» перелом свидетельствует о нарушении\:::[html]Термин «Blow-out» перелом свидетельствует о нарушении\:{
	=целостности нижней стенки орбиты без нарушения целостности нижнеглазничного края
	~целостности нижней стенки орбиты с нарушением целостности нижнеглазничного края
	~целостности нижней стенки орбиты без учета состояния целостности нижнеглазничного края
}

// question: 4151726 name: ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА
::ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА::[html]ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОСТИНЬЕКЦИОННОГО АБСЦЕССА{
	=крыловидно-нижнечелюстное пространство
	~поднижнечелюстной треугольник
	~окологлоточное пространство
	~подглазничная область
}

// question: 4152225 name: Типичные причины флегмоны глазницы:
::Типичные причины флегмоны глазницы\:::[html]Типичные причины флегмоны глазницы\:{

~ флегмона мягких тканей дна полости рта
~ флегмона височной области
~ флегмона окологлоточного пространства
=тромбофлебит угловой вены
}

// question: 4152226 name: Типичные причины флегмоны глазницы:
::Типичные причины флегмоны глазницы\:::[html]Типичные причины флегмоны глазницы\:{
~ флегмона мягких тканей дна полости рта
~ флегмона височной области
~ флегмона окологлоточного пространства
=острый гнойный гайморит или обострение хронического гайморита.
}

// question: 4151650 name: Титановые минипластины к костным фрагментам челюстей фиксируют:
::Титановые минипластины к костным фрагментам челюстей фиксируют\:::[html]Титановые минипластины к костным фрагментам челюстей фиксируют\:{
~спицей
=винтами
~проволочной лигатурой
~титановыми скобами
}

// question: 4152476 name: Травматический остеомиелит чаще развивается после переломов:
::Травматический остеомиелит чаще развивается после переломов\:::[html]Травматический остеомиелит чаще развивается после переломов\:{
=При переломах нижней челюсти в пределах зубной дуги
~При переломах верхней челюсти
~При переломе пирамиды носа
~Скуловой кости и скуловой дуги
~При переломах нижней челюсти в пределах ветви нижней челюсти.
}

// question: 4175042 name: Трихофолликулома - это:
::Трихофолликулома - это\:::[html]Трихофолликулома - это\:{
~доброкачественное новообразование, которое развивается из волосяных фолликулов и содержащее железистые кисты
=доброкачественная опухоль волосяных фолликулов, состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов

~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
~доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
}

// question: 4175041 name: Трихоэпителиома - это:
::Трихоэпителиома - это\:::[html]Трихоэпителиома - это\:{
~доброкачественное новообразование, которое развивается из волосяных фолликулов и содержащее железистые кисты
=доброкачественная опухоль волосяных фолликулов, состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов
~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
~доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
}

// question: 4151755 name: ТРОМБОФЛЕБИТ V. ANGULARIS ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ...
::ТРОМБОФЛЕБИТ V. ANGULARIS ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ...::[html]ТРОМБОФЛЕБИТ V. ANGULARIS ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ФУРУНКУЛА В ОБЛАСТИ{
=верхней губы
~нижней губы
~височной
~подбородка
}

// question: 4151684 name: У больного в результате травмы отмечаются подвижность костей носа, ...
::У больного в результате травмы отмечаются подвижность костей носа, ...::[html]У больного в результате травмы отмечаются подвижность костей носа, припухлость мягких тканей левой скуловой области, кровоизлияние в склеру глаз, симптом ступеньки по нижнеглазничному краю с обеих сторон. Каков наиболее вероятный диагноз?{
~Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор I
=Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор II
~Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор III
~Перелом костей носа
}

// question: 4175025 name: У больного имеется на слизистой оболочке щек бляшки белого цвета, которые не ...
::У больного имеется на слизистой оболочке щек бляшки белого цвета, которые не ...::[html]У больного имеется на слизистой оболочке щек бляшки белого цвета, которые не выступают над уровнем слизистой оболочки, четких границ нет. На фоне бляшек видны углубления красного цвета. Это описание какого вида лейкоплакий\:{
	=Таппейнера
	~Простой
	~плоской
	~эрозивно-язвенной
}

// question: 4175026 name: У больного на слизистой оболочке щек имеются плоские элементы, которые ...
::У больного на слизистой оболочке щек имеются плоские элементы, которые ...::[html]У больного на слизистой оболочке щек имеются плоские элементы, которые напоминают участки ожога с четкими границами, бело-серого цвета, который не снимается при интенсивном поскабливании. Какой вид лейкоплакии описан на данном примере\:{
	~Таппейнера
	=простая
	~эрозивно-язвенная
	~Веррукозная
}

// question: 4175027 name: У молодого человека на слизистой оболочке щеки на фоне участка возвышения ...
::У молодого человека на слизистой оболочке щеки на фоне участка возвышения ...::[html]У молодого человека на слизистой оболочке щеки на фоне участка возвышения имеется мягкий неснимаемый налет серого цвета, форма его мозаичная, очаги разрыхлены и покрыты множеством чешуек. Какой вид лейкоплакии приведен в описании\:{
	~Таппейнера
	~эрозивно-язвенная
	~Веррукозная
	=мягкая
}

// question: 4151943 name: УБЫЛЬ ТКАНЕЙ ПРИ НЕРАВНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ
::УБЫЛЬ ТКАНЕЙ ПРИ НЕРАВНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ::[html]УБЫЛЬ ТКАНЕЙ ПРИ НЕРАВНЫХ УГЛАХ ФИГУР ПРОИСХОДИТ{
	=у основания меньшего угла
	~у основания большего угла
	~у вершины большего угла

~у вершины малого угла
}

// question: 4151773 name: УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛЯРНЫХ РАЗРАСТАНИЙ (ОЧАГОВ ПАПИЛЛОМАТОЗА. НА ТВЕРДОМ НЕБЕ ...
::УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛЯРНЫХ РАЗРАСТАНИЙ (ОЧАГОВ ПАПИЛЛОМАТОЗА. НА ТВЕРДОМ НЕБЕ ...::[html]УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛЯРНЫХ РАЗРАСТАНИЙ (ОЧАГОВ ПАПИЛЛОМАТОЗА. НА ТВЕРДОМ НЕБЕ ПРОВОДЯТ ПРИ ПОМОЩИ{
=электрохирургической петли
~жидкого азота
~гелий-неонового лазера
~кровоостанавливающего зажима
}

// question: 4151786 name: УДЛИНЕНИЕ И УПЛОЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЕРЕЛОМЕ
::УДЛИНЕНИЕ И УПЛОЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЕРЕЛОМЕ::[html]УДЛИНЕНИЕ И УПЛОЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЕРЕЛОМЕ{
=суббазальном верхней челюсти
~нижней челюсти
~суборбитальном верхней челюсти
~альвеолярного отростка верхней челюсти
}

// question: 4151976 name: УСТРАНЕНИЕ СЕДЛОВИДНОГО НОСА ПОВОДИТСЯ ПУТЕМ
::УСТРАНЕНИЕ СЕДЛОВИДНОГО НОСА ПОВОДИТСЯ ПУТЕМ::[html]УСТРАНЕНИЕ СЕДЛОВИДНОГО НОСА ПОВОДИТСЯ ПУТЕМ{
=введение хрящевого трансплантата
~сшивания четырехугольных хрящей
~введение костного трансплантата
~сшивания крыльных хрящей
}

// question: 4152189 name: Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...
::Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...::[html]Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной флегмоне (половины лица)\:{
~Кожные покровы гиперемированы
~Кожные покровы сероватого цвета
=Все ответы верны
}

// question: 4152190 name: Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...
::Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...::[html]Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной флегмоне (половины лица)\:{
	~Твердый инфильтрат при пальпации
	~Флюктуация при пальпации.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152191 name: Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...
::Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...::[html]Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной флегмоне (половины лица)\:{
	~Кожные покровы гиперемированы
	~Флюктуация при пальпации.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152192 name: Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...
::Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной ...::[html]Уточните какой из нижеперечисленных симптомов встречается при гемифациальной флегмоне (половины лица)\:{
	~Твердый инфильтрат при пальпации
	~Флюктуация при пальпации.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152389 name: Уточните, в какой из этих ситуаций, как правило необходимо удаление зуба:
::Уточните, в какой из этих ситуаций, как правило необходимо удаление зуба\:::[html]Уточните, в какой из этих ситуаций, как правило необходимо удаление зуба\:{
	~Частичный вывих зуба
	~Полный перелом коронки
	=Перелом коронки и корня
	~Неполный перелом коронки
	~Пародонтальная контузия.
}

// question: 4152437 name: Уточните, при каких травмах лицевого скелета черепа возможны травмы основания...
::Уточните, при каких травмах лицевого скелета черепа возможны травмы основания...::[html]Уточните, при каких травмах лицевого скелета черепа возможны травмы основания черепа\:{
	~Переломы нижней челюсти
	~Рваная рана с переломом скуловой дуги
	=Переломы средней трети лица
	~Травма носа
	~Двухсторонний перелом суставного отростка.
}

// question: 4151685 name: Ушная ликворея – признак передлома основания черепа и сопровождается ...
::Ушная ликворея – признак передлома основания черепа и сопровождается ...::[html]Ушная ликворея – признак передлома основания черепа и сопровождается истечением ликвора через дефект твердой мозговой оболочки в области\:{
	~Клиновидной кости
	=Пирамиды височной кости
	~Пластинки решетчатой кости
	~Теменной кости
}

// question: 4151708 name: ФИБРОЗНУЮ ГИПЕРПЛАЗИЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ...
::ФИБРОЗНУЮ ГИПЕРПЛАЗИЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ...::[html]ФИБРОЗНУЮ ГИПЕРПЛАЗИЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С{
	=эпителиальной злокачественной опухолью
	~травматической язвой
	~папилломой
	~эпулидом
}

// question: 4175071 name: Фиброматоз десен характеризуется:
::Фиброматоз десен характеризуется\:::[html]Фиброматоз десен характеризуется\:{
	~ограниченным участком ороговения
	=диффузное разрастание десен и их сосочков
	~эрозиями десны, без тенденции к кровоточивости
	~рыхлым безболезненным кровоточащим образованием десны
	~плотным кровоточащим образованием на широкой ножке
}

// question: 4151984 name: ФИКСАЦИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ПРОВОДИТСЯ В ОБЛАСТИ
::ФИКСАЦИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ПРОВОДИТСЯ В ОБЛАСТИ::[html]ФИКСАЦИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ПРОВОДИТСЯ В ОБЛАСТИ{
	=скулоальвеолярного гребня и грушевидного отверстия
	~скулоальвеолярного гребня с двух сторон
	~скулоальвеолярного гребня и бугров с двух сторон
	~бугров
}

// question: 4151758 name: ФИКСАЦИЯ ОТЛОМКОВ ПО ДОНСКОМУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ...
::ФИКСАЦИЯ ОТЛОМКОВ ПО ДОНСКОМУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ...::[html]ФИКСАЦИЯ ОТЛОМКОВ ПО ДОНСКОМУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В{
	=области угла со смещением ветви
	~пределах зубного ряда
	~центральном отделе
	~области альвеолярного отростка
}

// question: 4151973 name: ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
::ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ::[html]ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ{
	=заклиниванием между отломками
	~коллодийной повязкой
	~пластмассовым вкладышем
	~тампоном, пропитанным йодоформом
}

// question: 4152005 name: ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
::ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ::[html]ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ КРЮЧКОМ ЛИМБЕРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ{
	=заклиниванием между отломками
	~наружными швами
	~пластмассовым вкладышем
	~тампоном, пропитанным йодоформом
}

// question: 4151972 name: ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ ЭЛЕВАТОРОМ КАРАПЕТЯНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
::ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ ЭЛЕВАТОРОМ КАРАПЕТЯНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ::[html]ФИКСАЦИЯ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕПОЗИЦИИ ЭЛЕВАТОРОМ КАРАПЕТЯНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ{
	=тампоном, пропитанным йодоформом
	~коллодийной повязкой
	~пластмассовым вкладышем
	~наружными швами
}

// question: 4152103 name: Флегмона характеризуется:
::Флегмона характеризуется\:::[html]Флегмона характеризуется\:{
	~диффузной инфильтрацией тканей
	~уплотнением, гиперимией, отечностью, болезненостью
	~содержание экссудата с нейтрофилами, бактериями, некротическими остатками
	=Все ответы верны
}

// question: 4152104 name: Флегмона характеризуется:
::Флегмона характеризуется\:::[html]Флегмона характеризуется\:{
	~содержание экссудата с нейтрофилами, бактериями, некротическими остатками
	~вызвана агрессивной стрептококковой инфекцией
	~местная и общая защитная реакция снижена.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152105 name: Флегмона характеризуется:
::Флегмона характеризуется\:::[html]Флегмона характеризуется\:{
	~диффузной инфильтрацией тканей
	~вызвана агрессивной стрептококковой инфекцией
	~местная и общая защитная реакция снижена.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152106 name: Флегмона характеризуется:
::Флегмона характеризуется\:::[html]Флегмона характеризуется\:{
	~диффузной инфильтрацией тканей
	~уплотнением, гиперимией, отечностью, болезненостью

~местная и общая защитная реакция снижена
=Все ответы верны
}

// question: 4152107 name: Флегмона характеризуется:
::Флегмона характеризуется\:::[html]Флегмона характеризуется\:{
~уплотнением, гиперимией, отечностью, болезненостью
~содержание экссудата с нейтрофилами, бактериями, некротическими остатками
~вызвана агрессивной стрептококковой инфекцией
=Все ответы верны
}

// question: 4152102 name: Флегмона это:
::Флегмона это\:::[html]Флегмона это\:{
~это гнойное локализованное воспаление
=это гнойное диффузное воспаление
~инкапсулированное образование
~процесс с серозной инфильтрацией
~процесс с фиброзной инфильтрацией.
}

// question: 4151749 name: ФОКУС ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В
::ФОКУС ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В::[html]ФОКУС ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В{
=межмышечной клетчатке
~надкостнице
~коже
~мышечной ткани
}

// question: 4175043 name: Фолликулярная кератома - это:
::Фолликулярная кератома - это\:::[html]Фолликулярная кератома - это\:{
~доброкачественное новообразование, которое развивается из волосяных фолликулов и содержащее железистые кисты
~доброкачественная опухоль волосяных фолликулов, состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов
=доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
~доброкачественная опухоль, возникающая из эпителия сальных желез и сохраняющая структурное сходство с исходной железой
}

```
// question: 4151698  name: ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА В СВОЕЙ ПОЛОСТИ СОДЕРЖИТ
::ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА В СВОЕЙ ПОЛОСТИ СОДЕРЖИТ::[html]ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ
КИСТА В СВОЕЙ ПОЛОСТИ СОДЕРЖИТ{
        =не полностью сформированный зуб
        ~полностью сформированный зуб
        ~верхушку или часть корня зуба
        ~корни нескольких зубов
}


// question: 4151815  name: ФОРМА АНКИЛОЗА ВНЧС
::ФОРМА АНКИЛОЗА ВНЧС::[html]ФОРМА АНКИЛОЗА ВНЧС{
        =фиброзный
        ~гнойный
        ~слипчивый
        ~катаральный
}


// question: 4151816  name: ФОРМА АНКИЛОЗА ВНЧС
::ФОРМА АНКИЛОЗА ВНЧС::[html]ФОРМА АНКИЛОЗА ВНЧС{
        =костный
        ~гнойный
        ~слипчивый
        ~катаральный
}


// question: 4174970  name: Форма анкилоза ВНЧС:
::Форма анкилоза ВНЧС\:::[html]Форма анкилоза ВНЧС\:{
        =фиброзный
        ~катаральный
        ~атрофический
        ~слизистый
}


// question: 4174971  name: Форма анкилоза ВНЧС:
::Форма анкилоза ВНЧС\:::[html]Форма анкилоза ВНЧС\:{
        ~слизистый
        ~катаральный
        ~атрофический
        =костный
}
```

// question: 4151696 name: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АБСЦЕССЕ ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМОК
::ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АБСЦЕССЕ ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМОК::[html]ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АБСЦЕССЕ ПОДВИСОЧНОЙ И КРЫЛОВИДНО-НЕБНОЙ ЯМОК{
	=умеренное ограничение открывания рта из-за воспалительной контрактуры мышц
	~выраженное ограничение открывания рта из-за рубцовой контрактуры мышц
	~нарушение зрения из-за отека век на стороне заболевания
	~нарушение жевания и речи из-за боли
}

// question: 4152138 name: Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются:
::Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются\:::[html]Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются\:{
	=Дисфагия
	~Выраженный тризм
	~Диплопия (двоение перед глазами).
}

// question: 4152139 name: Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются:
::Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются\:::[html]Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются\:{
	=Нарушения речи и жевания
	~Выраженный тризм
	~Диплопия (двоение перед глазами).
}

// question: 4152140 name: Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются:
::Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются\:::[html]Функциональные нарушения при подъязычном абсцессе проявляются\:{
	=Движения языка болезненные
	~Выраженный тризм
	~Диплопия (двоение перед глазами).
}

// question: 4152265 name: Фурункул какой локализации осложняется тромбофлебитом угловой вены лица ...
::Фурункул какой локализации осложняется тромбофлебитом угловой вены лица ...::[html]Фурункул какой локализации осложняется тромбофлебитом угловой вены лица наиболее часто?\:{
	= верхней губы
	~ периорбитальной области
	~ нижней губы, подбородка
	~ щеки, околоушно жевательной области
}

// question: 4152266 name: Фурункул какой локализации осложняется тромбофлебитом угловой вены лица ...
::Фурункул какой локализации осложняется тромбофлебитом угловой вены лица ...::[html]Фурункул какой локализации осложняется тромбофлебитом угловой вены лица наиболее часто?\:{
	~ периорбитальной области
	~ нижней губы, подбородка
	~ щеки, околоушно жевательной области
	= угла рта, подглазничной области.
}

// question: 4151752 name: ФУРУНКУЛ ЩЕКИ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ ТРОМБОФЛЕБИТОМ ВЕНЫ
::ФУРУНКУЛ ЩЕКИ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ ТРОМБОФЛЕБИТОМ ВЕНЫ::[html]ФУРУНКУЛ ЩЕКИ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ ТРОМБОФЛЕБИТОМ ВЕНЫ{
	=угловой
	~яремной
	~поверхностной височной
	~носолобной
}

// question: 4152264 name: Фурункул это:
::Фурункул это\:::[html]Фурункул это\:{
	= острое гнойно некротическое воспаление фолликула волоса и окружающей ткани
	~ острое гнойно некротическое воспаление нескольких, расположенных рядом, волосяных фолликулов
	~ воспаление сальной железы
	~ воспаление слёзной железы
	~ воспаление потовыводящей железы.
}

// question: 4152270 name: Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...
::Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...::[html]Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, локализованные в области богатой кровеносными и лимфатическими сосудами, часто вызывают грозные осложнения\:{
	~Тромбофлебит вен лица
	~Менингит
	~Тромбоз синусов головного мозга
	=Все ответы верны
}

// question: 4152271 name: Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...
::Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...::[html]Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, локализованные в области богатой кровеносными и лимфатическими сосудами, часто вызывают грозные осложнения\:{
	~Тромбоз синусов головного мозга
	~Сепсис
	~Абсцесс мозга.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152272 name: Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...
::Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...::[html]Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, локализованные в области богатой кровеносными и лимфатическими сосудами, часто вызывают грозные осложнения\:{
	~Тромбофлебит вен лица
	~Сепсис
	~Абсцесс мозга.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152273 name: Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...
::Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...::[html]Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, локализованные в области богатой кровеносными и лимфатическими сосудами, часто вызывают грозные осложнения\:{
	~Тромбофлебит вен лица
	~Менингит

~Абсцесс мозга.
=Все ответы верны
}

// question: 4152274 name: Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...
::Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, ...::[html]Фурункулы верхней губы, носогубного треугольника, подглазничной области, локализованные в области богатой кровеносными и лимфатическими сосудами, часто вызывают грозные осложнения\:{
~Тромбофлебит вен лица
~Тромбоз синусов головного мозга
~Абсцесс мозга.
=Все ответы верны
}

// question: 4152267 name: Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы :
::Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы \:::[html]Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы \:{
=На верхней губе
~В области бровей
~В области лба.
}

// question: 4152268 name: Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы :
::Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы \:::[html]Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы \:{
=На нижней губе
~В области бровей
~В области лба.
}

// question: 4152269 name: Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы :
::Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы \:::[html]Фурункулы на лице очень опасны, особенно если они локализованы \:{
=В области носа
~В области бровей
~В области лба.
}

// question: 4151856 name: ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ОСТРОГО АРТРИТА ВНЧС В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
::ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ОСТРОГО АРТРИТА ВНЧС В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ::[html]ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ОСТРОГО АРТРИТА ВНЧС В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ{
	=боль, ограничение открывания рта
	~тризм жевательных мышц
	~околоушный гипергидроз
	~боль в шейном отделе позвоночника, иррадиирующая в ВНЧС
}

// question: 4151789 name: ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ...
::ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ...::[html]ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=открытый прикус
	~кровотечение из носа
	~разрыв слизистой альвеолярного отростка
	~изменение прикуса моляров со стороны перелома
}

// question: 4151788 name: ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ...
::ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ...::[html]ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома
	~кровотечение из носа
	~разрыв слизистой альвеолярного отростка
	~изменение прикуса моляров со стороны перелома
}

// question: 4175139 name: Характерной морфологической картиной предрака является наличие:
::Характерной морфологической картиной предрака является наличие\:::[html]Характерной морфологической картиной предрака является наличие\:{
	=Гиперхраматоза ядер
	~Обизвествление миоцитов
	~Воспалительного инфильтрата
	~Вторичного казеозного некроза
	~Инвазия в подэпителиальные ткани

}

// question: 4175140 name: Характерной морфологической картиной предрака является наличие:
::Характерной морфологической картиной предрака является наличие\:::[html]Характерной морфологической картиной предрака является наличие\:{
	=Гиперкератоза
	~Обизвествление миоцитов
	~Воспалительного инфильтрата
	~Вторичного казеозного некроза
	~Инвазия в подэпителиальные ткани
}

// question: 4174948 name: Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии:
::Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии\:::[html]Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии\:{
	~контрактура жевательных мышц
	~околоушной гипергидроз
	=боль, ограничение открывания рта
	~боль в шейном отделе позвоночника, иррадиирущая в ВНЧС
}

// question: 4174973 name: Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии:
::Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии\:::[html]Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии\:{
	~тризм жевательных мышц
	~околоушный гипергидроз
	=боль, ограничение открывания рта
	~боль в шейном отделе позвоночника, иррадиирующая в ВНЧС
}

// question: 4175087 name: Характерный рост амелобластом:
::Характерный рост амелобластом\:::[html]Характерный рост амелобластом\:{
	~быстрый и безболезненный
	~быстрый и болезненный
	~медленный и болезненный
	~все ответы верны
	=медленный и безболезненный
}

// question: 4151675 name: Характерным симптомом изолированного перелома скуловой дуги является:
::Характерным симптомом изолированного перелома скуловой дуги является\:::[html]Характерным симптомом изолированного перелома скуловой дуги является\:{
	~Ликворея
	~Диплопия
	=Затруднение открывания рта
	~Парестезия
}

// question: 4151921 name: ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=остеосинтез по Макиенко
	~метод Адамса
	~дуга Энгля
	~наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
}

// question: 4151922 name: ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=лобно-челюстной остеосинтез
	~метод Адамса
	~дуга Энгля
	~наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
}

// question: 4151771 name: ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПОКАЗАННЫЙ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ...
::ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПОКАЗАННЫЙ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ...::[html]ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПОКАЗАННЫЙ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ НАГНОЕНИЕМ КОСТНОЙ РАНЫ{
	=внеочаговый остеосинтез
	~трансочаговый остеосинтез
	~остеосинтез накостными конструкциями
	~внутрикостный шов
}

// question: 4151992 name: ХИРУРГИЧЕСКО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ХИРУРГИЧЕСКО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ХИРУРГИЧЕСКО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=метод Адамса
	~остеосинтез
	~дуга Энгля
	~наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
}

// question: 4152243 name: Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в:
::Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:::[html]Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:{
	~Надгрудиный
	~По Ковтуновичу
	~По Лимбергу
	=Окологрудиный по Маделунгу.
}

// question: 4152244 name: Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в:
::Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:::[html]Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:{
	=В шёйной области по переднему краю грудино ключично сосцевидной мышцы
	~Надгрудиный
	~По Ковтуновичу
	~По Лимбергу
}

// question: 4152245 name: Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в:
::Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:::[html]Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:{
	~Надгрудиный
	=Вертикальный разрез проходящий через грудину (А. Иванов)
	~По Ковтуновичу
	~По Лимбергу
}

// question: 4152246 name: Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в:
::Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:::[html]Хирургическое лечение медиастинитов состоит в проведении разрезов в\:{
	=Трансдиафрагмальная медиастенитотомия (Савин Розинов)
	~По Ковтуновичу
	~По Лимбергу
	~Надгрудинный
}

// question: 4152047 name: Хронические периодонтиты различают:
::Хронические периодонтиты различают\:::[html]Хронические периодонтиты различают\:{
	~серозный
	~ гнойный
	~ фиброзный
	=гранулирующий, фиброзный и гранулематозный
	~ диффузные.
}

// question: 4175046 name: Цилиндрома кожи - это:
::Цилиндрома кожи - это\:::[html]Цилиндрома кожи - это\:{
	~доброкачественное новообразование, которое развивается из волосяных фолликулов и содержащее железистые кисты
	~доброкачественная опухоль волосяных фолликулов, состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов
	~доброкачественная опухоль гистогенетически связанная с воронкой волосяного фолликула
	=доброкачественная опухоль сложного строения, развивающаяся из придатков кожи характеризуется дольчатым строением и содержит полости
}

// question: 4152545 name: Цилиндрома:
::Цилиндрома\:::[html]Цилиндрома\:{
	~доброкачественная опухоль слюнных желез
	=злокачественная опухоль слюнных желез
	~доброкачественная опухоль слюнных желез с большим потенциалом озлокачествления
	~неинкапсулированная
}

// question: 4152546 name: Цилиндрома:
::Цилиндрома\:::[html]Цилиндрома\:{

~доброкачественная опухоль слюнных желез
~доброкачественная опухоль слюнных желез с большим потенциалом озлокачествления
=инкапсулированная
~неинкапсулированная
}

// question: 4151702 name: ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ НАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЕ ::ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ НАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ НАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЕ{
=клеточного состава опухоли, полученного при пункции
~небольшой опухоли
~распространенности опухоли
~участка ткани опухоли
}

// question: 4152404 name: Чаще всего переломы нижней челюсти происходят вследствие:
::Чаще всего переломы нижней челюсти происходят вследствие\:::[html]Чаще всего переломы нижней челюсти происходят вследствие\:{
~Падений на улице
~Дорожных происшествий
~Спортивных травм
~Трудовых травм
=Человеческой агрессии.
}

// question: 4152500 name: Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа:
::Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа\:::[html]Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа\:{
=Травма хряща
~Перелом Le Fort II
~Перелом Le Fort III
}

// question: 4152501 name: Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа:
::Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа\:::[html]Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа\:{
~Перелом Le Fort II
~Перелом Le Fort III
=Перелом костного скелета пирамиды носа (открытый)

}

// question: 4152502 name: Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа:
::Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа\:::[html]Чаще встречаются следующие разновидности травм пирамиды носа\:{
	~Перелом Le Fort II
	~Перелом Le Fort III
	=Перелом костного скелета пирамиды носа (закрытый)
}

// question: 4151688 name: ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНЫЙ ЖЕЛОБОК ПОДЪЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА НАХОДИТСЯ
::ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНЫЙ ЖЕЛОБОК ПОДЪЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА НАХОДИТСЯ::[html]ЧЕЛЮСТНО-ЯЗЫЧНЫЙ ЖЕЛОБОК ПОДЪЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА НАХОДИТСЯ{
	=в заднебоковом отделе подъязычной области
	~на уровне резцов нижней челюсти и кончика языка
	~между выводными протоками поднижнечелюстной слюнной железы
	~между корнем языка и крыловидно-нижнечелюстной складкой
}

// question: 4151663 name: Чем в основном обусловлена интенсивность кровотечения при переломе верхней ...
::Чем в основном обусловлена интенсивность кровотечения при переломе верхней ...::[html]Чем в основном обусловлена интенсивность кровотечения при переломе верхней челюсти по типу Ле Фор 3\:{
	=повреждением артерий проходящих в решетчатой кости
	~разрывом слизистой оболочки верхнечелюстных пазух
	~разрывом лицевой артерии
	~повреждением капилляров слизистой оболочки носа.
}

// question: 4157622 name: Чем выполняется закрытие раневой поверхности донорского участка при ...
::Чем выполняется закрытие раневой поверхности донорского участка при ...::[html]Чем выполняется закрытие раневой поверхности донорского участка при формировании Филатовского стебля\:{
	~Свободным кожным лоскутом
	~Ушиванием раны на себя
	~Лоскутами на микрососудистом анастамозе
	=Сформированными треугольными лоскутами
}

// question: 4157623 name: Чем выполняется закрытие раневой поверхности донорского участка при ...
::Чем выполняется закрытие раневой поверхности донорского участка при ...::[html]Чем выполняется закрытие раневой поверхности донорского участка при формировании Филатовского стебля\:{
	~Свободным кожным лоскутом
	~Лоскутами на микрососудистом анастамозе
	~Ушиванием раны на себя
	=Разгрузочными швами
}

// question: 4151741 name: ЧЕМ ВЫШЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК, ТЕМ
::ЧЕМ ВЫШЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК, ТЕМ::[html]ЧЕМ ВЫШЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК, ТЕМ{
	=медленнее она растет
	~быстрее она растет
	~быстрее она метастазирует
	~медленнее она изъязвляется
}

// question: 4151680 name: Чем может быть обусловлено наличие подкожной крепитации у пациентов с ...
::Чем может быть обусловлено наличие подкожной крепитации у пациентов с ...::[html]Чем может быть обусловлено наличие подкожной крепитации у пациентов с переломами верхней челюсти\:{
	~размерами костных фрагментов
	~травмой гортани
	~развитием воспалительного процесса в верхнечелюстных синусах
	=нарушением целостности слизистой оболочки верхнечелюстных синусов и носа
}

// question: 4151686 name: Чем может осложниться черепно-мозговая травма?
::Чем может осложниться черепно-мозговая травма?::[html]Чем может осложниться черепно-мозговая травма?{
	~Все варианты - верны
	=Переломом основания черепа
	~Пневмотораксом
}

// question: 4157656 name: Чем обусловлены сроки выполнения вторичной костной пластики после основной ...
::Чем обусловлены сроки выполнения вторичной костной пластики после основной ...::[html]Чем обусловлены сроки выполнения вторичной костной пластики после основной операции\:{
	~Завершением образования костной мозоли
	~Завершением формирования сосудов
	~Восстановлением иннервации
	=Завершением формирования рубцов
}

// question: 4157683 name: Чем осуществляется фиксация лоскутов при пластике верхней губы:
::Чем осуществляется фиксация лоскутов при пластике верхней губы\:::[html]Чем осуществляется фиксация лоскутов при пластике верхней губы\:{
	=Узловые швы
	~Непрерывный шов
	~Гипсовая повязка
	~Коллоидная повязка
}

// question: 4151916 name: ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ДЕФОРМАЦИЮ КОСТЕЙ НОСА УСТРАНЯЮТ
::ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ДЕФОРМАЦИЮ КОСТЕЙ НОСА УСТРАНЯЮТ::[html]ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ДЕФОРМАЦИЮ КОСТЕЙ НОСА УСТРАНЯЮТ{
	=остеотомией костей носа
	~мануальным вправлением
	~тампонадой носа
	~наложением повязки из коллодия
}

// question: 4151917 name: ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ДЕФОРМАЦИЮ КОСТЕЙ НОСА УСТРАНЯЮТ
::ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ДЕФОРМАЦИЮ КОСТЕЙ НОСА УСТРАНЯЮТ::[html]ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ДЕФОРМАЦИЮ КОСТЕЙ НОСА УСТРАНЯЮТ{
	=контурной пластикой
	~мануальным вправлением
	~тампонадой носа
	~наложением повязки из коллодия
}

// question: 4151681 name: Через какое время с момента получения травмы возникает симптом «очков»:

::Через какое время с момента получения травмы возникает симптом «очков»\:::[html]Через какое время с момента получения травмы возникает симптом «очков»\:{
	~непосредственно сразу после травмы
	=в течение 12-24 часов
	~через несколько суток
}

// question: 4152360 name: ЧЛО делятся на три основных этажа:
::ЧЛО делятся на три основных этажа\:::[html]ЧЛО делятся на три основных этажа\:{
	=Верхний
	~Боковой
	~Задний.
}

// question: 4152361 name: ЧЛО делятся на три основных этажа:
::ЧЛО делятся на три основных этажа\:::[html]ЧЛО делятся на три основных этажа\:{
	=Средний
	~Боковой
	~Задний.
}

// question: 4152362 name: ЧЛО делятся на три основных этажа:
::ЧЛО делятся на три основных этажа\:::[html]ЧЛО делятся на три основных этажа\:{
	=Нижний
	~Боковой
	~Задний
}

// question: 4151664 name: Что относится к переломам средней зоны лица:
::Что относится к переломам средней зоны лица\:::[html]Что относится к переломам средней зоны лица\:{
	~Перелом венечного отростка
	~Перелом мыщелкового отростка
	=Назоорбитоэтмоидальный перелом
	~перелом альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 4151665 name: Что относится к переломам средней зоны лица:
::Что относится к переломам средней зоны лица\:::[html]Что относится к переломам средней зоны лица\:{
	~Перелом венечного отростка

~Перелом мыщелкового отростка
=Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор 1
~Перелом наружной стенки фронтального синуса.
}

// question: 4175079 name: Что просиходит с зубами в пределах остеокластомы и ряда других опухолей:
::Что просиходит с зубами в пределах остеокластомы и ряда других опухолей\:::[html]Что просиходит с зубами в пределах остеокластомы и ряда других опухолей\:{
~многочисленные кариозные поражения
~стираемость коронковых частей
=патологическая подвижность
~оголение пришеечной части
~некариозные поражения
}

// question: 4151667 name: Что свидетельствует о переломе основания черепа:
::Что свидетельствует о переломе основания черепа\:::[html]Что свидетельствует о переломе основания черепа\:{
=Ликворея
~Подвижность альвеолярного отростка верхней челюсти
~наличие экзофтальма
~симптом Герена
}

// question: 4151658 name: Что характерно для переломов верхней челюсти:
::Что характерно для переломов верхней челюсти\:::[html]Что характерно для переломов верхней челюсти\:{
=ликворея
~нарушение открывания рта
~«щелчки» и «хруст» при открывании рта
~нарушение слуха
}

// question: 4151659 name: Что характерно для переломов верхней челюсти:
::Что характерно для переломов верхней челюсти\:::[html]Что характерно для переломов верхней челюсти\:{
=параорбитальные гематомы
~нарушение открывания рта
~«щелчки» и «хруст» при открывании рта
~расстройство вкусовой чувствительности
}

// question: 4151660 name: Что характерно для переломов верхней челюсти:
::Что характерно для переломов верхней челюсти\:::[html]Что характерно для переломов верхней челюсти\:{
	=симптом ступеньки
	~невозможность открывания рта
	~«щелчки» и «хруст» при открывании рта
	~нарушение слуха
}

// question: 4175102 name: Что является источником развития мукоэпидермоидной опухоли слюнных желез?
::Что является источником развития мукоэпидермоидной опухоли слюнных желез?::[html]Что является источником развития мукоэпидермоидной опухоли слюнных желез?{
	=Эпителий выводных протоков
	~Строма выводных протоков
	~Сосуды, находящиеся в железе
	~Нервы, находящиеся в железе
	~Все ранее перечисленное
}

// question: 4152015 name: ШВЫ В ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СНИМАЮТСЯ
::ШВЫ В ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СНИМАЮТСЯ::[html]ШВЫ В ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СНИМАЮТСЯ{
	=7-10 сутки
	~2-3 сутки
	~3-5 сутки
	~12-15 сутки
}

// question: 4151765 name: ШИНА ПОРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
::ШИНА ПОРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ::[html]ШИНА ПОРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ{
	=при полном отсутствии зубов
	~при частичной адентии
	~с дефектом кости
	~с переломом корней зубов
}

// question: 4152017 name: ЭКСТРЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ...
::ЭКСТРЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ...::[html]ЭКСТРЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В{
	=остановке кровотечения, улучшения функции внешнего дыхания
	~лечении осложнений воспалительного характера, окончательной иммобилизации переломов костей лица
	~первичной хирургической обработке раны
	~временной или окончательной иммобилизации переломов костей лица
}

// question: 4175081 name: Эозонофильную гранулему диффернецируют с:
::Эозонофильную гранулему диффернецируют с\:::[html]Эозонофильную гранулему диффернецируют с\:{
	=саркомой Юинга
	~остеомой
	~периоститом
	~сосудистыми опухолями
	~остеомиелитом челюстей
}

// question: 4175019 name: Эритроплазия Кейра - это:
::Эритроплазия Кейра - это\:::[html]Эритроплазия Кейра - это\:{
	~своеобразная разновидность старческой кератомы
	~внутриэпидермальный кожный рак
	=внутриэпителиальный рак слизистой оболочки
	~псевдокарциноматозный моллюск
}

// question: 4175021 name: Эритроплазия Кейра является:
::Эритроплазия Кейра является\:::[html]Эритроплазия Кейра является\:{
	=вариантом болезни Боуэна
	~роговой кератомой
	~узелковым предраком кожи
	~абразивным преканцерозным хейлитом Манганотти
}

// question: 4175050 name: Этиологическим фактором возникновения предрака является:

::Этиологическим фактором возникновения предрака является\:::[html]Этиологическим фактором возникновения предрака является\:{
	~острые воспалительные процессы в мягких тканях лица
	~специфические воспалительные процессы
	=хроническая травма слизистой оболочки полости рта
	~вторичная адентия
	~снижение иммунитета
}

// question: 4152078 name: Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является:
::Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:::[html]Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:{
	~Гангренозный пульпит осложненный острым верхушечным периодонтитом
	~Хронические верхушечные процессы в стадии обострения
	~Переломы челюстей
	=Все ответы верны
}

// question: 4152079 name: Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является:
::Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:::[html]Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:{
	~Переломы челюстей
	~Распространение гематогенным путем из других областей
	~Воспалительные осложнения удаления зубов, ретинированные зубы.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152080 name: Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является:
::Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:::[html]Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:{
	~Хронические верхушечные процессы в стадии обострения
	~Распространение гематогенным путем из других областей
	~Воспалительные осложнения удаления зубов, ретинированные зубы.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152081 name: Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является:
::Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:::[html]Этиологическим фактором при одонтогенном остеомиелите челюстей является\:{
	~Гангренозный пульпит осложненный острым верхушечным периодонтитом
	~Переломы челюстей
	~Распространение гематогенным путем из других областей
	=Все ответы верны
}

// question: 4151697 name: ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ФИБРОМАТОЗА ДЕСЕН ЯВЛЯЕТСЯ
::ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ФИБРОМАТОЗА ДЕСЕН ЯВЛЯЕТСЯ::[html]ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ФИБРОМАТОЗА ДЕСЕН ЯВЛЯЕТСЯ{
	=наследственная предрасположенность
	~курение
	~бруксизм
	~избыточное содержание солей кальция в питьевой воде
}

// question: 4152161 name: Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является:
::Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:::[html]Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:{
	=Зубопародонтальные воспалительные процессы нижних зубов
	~Зубопародонтальные воспалительные процессы верхних зубов
	~Верхнечелюстной синусит
}

// question: 4152162 name: Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является:
::Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:::[html]Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:{
	=Нагноившиеся слюнокаменная болезнь подчелюстной железы, с поражением её протока
	~ Нагноившиеся слюнокаменная болезнь подчелюстной железы, с поражением её протока
	~Зубопародонтальные воспалительные процессы верхних зубов
	~Верхнечелюстной синусит
}

// question: 4152163 name: Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является:
::Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:::[html]Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:{
	=Травма слизистой дна полости рта острыми инородными телами
	~Зубопародонтальные воспалительные процессы верхних зубов
	~Верхнечелюстной синусит
}

// question: 4152164 name: Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является:
::Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:::[html]Этиологическим фактором флегмоны дна полости рта является\:{
	=Фурункулы в нижней части лица.
	~Зубопародонтальные воспалительные процессы верхних зубов
	~Верхнечелюстной синусит
}

// question: 4152196 name: Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются:
::Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:::[html]Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:{
	~Дентопародонтальные поражения зубов н. ч.
	~Распространение из соседних пространств (дно полости рта, окологлоточное пространство, крылочелюстное пространство)
	~Фурункул, карбункул на коже шеи
	=Все ответы верны
}

// question: 4152197 name: Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются:
::Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:::[html]Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:{
	~Фурункул, карбункул на коже шеи
	~ Нагноившаяся киста нижней челюсти
	~ Нагноившаяся киста шеи.
	=Все ответы верны
}

// question: 4152198 name: Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются:
::Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:::[html]Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:{

~Дентопародонтальные поражения зубов н. ч.
~ Нагноившаяся киста нижней челюсти
~ Нагноившаяся киста шеи.
=Все ответы верны
}

// question: 4152199 name: Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются:
::Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:::[html]Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:{
~Дентопародонтальные поражения зубов н. ч.
~Распространение из соседних пространств (дно полости рта, окологлоточное пространство, крылочелюстное пространство)
~ Нагноившаяся киста шеи.
=Все ответы верны
}

// question: 4152200 name: Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются:
::Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:::[html]Этиологическими факторами абсцесса и флегмоны шеи являются\:{
~Распространение из соседних пространств (дно полости рта, окологлоточное пространство, крылочелюстное пространство)
~Фурункул, карбункул на коже шеи
~ Нагноившаяся киста нижней челюсти
=Все ответы верны
}

// question: 4152012 name: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО
::ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО::[html]ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО{
=анатомической форме
~восприятию со стороны окружающих
~общему состоянию больного
~адекватности восприятия лечения
}

// question: 4152013 name: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО
::ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО::[html]ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО{
=функции

~восприятию со стороны окружающих
~общему состоянию больного
~адекватности восприятия лечения
}

// question: 4152035 name: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО
::ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО::[html]ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО{
=эстетической гармонии
~восприятию со стороны окружающих
~общему состоянию больного
~адекватности восприятия лечения
}

// question: 4152595 name: Язвы и эрозии слизистой оболочки полости рта чаще развиваются в результате:
::Язвы и эрозии слизистой оболочки полости рта чаще развиваются в результате\:::[html]Язвы и эрозии слизистой оболочки полости рта чаще развиваются в результате\:{
~Термического ожога
~Сердечнососудистой недостаточности
~Хронической травмы
=Заболеваний крови
~Заболеваний желудочно кишечного тракта
}