

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Психиатрия

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета

37.00.00 Психологические науки

37.05.01 Клиническая психология

Рассмотрен на заседании кафедры Психиатрии и наркологии ИКМ

от «11» декабря 2024 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой

Психиатрии и наркологии
ИКМ

(подпись)

М.А.Кинкулькина

(фамилия, инициалы)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Аутосомно-доминантный тип наследования характерен для:

- А) шизофрении
- В) эпилепсии
- С) болезни Дауна
- Д) хореи Гентингтона
- Е) синдрома Мартина—Белл

ANSWER: D

Самый высокий коэффициент наследуемости получен при изучении генетической детерминированности:

- А) экстраверсии—интроверсии
- В) интеллекта
- С) добросовестности
- Д) консерватизма мышления

ANSWER: B

Конкордантность по шизофрении у монозиготных близнецов:

- А) колеблется от 90 до 100%
- В) зависит от их пола
- С) в несколько раз превышает таковую у дизиготных

ANSWER: C

Болезнь Альцгеймера:

- А) передается через X-хромосому
- В) определяется случайной мутацией хромосомы 5
- С) генетически гетерогенна
- Д) не передается по наследству

ANSWER: C

Вероятность возникновения эпилепсии у детей:

- А) больше в случае болезни матери
- В) больше в случае болезни отца
- С) не зависит от пола больного родителя

ANSWER: A

Вероятность возникновения алкоголизма у усыновленных детей:

- А) выше при наличии алкоголизма у приемного отца
- В) выше при наличии алкоголизма у приемной матери
- С) почти не зависит от здоровья приемных родителей
- Д) ничтожно мала в случае здоровья обоих приемных родителей

ANSWER: C

У супругов больных монополярной депрессией вероятность возникновения того же заболевания

- А) выше чем в общей популяции
- В) ниже чем в общей популяции
- С) такая же как в общей популяции

ANSWER: A

Потеря способности планировать и понимать последствия своих действий в сочетании с пассивностью и аспонтанностью весьма характерна для поражения

- А) лобных долей мозга
- В) теменных долей мозга
- С) височных долей мозга
- Д) затылочных долей мозга

ANSWER: A

Приступообразные слуховые и обонятельные галлюцинации характерны для:

- А) атрофии лобных долей

- В) опухоли затылочных долей
- С) эпилептических очагов в височной доле
- Д) гипертрофии теменных долей
- Е) диффузных повреждений головного мозга

ANSWER: С

Симптом бреда

- А) характерен для лобной атрофии
- В) указывает на очаг в височной доле
- С) свидетельствует о поражении гипоталамуса
- Д) не имеет проекции в мозге

ANSWER: D

Тормозным медиатором ЦНС является:

- А) дофамин
- В) гистамин
- С) ГАМК
- Д) глутамат
- Е) ацетилхолин

ANSWER: С

Ионы магния:

- А) усиливают действие ацетилхолина
- В) модифицируют действие гистамина
- С) блокируют действие глутамата
- Д) извращают действие кофеина

ANSWER: С

Депрессивные расстройства связывают с:

- А) избытком ГАМК
- В) дефицитом серотонина
- С) дефицитом глутамата
- Д) избытком дофамина
- Е) быстрым разрушением ацетилхолина

ANSWER: В

Нарушение памяти при болезни Альцгеймера связывают с:

- А) дефицитом ГАМК
- В) избытком серотонина
- С) дефицитом ацетилхолина
- Д) избытком гистамина

ANSWER: С

Нейрональный ответ в дофаминовых рецепторах усиливается под воздействием

- А) глицина
- В) серотонина
- С) субстанции Р
- Д) женских половых гормонов

ANSWER: D

Чувство боли в наибольшей степени регулируется

- А) ацетилхолином и гистамином
- В) норадреналином и нейропептидами
- С) пуринами и глицином
- Д) стероидами и пролактином

ANSWER: В

Важнейшим способом передачи метасмысла является

- А) манипуляция
- В) сексуализация
- С) невербальная коммуникация

D) процессуальная активность

E) процедура

ANSWER: C

По мнению Э.Бёрна, наибольшее удовольствие людям приносит

A) процедура

B) времяпрепровождение

C) ритуал

D) игра

E) близость

ANSWER: E

По мнению Э.Бёрна, семейные скандалы почти всегда представляют собой

A) процедуру

B) ритуал

C) времяпрепровождение

D) игру

E) близость

ANSWER: D

По мнению Э.Эриксона, воля и ответственность формируется в возрасте

A) 1,5—3 года

B) 4—5 лет

C) 6—11 лет

D) 12—15 лет

E) 16—25 лет

ANSWER: A

В общении с подростком очень важно

A) хвалить и вознаграждать за хорошее поведение

B) установить строгие рамки допустимого поведения с помощью системы наказаний

C) решать все споры путем дискуссии

D) выслушивать его, избегая эмоциональных оценок

E) нагружать его работой

F) нагружать его работой, чтобы не было свободного времени на шалости

ANSWER: D

Щедрость рассматривают как проявление

A) способностей

B) темперамента

C) характера

D) направленности личности

E) роли

F) маски

ANSWER: C

Шизофренический дефект личности проявляется

A) взрывчатостью и отходчивостью

B) ухудшением памяти и понимания

C) эгоцентризмом и стремлением к бытовому комфорту

D) пассивностью и бедностью эмоций

E) всем перечисленным

ANSWER: D

Термин «мания» используется в психиатрии со времен

A) Гиппократа

B) Пинеля

C) Конолли

D) Фрейда

E) Крепелина

ANSWER: A

Смирительная рубашка используется в психиатрии со времен

- A) Гиппократ
- B) Пинеля
- C) Конолли
- D) Фрейда
- E) Крепелина

ANSWER: B

Первые больницы для умалишенных появились

- A) в Древнем Египте
- B) в Древней Греции
- C) в Древнем Риме
- D) в Александрии в IV веке
- E) в Константинополе в VIII веке
- F) в Испании в XV веке

ANSWER: F

Движение «no restraint» в психиатрии призывало к

- A) закрытию психиатрических больниц_
- B) _замене железных кандалов на смирительные рубашки_
- C) _отказу от применения любых мер стеснения_
- D) _отказу от использования термина «шизофрения»_
- E) _исключению гомосексуализма из классификации психических расстройств_

ANSWER: C

Первые приюты для душевнобольных в России появились в период правления

- A) _Ярослава Мудрого_
- B) _Ивана Грозного_
- C) _Петра I_
- D) _Екатерины II_
- E) _Павла I_
- F) _Александра I_
- G) _ _

ANSWER: D

Бенедикт А. Морель стал известен как автор

- A) _терминов «ремиссия» и «интермиссия»_
- B) _концепции дегенерации_
- C) _теории единого психоза_
- D) _термина «шизофрения»_
- E) _термина «неврастения»_
- F) _работ по антипсихиатрии_

ANSWER: B

Основателем московской школы психиатрии считают:

- A) _И.М.Балинского_
- B) _С.С.Корсакова_
- C) _В.П.Сербского_
- D) _В.М.Бехтерева_
- E) _А.В.Снежневского_

ANSWER: B

Всемирная Психиатрическая Ассоциация была создана

- A) _во времена Великой Французской Революции_
- B) _накануне Первой Мировой войны_
- C) _сразу после окончания Второй Мировой войны_
- D) _в начале 60-х годов XX века_
- E) _после окончания «холодной войны»_

ANSWER: D

Основателем нозологического подхода в классификации психических расстройств считают

- A) _Ивана Петровича Павлова_
- B) _Филиппа Пинеля_
- C) _Вильгельма Гризингера_
- D) _Эмиля Крепелина_
- E) _Зигмунда Фрейда_

ANSWER: D

Разрешение на недобровольное содержание больного в психиатрическом стационаре дает

- A) _лечащий врач_
- B) _главный врач больницы_
- C) _прокурор_
- D) _суд_
- E) _представитель местной исполнительной власти_

ANSWER: D

Первым биологическим методом лечения, введенным в практику психиатрии стала

- A) _лоботомия_
- B) _психофармакотерапия_
- C) _маляротерапия_
- D) _инсулинокоматозная терапия_
- E) _электросудорожная терапия_

ANSWER: C

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» был введен в действие в

- A) _1925_
- B) _1937_
- C) _1953_
- D) _1985_
- E) _1993_

ANSWER: E

Стандарты психиатрической службы, разработанные ВОЗ предполагают

- A) _бесплатное получение психиатрической помощи_
- B) _возможность получения помощи вблизи от места постоянного проживания пациента_
- C) _отказ от любых вариантов недобровольного лечения_
- D) _отказ от применения ЭСТ и других шоковых методов лечения_
- E) _все перечисленное_

ANSWER: B

В Законе РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» среди основных принципов указывается

- A) _обеспечение гражданских свобод и гуманность_
- B) _сохранение врачебной тайны и преимущественная добровольность_
- C) _обеспечение наименее ограничительных условий_
- D) _приближение к месту жительства_
- E) _все перечисленное_

ANSWER: E

Психиатрическая помощь в РФ осуществляется преимущественно

- A) _добровольно_
- B) _по просьбе родственников больного_
- C) _по требованию органов правопорядка_
- D) _по решению суда_

ANSWER: A

Психиатрическое освидетельствование и госпитализация взрослого больного в недобровольном порядке

- A) _невозможны_
- B) _разрешены при наличии согласия ближайших родственников_
- C) _допустимы при наличии беспомощности или социальной опасности больного_

ANSWER: C

В листках нетрудоспособности и справках при выписке из психиатрического стационара:

- A) _выставляется диагноз с использованием шифров МКБ-10_
- B) _вместо психического указывается соматическое расстройство_
- C) _используются печати и штампы без указания на психиатрию_

ANSWER: C

Диагноз психического расстройства, выставленный врачом, не имеющим квалификации психиатра

- A) _не учитывается_
- B) _рассматривается как предварительный_
- C) _должен быть сформулирован в соответствии с МКБ-10_

ANSWER: B

Больного, впервые обратившегося в ПНД добровольно по поводу временного мягкого психического расстройства, следует

- A) _лечить в ПНД на условиях консультативного наблюдения_
- B) _поставить под диспансерное наблюдение_
- C) _направить на госпитализацию_
- D) _направить на лечение в поликлинику по месту жительства_

ANSWER: A

Больной, находящийся на консультативном наблюдении в ПНД

- A) _имеет право на вождение транспорта_
- B) _обязан не реже одного раза в месяц являться на прием_
- C) _освобождается от военной обязанности_
- D) _не имеет права вступать в брак_

ANSWER: A

Больной, поступивший в психиатрический стационар в недобровольном порядке, для решения о дальнейшем пребывании в больнице должен быть осмотрен комиссией психиатров в течение

- A) 6
- B) 12
- C) 24
- D) 48

ANSWER: D

Разрешение на недобровольное содержание больного в психиатрическом стационаре дает

- A) _лечащий врач_
- B) _главный врач больницы_
- C) _представитель местной исполнительной власти_
- D) _прокурор_
- E) _суд_

ANSWER: E

Лицо, страдающее психическим заболеванием, и совершившее уголовное преступление, признается судом

- A) _вменяемым во всех случаях_
- B) _вменяемым в случае совершения убийства_
- C) _невменяемым в случае невозможности руководить своими действиями_
- D) _невменяемым во всех случаях_

ANSWER: C

Лицо, признанное невменяемым в отношении совершенного им деяния

- A) _не подлежит ответственности за совершенное_
- B) _проходит наказание в специализированном учреждении_

С) _имеет право на более мягкое наказание_

ANSWER: A

Лицо, находящееся на диспансерном наблюдении в ПНД, считается:

А) _недееспособным в любом случае_

В) _недееспособным при отсутствии критики к заболеванию_

С) _дееспособным пока обратного не установил суд_

Д) _дееспособным при наличии критики к заболеванию_

Е) _ограниченно дееспособным_

ANSWER: С

Лицо, признанное недееспособным:

А) _имеет право владеть имуществом_

В) _имеет право вступать в брак_

С) _имеет право совершать мелкие сделки_

Д) _имеет право на все перечисленное_

Е) _лишено всех прав_

ANSWER: A

В гражданском процессе при утрате способности понимать значение своих действий вследствие психического расстройства лицо признается

А) _неправоспособным_

В) _недееспособным_

С) _невменяемым_

ANSWER: B

Причиной стигматизации психически больных считают

А) _социальную опасность психически больных_

В) _неизлечимый характер психических болезней_

С) _побочные эффекты применяемых психиатрами препаратов_

Д) _распространенные в обществе заблуждения и предубеждения_

ANSWER: D

О характере пациента надежнее всего свидетельствуют его:

А) _внешность и телосложение_

В) _убеждения_

С) _намерения_

Д) _поступки_

Е) _мимика и поза_

ANSWER: D

Нельзя рассматривать как вполне достоверные данные:

А) _объективного анамнеза_

В) _субъективного анамнеза_

С) _ни объективного, ни субъективного анамнеза_

ANSWER: С

Сведения, представленные в психическом статусе характеризуют

А) _течение заболевания_

В) _вероятный прогноз_

С) _степень потери трудоспособности_

Д) _состояние на настоящий момент_

Е) _все перечисленное_

ANSWER: D

Дексаметазоновый тест проводится для уточнения состояния у больных с

А) _эпилепсией_

В) _шизофренией_

С) _депрессией_

Д) _истерией_

Е) _всеми перечисленными расстройствами_

ANSWER: C

Стандартизованные глоссарии и шкалы используются для установления

- A) _показаний к госпитализации_
- B) _эффективности лекарственной терапии_
- C) _синдрома мального диагноза_
- D) _нозологического диагноза_

ANSWER: B

Субъективная, основанная на личном мнении врача, оценка тяжести болезни и выраженности достигнутого успеха в лечении проводится по шкале

- A) _M.I.N.I_
- B) _PANSS_
- C) _BPRS_
- D) _CGI_

ANSWER: D

При диагностике органических поражений мозга наибольший интерес представляет обследование

- A) _отоларингологическое_
- B) _офтальмологическое_
- C) _пульмонологическое_
- D) _гинекологическое_

ANSWER: B

Двигательные расстройства — например, скованность, стереотипные движения, гиперкинезы — могут быть признаками многих патологических состояний, но только не

- A) _истерии_
- B) _мании_
- C) _кататонии_
- D) _болезни Паркинсона_
- E) _осложнений психофармакотерапии_

ANSWER: B

Симптом Аргайла Робертсона — это нарушение

- A) _кожной чувствительности одной половины лица_
- B) _различения высоты звука_
- C) _реакции зрачка на свет_
- D) _глубокой чувствительности в нижних конечностях_

ANSWER: C

Нормальные показатели цереброспинальной жидкости предполагают не более

- A) 5 клеток в 1 мкл
- B) 50 клеток в 1 мкл
- C) 500 клеток в 1 мкл
- D) 5000 клеток в 1 мкл

ANSWER: A

К патологическим изменениям на ЭЭГ относят:

- A) _ α -ритм в затылочных отведениях_
- B) _ β -ритм в лобных отведениях_
- C) _ θ -ритм в состоянии бодрствования_
- D) _ δ -ритм во время сна_

ANSWER: C

ЭЭГ важнее всего проводить для диагностики

- A) _шизофрении_
- B) _эпилепсии_
- C) _мании_
- D) _депрессии_

ANSWER: B

Угнетение α -ритма и повышение содержания β -активности на ЭЭГ указывает на явление

- A) _синхронизации_
- B) _десинхронизации_
- C) _«уплощения» ЭЭГ_
- D) _асимметрии_
- E) _эпилептиформных комплексов_

ANSWER: B

Противопоказанием к МРТ является

- A) _параплегия_
- B) _геморрагический инсульт_
- C) _наличие кардиостимулятора_
- D) _закрытоугольная глаукома_

ANSWER: C

Корректурная проба применяется для исследования

- A) _внимания_
- B) _сознания_
- C) _мышления_
- D) _личности_

ANSWER: A

Для исследования интеллекта применяют различные методики, только не

- A) _тест Векслера_
- B) _тест Розенцвейга_
- C) _матрицы Равенна_
- D) _отсчитывание по Крепелину_
- E) _методику классификации понятий_

ANSWER: B

Проективными называются тесты, которые

- A) _имеют шкалы достоверности_
- B) _не имеют заранее заготовленных вариантов ответов_
- C) _нацелены на исследование абстрактного мышления_
- D) _проводятся многократно для оценки динамики изменений_

ANSWER: B

К личностным опросникам относят

- A) _тест Айзенка_
- B) _тест Векслера_
- C) _метод пиктограммы_
- D) _методику «четвертый лишний»_
- E) _тематический апперцептивный тест_

ANSWER: A

Пароксизмальность рассматривается как общее свойство всех продуктивных симптомов

- A) _шизофрении_
- B) _эпилепсии_
- C) _истерии_
- D) _мании_

ANSWER: B

Схизис рассматривают как

- A) _симптом_
- B) _синдром_
- C) _надсиндромное свойство_
- D) _регистр_

ANSWER: C

Связь симптомов с эмоциональным стрессом, их направленность на зрителей, подверженность самовнушению называется

- A) _негативизмом_
- B) _схизисом_
- C) _пароксизмальностью_
- D) _демонстративностью_

ANSWER: D

Синдром точнее всего характеризует:

- A) _причину болезни_
- B) _темпы ее развития_
- C) _текущее состояние_
- D) _прогноз_

ANSWER: C

Классификация МКБ-10 в большей степени нацелена на различение

- A) _синдромов_
- B) _регистров_
- C) _нозологических единиц_

ANSWER: A

Отсутствие критики является типичным признаком

- A) _невроза_
- B) _психоза_
- C) _дефекта_
- D) _схизиса_

ANSWER: B

Шизофрения может проявляться симптоматикой

- A) _невротической_
- B) _психотической_
- C) _невротической и психотической_

ANSWER: C

Необратимыми почти всегда бывают расстройства:

- A) _невротические_
- B) _психотические_
- C) _продуктивные_
- D) _негативные_
- E) _все перечисленные_

ANSWER: D

К негативным относят многие расстройства, ТОЛЬКО НЕ:

- A) _корсаковский синдром_
- B) _депессию_
- C) _деменцию_
- D) _апатию_
- E) _разорванность_

ANSWER: B

Простыми называют формы заболеваний, проявляющиеся преимущественно симптоматикой:

- A) _невротической_
- B) _психотической_
- C) _продуктивной_
- D) _негативной_

ANSWER: D

Нарастание продуктивной симптоматики свидетельствует о

- A) _злокачественности болезни_
- B) _остроте болезни_
- C) _необратимости болезни_
- D) _пароксизмальности болезни_

ANSWER: B

Нарастание тяжести болезни приводит к тому, что мягкие невротические симптомы

- A) _замещаются психотическими_
- B) _преобразуются в негативные_
- C) _сосуществуют с психотическими_

ANSWER: C

Согласно концепции Дж.Джексона, "в любой психоз обязательно входит...":

- A) _невроз_
- B) _схизис_
- C) _дефект_
- D) _бред_

ANSWER: A

Наибольшим разнообразием симптоматики отличается клиническая картина

- A) _неврозов_
- B) _маниакально-депрессивного психоза_
- C) _шизофрении_
- D) _органических заболеваний_

ANSWER: D

Наиболее специфичными считают симптомы, соответствующие регистру расстройств

- A) _астенических_
- B) _аффективных_
- C) _кататонических_
- D) _психоорганических_

ANSWER: D

Шизофрения никогда не проявляется симптомами, соответствующими регистру расстройств

- A) _аффективных_
- B) _деперсонализационных_
- C) _кататонических_
- D) _психоорганических_

ANSWER: D

Психогенные боли — это проявление:

- A) _мании_
- B) _истерии_
- C) _эпилепсии_
- D) _деменции_

ANSWER: B

Снижение порога чувствительности с повышенной раздражительностью называют:

- A) _гипестезией_
- B) _гиперестезией_
- C) _сенестопатией_
- D) _парестезией_
- E) _парейдолией_

ANSWER: B

При депрессии обычно наблюдается

- A) _анестезия_
- B) _гипестезия_
- C) _гиперестезия_
- D) _парестезия_
- E) _парейдолия_

ANSWER: A

При истерических расстройствах кожной чувствительности

- A) _отсутствуют безусловные рефлексы_
- B) _нарушения соответствуют зонам иннервации_
- C) _характерно преимущественное снижение чувствительности в дистальных отделах_

D) _нарушения усиливаются при повышенном внимании окружающих_

ANSWER: D

Ощущение похожее на то, что «кислота разъедает грудину» следует назвать

A) _парестезией_

B) _парейдолией_

C) _нарушением схемы тела_

D) _сенестопатией_

E) _гиперестезией_

ANSWER: D

Характерными симптомами шизофрении считают:

A) _истинные галлюцинации и парестезии_

B) _псевдогаллюцинации и сенестопатии_

C) _дереализацию и нарушения схемы тела_

D) _обонятельные галлюцинации и гиперестезию_

E) _императивные галлюцинации и гипестезию_

ANSWER: B

Деперсонализация — это симптом:

A) _продуктивный_

B) _негативный_

C) _может быть как продуктивным, так и негативным_

ANSWER: C

Особую опасность представляют галлюцинации

A) _рефлекторные_

B) _обонятельные_

C) _императивные_

D) _висцеральные_

E) _Шарля Бонне_

ANSWER: C

Обман восприятия, заключающейся в том, что больной чувствует запах цветов, специально вызванный у него «гипнозом», следует назвать

A) _псевдогаллюцинацией_

B) _истинной галлюцинацией_

C) _иллюзией_

D) _сенестопатией_

ANSWER: A

Для псевдогаллюцинаций характерно:

A) _телесность и весомость_

B) _интрапроекция_

C) _чувство физической угрозы_

D) _усиление в вечернее время_

E) _все перечисленное_

ANSWER: B

Истинные галлюцинации чаще всего возникают при

A) _шизофрении_

B) _мании_

C) _депрессии_

D) _эпилепсии_

E) _делирии_

ANSWER: E

Чувство, что окружающий мир повернулся на 180°, следует назвать

A) _галлюцинозом_

B) _деперсонализацией_

C) _психосенсорным расстройством_

D) _псевдогаллюцинацией_

E) _сенестопатией_

ANSWER: C

При галлюцинозе сознание

A) _выключено_

B) _помрачено_

C) _аффективно сужено_

D) _не нарушено_

ANSWER: D

Парейдолические иллюзии нередко сосуществуют с

A) _сенестопатиями_

B) _псевдогаллюцинациями_

C) _истинными галлюцинациями_

D) _нарушениями схемы тела_

ANSWER: C

Обман восприятия, при котором больной видит на чистом листе бумаги написанный текст, следует назвать

A) _псевдогаллюцинацией_

B) _истинной галлюцинацией_

C) _парейдолией_

D) _психосенсорным расстройством_

ANSWER: B

Состояние, при котором больному, находящемуся у себя дома, кажется, что он оказался в незнакомом месте, следует назвать

A) _симптом Рейхардта_

B) _симптом Липманна_

C) _симптом Маньяна_

D) _jamais vu_

E) _déjà vu_

ANSWER: D

Медленную тягучую речь, изобилующую отступлениями и несущественными подробностями, следует назвать:

A) _замедлением мышления_

B) _патологической вязкостью_

C) _резонерством_

D) _шперрунгом_

E) _симптомом открытости_

ANSWER: B

Резонерство рассматривается как утрата способности:

A) _к абстрактному мышлению_

B) _отличать главное от второстепенного_

C) _мыслить целенаправленно_

D) _концентрировать внимание_

ANSWER: C

Речевые стереотипии обычно рассматривают как признак:

A) _мании_

B) _депрессии_

C) _расстройства сознания_

D) _деменции_

ANSWER: D

Продуктивным расстройством является:

A) _идеаторный автоматизм_

B) _разорванность_

- C) _резонерство_
- D) _патологическая обстоятельность_
- E) _символическое мышление_

ANSWER: A

Проявлением синдрома психического автоматизма является

- A) _аутистическое мышление_
- B) _резонерство_
- C) _ментизм_
- D) _ускорение мышления_
- E) _бессвязность_

ANSWER: C

С инволюционным возрастом связывают появление бреда

- A) _изобретательства_
- B) _реформаторства_
- C) _воздействия_
- D) _материального ущерба_
- E) _дисморфоманического_

ANSWER: D

Систематизированные бредовые идеи наблюдаются при бреде

- A) _остром_
- B) _хроническом_
- C) _остром и хроническом_

ANSWER: B

Бред, возникающий на фоне возбуждения, иллюзий и дереализации следует назвать

- A) _систематизированным_
- B) _первичным_
- C) _интерпретативным_
- D) _чувственным_

ANSWER: D

Мегаломанический ипохондрический нигилистический депрессивный бред наблюдается при синдроме

- A) _Капгра_
- B) _Котара_
- C) _Кандинского-Клерамбо_
- D) _дисморфоманическом_

ANSWER: B

Сохранение критики отмечается при

- A) _бредовых __идеях_
- B) _сверхценных идеях_
- C) _навязчивых идеях_
- D) _примитивных идеях_

ANSWER: C

Опасное поведение характерно для больных с

- A) _контрастными навязчивостями_
- B) _шперрунгом_
- C) _депрессивным бредом_
- D) _бредом величия_

ANSWER: C

Страх толпы и открытых пространств называют:

- A) _агорафобией_
- B) _клаустрофобией_
- C) _акрофобией_
- D) _ксенофобией_

Е) _танатофобией_

ANSWER: A

К проявлениям синдрома Кандинского-Клерамбо относят

А) _folie a deux_

В) _fuga idearum_

С) _метафизическую интоксикацию_

Д) _симптом Фреголи_

Е) _симптом открытости_

ANSWER: E

Проявлением идеаторного автоматизма считают:

А) _вербальные псевдогаллюцинации_

В) _вербигерации_

С) _персеверации_

Д) _аутистическое мышление_

Е) _стоячие обороты_

ANSWER: A

Вариантом сенсорного автоматизма считают:

А) _истинные галлюцинации_

В) _сенестопатии_

С) _деперсонализацию_

Д) _резонерство_

Е) _психосенсорные расстройства_

ANSWER: B

Синдром психического автоматизма считают характерным признаком:

А) _гневливой мании_

В) _параноидной шизофрении_

С) _генуинной эпилепсии_

Д) _инволюционной депрессии_

ANSWER: B

Завершающим этапом развития хронического бреда считают

А) _парафренный синдром_

В) _паранойяльный синдром_

С) _параноидный синдром_

ANSWER: A

Бред при паранойальном синдроме возникает

А) _вследствие галлюцинаций_

В) _в результате помрачения сознания_

С) _на фоне явления психического автоматизма_

Д) _на фоне тревоги и растерянности_

Е) _первично_

ANSWER: E

Обсессивно-фобический синдром:

А) _не является нозологически специфичным_

В) _характерен для простой шизофрении_

С) _обычно возникает вследствие органических заболеваний_

Д) _является вариантом синдрома психического автоматизма_

ANSWER: A

Острый бред как правило:

А) _бывает систематизированным_

В) _бывает правдоподобным_

С) _возникает первично_

Д) _включает идеи инсценировки_

Е) _отличается монотонностью_

ANSWER: D

Резонерство — это расстройство:

- A) продуктивное
- B) негативное
- C) может быть и продуктивным и негативным

ANSWER: B

Гипомнезия рассматривается как типичный признак

- A) _обсессивно-фобического невроза_
- B) _церебрального артериосклероза_
- C) _простой шизофрении_
- D) _генуинной эпилепсии_

ANSWER: B

Выпадение из памяти событий, предшествовавших болезни, называют:

- A) _антероградной амнезией_
- B) _конградной амнезией_
- C) _ретроградной амнезией_
- D) _фиксационной амнезией_
- E) _истерической амнезией_

ANSWER: C

Палимпсест — это следствие:

- A) _антероградной амнезии_
- B) _конградной амнезии_
- C) _ретроградной амнезии_
- D) _фиксационной амнезии_
- E) _прогрессирующей амнезии_

ANSWER: B

Истерическая амнезия

- A) _склонна к прогрессированию_
- B) _развивается по закону Рибо_
- C) _имеет тематический характер_
- D) _сопровождается анекфорией_

ANSWER: C

При типичном корсаковском синдроме способность к абстрактному мышлению

- A) _сохранена_
- B) _значительно снижена_
- C) _утрачивается по мере прогрессирования_
- D) _полностью утрачена_

ANSWER: A

При типичном корсаковском синдроме ориентировка

- A) _совсем не нарушена_
- B) _нарушена в месте и времени_
- C) _нарушена в ситуации и собственной личности_
- D) _нарушена во всех отношениях_

ANSWER: B

Пациенты с фиксационной амнезией:

- A) _нетрудоспособны_
- B) _могут работать по своей прежней специальности_
- C) _нуждаются в освоении более легкой профессии_
- D) _полностью трудоспособны_

ANSWER: A

Прогрессирующая амнезия наблюдается при

- A) _истерии_
- B) _шизофрении_

- C) _депрессии_
- D) _болезни Альцгеймера_
- E) _всех перечисленных заболеваний_

ANSWER: D

Корсаковский синдром в большинстве случаев

- A) _полностью обратим_
- B) _склонен к регрессу_
- C) _протекает приступообразно_
- D) _склонен к прогрессированию_
- E) _не имеет никакой динамики_

ANSWER: B

Причиной корсаковского синдрома может быть

- A) _тяжелая психотравма_
- B) _злокачественная шизофрения_
- C) _злоупотребление алкоголем_
- D) _героиновый абстинентный синдром_
- E) _детская эпилепсия_

ANSWER: C

К продуктивным симптомам относят:

- A) _гипомнезию_
- B) _ретроградную амнезию_
- C) _конградную амнезию_
- D) _истерическую амнезию_

ANSWER: D

К негативным симптомам относят

- A) _гипермнезию_
- B) _фиксационную амнезию_
- C) _конфабуляции_
- D) _криптомнезии_

ANSWER: B

Признаком патологии считается IQ ниже

- A) _70 %_
- B) _80 %_
- C) _90 %_
- D) _100 %_

ANSWER: A

При острых психозах с продуктивной симптоматикой интеллект

- A) _не изменен_
- B) _снижен_
- C) _временно отсутствует_
- D) _оценивать нельзя_

ANSWER: D

Одно из заданий, используемых для оценки интеллекта у взрослого — это

- A) _умножить 5 на 5_
- B) _перечислить дни недели__перечислить дни недели_
- C) _сравнить два понятия_
- D) _посчитать пальцы на руках_
- E) _назвать президента страны_

ANSWER: C

Утверждение, что килограмм пуха легче килограмма гвоздей указывает на

- A) _паралогичное мышление_
- B) _символическое мышление_
- C) _конкретное мышление_

D) _абстрактное мышление_

ANSWER: C

У пациентов с олигофренией IQ с течением возраста:

A) _повышается_

B) _снижается_

C) _существенно не меняется_

ANSWER: C

Пациенты с имбецильностью могут:

A) _самостоятельно одеваться_

B) _складывать однозначные числа_

C) _читать по слогам_

D) _работать дворником_

E) _выполнять все перечисленные операции_

ANSWER: A

Пациенты с дебильностью преимущественно проживают и воспитываются:

A) _в психиатрических больницах_

B) _в интернатах для психически больных_

C) _в специальных детских домах_

D) _в собственной семье_

ANSWER: D

Правильнее всего олигофрению следует определить как:

A) _врожденное отсутствие интеллекта_

B) _тяжелую потерю интеллекта_

C) _недоразвитие интеллекта_

D) _прогрессирующее снижение интеллекта_

ANSWER: C

Вследствие органического повреждения лобных долей мозга обычно развивается:

A) _лакунарная деменция_

B) _тотальная деменция_

C) _концентрическая деменция_

D) _везаническая деменция_

ANSWER: B

К органическому слабоумию не следует относить:

A) _дисмнестическую деменцию_

B) _глобальную деменцию_

C) _эпилептическую деменцию_

D) _шизофреническую деменцию_

ANSWER: D

Характерной чертой шизофренического слабоумия является расстройство:

A) _памяти_

B) _абстрактного мышления_

C) _воли и эмоций_

D) _сознания_

E) _критики_

ANSWER: C

Изменения личности у пациентов с лакунарным слабоумием:

A) _отсутствуют_

B) _выражаются в апатии и абулии_

C) _проявляются заострением прежних черт_

D) _сопровождаются нарастанием эгоцентризма_

E) _достигают степени распада «ядра личности»_

ANSWER: C

Характерной причиной лакунарного слабоумия считают:

- A) _опухоли лобных долей_
- B) _локальные инсульты_
- C) _диффузные ангиопатии_
- D) _прогрессивный паралич_

ANSWER: C

Тотальное слабоумие чаще всего бывает следствием:

- A) _генуинной эпилепсии_
- B) _повторных сотрясений мозга_
- C) _церебрального артериосклероза_
- D) _дегенеративных процессов_

ANSWER: D

Дисфория чаще всего возникает у пациентов с:

- A) _неврозом_
- B) _эпилепсией_
- C) _шизофренией_
- D) _болезнью Альцгеймера_
- E) _маниакально-депрессивным психозом_

ANSWER: B

Эйфория проявляется:

- A) _гиперактивностью_
- B) _сентиментальностью_
- C) _благодушием_
- D) _злопамятностью_

ANSWER: C

Проявлением интоксикации может быть:

- A) _эйфория_
- B) _амбивалентность_
- C) _апатия_
- D) _слабодушие_
- E) _резонерство_

ANSWER: A

Больные с патологическим обсессивным влечением

- A) _представляют опасность для окружающих_
- B) _относятся к своему расстройству без критики_
- C) _должны быть госпитализированы_
- D) _могут контролировать свое поведение в соответствии с ситуацией_

ANSWER: D

Стремление к бродяжничеству называют:

- A) _экзгибиционизмом_
- B) _гэмблингом_
- C) _пикацизмом_
- D) _дромоманией_
- E) _дипсоманией_

ANSWER: D

Характерными признаками апатико-абулического синдрома считают

- A) _похудание и потерю аппетита_
- B) _молчание и бездвиженность_
- C) _пониженную самооценку и пессимизм_
- D) _безразличие и равнодушие_
- E) _все перечисленное_

ANSWER: D

Апатико-абулический синдром может быть проявлением

- A) _эпилепсии_

- B) _повреждения лобных долей мозга_
- C) _маниакально-депрессивного психоза_
- D) _истерии_
- E) _церебрального атеросклероза_

ANSWER: B

При мании общая продолжительность сна

- A) _уменьшается_
- B) _увеличивается_
- C) _не изменяется_

ANSWER: A

Больные с манией

- A) _представляют опасность для окружающих_
- B) _отличаются высокой производительностью в профессиональном труде_
- C) _часто проявляют упрямство и несговорчивость_
- D) _любят помогать знакомым и незнакомым людям_
- E) _характеризуются всем перечисленным_

ANSWER: D

Главным признаком, отличающим патологический аффект от физиологического, считают

- A) _раздражение и агрессию_
- B) _наличие галлюцинаций_
- C) _помрачение сознания_
- D) _компульсивное влечение к насилию и нанесению повреждений_

ANSWER: C

Апатия — это расстройство:

- A) продуктивное
- B) негативное
- C) может быть и продуктивным и негативным

ANSWER: B

Больные с кататоническим синдромом

- A) _спасаются от преследователей бегством_
- B) _не могут сохранять равновесия при ходьбе_
- C) _стремятся к самоубийству_
- D) _не отвечают на вопросы_
- E) _делают все перечисленное_

ANSWER: D

Возбуждение может быть проявлением синдрома

- A) _маниакального_
- B) _депрессивного_
- C) _кататонического_
- D) _гебефренического_
- E) _любого из перечисленных_

ANSWER: E

Ступор относят к

- A) _продуктивным расстройствам_
- B) _негативным расстройствам_

ANSWER: A

Чисто моторным называют возбуждение при:

- A) _кататоническом синдроме_
- B) _депрессивном синдроме_
- C) _маниакальном синдроме_
- D) _делириозном синдроме_

ANSWER: A

Прогностически благоприятным расстройством считают

- A) _люцидную кататонию_
- B) _онейроидную кататонию_
- C) _гебефренический синдром_

ANSWER: B

К симптомам кататонического синдрома относят

- A) _аутизм_
- B) _негативизм_
- C) _альтруизм_
- D) _инфантилизм_

ANSWER: B

К симптомам гебефренического синдрома относят

- A) _аутизм_
- B) _негативизм_
- C) _пароксизм_
- D) _ментизм_

ANSWER: B

К симптомам кататонического синдрома не относят

- A) _каталепсию_
- B) _эхолалию_
- C) _олигофазию_
- D) _симптом хоботка_
- E) _симптом Павлова_

ANSWER: C

Гебефренический синдром считают характерным проявлением злокачественной

- A) _шизофрении_
- B) _эпилепсии_
- C) _олигофрении_
- D) _истерии_

ANSWER: A

Полное молчание при кататонии называют

- A) _копролалией_
- B) _эхолалией_
- C) _мутизмом_
- D) _каталепсией_
- E) _вербигерацией_

ANSWER: C

У пациентов в кататоническом ступоре наибольшую опасность вызывает:

- A) _суицидальное поведение_
- B) _помрачение сознания_
- C) _отказ от еды_
- D) _низкая устойчивость к инфекциям_
- E) _императивные галлюцинации_

ANSWER: C

Пациенты в маниакальном возбуждении:

- A) _склонны к сексуальному насилию_
- B) _проявляют неконтролируемую агрессию_
- C) _дезориентированы в месте и времени_
- D) _обычно опасности не представляют_

ANSWER: D

В состоянии истерического возбуждения действия больных:

- A) _бессмысленны_
- B) _стереотипны_
- C) _демонстративны_

D) _импульсивны_

ANSWER: C

Кататонический ступор — это расстройство:

A) продуктивное

B) негативное

C) может быть и продуктивным и негативным

ANSWER: A

К признакам расстройства сознания относят:

A) _амбивалентность_

B) _галлюцинации_

C) _кататоническое возбуждение_

D) _дезориентировку_

E) _разорванность мышления_

ANSWER: D

У пациентов с астеническим синдромом обычно наблюдается:

A) _апрозексия_

B) _гипопрозексия_

C) _гиперпрозексия_

D) _гиперметаморфоз_

ANSWER: B

Безусловные рефлексы исчезают во время:

A) _сопора_

B) _комы_

C) _обнубления_

D) _сомноленции_

E) _любого состояния снижения уровня сознания_

ANSWER: B

Эффективность лекарственного лечения больше при:

A) _первично-генерализованных припадках_

B) _парциальных припадках_

C) _вторично-генерализованных припадках_

ANSWER: A

Снижение уровня сознания нередко бывает проявлением:

A) _невроза_

B) _маниакально-депрессивного психоза_

C) _шизофрении_

D) _органических заболеваний ЦНС_

ANSWER: D

К острым обратимым психозом относят:

A) _делирий_

B) _онейроид_

C) _сумеречное состояние_

D) _все перечисленное_

ANSWER: D

Внезапное возникает и резко прекращается:

A) _сопор_

B) _делирий_

C) _онейроид_

D) _сумеречное состояние_

E) _все перечисленное_

ANSWER: D

Характерным проявлением эпилепсии считают:

A) _оглушение_

- B) _делирий_
- C) _онейроид_
- D) _сумеречное состояние_

ANSWER: D

Сохранение ориентировки в собственной личности отмечается при:

- A) _сопоре_
- B) _делирии_
- C) _онейроиде_
- D) _сумеречном состоянии_
- E) _всех перечисленных нарушениях сознания_

ANSWER: B

Обычно делирий является следствием:

- A) _алкогольного опьянения_
- B) _кортикальной дегенерации_
- C) _острого приступа шизофрении_
- D) _различных экзогенных и органических поражений мозга_
- E) _внутриличностного конфликта_

ANSWER: D

Самая частая причина онейроида — это:

- A) _алкогольное опьянение_
- B) _кортикальная дегенерация_
- C) _острый приступ шизофрении_
- D) _различные экзогенные и органические поражения мозга_
- E) _внутриличностный конфликт_

ANSWER: C

Смертельный исход вследствие утяжеления состояния весьма вероятен при:

- A) _делирии_
- B) _онейроиде_
- C) _сумеречном состоянии_
- D) _любом типе помрачения сознания_

ANSWER: A

Сочетание иллюзий со сценopodobными истинными галлюцинациями характерно для:

- A) _обнубиляции_
- B) _делирия_
- C) _онейроида_
- D) _сумеречного состояния_
- E) _любого типа нарушения сознания_

ANSWER: B

Сумеречные состояния могут возникать при:

- A) _истерии_
- B) _маниакально-депрессивном психозе_
- C) _шизофрении_
- D) _корсаковском психозе_
- E) _обсессивно-фобическом неврозе_

ANSWER: A

Типичный делирий продолжается несколько:

- A) _минут_
- B) _часов_
- C) _дней_
- D) _недель_
- E) _месяцев_

ANSWER: C

Сумеречное помрачение сознания в типичных случаях продолжается несколько:

- A) _минут_
- B) _часов_
- C) _дней_
- D) _недель_
- E) _месяцев_

ANSWER: A

У пациентов с делирием наиболее тяжелые расстройства наблюдаются:

- A) _в первый день психоза_
- B) _в последний день психоза_
- C) _утром и днем_
- D) _вечером и ночью_

ANSWER: D

Вариантом эпилептиформных пароксизмов считают:

- A) _амбивалентность_
- B) _дисфорию_
- C) _делирий_
- D) _манию_
- E) _резонерство_

ANSWER: B

К генерализованным припадкам относят:

- A) _petit mal_
- B) _déjà vu_
- C) _jamais vu_
- D) _джексоновские припадки_
- E) _особые состояния сознания_

ANSWER: A

Наследственную отягощенность чаще выявляют у пациентов с:

- A) _первично-генерализованными припадками_
- B) _парциальными припадками_
- C) _вторично-генерализованными припадками_

ANSWER: A

Продолжительность большого судорожного припадка в типичных случаях составляет:

- A) _10-20 секунд_
- B) _1-2 минуты_
- C) _3-5 минут_
- D) _7-10 минут_
- E) _15-20 минут_

ANSWER: B

На протяжении клонико-тонического припадка сознание:

- A) _остается ясным_
- B) _аффективно сужено_
- C) _помрачено по типу онейроида_
- D) _изменено по типу déjà vu_
- E) _выключено по типу комы_

ANSWER: E

При большом судорожном припадке непроизвольное мочеиспускание наблюдается во время:

- A) _ауры_
- B) _тонических судорог_
- C) _клонических судорог_
- D) _постприпадочной сомноленции_

ANSWER: C

Множественные и одиночные пики ритмически повторяющиеся острые волны и комплексы «пик—волна» на ЭЭГ наблюдаются при:

- A) _эпилептиформных пароксизмах_
- B) _панических атаках_
- C) _приступах гипогликемии_
- D) _истерических припадках_
- E) _любом из перечисленных пароксизмов_

ANSWER: A

У пациентов с паническими атаками обычно имеется:

- A) _гиперактивность симпатической нервной системы_
- B) _гиперактивность парасимпатической нервной системы_
- C) _патологические очаги в диэнцефальной области_
- D) _психотравмирующая или конфликтная ситуация_

ANSWER: D

Полной амнезией сопровождаются:

- A) _панические атаки_
- B) _истерические припадки_
- C) _petit mal_
- D) _déjà vu_

ANSWER: C

Эпилептические пароксизмы могут проявляться

- A) _судорогами_
- B) _бредом_
- C) _галлюцинациями_
- D) _влечением к спиртному_
- E) _всем перечисленным_

ANSWER: E

Проявления парциальных припадков:

- A) _джексоновские припадки_
- B) _пароксизмальные галлюцинации_
- C) _приступы jamais vu_
- D) _дисфории_
- E) _все перечисленные пароксизмы_

ANSWER: E

Пациенты с истерическим припадком ведут себя:

- A) _стереотипно_
- B) _импульсивно_
- C) _демонстративно_
- D) _негативистично_

ANSWER: C

Последовательная смена тонических и клонических судорог характерна для:

- A) _миоклонических припадков_
- B) _petit mal_
- C) _grand mal_
- D) _истерических припадков_
- E) _панических атак_

ANSWER: C

Полный отказ от приема пищи, противодействие попыткам накормить характерно для больных с:

- A) _депрессией_
- B) _кататонией_
- C) _нервной анорексией_
- D) _абстинентным синдромом_
- E) _всем перечисленным_

ANSWER: B

Если больной ест достаточно в присутствии других людей, но затем вызывает рвоту и принимает средства для похудения, то вероятно у него:

- A) _депрессия_
- B) _кататония_
- C) _нервная анорексия_
- D) _абстинентный синдром_
- E) _парейдолия_

ANSWER: C

Копрофагия и пикацизм чаще всего наблюдаются при тяжелой:

- A) _депрессии_
- B) _астении_
- C) _мании_
- D) _олигофрении_
- E) _апатии_

ANSWER: D

Чаще всего булимия сочетается с:

- A) _депрессией_
- B) _кататонией_
- C) _гебефренией_
- D) _нервной анорексией_
- E) _абстинентным синдромом_

ANSWER: D

Внезапные приступы сонливости с резким падением тонуса мышц и гипнагогическими галлюцинациями наблюдаются при:

- A) _неврастении_
- B) _нарколепсии_
- C) _депрессии_
- D) _мании_
- E) _синдроме Мюнхгаузена_

ANSWER: B

Сильные распирающие головные боли, возникающие во второй половине ночи, сопровождающиеся рвотой, обычно бывают следствием:

- A) _мигрени_
- B) _депрессии_
- C) _ишемии_
- D) _напряжения апоневротического шлема_
- E) _повышения внутричерепного давления_

ANSWER: E

Повторные приступы головных болей, которым предшествуют галлюцинации, скорее всего являются признаком:

- A) _мигрени_
- B) _депрессии_
- C) _шизофрении_
- D) _напряжения апоневротического шлема_
- E) _повышения внутричерепного давления_

ANSWER: A

Электросудорожная терапия эффективна при лечении больных с:

- A) _манией_
- B) _депрессией_
- C) _эпилепсией_
- D) _деменцией_
- E) _апатией_
- F) _синдромом психического автоматизма_

G) _всем перечисленным_

ANSWER: B

Инсулинокоматозная терапия эффективна при лечении больных с:

A) _шизофренией_

B) _эпилепсией_

C) _деменцией_

D) _психопатией_

E) _маниакально-депрессивным психозом_

F) _всем перечисленным_

ANSWER: A

Действие нейролептиков реализуются через:

A) _блокаду рецепторов _дофамина_

B) _потенцирование рецепторов _дофамина_

C) _ингибирование обратного захвата _дофамина_

D) _предотвращение разрушения _дофамина_

ANSWER: A

Самой низкой токсичностью отличаются:

A) _нейролептики производные фенотиазина_

B) _нейролептики производные дибензодиазепаина_

C) _трициклические антидепрессанты_

D) _антидепрессанты из группы СИОЗС_

E) _бензодиазепиновые транквилизаторы_

F) _барбитураты_

ANSWER: D

Недопустимым сочетанием считается применение одновременно:

A) _галоперидола и циклодола_

B) _СИОЗС и ингибиторов МАО_

C) _дiazепама и ТЦА_

D) _карбамазепина и ацетазоламида_

E) _ТЦА и сульпирида_

ANSWER: B

Соматотропные эффекты нейролептиков разнообразны, но они НЕ ОБЛАДАЮТ способностью:

A) _подавлять рвоту_

B) _уменьшать аппетит_

C) _потенцировать действие анестетиков_

D) _снижать АД_

E) _лечить аллергические реакции_

ANSWER: B

При назначении мощных нейролептиков бред и галлюцинации обычно исчезают или дезактуализируются:

A) _через 15-30 минут_

B) _через 4-5 часов_

C) _через 4-5 дней_

D) _через несколько недель или месяцев_

E) _немедленно_

ANSWER: D

Нейролептики назначают больным с:

A) _шизофренией_

B) _МДП_

C) _неврозами_

D) _психопатиями_

E) _самыми различными психическими заболеваниями_

ANSWER: E

Кроме депрессии антидепрессанты используются также для лечения:

- A) _персекуторного бреда_
- B) _обсессивно-компульсивного расстройства_
- C) _болезни Альцгеймера_
- D) _тонико-клонических судорог_
- E) _острых аллергических реакций_

ANSWER: B

Больным с классической эндогенной (заторможенной) депрессией лучше назначать антидепрессанты с дополнительным эффектом:

- A) _седативным_
- B) _стимулирующим_
- C) _гармонизирующим_

ANSWER: A

При лечении пожилых пациентов бензодиазепиновые транквилизаторы следует назначать в:

- A) _повышенных_ дозах
- B) _пониженных_ дозах
- C) _стандартных_ дозах

ANSWER: B

Многие психофармакологические средства можно принимать длительно КРОМЕ:

- A) _нейролептиков_
- B) _трициклических антидепрессантов_
- C) _антидепрессантов из группы СИОЗС_
- D) _бензодиазепиновых транквилизаторов_
- E) _ноотропов_
- F) _антиконвульсантов_

ANSWER: D

При астении, вызванной длительными чрезмерными нагрузками, лучше всего назначить:

- A) _нейролептики производные бутирофенона_
- B) _трициклические антидепрессанты_
- C) _антидепрессанты из группы СИОЗС_
- D) _бензодиазепиновые транквилизаторы_
- E) _психостимуляторы_
- F) _ноотропы_

ANSWER: F

При выборе бензодиазепинового транквилизатора для лечения амбулаторного пациента следует в первую очередь учитывать:

- A) _спектр побочных эффектов_
- B) _длительность действия препарата_
- C) _особенности взаимодействия лекарства с ГАМК-рецепторами_
- D) _особенности сочетания симптомов у больного_

ANSWER: B

При миастении наиболее тяжелые осложнения возникают при приеме:

- A) _нейролептиков производных бутирофенона_
- B) _трициклических антидепрессантов_
- C) _бензодиазепиновых транквилизаторов_
- D) _ноотропов_
- E) _солей лития_

ANSWER: C

Сердечные заболевания, глаукома, аденома предстательной железы, хронические запоры являются противопоказаниями к назначению:

- A) _нейролептиков производных бутирофенона_
- B) _трициклических антидепрессантов_

- C) _ингибиторов MAO_
- D) _бензодиазепиновых транквилизаторов_
- E) _психостимуляторов_
- F) _антиконвульсантов_

ANSWER: B

Повышение толерантности и зависимость развиваются нередко при приеме:

- A) _нейролептиков_
- B) _трициклических антидепрессантов_
- C) _антидепрессантов из группы СИОЗС_
- D) _ингибиторов MAO_
- E) _бензодиазепиновых транквилизаторов_
- F) _ноотропов_

ANSWER: E

Тремор, неусидчивость и гиперкинезы развиваются при применении:

- A) _нейролептиков_
- B) _трициклических антидепрессантов_
- C) _антидепрессантов из группы СИОЗС_
- D) _антиконвульсантов_
- E) _бензодиазепиновых транквилизаторов_
- F) _психостимуляторов_

ANSWER: A

Ингибиторы холинэстеразы используются для лечения:

- A) _персекуторного бреда_
- B) _эндогенной депрессии_
- C) _болезни Альцгеймера_
- D) _генуинной эпилепсии_
- E) _обсессивно-компульсивного расстройства_

ANSWER: C

Регулярное исследование концентрации препарата в крови необходимо при приеме:

- A) _нейролептиков_
- B) _производных бутирофенона_
- C) _антидепрессантов из группы СИОЗС_
- D) _ингибиторов MAO_
- E) _бензодиазепиновых транквилизаторов_
- F) _солей лития_

ANSWER: F

Типичным осложнением при регулярном приеме антиконвульсантов считается:

- A) _паркинсонизм_
- B) _хронические запоры_
- C) _задержка мочи_
- D) _макроцитарная анемия_
- E) _тревога и бессонница_

ANSWER: D

Психотерапия проводится при самых различных психических расстройствах КРОМЕ:

- A) _реактивной депрессии_
- B) _истерического невроза_
- C) _острого психоза_
- D) _эпилепсии_
- E) _алкоголизма_

ANSWER: C

Гипноз относят к методам:

- A) _когнитивным_
- B) _суггестивным_

- C) _бихевиоральным_
- D) _психодинамическим_
- E) _парадоксальным_

ANSWER: B

В лечении расстройств личности лучше всего использовать методы психотерапии:

- A) _когнитивные_
- B) _суггестивные_
- C) _бихевиоральные_
- D) _парадоксальные_
- E) _групповые_

ANSWER: E

Генетическое консультирование — это метод профилактики:

- A) _первичной_
- B) _вторичной_
- C) _третичной_

ANSWER: A

Третичная профилактика в частности направлена на:

- A) _снижение заболеваемости неврозами_
- B) _преодоление явления госпитализма_
- C) _предотвращение повторных приступов болезни_
- D) _пропаганду здорового образа жизни_

ANSWER: B

С точки зрения клинициста, диагноз должен формулироваться в виде:

- A) _ведущего синдрома_
- B) _названия болезни_
- C) _ведущего синдрома и названия болезни_

ANSWER: C

Заболеванием можно назвать только такое расстройство, которое характеризуется наличием:

- A) _дезадаптации_
- B) _патологических симптомов_
- C) _прогрессирования_
- D) _течения_

ANSWER: D

В большинстве случаев психические нарушения, вызванные соматическим заболеванием, напоминают _____ расстройства:

- A) _эндогенные_
- B) _экзогенные_
- C) _психогенные_

ANSWER: B

Функциональными являются все:

- A) _эндогенные психические расстройства_
- B) _экзогенные психические расстройства_
- C) _психогенные психические расстройства_

ANSWER: C

Расстройство, обусловленное длительным пребыванием в необычных, исключительных условиях, повлиявших на весь склад личности человека, называется:

- A) _патологическим развитием_
- B) _заболеванием_
- C) _дефектом_

ANSWER: A

Характерным признаком эндогенных заболеваний считают:

- A) _неуклонное прогрессирование_
- B) _начало в детском возрасте_

- C) _аутохтонное течение_
- D) _неблагоприятный прогноз_
- E) _ундулирующее прогрессирование_

ANSWER: C

Прогноз психического расстройства в первую очередь определяется:

- A) _синдромальным диагнозом_
- B) _нозологическим диагнозом_

ANSWER: B

Основой официальной статистики психиатрии РФ является

- A) _классификация НЦПЗ __РАМН_
- B) _МКБ-10_
- C) _DSM-IV_

ANSWER: B

Для обозначения психических нарушений в МКБ-10 используется слово:

- A) _болезнь_
- B) _расстройство_
- C) _патология_
- D) _аномалия_

ANSWER: B

Назначение психофармакологических средств проводится в соответствии с:

- A) _данными ЭЭГ-обследования_
- B) _кодом МКБ-10_
- C) _ведущим синдромом_
- D) _нозологическим диагнозом_
- E) _заключением клинического психолога_

ANSWER: C

Характерными проявлениями органических заболеваний считают расстройства:

- A) _восприятия и мышления_
- B) _движений и эмоций_
- C) _памяти и интеллекта_
- D) _воли и влечений_

ANSWER: C

Изменения личности при органических заболеваниях характеризуются:

- A) _замкнутостью и склонностью к рассуждательству_
- B) _впечатлительностью и демонстративностью_
- C) _страхом и подозрительностью_
- D) _медлительностью и взрывчатостью_

ANSWER: D

Психические расстройства при различных инфекционных поражениях мозга:

- A) _зависят от особенности инфекционного агента_
- B) _имеют временный, обратимый характер_
- C) _обычно выражаются в бреде и галлюцинациях_
- D) _одинаковы при самых различных инфекциях_

ANSWER: D

К реакциям экзогенного типа относят:

- A) _депрессию_
- B) _делирий_
- C) _кататонию_
- D) _онейроид_
- E) _манию_

ANSWER: B

К типичным проявлениям болезни Альцгеймера относят:

- A) _апраксию и дизартрию_

- B) _ апатию и абулию _
- C) _ астазию и абазию _
- D) _ моторную афазию и арефлексию _
- E) _ все перечисленное _

ANSWER: A

Формальная критика к имеющимся расстройствам обычно сохраняется в начале:

- A) _ болезни Альцгеймера _
- B) _ болезни Пика _
- C) _ прогрессивного паралича _
- D) _ болезни Крейтцфельда—Якоба _

ANSWER: A

Антибиотикотерапия показана при:

- A) _ болезни Альцгеймера _
- B) _ болезни Пика _
- C) _ болезни Крейтцфельда—Якоба _
- D) _ деменции с тельцами Леви _
- E) _ прогрессивном параличе _

ANSWER: E

Лечение антихолинэстеразными средствами назначается при:

- A) _ болезни Альцгеймера _
- B) _ болезни Пика _
- C) _ болезни Крейтцфельда—Якоба _
- D) _ деменции с тельцами Леви _
- E) _ прогрессивном параличе _

ANSWER: A

Лакунарное слабоумие характерно для пациентов с:

- A) _ болезнью Пика _
- B) _ сосудистой деменцией _
- C) _ прогрессивным параличом _
- D) _ с травмами лобных долей мозга _

ANSWER: B

К наследственным заболеваниям относят:

- A) _ болезнь Крейтцфельда—Якоба _
- B) _ хорею Гентингтона _
- C) _ прогрессивный паралич _
- D) _ болезнь Аддисона _

ANSWER: B

Характерной чертой сосудистых заболеваний считают:

- A) _ раннее развитие апраксии _
- B) _ утрату критики к имеющимся расстройствам _
- C) _ утренние головные боли _
- D) _ мерцание симптомов _

ANSWER: D

Для диагностики опухолей мозга используются различные методы обследования КРОМЕ:

- A) _ электроэнцефалографии _
- B) _ доплерографии _
- C) _ компьютерной томографии _
- D) _ офтальмологического обследования _

ANSWER: B

Характерным проявлением прогрессивного паралича считают симптом:

- A) _ Липмана _
- B) _ Маринеску-Радовичи _
- C) _ Павлова _

D) _Аргайла Робертсона_

ANSWER: D

Заражающим агентом при болезни Крейтцфельда—Якоба является:

A) _белок_

B) _вирус_

C) _бактерия_

D) _грибок_

E) _простейшее_

ANSWER: A

На высокий риск внутричерепной опухоли указывает:

A) _делирий на фоне лихорадки_

B) _апраксия в сочетании с дизартрией и гипомнезией_

C) _возникший впервые эпилептический припадок у взрослого_

D) _отсутствие реакции зрачков на свет_

ANSWER: C

Психические расстройства при травмах головы обычно протекают:

A) _прогредиентно_

B) _регрессиентно_

C) _приступообразно_

D) _волнообразно_

ANSWER: B

Вследствие травмы головы делирий обычно возникает:

A) _в остром периоде_

B) _на этапе реконвалесценции_

C) _в период отдаленных последствий_

ANSWER: A

Болезнь Пика чаще всего начинается в возрасте:

A) до 19 лет

B) от 20 до 29 лет

C) от 30 до 39 лет

D) от 40 до 49 лет

E) старше 50 лет

ANSWER: E

Для диагностики прогрессивного паралича важнее всего провести:

A) _ЭЭГ_

B) _РПГА_

C) _МРТ_

D) _УЗИ_

E) _КТ_

ANSWER: B

«Стоячие симптомы» считают расстройством, довольно характерным для:

A) _сосудистой деменции_

B) _прогрессивного паралича_

C) _интоксикации тетраэтилсвинцом_

D) _болезни Пика_

E) _гипертиреоза_

ANSWER: D

Утренние и ночные головные боли, сопровождающиеся рвотой довольно характерны для:

A) _болезни Пика_

B) _прогрессивного паралича_

C) _внутричерепных опухолей_

D) _церебрального артериосклероза_

E) _отравления угарным газом_

F) _всех перечисленных поражений_

ANSWER: C

Острый психоз может быть следствием назначения лекарств:

A) _холинолитических_

B) _противопаркинсонических_

C) _противотуберкулезных_

D) _гипотензивных_

E) _всех перечисленных_

ANSWER: E

Хронические заболевания сердца могут стать причиной:

A) _астении_

B) _ипохондрии_

C) _депрессии_

D) _делирия_

E) _всех перечисленных расстройств_

ANSWER: E

Психоэндокринный синдром проявляется в первую очередь:

A) _возбуждением и помрачением сознания_

B) _аффективной неустойчивостью и нарушениями поведения_

C) _истинными галлюцинациями и парейдолическими иллюзиями_

D) _фиксационной амнезией и конфабуляциями_

E) _апраксией и дизартрией_

ANSWER: B

Из всех проявлений эпилептической болезни наиболее характерными, свойственными большинству больных считают:

A) _приступы grand mal_

B) _приступы petit mal_

C) _сумеречные помрачения сознания_

D) _специфические изменения личности_

ANSWER: D

Наибольшая заболеваемость эпилепсией отмечается:

A) _от 1 до 19 лет_

B) _от 20 до 29 лет_

C) _от 30 до 39 лет_

D) _от 40 до 49 лет_

ANSWER: A

Случаи спонтанного возникновения эпилепсии без каких-либо провоцирующих факторов составляют _____ от всех заболевших:

A) _не более 5%_

B) _до 25%_

C) _до 50%_

D) _до 75%_

ANSWER: B

Полной амнезией завершаются:

A) _grand mal_

B) _petit mal_

C) _сумеречные помрачения сознания_

D) _все перечисленные типы пароксизмов_

ANSWER: D

Дисфорию:

A) _считают парциальным припадком_

B) _считают генерализованным припадком_

C) _относят к формам сумеречного помрачения сознания_

D) _не относят к типичным проявлениям эпилепсии_

ANSWER: A

Характерной чертой эпилептической болезни считают:

A) _быстрое прогрессирование_

B) _нарастание эмоционально-волевого дефекта_

C) _стереотипность приступов_

D) _обострение на фоне эмоционального стресса_

E) _стойкую утрату трудоспособности_

ANSWER: C

К типичным признакам эпилептических изменений личности относят:

A) _педантичность_

B) _тревожность_

C) _замкнутость_

D) _агрессивность_

E) _пессимизм_

ANSWER: A

В речи больных эпилепсией часто можно заметить:

A) _символические обороты_

B) _паралогические высказывания_

C) _избыточное использование уменьшительно-ласкательных суффиксов_

D) _грубость и использование непечатных выражений_

ANSWER: C

В исходе эпилептической болезни развивается слабоумие:

A) _тотальное_

B) _лакунарное_

C) _концентрическое_

ANSWER: C

Эпилепсию следует заподозрить при возникновении у больного:

A) _пассивности и апатии_

B) _явления психического автоматизма_

C) _стереотипно повторяющихся коротких периодов галлюцинирования_

D) _периодической смены повышенного и сниженного настроения_

ANSWER: C

Более благоприятными считают варианты эпилепсии:

A) _имеющие семейный характер_

B) _с началом до 5 лет_

C) _с очагами патологической активности на ЭЭГ в височной области_

D) _возникшие после травмы головы_

ANSWER: A

В патогенезе эпилептических припадков ведущую роль отводят дисбалансу:

A) _ГАМК и глутамата_

B) _норадреналина и серотонина_

C) _дофамина и ацетилхолина_

D) _АКТГ и гидрокортизона_

ANSWER: A

Комплексы «пик—волна» на ЭЭГ:

A) _наблюдаются только при детской эпилепсии_

B) _отмечаются только при генерализованных припадках_

C) _постоянно регистрируются в медленную фазу сна_

D) _эпизодически отмечаются у здоровых людей_

ANSWER: D

Эпилептические припадки возникают:

A) _при злокачественной шизофрении_

- B) _на фоне интоксикации барбитуратами_
- C) _при алкогольном абстинентном синдроме_
- D) _только при эпилепсии_

ANSWER: C

Противоэпилептические средства принимают:

- A) _в день возникновения очередного припадка_
- B) _в течение месяца после установления диагноза_
- C) _в течение полугода после полного исчезновения припадков_
- D) _только на ночь_
- E) _непрерывно в течение многих лет_

ANSWER: E

В настоящее время при лечении эпилепсии с клонико-тоническими припадками идеальным считают:

- A) _сочетание барбитуратов с фенитоином_
- B) _монотерапию средствами против клонико-тонических припадков_
- C) _монотерапию средствами широкого спектра действия_
- D) _сочетание средств с широким и узким спектром действия_

ANSWER: C

При подборе доз антиконвульсантов рекомендуется:

- A) _начать с наименьшей и медленно наращивать_
- B) _начать с наибольшей и медленно снижать_
- C) _начать с наименьшей и быстро наращивать до эффекта_
- D) _начать со средней рекомендуемой и действовать с учетом основного и побочных эффектов_

ANSWER: A

По данным исследователей США, женщины преобладают среди пациентов с:

- A) _гэмблингом_
- B) _клептоманией_
- C) _пироманией_
- D) _эксгибиционизмом_
- E) _вуайеризмом_

ANSWER: B

Больным эпилепсией следует воздерживаться от:

- A) _умственной работы_
- B) _жирной и жареной пищи_
- C) _сна в дневное время_
- D) _приема алкоголя_
- E) _всего перечисленного_

ANSWER: D

В РФ большинство пациентов наркологических учреждений проходит лечение в связи с зависимостью от:

- A) _героина_
- B) _кокаина_
- C) _гашиша_
- D) _никотина_
- E) _алкоголя_

ANSWER: E

В настоящее время в РФ первичная учтенная заболеваемость наркоманиями по сравнению с 2000 годом

- A) _существенно выросла_
- B) _практически не изменилась_
- C) _существенно снизилась_

ANSWER: C

О наличии физической зависимости от психоактивного вещества свидетельствует:

- A) _ежедневное употребление ПАВ_
- B) _утрата количественного контроля_
- C) _высокая толерантность к ПАВ_
- D) _наличие синдрома отмены_
- E) _симптомы необратимого поражения внутренних органов_

ANSWER: D

Среди лиц зависимых от алкоголя и других психоактивных веществ смертность существенно повышена за счет увеличения вероятности стать жертвой:

- A) _соматических заболеваний_
- B) _преступлений_
- C) _травм и дорожно-транспортных происшествий_
- D) _самоубийств_
- E) _всего перечисленного_

ANSWER: E

К факторам риска употребления наркотиков и алкоголя НЕ СЛЕДУЕТ относить:

- A) _рождение и воспитание в семье больных алкоголизмом или наркоманией_
- B) _высокую самооценку и самоуверенность_
- C) _проблемы психического и физического здоровья_
- D) _низкий интеллект и отсутствие социальной компетентности_

ANSWER: B

Признаком болезни зависимости считают:

- A) _симптомы кардиомиопатии и поражения периферических нервных стволов_
- B) _наличие ПАВ в моче или сыворотке крови_
- C) _прием ПАВ, несмотря на наличие тяжелых последствий для здоровья и социального статуса_
- D) _выявление ВИЧ, вирусного гепатита и других инфекций, передаваемых через кровь_

ANSWER: C

Ухудшение артикуляции и нарушение тонкой координации движений возникает при:

- A) _легкой степени алкогольного опьянения_
- B) _средней степени алкогольного опьянения_
- C) _тяжелой степени алкогольного опьянения_

ANSWER: A

Характерными признаками патологического опьянения считают:

- A) _судорожные припадки_
- B) _бредовые идеи ревности_
- C) _неукротимую рвоту_
- D) _помрачение сознания_
- E) _любое из перечисленного_

ANSWER: D

Типичные проявления алкогольного абстинентного синдрома:

- A) _брадикардия и бледность_
- B) _отвращение к алкоголю_
- C) _тремор и эпилептические припадки_
- D) _мышечная слабость и сонливость_
- E) _жажда и повышение аппетита_

ANSWER: C

К последствиям злоупотребления алкоголем относят:

- A) _сердечные аритмии_
- B) _вирусный гепатит_
- C) _рак мочевого пузыря_
- D) _лимфобластный лейкоз_
- E) _тромбоэмболию легочной артерии_

F) _все перечисленное_

ANSWER: A

Характерным последствием алкоголизма считают:

A) _пиелонефрит_

B) _полинейропатию_

C) _паркинсонизм_

D) _приступы бронхоспазма_

E) _распространенный атеросклероз_

F) _все перечисленное_

ANSWER: B

Утрата количественного контроля наблюдается у больных алкоголизмом, начиная с:

A) I стадии

B) II стадии

C) III стадии

ANSWER: A

Именно на II стадии алкоголизма возникают:

A) _палимпсесты_

B) _псевдозапой_

C) _истинные запои_

D) _деградация личности_

ANSWER: B

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома следует обязательно назначить:

A) _нейролептики_

B) _трициклические антидепрессанты_

C) _бензодиазепиновые транквилизаторы_

D) _психостимуляторы_

E) _соли лития_

ANSWER: C

Алкогольный делирий обычно возникает на фоне

A) _патологического опьянения_

B) _тяжелого опьянения_

C) _опьянения средней степени_

D) _легкого опьянения_

E) _отказа от приема спиртного_

ANSWER: E

К типичным проявлениям белой горячки НЕ ОТНОСЯТ:

A) _нарушение ориентировки в собственной личности_

B) _истинные галлюцинации_

C) _иллюзии_

D) _помрачение сознания_

E) _психомоторное возбуждение_

ANSWER: A

Признаками тяжелого делирия с высоким риском осложнений считают:

A) _потливость и полиурию_

B) _выраженное повышение АД_

C) _психомоторное возбуждение_

D) _гипертермию и обезвоживание_

E) _тремор и гиперемию кожных покровов_

ANSWER: D

Следствием тяжелой алкогольной зависимости является:

A) _болезнь Крейтцфельда—Якоба_

B) _болезнь Стерджа—Вебера_

C) _синдром Леннокса—Гасто_

D) _энцефалопатия Гайе—Вернике_

E) _синдром Жиля де ля Туретта_

ANSWER: D

Ранним признаком начинающегося алкогольного психоза считают:

A) _аффект витальной тоски_

B) _вспыльчивость и дисфорию_

C) _тревогу и упорную бессонницу_

D) _явления «дежа вю» и «жаме вю»_

E) _ступор и мутизм_

F) _все перечисленное_

ANSWER: C

К косвенным признакам алкоголизма относят:

A) _гепатомегалию и спленомегалию_

B) _длительные периоды полного воздержания от спиртного_

C) _полинейропатию_

D) _макроцитоз эритроцитов_

E) _повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови_

F) _всё перечисленное_

ANSWER: F

Больным в случае алкогольного абстинентного синдрома обязательно следует вводить витамин:

A) _A_

B) _B1_

C) _PP_

D) _C_

E) _E_

ANSWER: B

К характерным проявлениям корсаковского психоза относят

A) _псевдогаллюцинации_

B) _бред ревности_

C) _психомоторное возбуждение_

D) _фиксационную амнезию_

E) _дезориентировку в собственной личности_

ANSWER: D

К косвенным диагностическим признакам наркоманий НЕ ОТНОСЯТ:

A) _беспричинные колебания настроения_

B) _крупные денежные траты_

C) _снижение или повышение аппетита_

D) _дизартрию и ухудшение памяти_

E) _изменение реакции зрачка_

ANSWER: D

Характерным признаком приема опиоидов считают:

A) _расширение зрачка_

B) _нарушение координации ___движений_

C) _истинные галлюцинации_

D) _редкое дыхание_

E) _повышение сексуального влечения_

ANSWER: A

Опиоидам НЕ СВОЙСТВЕННО:

A) _обезболивающее действие_

B) _галлюциногенное действие_

C) _седативное действие_

D) _противокашлевое действие_

Е) _противодиарейное действие_

ANSWER: B

Налтрексон используют у больных с опиоидной зависимостью:

А) _для купирования опьянения_

В) _для купирования АС_

С) _на этапе формирования ремиссии_

Д) _для поддерживающего лечения_

ANSWER: D

Характерными признаками кокаинового опьянения считают:

А) _бессонницу и гиперсексуальность_

В) _миоз и диарею_

С) _повышение аппетита и ухудшение памяти_

Д) _полиурию и полидипсию_

ANSWER: A

Характерными признаками приема каннабиноидов считают:

А) _нарушение координации движений и дизартрию_

В) _бред и галлюцинации_

С) _кашель и чихание_

Д) _покраснение лица и повышение аппетита_

Е) _потливость и слюнотечение_

Ф) _все перечисленное_

ANSWER: D

Наиболее выраженная энцефалопатия развивается при длительном употреблении:

А) _морфина_

В) _кокаина_

С) _каннабиноидов_

Д) _летучих растворителей_

Е) _ЛСД_

ANSWER: D

Одномоментное прекращение приема психоактивного вещества не рекомендуется при лечении зависимости от:

А) _героина_

В) _кокаина_

С) _амфетамина_

Д) _летучих растворителей_

Е) _барбитуратов_

ANSWER: E

У больных алкоголизмом формируется перекрестная толерантность к:

А) _героину_

В) _каннабиноидам_

С) _кокаину_

Д) _барбитуратам_

Е) _ЛСД_

Ф) _всему перечисленному_

ANSWER: D

Характерным признаком никотиновой зависимости является:

А) _волчий аппетит_

В) _утренний кашель_

С) _фиксационная амнезия_

Д) _нарастающая пассивность_

Е) _гиперсексуальность_

ANSWER: B

Важнейшим диагностическим признаком маниакально-депрессивного психоза считают

наличие:

- A) _приступов депрессии_
- B) _хронической депрессии_
- C) _приступов мании_
- D) _хронической мании_
- E) _интермиссий_

ANSWER: E

Течение биполярного расстройства тесно связано с

- A) _семейной обстановкой_
- B) _погодными условиями_
- C) _внутренними биоритмами_
- D) _соматическим здоровьем_
- E) _условиями питания_
- F) _периодами солнечной активности_

ANSWER: C

Монополярная депрессия возникает:

- A) _чаще у мужчин_
- B) _чаще у женщин_
- C) _примерно одинаково часто у мужчин и женщин_

ANSWER: B

В генезе МДП наиболее заметную роль играют:

- A) _генетические факторы_
- B) _эмоциональный стресс_
- C) _злоупотребление психоактивными веществами_
- D) _травмы головы_
- E) _внутриутробные вредности и патологические роды_

ANSWER: A

Состояние полного психического здоровья в промежутках между болезненными фазами МДП называют:

- A) _компенсацией_
- B) _обстипацией_
- C) _ремиссией_
- D) _интермиссией_
- E) _регрессией_

ANSWER: D

Anaesthesia psychica dolorosa рассматривается как симптом, типичный для:

- A) _депрессии_
- B) _мании_
- C) _интермиссии_
- D) _циклотимии_
- E) _дистимии_

ANSWER: A

Настроение у депрессивных больных обычно

- A) _ухудшается на фоне респираторной инфекции_
- B) _улучшается после встречи с близкими_
- C) _ухудшается в утренние часы_
- D) _улучшается в солнечный день_
- E) _не меняется в течение дня_

ANSWER: C

Типичными проявлениями мании считают:

- A) _тремор и гиперкинезы_
- B) _сердцебиение и непереносимость жары_
- C) _повышение аппетита и нарушение сна_

- D) _запор и повышение тонуса мышц_
- E) _потливость и широкие глазные щели_

ANSWER: C

В подавляющем большинстве случаев биполярный психоз начинается в возрасте:

- A) _от 10 до 15 лет_
- B) _от 16 до 25 лет_
- C) _от 30 до 45 лет_
- D) _от 50 до 65 лет_

ANSWER: B

Быструю смену относительно неглубоких аффективных фаз называют:

- A) _циклотимией_
- B) _дистимией_
- C) _гипотимией_
- D) _алекситимией_

ANSWER: A

В исходе маниакально-депрессивного психоза наблюдается:

- A) _ухудшение памяти_
- B) _нарушения понимания_
- C) _апатия и абulia_
- D) _нарастание замкнутости и подозрительности_
- E) _нарастание эгоцентризма_
- F) _ничего из перечисленного_

ANSWER: F

Аффективные психозы несколько чаще развиваются у пациентов:

- A) _с астеническим телосложением_
- B) _склонных к полноте_
- C) _с диспластическим телосложением_
- D) _физически тренированных_
- E) _высокого роста_

ANSWER: B

Случаи хронической подавленности без выраженных колебаний в самочувствии называют:

- A) _апатией_
- B) _дисфорией_
- C) _дистимией_
- D) _астенией_
- E) _дистонией_

ANSWER: E

Важнейшими механизмами развития депрессии считают нарушение баланса:

- A) _норадреналина и серотонина_
- B) _ГАМК и глутамата_
- C) _дофамина и ацетилхолина_
- D) _гистамина и пролактина_

ANSWER: A

Нигилистический ипохондрический бред характерен для:

- A) _биполярного психоза_
- B) _реактивной депрессии_
- C) _инволюционной депрессии_
- D) _циклотимии_
- E) _дистимии_

ANSWER: C

Психотерапия наиболее эффективна при:

- A) _биполярном психозе_
- B) _монополярной депрессии_

- C) _реактивной депрессии_
- D) _инволюционной депрессии_
- E) _циклотимии_

ANSWER: C

В амбулаторной практике для лечения депрессии наиболее безопасными считаются:

- A) _ТЦА и миансерин_
- B) _пиразидол и СИОЗС_
- C) _необратимые ингибиторы MAO_
- D) _бензодиазепиновые транквилизаторы_

ANSWER: B

Для преодоления резистентности при депрессии применяют:

- A) _гемодиализ и гемосорбцию_
- B) _гипербарическую оксигенацию_
- C) _инсулинокоматозную терапию_
- D) _электросудорожную терапию_

ANSWER: D

В межприступный период больным с биполярным расстройством рекомендуют принимать:

- A) _антидепрессанты или нейрореплепты_
- B) _барбитураты или транквилизаторы_
- C) _соли лития или противосудорожные средства_
- D) _ноотропы или психостимуляторы_
- E) _не принимать никаких лекарств_

ANSWER: C

Эмоциональный стресс играет важную роль в возникновении:

- A) _корсаковского синдрома_
- B) _мании_
- C) _псевдодеменции_
- D) _делирия_
- E) _кататонии_
- F) _всего перечисленного_

ANSWER: C

Психогенные заболевания:

- A) _возникают непосредственно после действия стресса_
- B) _проявляются симптомами, логично связанными со стрессовой ситуацией_
- C) _заканчиваются выздоровлением после разрешения стрессовой ситуации_
- D) _характеризуются всем перечисленным_

ANSWER: D

Типичным исходом реактивных психозов является:

- A) _выздоровление_
- B) _формирование ремиссии_
- C) _мнестико-интеллектуальный дефект_
- D) _апатико-абулический дефект_
- E) _длительное безремиссионное непрогредиентное течение_

ANSWER: A

Характерной чертой аффективно-шоковых реакций считают:

- A) _наличие галлюцинаций_
- B) _тоску и безысходность_
- C) _дурашливость и кривляние_
- D) _явление психического автоматизма_
- E) _помрачение сознания_

ANSWER: E

Характерной чертой посттравматического стрессового расстройства считают:

- A) _наличие бреда преследования_

- B) _отказ от врачебной помощи_
- C) _ступор или возбуждение_
- D) _мутизм и негативизм_
- E) _помрачение сознания_

ANSWER: B

Ситуации, связанные с внезапно возникшей угрозой жизни, часто вызывают:

- A) _аффективно-шоковую реакцию_
- B) _реактивную депрессию_
- C) _реактивный паранойд_
- D) _истерический психоз_

ANSWER: A

Возникновению реактивного параноида способствует:

- A) _низкий уровень интеллекта и образования_
- B) _воспитание в неполной семье_
- C) _пребывание в иноязычной среде_
- D) _работа с техническими устройствами_
- E) _длительное воздержание от сексуальных контактов_

ANSWER: C

Появление у больного негативной симптоматики:

- A) _подтверждает диагноз невроза_
- B) _подтверждает диагноз реактивного психоза_
- C) _подтверждает диагноз МДП_
- D) _исключает диагноз шизофрении_
- E) _исключает диагноз любого психогенного заболевания_

ANSWER: E

Наиболее эффективной при реактивной депрессии считается:

- A) _бихевиоральная психотерапия_
- B) _когнитивная психотерапия_
- C) _суггестивная психотерапия_
- D) _релаксирующая психотерапия_
- E) _ _

ANSWER: B

Самым благоприятным вариантом невроза считают:

- A) _неврастению_
- B) _обсессивно-фобический невроз_
- C) _истерию_

ANSWER: A

Невроз ожидания считают вариантом:

- A) _неврастении_
- B) _обсессивно-фобического невроза_
- C) _истерии_

ANSWER: B

Наследственные факторы в этиологии и патогенезе неврозов:

- A) _рассматриваются как основные причинные_
- B) _имеют существенное значение_
- C) _определяют прогноз болезни_
- D) _не играют никакой роли_

ANSWER: B

Закрепление в поведении больных неврозами патологических стереотипов, стремление приспособить свою жизнь к проявлениям болезни называют:

- A) _морально-этическим дефектом личности_
- B) _внутриличностным конфликтом_
- C) _невротическим развитием личности_

D) _органическим дефектом личности_

E) _личностным ростом_

ANSWER: C

Большинству больных неврозом свойственно стремление:

A) _получить социальные выгоды от своей болезни_

B) _ограничить круг общения_

C) _избегать чрезмерных физических нагрузок_

D) _делиться своими переживаниями со всеми окружающими_

E) _сохранить свой социальный статус и трудоспособность_

ANSWER: E

Характерными чертами психопатии считают:

A) _малую прогредиентность и эгодистонность_

B) _цикличность и фрагментарность_

C) _относительную стабильность и тотальность_

D) _регрессиентность и пароксизмальность_

ANSWER: C

Среди российских психиатров наиболее полно проблему психопатии исследовал:

A) _Кандинский_

B) _Корсаков_

C) _Сербский_

D) _Ганнушкин_

E) _Кащенко_

F) _Снежневский_

ANSWER: D

Психопатию считают:

A) _грубой личностной дисгармонией_

B) _преходящей реакцией на стрессовую ситуацию_

C) _относительно благоприятным заболеванием_

D) _вариантом здоровой личности_

ANSWER: A

Наиболее точное представление о личности человека можно получить, анализируя:

A) _его наследственную отягощенность_

B) _результаты обследования с помощью личностных опросников_

C) _его ЭЭГ и другие психофизиологические показатели_

D) _совершенные им ранее поступки_

ANSWER: D

Психопатии, возникшие вследствие неправильного воспитания в детстве, называют:

A) _тормозимыми_

B) _краевыми_

C) _эгодистонными_

D) _эксцентричными_

E) _ядерными_

ANSWER: B

Характерной чертой психастеников считают:

A) _сверхценные идеи_

B) _дисфории_

C) _конверсионные расстройства_

D) _навязчивое мудрствование_

E) _экстраверсию_

ANSWER: D

Для паранойяльных психопатов свойственны:

A) _упорство и стеничность_

B) _подозрительность и эгоцентризм_

- C) _склонность к формированию сверхценных идей_
- D) _нетерпимость к ущемлению прав личности_
- E) _все перечисленное_

ANSWER: E

Отсутствие воли и терпеливости считают характерной чертой психопатов:

- A) _паранойяльных_
- B) _истерических_
- C) _неустойчивых_
- D) _эксплозивных_
- E) _психастенических_

ANSWER: C

Замкнутость считают характерной чертой:

- A) _истерических и возбудимых психопатов_
- B) _паранойяльных и неустойчивых психопатов_
- C) _дистимических психопатов и психастеников_

ANSWER: C

Алкоголизм нередко становится декомпенсацией:

- A) _истерической и шизоидной психопатий_
- B) _психастении и неустойчивой психопатии_
- C) _паранойяльной и астенической психопатий_

ANSWER: B

Склонность к обману считают довольно характерной чертой:

- A) _истерических и неустойчивых психопатов_
- B) _психастеников и астенических психопатов_
- C) _возбудимых и дистимических психопатов_

ANSWER: A

Резкое преобладание 1-й сигнальной системы характерно для:

- A) _паранойяльных психопатов_
- B) _шизоидных психопатов_
- C) _психастеников_
- D) _дистимических психопатов_
- E) _истерических психопатов_
- F) _всех перечисленных_

ANSWER: E

Педантичность является довольно характерной чертой:

- A) _психастеников_
- B) _истерических психопатов_
- C) _неустойчивых психопатов_
- D) _гипертимических психопатов_
- E) _дистимических психопатов_
- F) _всех перечисленных_

ANSWER: A

Инфантилизм считают довольно характерной чертой:

- A) _паранойяльных психопатов_
- B) _шизоидных психопатов_
- C) _психастеников_
- D) _гипертимических психопатов_
- E) _истерических психопатов_

ANSWER: E

Сезонные колебания активности при психопатиях относят к:

- A) _фазам_
- B) _эволюционным изменениям_
- C) _патологическим реакциям_

ANSWER: A

К расстройствам половой идентификации относят:

- A) _фетишизм и вуайеризм_
- B) _транссексуализм и трансвестизм_
- C) _эксгибиционизм и гомосексуализм_
- D) _садизм и мазохизм_

ANSWER: B

Возникновение психопатии объясняют:

- A) _патологической наследственностью_
- B) _органическими повреждениями в раннем детстве_
- C) _неправильным воспитанием_
- D) _сочетанием всех перечисленных факторов_

ANSWER: D

Лицам с пониженной самооценкой, тревожным, подавленным, склонным к необоснованным страхам и панике рекомендуют принимать:

- A) _нейролептики_
- B) _антидепрессанты_
- C) _транквилизаторы_
- D) _антиконвульсанты_
- E) _соли лития_
- F) _ноотропы_

ANSWER: B

Для коррекции расстройств личности лучше всего использовать психотерапию:

- A) _суггестивную_
- B) _рациональную_
- C) _когнитивную_
- D) _групповую_
- E) _бихевиоральную_

ANSWER: D

Характерной чертой умственной отсталости считают отсутствие:

- A) _продуктивной симптоматики_
- B) _прогредиентности_
- C) _апатико-абулического синдрома_
- D) _расстройств сознания_

ANSWER: B

Распространенность олигофрений на 10 тысяч населения в большинстве стран составляет примерно:

- A) 1
- B) 5
- C) 10
- D) 100
- E) 1000

ANSWER: D

Олигофрению обнаруживают:

- A) _чаще у мальчиков_
- B) _чаще у девочек_
- C) _одинаково часто у обоих полов_

ANSWER: A

В наибольшей степени при олигофрении нарушены:

- A) _долговременная память и восприятие_
- B) _способности к пониманию и познанию_
- C) _эмоции и двигательные акты_
- D) _сознание и ориентировка в окружающем_

ANSWER: B

Одним из типичных проявлений умственной отсталости считают:

- A) _ олигофазию _
- B) _ апатию _
- C) _ псевдодеменцию _
- D) _ восковую гибкость _
- E) _ астазию и абазию _

ANSWER: A

Навыки и способности взрослых олигофренов по сравнению с их же способностями в детстве:

- A) более развиты
- B) менее развиты
- C) также развиты

ANSWER: A

Наибольшая частота психозов при олигофрении отмечается в:

- A) _ дошкольном _ возрасте
- B) _ пубертатном _ возрасте
- C) _ зрелом _ возрасте
- D) _ климактерическом _ возрасте
- E) _ старческом _ возрасте

ANSWER: B

В настоящее время доля пациентов с олигофренией, у которых удается установить причину патологии составляет не более:

- A) 35%
- B) 47%
- C) 53%
- D) 68%
- E) 80%

ANSWER: A

В МКБ-10 умственная отсталость классифицируется:

- A) _ по ведущей продуктивной симптоматике _
- B) _ по типу патогенного фактора _
- C) _ по времени действия патогенного фактора _
- D) _ по степени психического дефекта _

ANSWER: D

Клинические и субклинические варианты умственной отсталости у ближайших родственников отмечаются:

- A) _ чаще при дебильности _
- B) _ чаще при имбецильности и идиотии _
- C) _ одинаково часто при легкой и тяжелой умственной отсталости _

ANSWER: A

Болезнь Дауна относят к:

- A) _ хромосомным абберациям _
- B) _ аутосомно-доминантным генным дефектам _
- C) _ аутосомно-рецессивным генным дефектам _
- D) _ сцепленным с полом генным дефектам _
- E) _ постнатальным эндокринопатиям _

ANSWER: A

Кретинизм относят к:

- A) _ хромосомным абберациям _
- B) _ сцепленным с полом генным дефектам _
- C) _ интоксикационным эмбриопатиям _
- D) _ постнатальным эндокринопатиям _

ANSWER: D

При олигофрении довольно часто возникают:

- A) _псевдогаллюцинации_
- B) _конверсионные симптомы_
- C) _онейроидные помрачения сознания_
- D) _судорожные припадки_

ANSWER: D

Для детей с фенилкетонурией характерны:

- A) _снижение слуха и волчий аппетит_
- B) _депигментация и пот с неприятным запахом_
- C) _двигательная расторможенность и оттопыренные уши_
- D) _эктопия хрусталика и тромбозы вен_
- E) _шелушение волосистой части головы и двусторонняя катаракта_

ANSWER: B

Триада Гетчинсона характерна для врожденного:

- A) _листериоза_
- B) _сифилиса_
- C) _токсоплазмоза_
- D) _резус-конфликта_
- E) _кретинизма_
- F) _рубцеллярного энцефалита_

ANSWER: B

Признаком психического инфантилизма считают:

- A) _недоразвитие абстрактного мышления_
- B) _плохую память и расстройство внимания_
- C) _низкую успеваемость в школе_
- D) _двигательную неловкость_
- E) _эмоциональную незрелость_

ANSWER: E

Сцепленный с полом тип наследования характерен для синдрома:

- A) _Дауна_
- B) _Мартина—Бэлл_
- C) _Марфана_
- D) _Лоренса—Муна—Барде—Бидля_
- E) _Лежена_

ANSWER: B

У пациентов с детским аутизмом умственная отсталость:

- A) _наблюдается во всех случаях_
- B) _отмечается у большей части пациентов_
- C) _отмечается у меньшей части _пациентов_
- D) _никогда не наблюдается_

ANSWER: B

Психические расстройства у детей наблюдаются по сравнению со взрослыми:

- A) _реже_
- B) _чаще_
- C) _так же часто_

ANSWER: C

Избегание зрительного контакта, неадекватное использование жестов, интонации и мимики при выражении эмоций, недоразвитие речи со склонностью к повторам и эхолалии характерны для:

- A) _гиперкинетического расстройства_
- B) _детского аутизма_
- C) _синдрома Ландау—Клеффнера_

D) _синдрома Жиля де ля Туретта_

E) _синдрома Леннокса—Гасто_

ANSWER: B

Синдром Аспергера часто бывает ассоциирован с:

A) _бредом преследования_

B) _навязчивостями_

C) _эпилептическими припадками_

D) _умственной отсталостью_

E) _множественными гиперкинезами_

ANSWER: B

Приступы потери сознания с наклонами вперед, пропульсиями, кивками и задержкой психического развития характерны для синдрома:

A) _Аспергера_

B) _Каннера_

C) _Уэста_

D) _Геллера_

E) _Ретта_

ANSWER: C

Гиперкинетическое расстройство:

A) _чаще отмечается у мальчиков_

B) _чаще отмечается у девочек_

C) _одинаково часто обнаруживается у обоих полов_

ANSWER: A

Для лечения гиперкинетического расстройства чаще всего используют:

A) _барбитураты и бензодиазепины_

B) _антидепрессанты и симпатомиметики_

C) _соли лития и антиконвульсанты_

D) _нейролептики и десмопрессин_

ANSWER: B

Инфантилизму чаще всего сопутствует телосложение:

A) _пикническое_

B) _лептосомное_

C) _атлетическое_

D) _грацильное_

ANSWER: D

Заикание может быть одним из основных проявлений:

A) _шизофрении_

B) _эпилепсии_

C) _маниакально-депрессивного психоза_

D) _олигофрении_

E) _невроза_

ANSWER: E

Диагноз энуреза не ставится детям младше:

A) 4 лет

B) 6 лет

C) 8 лет

D) 10 лет

E) 12 лет

ANSWER: A

Для лечения энуреза применяют:

A) _трифторидонин_

B) _десмопрессин_

C) _гуанфацин_

- D) _ атомоксетин _
- E) _ синтетический аналог АКТГ _

ANSWER: B

Тики обычно:

- A) _ усиливаются по сне _
- B) _ полностью амнезируются _
- C) _ подавляются усилием воли _
- D) _ исчезают во время стресса _
- E) _ прогрессируют в течение всей жизни _

ANSWER: C

Для синдрома Жиля де ля Туретта характерны:

- A) _ аутизм и амбивалентность _
- B) _ речь «взахлеб» с множеством повторений _
- C) _ навязчивое стремление к чистоте и порядку _
- D) _ произнесение бранных слов _

ANSWER: D

Фантазии в виде самооговоров, ложных признаний в преступлениях, рассказов о невероятных приключениях характерны для подростков с личностными чертами:

- A) _ шизоидными _
- B) _ эпилептоидными _
- C) _ циклоидными _
- D) _ истерическими _

ANSWER: D

Шизофрения в детском возрасте чаще всего проявляется:

- A) _ галлюцинациями _
- B) _ систематизированным бредом _
- C) _ атипичной депрессией _
- D) _ кататонической симптоматикой _

ANSWER: D

Почти все психические заболевания, возникшие в детском возрасте приводят к:

- A) _ апатико-абулическому синдрому _
- B) _ кататоническому ступору _
- C) _ грубому расстройству памяти _
- D) _ задержке психического развития _
- E) _ ранней смерти _

ANSWER: D

Метаболизм психофармакологических средств у детей по сравнению со взрослыми:

- A) _ происходит быстрее _
- B) _ замедлен _
- C) _ существенно не отличается _

ANSWER: A

При назначении нейролептиков детям предпочитают использовать:

- A) _ малые дозы мощных средств _
- B) _ малые дозы низкопотентных средств _
- C) _ большие дозы мощных средств _
- D) _ большие дозы низкопотентных средств _

ANSWER: A

Для скорейшего выздоровления в детском психиатрическом отделении следует:

- A) _ совместно обсуждать факты нарушения дисциплины _
- B) _ изолировать тревожных пациентов от гиперактивных _
- C) _ ограничить контакты детей с родителями _
- D) _ организовать режим «занятости» _
- E) _ делать всё перечисленное _

ANSWER: D

Фиксируя возбужденного больного в постели, необходимо:

- A) _получить письменное согласие родственников_
- B) _поместить его в отдельную палату_
- C) _неотступно находиться у его постели_
- D) _снять с него одежду и белье_
- E) _ограничивать прием жидкости и соли_

ANSWER: C

Существенную опасность представляют больные с:

- A) _контрастными навязчивостями_
- B) _бредом ревности_
- C) _истерической конверсией_
- D) _конфабуляциями_
- E) _сенестопатиями_

ANSWER: B

Вероятность, что суицидальная попытка приведет к смерти, больше всего у:

- A) _молодых мужчин_
- B) _молодых женщин_
- C) _пожилых мужчин_
- D) _пожилых женщин_

ANSWER: C

О своих суицидальных мыслях пациенты рассказывают врачу:

- A) _в большинстве случаев_
- B) _иногда_
- C) _крайне редко_
- D) _почти никогда_

ANSWER: A

В случае активного суицидального поведения в первую очередь следует назначить:

- A) _антидепрессанты_
- B) _нейролептики или литий_
- C) _ноотропы или психостимуляторы_
- D) _ β -блокаторы_
- E) _суггестивную психотерапию_

ANSWER: B

Отказ от еды характерен для синдрома:

- A) _парафренного_
- B) _обсессивно-фобического_
- C) _гебоидного_
- D) _маниакального_
- E) _кататонического_

ANSWER: E

Для предупреждения и своевременного выявления скрытого отказа от приема пищи рекомендуется:

- A) _проверять наличие продуктов в холодильнике_
- B) _проводить еженедельное взвешивание_
- C) _следить за поведением больных в туалете_
- D) _фиксировать больного в постели_
- E) _назначить больному высококалорийную диету_

ANSWER: B

О длительном голодании свидетельствует:

- A) _запор и запах ацетона изо рта_
- B) _расширение зрачков и урежение дыхания_
- C) _сужение зрачков и отсутствие реакции на свет_

- D) _ночные боли в эпигастрии_
E) _распространенный кариес и отечность вокруг глаз_

ANSWER: A

Делирий рассматривается как:

- A) _острая психогенная реакция_
B) _благоприятно протекающий функциональный психоз_
C) _острый приступ эндогенного заболевания_
D) _угрожающий жизни органический психоз_

ANSWER: D

При делирии во всех случаях необходимо:

- A) _фиксировать больного в постели_
B) _ввести внутримышечно большую дозу нейролептика_
C) _ввести внутривенно бензодиазепиновый транквилизатор_
D) _корректировать метаболические нарушения и соматические расстройства_

ANSWER: D

При эпилептическом статусе в первую очередь необходимо:

- A) _фиксировать больного в постели_
B) _ввести внутримышечно большую дозу нейролептика_
C) _ввести внутривенно бензодиазепиновый транквилизатор_
D) _корректировать метаболические нарушения и соматические расстройства_

ANSWER: C

Чаще всего причиной эпилептического статуса является:

- A) _злокачественная эпилепсия_
B) _внутричерепные опухоли_
C) _алкогольная интоксикация_
D) _абстинентный синдром при опиной наркомании_

ANSWER: B

При всех острых психозах необходимо:

- A) _фиксировать больного в постели_
B) _регулярно измерять температуру тела_
C) _назначить бензодиазепиновые транквилизаторы_
D) _еженедельно взвешивать пациента_
E) _ограничивать прием жидкости и соли_

ANSWER: B

Признаком злокачественного нейролептического синдрома считают:

- A) _клонические судороги и кому_
B) _диарею и неукротимую рвоту_
C) _боли за грудиной и нарушения сердечного ритма_
D) _кашель и отеки на нижних конечностях_
E) _гипертермию и мышечную ригидность_

ANSWER: E

Серотониновый синдром часто развивается при сочетании:

- A) _трициклических антидепрессантов и фенотиазиновых нейролептиков_
B) _лития и атипичных нейролептиков_
C) _бензодиазепиновых транквилизаторов и антиконвульсантов_
D) _антидепрессантов из группы СИОЗС и ингибиторов MAO_
E) типичных нейролептиков и циклодола

ANSWER: D

Передозировка трициклических антидепрессантов может спровоцировать:

- A) _злокачественную гипертермию_
B) _серотониновый синдром_
C) _холинолитический делирий_
D) _злокачественный нейролептический синдром_

Е) _апноэ во сне_

ANSWER: C

Отравление психофармакологическими средствами чаще всего бывает результатом:

А) _некомпетентности врача_

В) _невнимательности больного_

С) _индивидуальной непереносимости препарата_

Д) _суицидальных намерений_

Е) _непредсказуемого сочетания нескольких факторов_

ANSWER: D

Известно, что пациент принял 2 часа назад 100 таблеток неизвестного психофармакологического средства, в первую очередь следует:

А) _промыть желудок_

В) _провести форсированный диурез_

С) _ввести внутривенно сильный стимулирующий препарат_

Д) _ввести налоксон_

Е) _провести плазмаферез_

ANSWER: A

При отравлении опиатами обычно наблюдают:

А) _тахикардию и анурию_

В) _гиперэмию лица и бледный носогубный треугольник_

С) _миоз и брадикардию_

Д) _тошноту и рвоту_

Е) _повторные клонико-тонические судороги на фоне комы_

ANSWER: C

Методом выбора при отравлении опиатами считается внутривенное введение:

А) _диазепама_

В) _преднизолона_

С) _бромкриптина_

Д) _налоксона_

Е) _дроперидола_

ANSWER: D

Страх смерти чаще всего:

А) _заставляет человека обратиться к врачу_

В) _мешает использовать психологическую защиту_

С) _резко выражен у дистимичных личностей_

Д) _дезорганизует мышление человека_

ANSWER: D

Чувство скуки указывает на неудовлетворенную потребность в:

А) _понимании_

В) _аффилиации_

С) _переживаниях_

Д) _доминировании_

Е) _положительной самооценке_

ANSWER: C

Потребность в понимании наиболее выражена у лиц:

А) _с повышенной самооценкой_

В) _альтруистичных_

С) _с преобладанием второй сигнальной системы_

Д) _экстравертированных_

Е) _гипотимных_

ANSWER: C

Стремление найти оправдания своим действиям, переложить вину за собственную ошибку на кого-либо другого, или объяснить плохой исход неудачными обстоятельствами считается

проявлением потребности в:

- A) _ понимания _
- B) _ аффилиации _
- C) _ переживаниях _
- D) _ доминировании _
- E) _ положительной самооценке _

ANSWER: E

Стремление к автономии характерно для лиц:

- A) _ с заниженной самооценкой _
- B) _ эгоцентричных _
- C) _ с преобладанием первой сигнальной системы _
- D) _ интровертированных _
- E) _ демонстративных _

ANSWER: D

Чувство стыда связывают с неудовлетворенной потребностью:

- A) _ в переживаниях _
- B) _ соответствовать общественной норме _
- C) _ принадлежать к группе _
- D) _ в понимании _
- E) _ принижать себя _
- F) _ в доминировании _

ANSWER: B

Неудовлетворенность может быть следствием:

- A) _ неоправдавшихся ожиданий _
- B) _ сравнения своих и чужих достижений _
- C) _ несоответствия результата собственным заслугам _
- D) _ всего перечисленного _

ANSWER: D

При сравнении с окружающими наибольшую неудовлетворенность испытывают лица:

- A) _ с завышенной самооценкой _
- B) _ альтруистичные _
- C) _ с преобладанием второй сигнальной системы _
- D) _ экстравертированные _
- E) _ гипотимные _

ANSWER: A

Попытки реорганизовать работу медицинского учреждения, ввести новые методы лечения и обследования:

- A) _ обычно приветствуются всеми членами коллектива _
- B) _ способствуют сплоченности коллектива _
- C) _ могут приводить к конфликту _
- D) _ обусловлены исключительно альтруистическими мотивами _
- E) _ все перечисленное _ _ верно _

ANSWER: C

Период активной адаптации к болезни обычно характеризуется наличием:

- A) _ паники _
- B) _ индифферентности _
- C) _ эйфории _
- D) _ депрессии _
- E) _ всего перечисленного _

ANSWER: C

Внутренняя картина болезни определяется:

- A) _ этапом течения болезни _
- B) _ типом личности пациента _

- C) _отношением к данному заболеванию в обществе_
- D) _возрастом больного_
- E) _всем перечисленным_

ANSWER: E

Если вопрос пациента приводит врача в растерянность, лучше всего:

- A) _сохранять самообладание и демонстрировать уверенность_
- B) _отказаться от ответа_
- C) _ответить вопросом на вопрос_
- D) _перенаправить пациента к компетентному лицу_

ANSWER: C

Высказанное врачу в лицо желание умереть следует расценивать как:

- A) _свободный выбор индивидуума_
- B) _минутную слабость_
- C) _призыв о помощи_
- D) _желание избавиться от помехи_
- E) _аморальный поступок_

ANSWER: C

Врач, решивший приблизить смерть тяжелобольному пациенту, вероятнее всего:

- A) _обладает сильной волей_
- B) _руководствуется только гуманными принципами_
- C) _удовлетворяет свои собственные неосознаваемые потребности_
- D) _хочет продемонстрировать своё несогласие с обществом_

ANSWER: C

К типичным стадиям осознания приближающейся смерти относят все следующие КРОМЕ:

- A) _фазы агрессии_
- B) _фазы депрессии_
- C) _фазы анализа_
- D) _стадии примирения с судьбой_
- E) _фазы отрицания_
- F) _фазы шока_

ANSWER: C

Психологическая работа с неизлечимо больными более эффективна, если она повышает:

- A) _настроение и общий тонус_
- B) _чувство самореализации_
- C) _чувство защищенности и безопасности_
- D) _степень общительности пациента_
- E) _степень компетентности_

ANSWER: B

Родственники умирающего больного довольно часто:

- A) _проявляют эгоизм и равнодушие_
- B) _не верят в возможность близкой смерти_
- C) _стремятся приблизить смерть близкого_
- D) _реалистично оценивают перспективы пациента_
- E) _переживают примерно такие же чувства, как и пациент_

ANSWER: E

При сообщении негативной информации важнее всего использовать принципы:

- A) _логичности и обоснованности_
- B) _спокойствия и непоколебимости_
- C) _искренности и ступенчатости_
- D) _душевности и эмоциональности_
- E) _сомнительности и неопределенности_
- F) _оптимизма и веры в лучший исход_

ANSWER: C

Согласно опросам доля тех, кто хотели бы, чтоб их своевременно поставили в известность, в случае обнаружении у них злокачественной опухоли составляет:

- A) _около трети_
- B) _примерно половину_
- C) _около 70%_
- D) _больше 90%_

ANSWER: D

Если сообщение врача привело больного в шок и выразилось бурными чувствами, правильное всего:

- A) _предложить больному стакан воды_
- B) _пожурить его за несдержанность_
- C) _назвать переживаемые больным чувства словами_
- D) _показать собственной мимикой те же самые чувства_
- E) _продемонстрировать безучастность_

ANSWER: C

Чрезмерная тревога — это результат:

- A) _реакции на экстраординарную ситуацию_
- B) _ухудшения соматического состояния_
- C) _панической атаки_
- D) _депрессии_
- E) _начинающегося психоза_
- F) _всего перечисленного_

ANSWER: F

Если обнаружено, что пациент симулирует болезнь, правильное всего:

- A) _отказать в лечении с помощью комиссии специалистов_
- B) _выразить радость по поводу того, что у пациента нет опасного заболевания_
- C) _прямо заявить пациенту о раскрытом обмане_
- D) _сообщить своё заключение в присутствии родственников или других свидетелей_

ANSWER: B

В основе диссимуляции всегда лежит:

- A) _депрессия_
- B) _агрессия_
- C) _страх_
- D) _недоумение_
- E) _некомпетентность_
- F) _всё перечисленное_

ANSWER: C