

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт Фармации им. А.П. Нелюбина
Кафедра фармакологии

Методические материалы по дисциплине:

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Фармакология

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета

31.00.00 Клиническая медицина

31.05.02 Педиатрия

№	Текст вопроса	Ответ (буквенный)
	ТЕРМИНОЛОГИЯ	
1.	ДЕ-1. Вопрос-1 ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ: А) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ Б) VIDAL В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" Г) Государственный реестр лекарственных средств @	А
2.	ДЕ-1. Вопрос-2 ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ: А) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" Б) VIDAL В) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ Г) Государственный реестр лекарственных средств @	А
3.	ДЕ-1. Вопрос-3 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ РАЗМЕЩЕНЫ В: А) Государственный реестр лекарственных средств Б) Реестре лекарственных средств В) Справочник Машковского Г) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ @	А
4.	ДЕ-1. Вопрос-4 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ КОНКРЕТНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПАРТИЙ И СЕРИЙ МОЖНО НАЙТИ: А) в Государственном реестре лекарственных средств Б) на сайте консультант плюс В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" Г) Реестре лекарственных средств Д) VIDAL @	А
5.	ДЕ-1. Вопрос-5 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ ВЫПУСКА, СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВА И РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖНО НАЙТИ: А) Государственный реестр лекарственных средств Б) на сайте консультант плюс В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" Г) Реестре лекарственных средств Б) VIDAL @	А
6.	ДЕ-1. Вопрос-6 РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ: А) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ Б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических	А

	лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность” Г) Реестре лекарственных средств Б) VIDAL @	
7.	ДЕ-1. Вопрос-7 РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО И МАРКИРОВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: А) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ Б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н “Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность” Г) Реестре лекарственных средств Б) VIDAL @	A
8.	ДЕ-1. Вопрос-8 РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ВВОЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: А) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ Б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н “Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность” Г) Реестре лекарственных средств Б) VIDAL @	A
9.	ДЕ-1. Вопрос-9 РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРОДАЖУ, ПЕРЕДАЧУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ: А) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ Б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н “Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность” Г) Реестре лекарственных средств Б) VIDAL @	A
10.	ДЕ-1. Вопрос-10 РЕГЛАМЕНТИРУЕТ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: А) Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ Б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" В) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н “Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность” Г) Реестре лекарственных средств Б) VIDAL @	A
11.	ДЕ-1. Вопрос-11 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО: А) вещества или их комбинации, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности Б) вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе производства, изготовления лекарственных препаратов В) лекарственный препарат в виде лекарственных форм Г) вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе производства ЛП для придания им необходимых физико-химических свойств @	A
12.	ДЕ-1. Вопрос-12 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ: А) лекарственные средства в виде лекарственных форм Б) вещества или их комбинации, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности Г) ЛС в виде обладающих фармакологической активностью действующих веществ, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов	A

	Б) вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе производства ЛП для придания им необходимых физико-химических свойств @	
13.	ДЕ-1. Вопрос-13 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ: А) ЛС в виде обладающих фармакологической активностью действующих веществ, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов Б) вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе производства ЛП для придания им необходимых физико-химических свойств В) лекарственные средства в виде лекарственных форм Г) вещества или их комбинации, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности @	А
14.	ДЕ-1. Вопрос-14 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: А) вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе производства ЛП для придания им необходимых физико-химических свойств Б) ЛС в виде обладающих фармакологической активностью действующих веществ, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов В) лекарственные средства в виде лекарственных форм Г) вещества или их комбинации, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности @	А
15.	ДЕ-1. Вопрос-15 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: А) состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта Б) ЛС в виде обладающих фармакологической активностью действующих веществ, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов В) лекарственные средства в виде лекарственных форм Г) вещества или их комбинации, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности @	А
16.	ДЕ-1. Вопрос-16 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: А) профилактики заболеваний Б) для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность В) изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств @	А
17.	ДЕ-1. Вопрос-17 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: А) диагностики заболеваний Б) для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность В) изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств @	А
18.	ДЕ-1. Вопрос-18 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: А) лечения заболеваний Б) для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность В) изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств @	А
19.	ДЕ-1. Вопрос-19 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: А) реабилитации Б) для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность В) изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств @	А
20.	ДЕ-1. Вопрос-20 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: А) для сохранения, предотвращения или прерывания беременности Б) для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность В) изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств @	А
21.	ДЕ-1. Вопрос-21 ОРФАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: А) ЛП, предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний Б) ЛП, действующее вещество которых произведено или выделено из биологического источника и для определения свойств и качества которых необходима комбинация биологических и физико-химических методов В) ЛП, предназначенные для формирования активного или пассивного иммунитета либо диагностики наличия иммунитета	А

	Г) ЛП, производство которых осуществляется с использованием биотехнологических процессов и методов (в том числе ДНК-рекомбинантной технологии) @	
22.	ДЕ-1. Вопрос-22 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: А) ЛП, действующее вещество которых произведено или выделено из биологического источника и для определения свойств и качества которых необходима комбинация биологических и физико-химических методов Б) ЛП, предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний В) ЛП, предназначенные для формирования активного или пассивного иммунитета либо диагностики наличия иммунитета Г) ЛП, производство которых осуществляется с использованием биотехнологических процессов и методов (в том числе ДНК-рекомбинантной технологии) @	А
23.	ДЕ-1. Вопрос-23 ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: А) ЛП, предназначенные для формирования активного или пассивного иммунитета либо диагностики наличия иммунитета Б) ЛП, предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний В) ЛП, действующее вещество которых произведено или выделено из биологического источника и для определения свойств и качества которых необходима комбинация биологических и физико-химических методов Г) ЛП, производство которых осуществляется с использованием биотехнологических процессов и методов (в том числе ДНК-рекомбинантной технологии) @	А
24.	ДЕ-1. Вопрос-24 БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: А) ЛП, производство которых осуществляется с использованием биотехнологических процессов и методов (в том числе ДНК-рекомбинантной технологии) Б) ЛП, предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний В) ЛП, действующее вещество которых произведено или выделено из биологического источника и для определения свойств и качества которых необходима комбинация биологических и физико-химических методов Г) ЛП, предназначенные для формирования активного или пассивного иммунитета либо диагностики наличия иммунитета @	А
25.	ДЕ-1. Вопрос-25 ГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: А) ЛП, фармацевтическая субстанция которых является рекомбинантной нуклеиновой кислотой или включает в себя рекомбинантную нуклеиновую кислоту Б) ЛП, предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний В) ЛП, действующее вещество которых произведено или выделено из биологического источника и для определения свойств и качества которых необходима комбинация биологических и физико-химических методов Г) ЛП, производство которых осуществляется с использованием биотехнологических процессов и методов (в том числе ДНК-рекомбинантной технологии) @	А
26.	ДЕ-1. Вопрос-26 РЕФЕРЕНТНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ: А) ЛП, который впервые зарегистрирован в РФ, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов Б) биологический ЛП, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим ЛП в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения В) ЛП, который имеет такой же качественный состав и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный ЛП, и биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями Г) ЛП с доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ введения @	А
27.	ДЕ-1. Вопрос-27 ВОСПРОИЗВЕДЕННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ: А) ЛП, который имеет такой же качественный состав и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный ЛП, и биоэквивалентность или терапевтическая	А

	эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями Б) ЛП, который впервые зарегистрирован в РФ, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов В) биологический ЛП, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим ЛП в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения Г) ЛП с доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ введения @	
28.	ДЕ-1. Вопрос-28 БИОАНАЛОГОВЫЙ (БИОПОДОБНЫЙ) ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ (БИОАНАЛОГ) А) биологический ЛП, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим ЛП в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения Б) ЛП, который впервые зарегистрирован в РФ, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов В) биологический ЛП, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим ЛП в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения Г) ЛП с доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ введения @	А
29.	ДЕ-1. Вопрос-29 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ: А) ЛП с доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ введения Б) ЛП, который впервые зарегистрирован в РФ, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов В) биологический ЛП, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим ЛП в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения Г) ЛП с доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ введения @	А
30.	ДЕ-1. Вопрос-30 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ: А) ЛП, произведенный или изготовленный из одного вида лекарственного растительного сырья или нескольких видов такого сырья и реализуемый в расфасованном виде во вторичной (потребительской) упаковке Б) ЛП, который впервые зарегистрирован в РФ, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов В) биологический ЛП, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим ЛП в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения Г) ЛП с доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему качественный состав и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ введения @	А
ФАРМАКОКИНЕТИКА		
31.	ДЕ-1. Вопрос-31 ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОКИНЕТИКА» ВКЛЮЧАЕТ А) всасывание Б) фармакологические эффекты В) локализацию действия Г) механизм действия @	А
32.	ДЕ-1. Вопрос-32 ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОКИНЕТИКА» ВКЛЮЧАЕТ А) транспорт Б) фармакологические эффекты В) локализацию действия Г) механизм действия	А

	@	
33.	ДЕ-1. Вопрос-33 ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОКИНЕТИКА» ВКЛЮЧАЕТ А) выведение Б) фармакологические эффекты В) локализацию действия Г) механизм действия @	A
34.	ДЕ-1. Вопрос-34 ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОКИНЕТИКА» ВКЛЮЧАЕТ А) распределение Б) фармакологические эффекты В) локализацию действия Г) механизм действия @	A
35.	ДЕ-1. Вопрос-35 ФАРМАКОКИНЕТИКА ИЗУЧАЕТ А) всасывание, распределение, метаболизм, выведение Б) локализацию, механизм действия В) механизм действия, фармакологические эффекты Г) пути введения, виды действия ЛВ @	A
36.	ДЕ-1. Вопрос-36 К ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) метаболизм Б) фармакологические эффекты В) локализация действия Г) механизм действия @	A
37.	ДЕ-1. Вопрос-37 К ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) всасывание Б) фармакологические эффекты В) локализация действия Г) механизм действия @	A
38.	ДЕ-1. Вопрос-38 К ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) транспорт Б) фармакологические эффекты В) локализация действия Г) механизм действия @	A
39.	ДЕ-1. Вопрос-39 К ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) выведение Б) фармакологические эффекты В) локализация действия Г) механизм действия @	A
40.	ДЕ-1. Вопрос-40 К ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) распределение Б) фармакологические эффекты В) локализация действия Г) механизм действия @	A
41.	ДЕ-1. Вопрос-41 ОТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ЗАВИСИТ А) продолжительность действия ЛВ Б) механизм действия В) локализация действия Г) фармакологический эффект @	A
42.	ДЕ-1. Вопрос-42 ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ ОПРЕДЕЛЯЕТ	A

	А) выраженность эффекта Б) локализацию действия В) механизм действия Г) путь метаболизма @	
43.	ДЕ-1. Вопрос-43 ВНУТРИВЕННО НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ РАСТВОРЫ А) масляные Б) водные В) гипертонические Г) изотонические @	A
44.	ДЕ-1. Вопрос-44 ВНУТРИВЕННО НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ А) суспензии Б) водные растворы В) гипертонические растворы Г) изотонические растворы @	A
45.	ДЕ-1. Вопрос-45 ПРОЦЕСС ВСАСЫВАНИЯ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛВ А) в вену Б) под кожу В) в мышцу Г) через рот @	A
46.	ДЕ-1. Вопрос-46 ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВСАСЫВАНИЯ ЛВ ЯВЛЯЕТСЯ А) простая диффузия Б) активный транспорт В) пиноцитоз Г) фильтрация @	A
47.	ДЕ-1. Вопрос-47 ПО МЕХАНИЗМУ ПРОСТОЙ ДИФФУЗИИ ХОРОШО ВСАСЫВАЮТСЯ ЛВ А) липофильные и неполярные Б) гидрофильные и полярные В) липофильные и полярные Г) гидрофильные и неполярные @	A
48.	ДЕ-1. Вопрос-48 ПО МЕХАНИЗМУ АКТИВНОГО ТРАНСПОРТА ХОРОШО ВСАСЫВАЮТСЯ ЛВ А) гидрофильные и полярные Б) липофильные и неполярные В) липофильные и полярные Г) гидрофильные и неполярные @	A
49.	ДЕ-1. Вопрос-49 МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ ЛВ, ТРЕБУЮЩИЙ ЗАТРАТЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ А) активный транспорт Б) простая диффузия В) фильтрация Г) пиноцитоз @	A
50.	ДЕ-1. Вопрос-50 ПРОЦЕСС ВСАСЫВАНИЯ ЛВ ПО МЕХАНИЗМУ АКТИВНОГО ТРАНСПОРТА ПРОХОДИТ А) при участии белков-переносчиков и требует затраты метаболической энергии Б) без участия белков-переносчиков и не требует затраты метаболической энергии В) при участии белков-переносчиков и не требует затраты метаболической энергии Г) без участия белков-переносчиков и требует затраты метаболической энергии @	A
51.	ДЕ-1. Вопрос-51 ПРОЦЕСС ВСАСЫВАНИЯ ЛВ ПО МЕХАНИЗМУ АКТИВНОГО ТРАНСПОРТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ А) против градиента концентрации при участии белков-переносчиков Б) по градиенту концентрации без участия белков-переносчиков В) против градиента концентрации без участия белков-переносчиков Г) по градиенту концентрации при участии белков-переносчиков @	A
52.	ДЕ-1. Вопрос-52 МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ ЛВ, ТРЕБУЮЩИЙ УЧАСТИЯ БЕЛКОВ-ПЕРЕНОСЧИКОВ	A

	А) активный транспорт Б) простая диффузия В) фильтрация Г) пиноцитоз @	
53.	ДЕ-1. Вопрос-53 ВСАСЫВАНИЕ ЛВ ПО МЕХАНИЗМУ ФИЛЬТРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ А) диаметром пор мембран Б) степенью липофильности В) величиной всасывающей поверхности Г) кислотно-основными свойствами ЛВ @	А
54.	ДЕ-1. Вопрос-54 ВСАСЫВАНИЕ ЛВ ПО МЕХАНИЗМУ ФИЛЬТРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ А) диаметром молекулы ЛВ Б) степенью липофильности В) величиной всасывающей поверхности Г) кислотно-основными свойствами ЛВ @	А
55.	ДЕ-1. Вопрос-55 ЛВ ОСНОВНОГО ХАРАКТЕРА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВСАСЫВАЮТСЯ В А) тонком кишечнике Б) ротовой полости В) пищеводе Г) желудке @	А
56.	ДЕ-1. Вопрос-56 ЛВ КИСЛОГО ХАРАКТЕРА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВСАСЫВАЮТСЯ В А) желудке Б) ротовой полости В) пищеводе Г) тонком кишечнике @	А
57.	ДЕ-1. Вопрос-57 ПРИ ВВЕДЕНИИ ЧЕРЕЗ РОТ ЛВ ВСАСЫВАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В КРОВЬ ИЗ А) тонкого кишечника Б) толстого кишечника В) желудка Г) прямой кишки @	А
58.	ДЕ-1. Вопрос-58 НЕИОНИЗИРОВАННЫЕ МОЛЕКУЛЫ ВСАСЫВАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО МЕХАНИЗМУ: А) Пассивной диффузии Б) Активного транспорта В) Пиноцитоза Г) Активной диффузии @	А
59.	ДЕ-1. Вопрос-59 ЛИПОФИЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ ВСАСЫВАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО МЕХАНИЗМУ: А) Пассивной диффузии Б) Активного транспорта В) Пиноцитоза Г) Фильтрации @	А
60.	ДЕ-1. Вопрос-60 АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ? А) Да Б) Нет @	А
61.	ДЕ-1. Вопрос-61 АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ: А) Осуществляется против градиента концентрации Б) Осуществляется по градиенту концентрации В) Не обладает специфичностью Г) Не обладает свойством насыщаемости @	А
62.	ДЕ-1. Вопрос-62 ПАССИВНАЯ ДИФФУЗИЯ ЛВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ: А) Не требует метаболической энергии Б) Требуется метаболической энергии	А

	В) Обладает специфичностью Г) Обладает свойством насыщаемости @	
63.	ДЕ-1. Вопрос-63 ПАССИВНАЯ ДИФФУЗИЯ ЛВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОТИВ ГРАДИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ? А) Нет Б) Да @	А
64.	ДЕ-1. Вопрос-64 ЛИПОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: А) Хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер Б) Плохо проникают через гематоэнцефалический барьер В) Не проникают через гематоэнцефалический барьер так как никогда не поступают в общий кровоток Г) Проникают через гематоэнцефалический барьер только в очень редких случаях @	А
65.	ДЕ-1. Вопрос-65 ГИДРОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛОХО ПРОНИКАЮТ ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР? А) Да Б) Нет @	А
66.	ДЕ-1. Вопрос-66 НЕПОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: А) Хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер Б) Плохо проникают через гематоэнцефалический барьер В) Не проникают через гематоэнцефалический барьер, так как никогда не поступают в общий кровоток Г) Проникают через гематоэнцефалический барьер только в очень редких случаях @	А
67.	ДЕ-1. Вопрос-67 ПОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ХОРОШО ПРОНИКАЮТ ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР? А) Нет Б) Да @	А
68.	ДЕ-1. Вопрос-68 ВСАСЫВАНИЕ ЛВ ИЗ ЖКТ ЗАВИСИТ ОТ А) рН среды Б) лекарственной формы В) эффекта первого прохождения Г) энтерогепатической циркуляции @	А
69.	ДЕ-1. Вопрос-69 ВСАСЫВАНИЕ ЛВ ИЗ ЖКТ ЗАВИСИТ ОТ А) содержимого ЖКТ (пищи) Б) лекарственной формы В) эффекта первого прохождения Г) энтерогепатической циркуляции @	А
70.	ДЕ-1. Вопрос-70 ВСАСЫВАНИЕ ЛВ ИЗ ЖКТ ЗАВИСИТ ОТ А) моторики ЖКТ Б) лекарственной формы В) эффекта первого прохождения Г) энтерогепатической циркуляции @	А
71.	ДЕ-1. Вопрос-71 ЛВ ПОПАДАЮТ В СИСТЕМНЫЙ КРОВТОК ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕЧЕНЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) через рот Б) под кожу В) в прямую кишку Г) в мышцу @	А
72.	ДЕ-1. Вопрос-72 К ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) сублингвальный Б) внутримышечный В) внутривенный Г) трансдермальный @	А
73.	ДЕ-1. Вопрос-73	А

	К ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) пероральный Б) внутримышечный В) внутривенный Г) трансдермальный @	
74.	ДЕ-1. Вопрос-74 К ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) ректальный Б) внутримышечный В) подкожный Г) трансдермальный @	А
75.	ДЕ-1. Вопрос-75 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ А) Трансбуккальный путь Б) Интраназальный В) Внутривенный Г) В полость мочевого пузыря @	А
76.	ДЕ-1. Вопрос-76 СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ: А) К энтеральному пути введения, под язык Б) К парентеральному полостному пути введения В) К трансдермальному пути введения Г) К энтеральному пути введения, за щеку @	А
77.	ДЕ-1. Вопрос-77 БУККАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ: А) К энтеральному пути введения, за щеку Б) К парентеральному полостному пути введения В) К трансдермальному пути введения Г) К энтеральному пути введения, под язык @	А
78.	ДЕ-1. Вопрос-78 ПЕРОРАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ? А) Да Б) Нет @	А
79.	ДЕ-1. Вопрос-79 РЕКТАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ: А) К энтеральному пути введения, в прямую кишку Б) К парентеральному пути введения, в полость ЖКТ В) К энтеральному пути введения, за щеку Г) К парентеральному пути введения, в мочевой пузырь @	А
80.	ДЕ-1. Вопрос-80 ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ? А) Да Б) Нет @	А
81.	ДЕ-1. Вопрос-81 ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ: А) К парентеральному пути введения, инъекционному Б) К энтеральному пути введения В) К парентеральному пути введения, трансдермальному Г) К парентеральному пути введения, полостному @	А
82.	ДЕ-1. Вопрос-82 ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ? А) Да Б) Нет @	А
83.	ДЕ-1. Вопрос-83 ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛВ: А) Попадают в системное кровообращение после первого прохождения через печень Б) Сразу попадают в системное кровообращение В) Попадают в подкожно жировую клетчатку затем в системный кровоток Г) Попадают в системное кровообращение после первого прохождения через ГЭБ @	А

84.	ДЕ-1. Вопрос-84 ПРИ СУБЛИНГВАЛЬНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛВ: А) Сразу попадают в системное кровообращение Б) Попадают в системное кровообращение после первого прохождения через печень В) Попадают в системный кровоток из прямой кишки Г) Попадают в ЖКТ, действие начинается только в желудке @	A
85.	ДЕ-1. Вопрос-85 ПРИ БУККАЛЬНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛВ ПОПАДАЮТ В СИСТЕМНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕЧЕНЬ? А) Нет Б) Да @	A
86.	ДЕ-1. Вопрос-86 ПРИ РЕКТАЛЬНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛВ: А) Сразу попадают в системное кровообращение Б) Попадают в системное кровообращение после первого прохождения через печень В) Не попадают в системное кровообращение вообще Г) Попадают в ЖКТ, действие начинается только в желудке @	A
87.	ДЕ-1. Вопрос-87 ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛВ СРАЗУ ПОПАДАЮТ В СИСТЕМНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ? А) Да Б) Нет @	A
88.	ДЕ-1. Вопрос-88 ПРИ ПОДКОЖНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛВ СРАЗУ ПОПАДАЮТ В СИСТЕМНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ? А) Да Б) Нет @	A
89.	ДЕ-1. Вопрос-89 ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛВ ПОПАДАЮТ В СИСТЕМНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕЧЕНЬ? А) Нет Б) Да @	A
90.	ДЕ-1. Вопрос-90 К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) внутримышечный Б) ректальный В) пероральный Г) сублингвальный @	A
91.	ДЕ-1. Вопрос-91 ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ А) В полость мочевого пузыря Б) Трансбуккальный путь В) Сублингвальный путь Г) Ректальный путь @	A
92.	ДЕ-1. Вопрос-92 К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) внутривенный Б) ректальный В) пероральный Г) сублингвальный @	A
93.	ДЕ-1. Вопрос-93 К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) подкожный Б) ректальный В) пероральный Г) сублингвальный @	A

94.	ДЕ-1. Вопрос-94 К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) трансдермальный Б) ректальный В) пероральный Г) сублингвальный @	А
95.	ДЕ-1. Вопрос-95 ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛВ PER OS ХАРАКТЕРНО А) отсутствие стерильности Б) возможность использования в бессознательном состоянии В) очень быстрое развитие эффекта Г) возможность применения ЛВ, разрушающихся в кислой среде @	А
96.	ДЕ-1. Вопрос-96 ВНУТРИМЫШЕЧНО НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ А) гипертонические растворы Б) изотонические растворы В) масляные растворы Г) суспензии @	А
97.	ДЕ-1. Вопрос-97 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫМИ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) под кожу Б) через рот В) в прямую кишку Г) под язык @	А
98.	ДЕ-1. Вопрос-98 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫМИ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) в вену Б) через рот В) в прямую кишку Г) под язык @	А
99.	ДЕ-1. Вопрос-99 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫМИ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) в мышцу Б) через рот В) в прямую кишку Г) под язык @	А
100.	ДЕ-1. Вопрос-100 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЕРИЛЬНЫМИ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) субарахноидально Б) через рот В) в прямую кишку Г) под язык @	А
101.	ДЕ-1. Вопрос-101 ПЕРОРАЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ А) ЛВ белковой природы Б) суспензии В) гранулы Г) таблетки @	А
102.	ДЕ-1. Вопрос-102 ЛВ ПОДВЕРГАЕТСЯ «ЭФФЕКТУ ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» ПРИ ВВЕДЕНИИ А) per os Б) в вену В) под кожу Г) в мышцу @	А
103.	ДЕ-1. Вопрос-103 ЛВ ПОДВЕРГАЕТСЯ «ЭФФЕКТУ ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» ПРИ ВВЕДЕНИИ А) per os Б) в вену В) под кожу Г) в прямую кишку @	А
104.	ДЕ-1. Вопрос-104 ЛВ ПОДВЕРГАЕТСЯ «ЭФФЕКТУ ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» ПРИ ВВЕДЕНИИ	А

	А) пероральном Б) ректальном В) сублингвальном Г) внутривенном @	
105.	ДЕ-1. Вопрос-105 НАИБОЛЕЕ БЫСТРО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЛВ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) в/в Б) п/к В) в/м Г) per os @	A
106.	ДЕ-1. Вопрос-106 КАКОЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 100% БИОДОСТУПНОСТЬ ЛВ? А) внутривенный Б) подкожный В) трансдермальный Г) пероральный @	A
107.	ДЕ-1. Вопрос-107 ИЗ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ В ОРГАНИЗМ ПЛОДА ЛВ ПЕРЕХОДЯТ ЧЕРЕЗ БАРЬЕР А) плацентарный Б) гематоэнцефалический В) гематоофтальмический Г) тестикулярный @	A
108.	ДЕ-1. Вопрос-108 ИЗ КРОВИ В ЦНС ЛВ ПЕРЕХОДЯТ ЧЕРЕЗ БАРЬЕР А) гематоэнцефалический Б) плацентарный В) гематоофтальмический Г) тестикулярный @	A
109.	ДЕ-1. Вопрос-109 ИЗ КРОВИ В ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЛВ ПЕРЕХОДЯТ ЧЕРЕЗ БАРЬЕР А) тестикулярный Б) плацентарный В) гематоофтальмический Г) гематоэнцефалический @	A
110.	ДЕ-1. Вопрос-110 ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ХОРОШО ПЕРЕХОДЯТ ЛВ А) липофильные и неполярные Б) гидрофильные и полярные В) липофильные и полярные Г) гидрофильные и неполярные @	A
111.	ДЕ-1. Вопрос-111 ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ХОРОШО ПЕРЕХОДЯТ ЛВ А) липофильные Б) гидрофильные В) полярные Г) четвертичные аммониевые соединения @	A
112.	ДЕ-1. Вопрос-112 ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ХОРОШО ПЕРЕХОДЯТ ЛВ А) неполярные Б) полярные В) гидрофильные Г) четвертичные аммониевые соединения @	A
113.	ДЕ-1. Вопрос-113 ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ХОРОШО ПЕРЕХОДЯТ А) третичные аммониевые соединения Б) четвертичные аммониевые соединения В) гидрофильные Г) полярные @	A
114.	ДЕ-1. Вопрос-114 ЧЕРЕЗ ГИСТОГЕМАТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ХОРОШО ПЕРЕХОДЯТ СОЕДИНЕНИЯ А) липофильные и неполярные Б) гидрофильные и полярные	A

	В) гидрофильные и неполярные Г) липофильные и полярные @	
115.	ДЕ-1. Вопрос-115 ЛВ ПОПАДАЮТ В СИСТЕМНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕЧЕНЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) через рот Б) в вену В) в мышцу Г) под кожу @	А
116.	ДЕ-1. Вопрос-116 ОТНОСИТЕЛЬНО РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ОРГАНИЗМЕ СОЕДИНЕНИЯ А) липофильные и неполярные Б) гидрофильные и полярные В) липофильные и полярные Г) гидрофильные и неполярные @	А
117.	ДЕ-1. Вопрос-117 В ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЕПонируются ВЕЩЕСТВА А) липофильные Б) гидрофильные В) связанные с белками плазмы крови Г) связанные с форменными элементами крови @	А
118.	ДЕ-1. Вопрос-118 ЕСЛИ ОБЪЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (V_d) РАВЕН 5 л, ТО ЛВ РАСПРЕДЕЛЕНО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В А) кровяном русле Б) межклеточной жидкости В) жировой ткани Г) ЦНС @	А
119.	ДЕ-1. Вопрос-119 ЕСЛИ ОБЪЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (V_d) РАВЕН 15 л, ТО ЛВ РАСПРЕДЕЛЕНО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В А) плазме крови и межклеточной жидкости Б) форменных элементах крови В) жировой ткани Г) ЦНС @	А
120.	ДЕ-1. Вопрос-120 ЕСЛИ ОБЪЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (V_d) РАВЕН 40 л, ТО ЛВ РАСПРЕДЕЛЕНО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В А) внеклеточной и внутриклеточной жидкости Б) форменных элементах крови В) жировой ткани Г) ЦНС @	А
121.	ДЕ-1. Вопрос-121 ЕСЛИ ОБЪЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (V_d) РАВЕН 600 л, ТО ЛВ ДЕПонируется В А) периферических тканях Б) форменных элементах крови В) плазме крови Г) ЦНС @	А
122.	ДЕ-1. Вопрос-122 МОЛЕКУЛЫ ЛВ НЕ СВЯЗАННЫЕ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ А) фармакологически активны Б) являются депо препарата в крови В) не фильтруются в почечных клубочках Г) не выводятся с мочой @	А
123.	ДЕ-1. Вопрос-123 МОЛЕКУЛЫ ЛВ СВЯЗАННЫЕ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ А) фармакологически неактивны Б) проникают из крови в ткани и органы В) фильтруются в почечных клубочках Г) выводятся с мочой @	А
124.	ДЕ-1. Вопрос-124	А

	ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛВ В ВЕНУ ЕГО БИОДОСТУПНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ А) 100% Б) 75% В) 50% Г) 25% @	
125.	ДЕ-1. Вопрос-125 БИОДОСТУПНОСТЬ ЛВ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО А) площади под кривой Б) клиренсу В) $T_{1/2}$ Г) объему распределения @	A
126.	ДЕ-1. Вопрос-126 АНТИБИОТИКИ ГРУППЫ ТЕТРАЦИКЛИНА МОГУТ ДЕПОНИРОВАТЬСЯ В А) костной ткани Б) плазме крови В) ЦНС Г) почках @	A
127.	ДЕ-1. Вопрос-127 В КОСТНОЙ ТКАНИ МОГУТ ДЕПОНИРОВАТЬСЯ А) антибиотики группы тетрациклина Б) снотворные В) противогистаминные Г) НПВС @	A
128.	ДЕ-1. Вопрос-128 В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ МОГУТ ДЕПОНИРОВАТЬСЯ А) препараты йода Б) снотворные В) антибиотики группы тетрациклина Г) НПВС @	A
129.	ДЕ-1. Вопрос-129 ПРЕПАРАТЫ ИОДА МОГУТ ДЕПОНИРОВАТЬСЯ В А) щитовидной железе Б) плазме крови В) костной ткани Г) почках @	A
130.	ДЕ-1. Вопрос-130 ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОСОМАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ ОБЫЧНО ПРИВОДИТ К А) ускорению инактивации ЛВ Б) увеличению токсичности ЛВ В) увеличению числа побочных эффектов Г) усилению основного эффекта ЛВ @	A
131.	ДЕ-1. Вопрос-131 СКОРОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА (БИОТРАНСФОРМАЦИИ) ЛВ ПОВЫШЕНА А) при применении индукторов микросомальных ферментов печени Б) у детей в первые месяцы жизни В) у лиц пожилого возраста Г) при нарушении функции печени @	A
132.	ДЕ-1. Вопрос-132 СКОРОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА (БИОТРАНСФОРМАЦИИ) ЛВ СНИЖЕНА А) при применении ингибиторов микросомальных ферментов печени Б) при нормальной функции печени В) у лиц молодого возраста Г) при применении индукторов микросомальных ферментов печени @	A
133.	ДЕ-1. Вопрос-133 МЕТАБОЛИЗМ (БИОТРАНСФОРМАЦИЯ) ЛВ В ПЕЧЕНИ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ А) пола Б) пути введения В) лекарственной формы Г) дозы @	A
134.	ДЕ-1. Вопрос-134 МЕТАБОЛИЗМ (БИОТРАНСФОРМАЦИЯ) ЛВ В ПЕЧЕНИ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ	A

	А) возраста Б) пути введения В) лекарственной формы Г) дозы @	
135.	ДЕ-1. Вопрос-135 МЕТАБОЛИЗМ (БИОТРАНСФОРМАЦИЯ) ЛВ В ПЕЧЕНИ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ А) функционального состояния печени Б) пути введения В) лекарственной формы Г) дозы @	A
136.	ДЕ-1. Вопрос-136 МЕТАБОЛИЗМ (БИОТРАНСФОРМАЦИЯ) ЛВ В ПЕЧЕНИ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ А) печеночного кровотока Б) пути введения В) лекарственной формы Г) дозы @	A
137.	ДЕ-1. Вопрос-137 МЕТАБОЛИЗМ (БИОТРАНСФОРМАЦИЯ) ЛВ В ПЕЧЕНИ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ А) генетического полиморфизма ферментов печени Б) пути введения В) лекарственной формы Г) дозы @	A
138.	ДЕ-1. Вопрос-138 К СИНТЕТИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ОТНОСИТСЯ А) конъюгация Б) окисление В) восстановление Г) гидролиз @	A
139.	ДЕ-1. Вопрос-139 К СИНТЕТИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ОТНОСИТСЯ А) конъюгация с глюкуроновой кислотой Б) окисление В) восстановление Г) гидролиз @	A
140.	ДЕ-1. Вопрос-140 К СИНТЕТИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ОТНОСИТСЯ А) соединение с глицином Б) окисление В) восстановление Г) гидролиз @	A
141.	ДЕ-1. Вопрос-141 К НЕСИНТЕТИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ОТНОСИТСЯ А) окисление Б) соединение с глюкуроновой кислотой В) соединение с глицином Г) соединение с уксусной кислотой @	A
142.	ДЕ-1. Вопрос-142 К НЕСИНТЕТИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ОТНОСИТСЯ А) восстановление Б) соединение с глюкуроновой кислотой В) соединение с глицином Г) соединение с уксусной кислотой @	A
143.	ДЕ-1. Вопрос-143 К НЕСИНТЕТИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ОТНОСИТСЯ А) гидролиз Б) соединение с глюкуроновой кислотой В) соединение с глицином Г) соединение с уксусной кислотой @	A
144.	ДЕ-1. Вопрос-144 В ПРОЦЕССЕ МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ИХ МЕТАБОЛИТЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ А) гидрофильными и полярными Б) липофильными и неполярными	A

	В) гидрофильными и неполярными Г) липофильными и полярными @	
145.	ДЕ-1. Вопрос-145 К РЕАКЦИЯМ ПЕРВОЙ ФАЗЫ МЕТАБОЛИЗМА ОТНОСЯТСЯ А) окисление, восстановление, гидролиз Б) окисление, конъюгация, гидролиз В) восстановление, соединение с глюкуроновой кислотой, гидролиз Г) соединение с глицином, восстановление, окисление @	А
146.	ДЕ-1. Вопрос-146 МЕТАБОЛИТЫ ЛВ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ КАК ПРАВИЛО А) менее активны Б) более липофильны В) менее полярны Г) более токсичны @	А
147.	ДЕ-1. Вопрос-147 МЕТАБОЛИТЫ ЛВ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, КАК ПРАВИЛО А) более гидрофильны Б) более активны В) менее полярны Г) более токсичны @	А
148.	ДЕ-1. Вопрос-148 МЕТАБОЛИТЫ ЛВ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, КАК ПРАВИЛО А) менее токсичны Б) более липофильны В) менее полярны Г) более активны @	А
149.	ДЕ-1. Вопрос-149 У КАКОГО ЛВ МЕТАБОЛИТ АКТИВНЕЕ ИСХОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ? А) эналаприл Б) морфин В) гепарин Г) атропин @	А
150.	ДЕ-1. Вопрос-150 «ПРОЛЕКАРСТВОМ» ЯВЛЯЕТСЯ А) эналаприл Б) морфин В) гепарин Г) атропин @	А
151.	ДЕ-1. Вопрос-151 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫВЕДЕНИЯ ПОЧКАМИ ЛВ КИСЛОГО ХАРАКТЕРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ А) щелочное питье Б) кислое питье В) повышение их липофильности Г) снижение их диссоциации @	А
152.	ДЕ-1. Вопрос-152 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫВЕДЕНИЯ ПОЧКАМИ ЛВ ЩЕЛОЧНОГО ХАРАКТЕРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ А) кислое питье Б) щелочное питье В) повышение их липофильности Г) снижение их диссоциации @	А
153.	ДЕ-1. Вопрос-153 ХОРОШО ВЫВОДЯТСЯ С МОЧЬ ЛВ И ИХ МЕТАБОЛИТЫ А) гидрофильные и полярные Б) липофильные и неполярные В) гидрофильные и неполярные Г) липофильные и полярные @	А
154.	ДЕ-1. Вопрос-154 ПОЛЯРНЫЕ ГИДРОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫВОДЯТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО: А) С мочой Б) С желчью В) С калом	А

	Г) Со слюной @	
155.	ДЕ-1. Вопрос-155 НЕПОЛЯРНЫЕ ЛИПОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫВОДЯТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО: А) С желчью Б) С мочой В) С калом Г) Со слюной @	А
156.	ДЕ-1. Вопрос-156 НЕПОЛЯРНЫЕ ЛИПОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫВОДЯТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С МОЧОЙ? А) Нет Б) Да @	А
157.	ДЕ-1. Вопрос-157 ГАЗООБРАЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА ВЫДЕЛЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЧЕРЕЗ А) легкие Б) печень В) почки Г) кожу @	А
158.	ДЕ-1. Вопрос-158 ПО ПОКАЗАТЕЛЮ $T_{1/2}$ ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЕ ИЗ ЛВ ЭЛИМИНИРУЕТ БЫСТРЕЕ А) $T_{1/2} = 6$ час Б) $T_{1/2} = 12$ час В) $T_{1/2} = 18$ час Г) $T_{1/2} = 24$ часа @	А
159.	ДЕ-1. Вопрос-159 ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ПОЧЕЧНОГО КЛИРЕНСА ($Cl_{\text{поч}}$) ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЕ ИЗ ЛВ ВЫВОДИТСЯ БЫСТРЕЕ А) $Cl_{\text{поч}} = 20$ мл/мин Б) $Cl_{\text{поч}} = 15$ мл/ми В) $Cl_{\text{поч}} = 10$ мл/ми Г) $Cl_{\text{поч}} = 5$ мл/мин @	А
160.	ДЕ-1. Вопрос-160 ОБЩИЙ КЛИРЕНС ЕСТЬ ОБЪЕМ ПЛАЗМЫ КРОВИ, ОЧИЩАЮЩИЙСЯ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ, ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ А) все органы выведения Б) почки В) печень Г) потовые железы @	А
161.	ДЕ-1. Вопрос-161 ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ФАРМАКОКИНЕТИКИ «ОБЩИЙ КЛИРЕНС ЛВ»? А) скорость элиминирования из организма Б) скорость всасывания В) полноту всасывания Г) характер распределения @	А
162.	ДЕ-1. Вопрос-162 ЛВ ВВЕДЕНО В ВЕНУ В ДОЗЕ 100 мг. $T_{1/2}$ 6 ЧАСОВ. ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ В КРОВИ ОСТАНЕТСЯ А) 25 мг Б) 50 мг В) 75 мг Г) 100 мг @	А
163.	ДЕ-1. Вопрос-163 ВРЕМЯ, ЗА КОТОРОЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ СНИЖАЕТСЯ НА 50% ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) $T_{1/2}$ Б) $CL_{\text{почечный}}$ В) V_D Г) C_{ss} @	А
164.	ДЕ-1. Вопрос-164 ОБЪЕМ ПЛАЗМЫ КРОВИ, ОЧИЩАЮЩИЙСЯ ОТ ЛВ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ПОЧКИ ЭТО А) $CL_{\text{почечный}}$ Б) $T_{1/2}$ В) V_D	А

	Г) C_{ss} @	
165.	ДЕ-1. Вопрос-165 ЧАСТЬ ДОЗЫ ЛВ, КОТОРАЯ В НЕИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ ДОСТИГЛА СИСТЕМНОГО КРОВОТОКА ЭТО А) F Б) $T_{1/2}$ В) V_D Г) C_{ss} @	A
166.	ДЕ-1. Вопрос-166 ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ, В КОТОРОМ НУЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ДОЗУ ЛВ, ЧТО БЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛВ В НЕМ БЫЛА РАВНА КОНЦЕНТРАЦИИ ЛВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЭТО А) V_D Б) $T_{1/2}$ В) $CL_{\text{почечный}}$ Г) C_{ss} @	A
167.	ДЕ-1. Вопрос-167 СИТУАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛВ В КРОВЬ УРАВНОВЕШИВАЕТСЯ ЕГО ВЫВЕДЕНИЕМ ЭТО А) C_{ss} Б) $T_{1/2}$ В) $CL_{\text{почечный}}$ Г) V_D @	A
168.	ДЕ-1. Вопрос-168 ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ($T_{1/2}$) ОБОЗНАЧАЕТ ВРЕМЯ ЗА КОТОРОЕ А) концентрация ЛВ в плазме крови снижается на 50% Б) выводится из организма почками 50% ЛВ В) метаболизируется в печени 50% ЛВ Г) транспортируется из крови в ткани 50% ЛВ @	A
ВИДЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ		
169.	ДЕ-1. Вопрос-169 ЭТИОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА УСТРАНЯЮТ А) причину болезни Б) механизмы развития болезни В) симптомы болезни Г) недостаток эндогенных веществ @	A
170.	ДЕ-1. Вопрос-170 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УСТРАНЯЮТ А) механизмы развития болезни Б) причину болезни В) симптомы болезни Г) недостаток эндогенных веществ @	A
171.	ДЕ-1. Вопрос-171 СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УСТРАНЯЮТ А) проявления болезни Б) причину болезни В) механизмы развития болезни Г) недостаток эндогенных веществ @	A
172.	ДЕ-1. Вопрос-172 СРЕДСТВА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ УСТРАНЯЮТ А) недостаток эндогенных веществ Б) причину болезни В) механизмы развития болезни Г) симптомы болезни @	A
173.	ДЕ-1. Вопрос-173 ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ УСТРАНЯЮТ СРЕДСТВА А) этиотропные Б) патогенетические В) симптоматические Г) заместительной терапии @	A
174.	ДЕ-1. Вопрос-174 МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ УСТРАНЯЮТ СРЕДСТВА А) патогенетические	A

	Б) этиотропные В) симптоматические Г) заместительной терапии @	
175.	ДЕ-1. Вопрос-175 ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ УСТРАНЯЮТ СРЕДСТВА А) симптоматические Б) этиотропные В) патогенетические Г) заместительной терапии @	А
176.	ДЕ-1. Вопрос-176 ВОСПОЛНЯЮТ НЕДОСТАТОК ЭНДОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ СРЕДСТВА А) заместительной терапии Б) этиотропные В) патогенетические Г) симптоматические @	А
177.	ДЕ-1. Вопрос-177 К СРЕДСТВАМ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ А) антибиотики Б) анальгетики В) местные анестетики Г) анксиолитики @	А
178.	ДЕ-1. Вопрос-178 К СРЕДСТВАМ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ А) противомикробные Б) анальгетики В) местные анестетики Г) противовоспалительные @	А
179.	ДЕ-1. Вопрос-179 К СРЕДСТВАМ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ А) наркотические анальгетики Б) противомикробные В) гормоны Г) витамины @	А
180.	ДЕ-1. Вопрос-180 К СРЕДСТВАМ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ А) пищеварительные ферменты Б) противомикробные В) аденоблокаторы Г) наркотические анальгетики @	А
181.	ДЕ-1. Вопрос-181 К СРЕДСТВАМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ А) противовоспалительные Б) противомикробные В) гормоны Г) наркотические анальгетики @	А
182.	ДЕ-1. Вопрос-182 К СРЕДСТВАМ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ А) жаропонижающие Б) противомикробные В) гормоны Г) витамины @	А
183.	ДЕ-1. Вопрос-183 МЕЗИМ - СРЕДСТВО ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ? А) Нет Б) Да @	А
184.	ДЕ-1. Вопрос-184 МЕЗИМ - СРЕДСТВО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ? А) Нет Б) Да @	А
185.	ДЕ-1. Вопрос-185 МЕТРОНИДАЗОЛ - СРЕДСТВО:	А

	А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	
186.	ДЕ-1. Вопрос-186 ЛИНКОМИЦИН - СРЕДСТВО: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
187.	ДЕ-1. Вопрос-187 АЦИКЛОВИР - СРЕДСТВО: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
188.	ДЕ-1. Вопрос-188 АМОКСИКЛАВ - СРЕДСТВО: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
189.	ДЕ-1. Вопрос-189 ДОКСИЦИКЛИН (ЮНИДОКС) - СРЕДСТВО: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
190.	ДЕ-1. Вопрос-190 ПИПЕРАЦИЛЛИН - СРЕДСТВО: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
191.	ДЕ-1. Вопрос-191 ХЛОРАМФЕНИКОЛ (ЛЕВОМИЦЕТИН) - СРЕДСТВО: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
192.	ДЕ-1. Вопрос-192 ЦИПРОФЛОКСАЦИН (ЦИПРОБАЙ) - СРЕДСТВО: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
193.	ДЕ-1. Вопрос-193 Ко-тримоксазол - средство: А) Этиотропной терапии Б) Патогенетической терапии В) Симптоматической терапии Г) Заместительной терапии @	A
194.	ДЕ-1. Вопрос-194 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Амоксиклав Б) Лоратадин (Кларитин) В) Преднизолон Г) Иммунал @	A
195.	ДЕ-1. Вопрос-195 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Метронидазол Б) Хлоропирамин (Супрастин)	A

	В) Преднизолон Г) Иммунал @	
196.	ДЕ-1. Вопрос-196 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Сульфадиметоксин Б) Флуоксетин В) Верапамил Г) Лития карбонат @	А
197.	ДЕ-1. Вопрос-197 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Линкомицин Б) Атропин В) Ацетилсалициловая кислота Г) Метформин @	А
198.	ДЕ-1. Вопрос-198 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Цефуроксим Б) Ципротерона ацетат В) Стрептокиназа Г) Гепарин @	А
199.	ДЕ-1. Вопрос-199 ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ УСТРАНЯЮТ: А) Этиотропные средства Б) Патогенетические средства В) Симптоматические средства Г) Средства заместительной терапии @	А
200.	ДЕ-1. Вопрос-200 СНИЖАЮТ ИЛИ УСТРАНЯЮТ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ: А) Патогенетические средства Б) Этиотропные средства В) Симптоматические средства Г) Средства заместительной терапии @	А
201.	ДЕ-1. Вопрос-201 НЕДОСТАТОК ЭНДОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ВОСПОЛНЯЮТ: А) Средства заместительной терапии Б) Этиотропные средства В) Патогенетические средства Г) Симптоматические средства @	А
202.	ДЕ-1. Вопрос-202 ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ СНИЖАЮТ ИЛИ УСТРАНЯЮТ: А) Симптоматические средства Б) Этиотропные средства В) Патогенетические средства Г) Средства заместительной терапии @	А
203.	ДЕ-1. Вопрос-203 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Эритромицин Б) Диклофенак натрия В) Атропин Г) Глибенкламид @	А
204.	ДЕ-1. Вопрос-204 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Мирамистин Б) Добутамин В) Амитриптилин Г) Тримеперидин (Промедол) @	А
205.	ДЕ-1. Вопрос-205 ЭТИОТРОПНОЕ СРЕДСТВО: А) Хлоргексидин Б) Клозапин В) Гепарин Г) Гентамицин	А

	@	
	ФАРМАКОДИНАМИКА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ	
206.	ДЕ-1. Вопрос-206 ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОДИНАМИКА» ВКЛЮЧАЕТ А) механизм действия Б) транспорт В) всасывание Г) распределение @	А
207.	ДЕ-1. Вопрос-207 ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОДИНАМИКА» ВКЛЮЧАЕТ А) локализацию действия Б) выведение В) всасывание Г) распределение @	А
208.	ДЕ-1. Вопрос-208 ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОДИНАМИКА» ВКЛЮЧАЕТ А) фармакологические эффекты Б) выведение В) всасывание Г) распределение @	А
209.	ДЕ-1. Вопрос-209 ФАРМАКОДИНАМИКА ИЗУЧАЕТ А) локализацию, механизм действия, фармакологические эффекты Б) всасывание, дозирование В) транспорт, распределение Г) метаболизм, выведение @	А
210.	ДЕ-1. Вопрос-210 К ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) локализация действия Б) всасывание В) транспорт Г) метаболизм @	А
211.	ДЕ-1. Вопрос-211 К ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) механизм действия Б) всасывание В) экскреция Г) метаболизм @	А
212.	ДЕ-1. Вопрос-212 К ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ОТНОСИТСЯ А) фармакологический эффект Б) всасывание В) экскреция Г) распределение @	А
213.	ДЕ-1. Вопрос-213 ФАРМАКОДИНАМИКУ ОПРЕДЕЛЯЕТ А) химическая структура Б) лекарственная форма В) путь введения Г) время введения @	А
214.	ДЕ-1. Вопрос-214 ДЕЙСТВИЕ ЛВ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НА МЕСТЕ ЕГО НАНЕСЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ А) местным Б) рефлекторным В) резорбтивным Г) токсическим @	А
215.	ДЕ-1. Вопрос-215 ПРИ МЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) рефлекторную реакцию Б) идиосинкразию В) потенцирование Г) лекарственную зависимость @	А

216.	ДЕ-1. Вопрос-216 ДЕЙСТВИЕ ЛВ ПОСЛЕ ЕГО ВСАСЫВАНИЯ В КРОВЬ НАЗЫВАЕТСЯ А) резорбтивным Б) местным В) рефлекторным Г) некротизирующим @	A
217.	ДЕ-1. Вопрос-217 РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАК ЖЕ НАЗЫВАЮТ А) системным Б) местным В) рефлекторным Г) некротизирующим @A	A
218.	ДЕ-1. Вопрос-218 РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАК ЖЕ НАЗЫВАЮТ А) общим Б) местным В) рефлекторным Г) некротизирующим @	A
219.	ДЕ-1. Вопрос-219 РЕФЛЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ЛВ А) афферентных(чувствительных) рецепторов Б) холинорецепторов ЦНС В) адренорецепторов ЦНС Г) холинорецепторов скелетных мышц @	A
220.	ДЕ-1. Вопрос-220 ЛВ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ РЕФЛЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ, МОГУТ ВОССТАНОВИТЬ А) дыхание Б) функцию почек В) функцию печени Г) выделение гормонов @	A
221.	ДЕ-1. Вопрос-221 ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗВИВАЕТСЯ А) при непосредственном влиянии ЛВ на орган или процесс Б) при влиянии ЛВ на орган или процесс при участии посредника В) при стимуляции афферентной части рефлекторной дуги Г) после образования активных метаболитов @	A
222.	ДЕ-1. Вопрос-222 КОСВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗВИВАЕТСЯ А) при влиянии ЛВ на орган или процесс через посредника Б) при непосредственном влиянии ЛВ на орган или процесс В) при стимуляции афферентной части рефлекторной дуги Г) после образования активных метаболитов @	A
223.	ДЕ-1. Вопрос-223 НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛВ НА ОРГАН ИЛИ ПРОЦЕСС НАЗЫВАЕТСЯ А) прямым Б) косвенным В) рефлекторным Г) токсическим @	A
224.	ДЕ-1. Вопрос-224 ДЕЙСТВИЕ ЛВ НА ОРГАН ИЛИ ПРОЦЕСС ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА НАЗЫВАЕТСЯ А) косвенным Б) прямым В) рефлекторным Г) токсическим @	A
225.	ДЕ-1. Вопрос-225 ДЕЙСТВИЕ ЛВ, РАДИ КОТОРОГО ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ В КЛИНИКЕ, НАЗЫВАЕТСЯ А) главным Б) побочным В) рефлекторным Г) токсическим @	A
226.	ДЕ-1. Вопрос-226 ДЕЙСТВИЕ ЛВ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НАРЯДУ С ГЛАВНЫМ, ОБОЗНАЧАЮТ КАК	A

	А) побочное Б) основное В) рефлекторное Г) местное @	
227.	ДЕ-1. Вопрос-227 ДЕЙСТВИЕ ЛВ ПОСЛЕ ЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ОБОЗНАЧАЮТ КАК А) центральное Б) периферическое В) рефлекторное Г) местное @	А
228.	ДЕ-1. Вопрос-228 ДЕЙСТВИЕ ЛВ НА ОРГАНЫ ОБОЗНАЧАЮТ КАК А) периферическое Б) центральное В) рефлекторное Г) побочное @	А
229.	ДЕ-1. Вопрос-229 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛВ ЗАВИСИТ ОТ А) химической структуры Б) пути введения В) лекарственной формы Г) энтерогепатической циркуляции @	А
230.	ДЕ-1. Вопрос-230 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЮТСЯ А) ионные каналы Б) структурные белки В) белки плазмы крови Г) стволовые клетки @	А
231.	ДЕ-1. Вопрос-231 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЮТСЯ А) мембранные рецепторы Б) структурные белки В) белки плазмы крови Г) стволовые клетки @	А
232.	ДЕ-1. Вопрос-232 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЮТСЯ А) ферменты Б) структурные белки В) белки плазмы крови Г) стволовые клетки @	А
233.	ДЕ-1. Вопрос-233 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЮТСЯ А) транспортные системы Б) структурные белки В) белки плазмы крови Г) стволовые клетки @	А
234.	ДЕ-1. Вопрос-234 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЮТСЯ А) ионные каналы Б) структурные белки В) белки плазмы крови Г) стволовые клетки @	А
235.	ДЕ-1. Вопрос-235 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЮТСЯ А) внутриклеточные рецепторы Б) структурные белки В) белки плазмы крови Г) стволовые клетки @	А
236.	ДЕ-1. Вопрос-236 АГОНИСТ – ЭТО ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ А) обладает аффинитетом и внутренней активностью	А

	Б) обладает внутренней активностью, но не обладает аффинитетом В) обладает аффинитетом, но не обладает внутренней активностью Г) не обладает аффинитетом и внутренней активностью @	
237.	ДЕ-1. Вопрос-237 АНТАГОНИСТ – ЭТО ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ А) обладает аффинитетом, но не обладает внутренней активностью Б) обладает внутренней активностью, но не обладает аффинитетом В) обладает аффинитетом и внутренней активностью Г) не обладает аффинитетом и внутренней активностью @	А
238.	ДЕ-1. Вопрос-238 АНТАГОНИСТЫ НАРУШАЮТ А) действие эндогенных лигандов на рецепторы Б) активность ферментов В) связывание ЛВ с белками плазмы крови Г) выделение ЛВ почками @	А
239.	ДЕ-1. Вопрос-239 Агонист-антагонист – это вещество, которое А) стимулирует один подтип и блокирует другой подтип одних и тех же рецепторов Б) обладает внутренней активностью менее, чем максимальной В) обладает аффинитетом, но не обладает внутренней активностью Г) обладает аффинитетом и менее чем максимальной внутренней активностью @	А
240.	ДЕ-1. Вопрос-240 ВЕЩЕСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ АФФИНИТЕТОМ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ АКТИВНОСТЬЮ, НАЗЫВАЮТСЯ А) полные агонисты Б) агонисты-антагонисты В) частичные агонисты Г) антагонисты @	А
241.	ДЕ-1. Вопрос-241 ВЕЩЕСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ АФФИНИТЕТОМ И МЕНЬШЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ АКТИВНОСТЬЮ, НАЗЫВАЮТСЯ А) частичные агонисты Б) полные агонисты В) агонисты-антагонисты Г) антагонисты @	А
242.	ДЕ-1. Вопрос-242 ДОЗЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В МЕДИЦИНЕ А) токсические Б) максимальные В) насыщающие Г) ударные @	А
243.	ДЕ-1. Вопрос-243 ДОЗЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В МЕДИЦИНЕ А) летальные Б) максимальные В) насыщающие Г) ударные @	А
244.	ДЕ-1. Вопрос-244 ПОДПОРОГОВАЯ ДОЗА А) не вызывает регистрируемого эффекта Б) быстро создает максимальную концентрацию ЛВ в крови В) вызывает минимальный эффект Г) вызывает средний эффект @	А
245.	ДЕ-1. Вопрос-245 ДОЗА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) пороговая Б) подпороговая В) насыщающая Г) средняя @	А
246.	ДЕ-1. Вопрос-246 ПОРОГОВАЯ ДОЗА А) вызывает минимальный эффект	А

	Б) быстро создает максимальную концентрацию ЛВ в крови В) не вызывает регистрируемого эффекта Г) вызывает средний эффект @	
247.	ДЕ-1. Вопрос-247 ДОЗА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) минимально действующая Б) подпороговая В) насыщающая Г) средняя @	А
248.	ДЕ-1. Вопрос-248 СРЕДНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ А) вызывают необходимую величину терапевтического эффекта Б) быстро создают максимальную концентрацию ЛВ в крови В) поддерживают в крови равновесную терапевтическую концентрацию Г) вызывают, как правило, выраженные отрицательные эффекты @	А
249.	ДЕ-1. Вопрос-249 ДОЗЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ У БОЛЬШИНСТВА ПАЦИЕНТОВ, ОБОЗНАЧАЮТ КАК А) средние Б) подпороговые В) насыщающие Г) ударные @	А
250.	ДЕ-1. Вопрос-250 ВЫСШИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ А) вызывают максимальную величину терапевтического эффекта Б) медленно создают максимальную концентрацию ЛВ в крови В) поддерживают в крови равновесную терапевтическую концентрацию Г) не вызывают, как правило, отрицательных эффектов @	А
251.	ДЕ-1. Вопрос-251 МАКСИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ВЫЗЫВАЮТ ДОЗЫ А) высшие терапевтические Б) подпороговые В) насыщающие Г) ударные @	А
252.	ДЕ-1. Вопрос-252 УДАРНЫЕ ДОЗЫ А) быстро создают высокую концентрацию ЛВ в крови Б) вызывают минимальную величину терапевтического эффекта В) медленно создают максимальную концентрацию ЛВ в крови Г) поддерживают в крови равновесную терапевтическую концентрацию @	А
253.	ДЕ-1. Вопрос-253 БЫСТРО СОЗДАЮТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ЛВ В КРОВИ А) высшие терапевтические Б) подпороговые В) насыщающие Г) курсовые @	А
254.	ДЕ-1. Вопрос-254 КУРСОВЫЕ ДОЗЫ А) назначены больному на определенный период лечения Б) быстро создают высокую концентрацию ЛВ в крови В) вызывают минимальную величину терапевтического эффекта Г) поддерживают в крови равновесную терапевтическую концентрацию @	А
255.	ДЕ-1. Вопрос-255 ДОЗЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ ПАЦИЕНТУ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ, ОБОЗНАЧАЮТСЯ КАК А) курсовые Б) подпороговые В) насыщающие Г) высшие терапевтические @	А
256.	ДЕ-1. Вопрос-256 ДОЗЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ В КРОВИ ПОСТОЯННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ОБОЗНАЧАЮТ КАК	А

	А) поддерживающие Б) подпороговые В) насыщающие Г) высшие терапевтические @	
257.	ДЕ-1. Вопрос-257 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ДОЗЫ А) обеспечивают создание в крови постоянной терапевтической концентрации Б) вызывают минимальную величину терапевтического эффекта В) медленно создают максимальную концентрацию ЛВ в крови Г) быстро создают высокую концентрацию ЛВ в крови @	A
258.	ДЕ-1. Вопрос-258 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛВ ЧАЩЕ ВСЕГО МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ДОЗАХ А) высших терапевтических Б) подпороговых В) пороговых Г) средних @	A
259.	ДЕ-1. Вопрос-259 НЕОБРАТИМОЕ ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛВ В ДОЗАХ А) превышающих высшие Б) средних В) курсовых Г) поддерживающих @	A
260.	ДЕ-1. Вопрос-260 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛВ ЧАЩЕ ВСЕГО МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ДОЗАХ А) максимальных терапевтических Б) подпороговых В) пороговых Г) средних @	A
261.	ДЕ-1. Вопрос-261 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШИРОТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ДИАПАЗОН ДОЗ МЕЖДУ А) минимальной и максимальной терапевтической Б) средней и максимальной терапевтической В) подпороговой и средней терапевтической Г) подпороговой и максимальной терапевтической @	A
262.	ДЕ-1. Вопрос-262 О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛВ МОЖНО СУДИТЬ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПО А) терапевтической широте Б) подпороговой дозе В) средней терапевтической дозе Г) максимальной терапевтической дозе @	A
263.	ДЕ-1. Вопрос-263 ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) кумуляцию Б) синергизм В) антагонизм Г) потенцирование @	A
264.	ДЕ-1. Вопрос-264 ПРИ ПОВТОРНЫХ ВВЕДЕНИЯХ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ТОЛЬКО А) привыкание Б) канцерогенность В) идиосинкразия Г) антагонизм @	A
265.	ДЕ-1. Вопрос-265 ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) сенсibilизацию Б) синергизм В) антагонизм Г) потенцирование @	A
266.	ДЕ-1. Вопрос-266 ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ	A

	А) привыкание Б) синергизм В) антагонизм Г) потенцирование @	
267.	ДЕ-1. Вопрос-267 ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) лекарственную зависимость Б) синергизм В) антагонизм Г) потенцирование @	А
268.	ДЕ-1. Вопрос-268 КУМУЛЯЦИЯ ОЗНАЧАЕТ А) накопление в организме ЛВ или его эффекта Б) повышенную чувствительность к ЛВ В) атипичную реакцию на ЛВ Г) ослабление эффекта на ЛВ @	А
269.	ДЕ-1. Вопрос-269 МАТЕРИАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ ОЗНАЧАЕТ А) накопление в организме ЛВ Б) повышенную чувствительность к ЛВ В) атипичную реакцию на ЛВ Г) ослабление эффекта на ЛВ @	А
270.	ДЕ-1. Вопрос-270 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ ОЗНАЧАЕТ А) накопление эффекта ЛВ Б) повышенную чувствительность к ЛВ В) атипичную реакцию на ЛВ Г) ослабление эффекта на ЛВ @	А
271.	ДЕ-1. Вопрос-271 НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЛВ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) материальная кумуляция Б) функциональная кумуляция В) атипичная реакция на ЛВ Г) лекарственная зависимость @	А
272.	ДЕ-1. Вопрос-272 НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЭФФЕКТА ЛВ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) функциональная кумуляция Б) материальная кумуляция В) атипичная реакция на ЛВ Г) лекарственная зависимость @	А
273.	ДЕ-1. Вопрос-273 МАТЕРИАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ А) высокой степени связывания ЛВ с белками плазмы крови Б) пути введения В) лекарственной формы Г) повышенной чувствительности к ЛВ @	А
274.	ДЕ-1. Вопрос-274 МАТЕРИАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ А) функционального состояния печени Б) пути введения В) лекарственной формы Г) повышенной чувствительности к ЛВ @	А
275.	ДЕ-1. Вопрос-275 МАТЕРИАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ А) функционального состояния органов выведения Б) пути введения В) лекарственной формы Г) повышенной чувствительности к ЛВ @	А
276.	ДЕ-1. Вопрос-276 МАТЕРИАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ А) сердечных гликозидов из группы наперстянки Б) наркотических анальгетиков	А

	В) курареподобных средств Г) антацидов @	
277.	ДЕ-1. Вопрос-277 СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ОЗНАЧАЕТ А) повышенную чувствительность к ЛВ при повторном введении Б) накопление в организме ЛВ В) накопление эффекта ЛВ Г) ослабление эффекта на ЛВ @	А
278.	ДЕ-1. Вопрос-278 ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЛВ ПРИ ЕГО ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) сенсibilизация Б) кумуляция В) привыкание Г) лекарственная зависимость @	А
279.	ДЕ-1. Вопрос-279 ПРИВЫКАНИЕ ОЗНАЧАЕТ А) снижение эффекта на повторное введение одной и той же дозы ЛВ Б) накопление в организме ЛВ В) накопление эффекта ЛВ Г) повышенную чувствительность к ЛВ @	А
280.	ДЕ-1. Вопрос-280 СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА НА ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДОЗЫ ЛВ ОБОЗНАЧАЮТ КАК А) привыкание Б) кумуляцию В) сенсibilизацию Г) лекарственную зависимость @	А
281.	ДЕ-1. Вопрос-281 КУМУЛЯЦИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ: А) Повторном введении лекарственных средств Б) Комбинированном введении лекарственных средств В) Фармацевтическом взаимодействии лекарственных средств Г) При феномене отдачи @	А
282.	ДЕ-1. Вопрос-282 СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ: А) Повторном введении лекарственных средств Б) Комбинированном введении лекарственных средств В) Фармацевтическом взаимодействии лекарственных средств Г) При феномене отдачи @	А
283.	ДЕ-1. Вопрос-283 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ПРИ: А) Повторном введении лекарственных средств Б) Комбинированном введении лекарственных средств В) Фармацевтическом взаимодействии лекарственных средств Г) При физическом антагонизме @	А
284.	ДЕ-1. Вопрос-284 ПРИВЫКАНИЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ: А) Повторном введении лекарственных средств Б) При синдроме отмены В) При суммировании в синергизме Г) Комбинированном введении лекарственных средств @	А
285.	ДЕ-1. Вопрос-285 СИНЕРГИЗМ ВОЗНИКАЕТ ПРИ: А) Комбинированном введении лекарственных средств Б) Повторном введении лекарственных средств В) При суммировании в синергизме Г) Комбинированном введении лекарственных средств @	А
286.	ДЕ-1. Вопрос-286 ПОТЕНЦИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВОЗНИКАЕТ ПРИ: А) Комбинированном введении лекарственных средств Б) При однократном приеме лекарственного средства	А

	В) Повторном введении лекарственных средств Г) При пониженном иммунном ответе организма @	
287.	ДЕ-1. Вопрос-287 ТАХИФИЛАКСИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ? А) Да Б) Нет @	А
288.	ДЕ-1. Вопрос-288 МАТЕРИАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ - ЭТО НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ ПОВТОРНЫХ ВВЕДЕНИЯХ? А) Да Б) Нет @	А
289.	ДЕ-1. Вопрос-289 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ ЭТО: А) Накопление в организме эффекта лекарственного вещества при повторных введениях Б) Накопление в организме лекарственного вещества при повторных введениях @	А
290.	ДЕ-1. Вопрос-290 ПРИВЫКАНИЕ – ЭТО: А) Снижение эффекта лекарственного вещества при повторных введениях в одной и той же дозы Б) Накопление в организме лекарственного вещества при повторных введениях @	А
291.	ДЕ-1. Вопрос-291 СУММИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВОЗНИКАЕТ ПРИ: А) Комбинированном введении лекарственных средств Б) Повторном введении лекарственных средств @	А
292.	ДЕ-1. Вопрос-292 ПРИВЫКАНИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ А) наркотических анальгетиков Б) анальгетиков-антипиретиков В) НПВС Г) антиаритмических средств @	А
293.	ДЕ-1. Вопрос-293 ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ, КАК ПРАВИЛО, РАЗВИВАЕТСЯ А) привыкание Б) кумуляция В) сенсibilизация Г) идиосинкразия @	А
294.	ДЕ-1. Вопрос-294 ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ А) лекарственная зависимость Б) кумуляция В) сенсibilизация Г) идиосинкразия @	А
295.	ДЕ-1. Вопрос-295 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ А) наркотических анальгетиков Б) анальгетиков-антипиретиков В) НПВС Г) антиаритмических средств @	А
296.	ДЕ-1. Вопрос-296 НЕПРЕОДОЛИМОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОВТОРНЫМ ПРИЕМАМ ЛВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ А) лекарственной зависимости Б) кумуляции В) идиосинкразии Г) тахифилаксии @	А
297.	ДЕ-1. Вопрос-297 СИНДРОМ АБСТИНЕНЦИИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ А) физической зависимости Б) психической зависимости В) идиосинкразии Г) тахифилаксии @	А

298.	ДЕ-1. Вопрос-298 ФИЗИЧЕСКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ А) развитием абстинентного синдрома (психосоматических нарушений) Б) улучшением самочувствия при отмене ЛВ В) улучшением настроения при отмене ЛВ Г) снижением эффекта на прием ЛВ @	A
299.	ДЕ-1. Вопрос-299 ПСИХИЧЕСКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ А) психическим дискомфортом Б) развитием абстинентного синдрома (психосоматических нарушений) В) улучшением самочувствия при отмене ЛВ Г) снижением эффекта на прием ЛВ @	A
300.	ДЕ-1. Вопрос-300 БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА НА ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛВ ЧЕРЕЗ КОРОТКИЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) тахифилаксия Б) кумуляция В) идиосинкразия Г) лекарственная зависимость @	A
301.	ДЕ-1. Вопрос-301 ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПРИЕМЕ ЛВ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ А) синергизм Б) кумуляция В) идиосинкразия Г) лекарственная зависимость @	A
302.	ДЕ-1. Вопрос-302 ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПРИЕМЕ ЛВ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ А) антагонизм Б) кумуляция В) идиосинкразия Г) тахифилаксия @	A
303.	ДЕ-1. Вопрос-303 СИНЕРГИЗМ ЭТО А) усиление эффекта при совместном введении ЛВ Б) ослабление эффекта при совместном введении ЛВ В) накопление ЛВ в организме Г) усиление эффекта при повторном введении ЛВ @	A
304.	ДЕ-1. Вопрос-304 АНТАГОНИЗМ ЭТО А) ослабление эффекта при совместном введении ЛВ Б) усиление эффекта при совместном введении ЛВ В) накопление ЛВ в организме Г) снижение эффекта при повторном введении ЛВ @	A
305.	ДЕ-1. Вопрос-305 ПРИ СИНЕРГИЗМЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ А) потенцирование эффектов ЛВ Б) ослабление эффектов ЛВ В) накопление ЛВ в организме Г) кумуляция @	A
306.	ДЕ-1. Вопрос-306 ПРИ СИНЕРГИЗМЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ А) суммирование эффектов ЛВ Б) ослабление эффектов ЛВ В) накопление ЛВ в организме Г) кумуляция @	A
307.	ДЕ-1. Вопрос-307 ПОТЕНЦИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ А) усилением действия ЛВ, превышающим сумму их эффектов Б) усилением действия ЛВ не превышающего сумму их эффектов В) накоплением ЛВ в организме Г) резким усилением токсичности @	A
308.	ДЕ-1. Вопрос-308	A

	СУММИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ А) усилением действия ЛВ, не превышающим сумму их эффектов Б) усилением действия ЛВ превышающим сумму их эффектов В) накоплением ЛВ в организме Г) резким усилением токсичности @	
309.	ДЕ-1. Вопрос-309 ТАХИФИЛАКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ А) эфедрина Б) резерпина В) кодеина Г) кофеина @	А
310.	ДЕ-1. Вопрос-310 ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЭФЕДРИНА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ А) тахифилаксия Б) кумуляция В) идиосинкразия Г) потенцирование @	А
311.	ДЕ-1. Вопрос-311 АНТАГОНИЗМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ А) ослаблением эффекта одного ЛВ другим ЛВ при их совместном введении Б) усилением эффекта при совместном введении ЛВ В) накоплением обоих ЛВ в организме Г) резким усилением токсичности одного из ЛВ @	А
312.	ДЕ-1. Вопрос-312 АНТАГОНИЗМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ А) устранением эффекта одного ЛВ другим ЛВ при их совместном введении Б) усилением эффекта одного ЛВ другим ЛВ при их совместном введении В) накоплением обоих ЛВ в организме Г) резким усилением токсичности одного из ЛВ @	А
313.	ДЕ-1. Вопрос-313 ПОТЕНЦИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ А) фентанила и дроперидола Б) парацетамола и анальгина В) тетрациклина и пенициллина Г) атропина и пилокарпина @	А
314.	ДЕ-1. Вопрос-314 СУММИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ А) парацетамола и анальгина Б) фентанила и дроперидола В) тетрациклина и пенициллина Г) атропина и пилокарпина @	А
315.	ДЕ-1. Вопрос-315 ПРИВЫКАНИЕ К ЛВ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ А) снижения чувствительности рецепторов к ЛВ Б) психической зависимости В) снижения активности ферментов печени Г) снижения связывания ЛВ с белками плазмы крови @	А
316.	ДЕ-1. Вопрос-316 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) приготовления комбинированных ЛС Б) всасывания В) выведения Г) метаболизма @	А
317.	ДЕ-1. Вопрос-317 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) хранения комбинированных ЛС Б) всасывания В) выведения Г) метаболизма	А

	@	
318.	ДЕ-1. Вопрос-318 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) смешивания нескольких ЛВ в одном шприце Б) всасывания В) выведения Г) метаболизма @	А
319.	ДЕ-1. Вопрос-319 ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) всасывания ЛВ в ЖКТ Б) смешивания нескольких ЛВ в одном шприце В) хранения комбинированных ЛС Г) приготовления комбинированных ЛС @	А
320.	ДЕ-1. Вопрос-320 ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) распределения ЛВ в организме Б) смешивания нескольких ЛВ в одном шприце В) хранения комбинированных ЛС Г) приготовления комбинированных ЛС @	А
321.	ДЕ-1. Вопрос-321 ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) метаболизма ЛВ в организме Б) смешивания нескольких ЛВ в одном шприце В) хранения комбинированных ЛС Г) приготовления комбинированных ЛС @	А
322.	ДЕ-1. Вопрос-322 ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) выведения ЛВ из организма Б) смешивания нескольких ЛВ в одном шприце В) хранения комбинированных ЛС Г) приготовления комбинированных ЛС @	А
323.	ДЕ-1. Вопрос-323 ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛВ ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ А) нарушения действия одного ЛВ другим ЛВ Б) смешивания нескольких ЛВ в одном шприце В) выведения ЛВ из организма Г) всасывания ЛВ из ЖКТ @	А
324.	ДЕ-1. Вопрос-324 ПРИМЕРОМ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ВВЕДЕНИЕ А) атропина и пилокарпина Б) тетрациклина и кальция хлорида В) алмагеля и препаратов железа Г) дигоксина и активированного угля @	А
325.	ДЕ-1. Вопрос-325 ПРИМЕРОМ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛВ ЯВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ВВЕДЕНИЕ А) фенотерола и пропранолола Б) тетрациклина и кальция хлорида В) алмагеля и препаратов железа Г) дигоксина и активированного угля @	А
326.	ДЕ-1. Вопрос-326 ТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЛВ ЧАЩЕ ВСЕГО МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ А) кумуляции ЛВ Б) применении ЛВ в средних дозах В) применении ЛВ в малых дозах Г) применении ЛВ в поддерживающих дозах @	А
327.	ДЕ-1. Вопрос-327 ТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЛВ ЧАЩЕ ВСЕГО МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ А) замедлении выведения из организма Б) замедлении всасывания из ЖКТ В) применении ЛВ в средних дозах Г) применении ЛВ в поддерживающих дозах	А

	@	
328.	ДЕ-1. Вопрос-328 ТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЛВ ЧАЩЕ ВСЕГО МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ А) замедлении метаболизма Б) замедлении всасывания из ЖКТ В) применении в средних дозах Г) применении в поддерживающих дозах @	A
329.	ДЕ-1. Вопрос-329 АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ЛВ А) не зависят от дозы Б) связаны с нарушением всасывания из ЖКТ В) обусловлены нарушением выведения ЛВ из организма Г) зависят от изменения функции почек @	A
330.	ДЕ-1. Вопрос-330 НАРУШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ВВЕДЕНИЕ ЛВ НАЗЫВАЕТСЯ А) мутагенное действие Б) фетотоксичность В) ulcerогенность Г) эмбриотоксичность @	A
331.	ДЕ-1. Вопрос-331 МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛВ ЭТО А) повреждение генетического аппарата Б) гибель эмбриона В) нарушение развития скелета у плода Г) развитие злокачественных новообразований @	A
332.	ДЕ-1. Вопрос-332 КАНЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛВ ЭТО А) развитие злокачественных новообразований Б) гибель эмбриона В) нарушение развития скелета у плода Г) повреждение генетического аппарата @	A
333.	ДЕ-1. Вопрос-333 ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ОПУХОЛИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛВ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) канцерогенность Б) фетотоксичность В) ulcerогенность Г) эмбриотоксичность @	A
334.	ДЕ-1. Вопрос-334 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) фетотоксичность Б) канцерогенность В) ulcerогенность Г) мутагенность @	A
335.	ДЕ-1. Вопрос-335 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) эмбриотоксичность Б) канцерогенность В) ulcerогенность Г) мутагенность @	A
336.	ДЕ-1. Вопрос-336 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) тератогенность Б) канцерогенность В) ulcerогенность Г) мутагенность @	A
337.	ДЕ-1. Вопрос-337 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА В ПОСЛЕДНИЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) фетотоксичность Б) канцерогенность В) ulcerогенность Г) мутагенность @	A

338.	ДЕ-1. Вопрос-338 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ЕГО ГИБЕЛИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) эмбриотоксичность Б) тератогенность В) фетотоксичность Г) мутагенность @	А
339.	ДЕ-1. Вопрос-339 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА В ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К РАЗВИТИЮ УРОДСТВ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) тератогенность Б) эмбриотоксичность В) фетотоксичность Г) мутагенность @	А
340.	ДЕ-1. Вопрос-340 ЭМБРИОТОКСИЧНОСТЬ ЭТО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ, ПРИВОДЯЩЕЕ К А) гибели плода в I триместр беременности Б) развитию уродств В) нарушению биохимических показателей плода в III триместр беременности Г) нарушению генетического аппарата клеток @	А
341.	ДЕ-1. Вопрос-341 ТЕРАТОГЕННОСТЬ ЭТО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ, ПРИВОДЯЩЕЕ К А) развитию уродств Б) гибели плода в I триместр беременности В) нарушению биохимических показателей у плода в III триместр беременности Г) нарушению генетического аппарата клеток @	А
342.	ДЕ-1. Вопрос-342 НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ СКЕЛЕТА У ПЛОДА ВЫЗЫВАЛ А) талидомид Б) бензилпенициллин В) ацетилсалициловая кислота Г) парацетамол @	А
343.	ДЕ-1. Вопрос-343 ФЕТОТОКСИЧНОСТЬ ЭТО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛВ, ПРИВОДЯЩЕЕ К А) нарушению биохимических показателей у плода в III триместр беременности Б) гибели плода в I триместр беременности В) развитию уродств Г) нарушению генетического аппарата клеток @	А
344.	ДЕ-1. Вопрос-344 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛВ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ А) образовании токсических метаболитов Б) замедлении всасывания из ЖКТ В) применении в малых дозах Г) применении в поддерживающих дозах @	А
345.	ДЕ-1. Вопрос-345 ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ АНЕМИЮ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ФЕРМЕНТА ГЛЮКОЗО-6ФОСФАТ-ДЕГИДРОГЕНАЗЫ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ А) хинин Б) атропин В) пилокарпин Г) кодеин @	А
346.	ДЕ-1. Вопрос-346 ХИНИН У ЛИЦ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ФЕРМЕНТА ГЛЮКОЗО-6ФОСФАТ-ДЕГИДРОГЕНАЗЫ МОЖЕТ А) гемолитическую анемию Б) нарушение слуха В) нарушение функции почек Г) сердечные аритмии @	А
347.	ДЕ-1. Вопрос-347 У ЛИЦ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ФЕРМЕНТА ПЕЧЕНИ N-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ ВОЗРАСТАЕТ ТОКСИЧНОСТЬ А) изониазида Б) пилокарпина	А

	В) атропина Г) кодеина @	
348.	ДЕ-1. Вопрос-348 УЛЬЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛВ ЭТО: А) образование язвы на слизистой желудка Б) повреждение генетического аппарата В) нарушение развития скелета у плода Г) развитие злокачественных новообразований @	А
349.	ДЕ-1. Вопрос-349 ОБРАЗОВАНИЕ ЯЗВЫ НА СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛВ ОБОЗНАЧАЮТ КАК: А) ulcerогенное действие Б) дисбактериоз В) сенсибилизация Г) развитие злокачественных новообразований @	А
350.	ДЕ-1. Вопрос-350 УЛЬЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ: А) Изъязвление слизистой ЖКТ Б) Злокачественные новообразования В) Нарушение развития скелета у плода Г) Изменение генетического аппарата соматических клеток @	А
351.	ДЕ-1. Вопрос-351 КАНЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ: А) Злокачественные новообразования Б) Изъязвление слизистой ЖКТ В) Нарушение развития скелета у плода Г) Изменение генетического аппарата соматических клеток @	А
352.	ДЕ-1. Вопрос-352 ТЕРАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ: А) Нарушение развития скелета у плода Б) Злокачественные новообразования В) Изъязвление слизистой ЖКТ Г) Изменение генетического аппарата соматических клеток @	А
353.	ДЕ-1. Вопрос-353 МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ: А) Изменение генетического аппарата соматических клеток Б) Злокачественные новообразования В) Изъязвление слизистой ЖКТ Г) Нарушение развития скелета у плода @	А
354.	ДЕ-1. Вопрос-354 ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ: А) Нарушение развития зародыша на ранних стадиях беременности Б) Злокачественные новообразования В) Изъязвление слизистой ЖКТ Г) Нарушение развития скелета у плода @	А
355.	ДЕ-1. Вопрос-355 НАРУШЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛС ОБОЗНАЧАЮТ КАК А) дисбактериоз Б) ulcerогенное действие В) сенсибилизация Г) развитие злокачественных новообразований @	А
356.	ДЕ-1. Вопрос-356 ДИСБАКТЕРИОЗ ЭТО А) нарушение полезной микрофлоры Б) образование язвы на слизистой желудка В) нарушение развития скелета у плода Г) развитие злокачественных новообразований @	А
357.	ДЕ-1. Вопрос-357 ДИСБАКТЕРИОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ А) антибиотиков Б) анксиолитиков В) ноотропов Г) седативных средств	А

	@	
358.	ДЕ-1. Вопрос-358 НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛВ НА ГЕНОТИП ОБОЗНАЧАЮТ КАК А) мутагенность Б) эмбриотоксичность В) дисбактериоз Г) тератогенность @	А
359.	ДЕ-1. Вопрос-359 ПОЛИПРАГМАЗИЯ ЭТО А) необоснованное назначение множество ЛС Б) отрицательное влияние ЛС на плод В) необычные реакции на ЛВ обусловленные генетически Г) механизм всасывания ЛВ из ЖКТ @	А
360.	ДЕ-1. Вопрос-360 НЕОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ МНОЖЕСТВА ЛС ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК А) полипрагмазия Б) тахифилаксия В) антагонизм Г) идиосинкразия @	А
361.	ДЕ-1. Вопрос-361 ФАРМАКОГЕНЕТИКА ИЗУЧАЕТ А) атипичные реакции на ЛВ, обусловленные генетически Б) токсичность ЛВ В) атипичное строение рецепторов Г) повышенную чувствительность к ЛВ @	А
362.	ДЕ-1. Вопрос-362 АТИПИЧНАЯ РЕАКЦИЯ НА ЛС, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ, НАЗЫВАЕТСЯ А) идиосинкразия Б) тахифилаксия В) сенсibilизация Г) кумуляция @	А
363.	ДЕ-1. Вопрос-363 ИДИОСИНКРАЗИЯ – ЭТО А) атипичная реакция на ЛС, обусловленная генетически В) быстрое привыкание к ЛС Б) повышенная чувствительность к ЛС Г) накопление ЛВ в организме @	А
364.	ДЕ-1. Вопрос-364 ИДИОСИНКРАЗИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ А) генетически обусловленных изменений активности ферментов лекарственного метаболизма (ферментопатий) В) быстрого привыкания к ЛС Б) повышенной чувствительности к ЛС Г) накопления ЛВ в организме @	А
365.	ДЕ-1. Вопрос-365 ИДИОСИНКРАЗИЯ ОБЫЧНО СВЯЗАНА С А) врожденными энзимопатиями Б) гиперчувствительностью к ЛВ В) накоплением ЛВ в организме Г) лекарственной зависимостью @	А
ФАРМАКОДИНАМИКА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ		
366.	ДЕ-1. Вопрос-366 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) ионный канал Б) фермент В) рецептор Г) транспортная система @	А
367.	ДЕ-1. Вопрос-367 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ АДРЕНОМИМЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) рецептор Б) фермент В) ионный канал Г) транспортная система	А

	@	
368.	ДЕ-1. Вопрос-368 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ НПВС ЯВЛЯЕТСЯ А) фермент Б) рецептор В) ионный канал Г) транспортная система @	A
369.	ДЕ-1. Вопрос-369 «МИШЕНЬЮ» ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ЯВЛЯЕТСЯ А) транспортная система Б) рецептор В) ионный канал Г) фермент @	A
370.	ДЕ-1. Вопрос-370 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ СВЯЗАН С БЛОКАДОЙ А) ионных каналов Б) ферментов В) рецепторов Г) транспортных систем @	A
371.	ДЕ-1. Вопрос-371 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НПВС СВЯЗАН С БЛОКАДОЙ А) ферментов Б) ионных каналов В) рецепторов Г) транспортных систем @	A
372.	ДЕ-1. Вопрос-372 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ СВЯЗАН С БЛОКАДОЙ А) транспортной системы Б) фермента В) рецептора Г) ионного канала @	A
373.	ДЕ-1. Вопрос-373 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЯМЫХ ХОЛИНОМИМЕТИКОВ СВЯЗАН С А) рецепторами Б) ферментами В) ионными каналами Г) транспортными системами @	A
374.	ДЕ-1. Вопрос-374 ТЕТРАЦИКЛИН МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ У ПЛОДА А) нарушение развития скелета и зубов Б) нарушение слуха В) гемолитическую анемию Г) гипогликемию @	A
375.	ДЕ-1. Вопрос-375 ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОКАЗАН: А) Дуба коры отвар Б) Карведилол В) Протамина сульфат Г) Аминокапроновая кислота @	A
376.	ДЕ-1. Вопрос-376 РОМАШКИ ЦВЕТКОВ НАСТОЙ ОКАЗЫВАЕТ: А) Местное действие Б) Резорбтивное действие В) Рефлекторное действие Г) Рефлекторное действие @	A
377.	ДЕ-1. Вопрос-377 ШАЛФЕЙ ЛИСТЬЕВ НАСТОЙ ОКАЗЫВАЕТ: А) Местное действие Б) Резорбтивное действие В) Рефлекторное действие Г) Центральное действие @	A

378.	ДЕ-1. Вопрос-378 ДУБА КОРЫ ОТВАР ОКАЗЫВАЕТ: А) Местное действие Б) Резорбтивное действие В) Рефлекторное действие Г) Обратимое действие @	A
379.	ДЕ-1. Вопрос-379 ИНСУЛИН - СРЕДСТВО: А) Заместительной терапии Б) Этиотропной терапии В) Патогенетической терапии Г) Симптоматической терапии @	A
380.	ДЕ-1. Вопрос-380 МЕЗИМ - СРЕДСТВО: А) Заместительной терапии Б) Этиотропной терапии В) Патогенетической терапии Г) Симптоматической терапии @	A
381.	ДЕ-1. Вопрос-381 ИНСУЛИН – СРЕДСТВО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ? А) Нет Б) Да @	A
382.	ДЕ-1. Вопрос-382 ИНСУЛИН – СРЕДСТВО СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ? А) Нет Б) Да @	A
383.	ДЕ-1. Вопрос-383 АРБИДОЛ – СРЕДСТВО ФАРМАКОПРОФИЛАКТИКИ? А) да Б) Нет @	A
384.	ДЕ-1. Вопрос-384 СНОТВОРНЫЙ ПРЕПАРАТ ТАЛИДОМИД ВЫЗЫВАЛ А) нарушение развития скелета у плода Б) злокачественные новообразования В) дисбактериоз Г) изменение генотипа @	A
385.	ДЕ-1. Вопрос-385 НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ СКЕЛЕТА У ПЛОДА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) тетрациклин Б) бензилпенициллин В) ацетилсалициловая кислота Г) парацетамол @	A
386.	ДЕ-1. Вопрос-386 НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ У РЕБЕНКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) тетрациклин Б) бензилпенициллин В) ацетилсалициловая кислота Г) парацетамол @	A
387.	ДЕ-1. Вопрос-387 ПРИЕМ ТЕТРАЦИКЛИНА НЕ СОВМЕСТИМ С ПИЩЕЙ СОДЕРЖАЩЕЙ А) кальций Б) листовую зелень В) белок Г) морепродукты @	A
388.	ДЕ-1. Вопрос-388 ПИЩА, БОГАТАЯ КАЛЬЦИЕМ, НЕ СОВМЕСТИМА С ПРИЕМОМ А) тетрациклина Б) бензилпенициллина В) ацетилсалициловой кислоты Г) парацетамола @	A
389.	ДЕ-1. Вопрос-389 МОЛОЧНАЯ ПИЩА НЕ СОВМЕСТИМА С ПРИЕМОМ	A

	А) тетрациклина Б) бензилпенициллина В) ацетилсалициловой кислоты Г) парацетамола @	
390.	ДЕ-1. Вопрос-390 АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПЕРОРАЛЬНО ПРОЯВЛЯЕТ: А) Антагонизм Б) Синергизм В) Эффект суммации Г) Потенцирование @	А
391.	ДЕ-1. Вопрос-391 АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПЕРОРАЛЬНО ПРОЯВЛЯЕТ: А) Физический антагонизм Б) Химический антагонизм В) Антиметаболическое действие Г) Конкурентный антагонизм @	А
392.	ДЕ-1. Вопрос-392 ПРИМЕРОМ РЕФЛЕКТОРНОГО ВИДА ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТ БЫТЬ: А) Горчичники Б) Ниаламид В) Сердечные гликозиды Г) Хлорпромазин @	А
393.	ДЕ-1. Вопрос-393 ПРИМЕРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИДА ДЕЙСТВИЯ ВИДА ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТ БЫТЬ: А) Кодеин Б) Ментол В) Сердечные гликозиды Г) Горчичники @	А
394.	ДЕ-1. Вопрос-394 ПРИМЕРОМ ОБРАТИМОГО ВИДА ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТ БЫТЬ: А) Неостигмина метилсульфат Б) Горчичники В) Азаметония бромид Г) Ниаламид @	А
395.	ДЕ-1. Вопрос-395 ПРИМЕРОМ МЕСТНОГО ВИДА ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТ БЫТЬ: А) Ультракаин (Артикаин) Б) Пропранолол (Обзидан, Анаприлин) В) Неостигмина метилсульфат (Прозерин) Г) Ниаламид @	А
396.	ДЕ-1. Вопрос-396 ПОВЫШЕНИЕ ДИУРЕЗА ПРИ ПРИЕМЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЭТО: А) Пример косвенного вида действия Б) пример прямого вида действия В) Пример центрального вида действия Г) Пример местного вида действия @	А
397.	ДЕ-1. Вопрос-397 РАЗДРАЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА ОКАЗЫВАЮТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ: А) Рефлекторное действие Б) Резорбтивное действие В) Местное действие Г) Обратимое действие @	А
398.	ДЕ-1. Вопрос-398 ПРИЖИГАЮЩИЕ СРЕДСТВА ОКАЗЫВАЮТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ: А) Местное действие Б) Рефлекторное действие В) Резорбтивное действие Г) Центральное действие @	А
	ОБЩИЕ ВОПРОСЫ	
399.	ДЕ-1. Вопрос-399	А

	ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) фармакокинетика изучает скорости движение ЛВ в организме Б) трансдермально – это энтеральный путь введения В) стерильность не обязательна для лекарственных форм, вводимых п/к Г) pH среды не влияет на всасывание ЛВ из ЖКТ @	
400.	ДЕ-1. Вопрос-400 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) при повторных введениях может развиваться привыкание Б) аллергические реакции наблюдаются при кумуляции В) эмбриотоксичность развивается в III триместре беременности Г) лекарственную зависимость может вызвать любое ЛВ @	А
401.	ДЕ-1. Вопрос-401 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) понятие «фармакокинетика» включает всасывание, распределение, метаболизм и выведение ЛВ Б) этиотропные средства устраняют симптомы болезни В) пассивная диффузия требует затраты метаболической энергии Г) местное действие развивается после всасывания ЛВ в кровь @	А
402.	ДЕ-1. Вопрос-402 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) понятие «фармакодинамика» включает локализацию действия, механизм действия ЛВ Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) активный транспорт осуществляется по градиенту концентрации Г) местное действие развивается после всасывания ЛВ в кровь @	А
403.	ДЕ-1. Вопрос-403 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) резорбтивное действие развивается после всасывания ЛВ в кровь Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) активный транспорт осуществляется по градиенту концентрации Г) понятие «фармакодинамика» включает всасывание, распределение, метаболизм и выведение ЛВ @	А
404.	ДЕ-1. Вопрос-404 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) энтеральные пути введения: сублингвальный, пероральный, ректальный Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) активный транспорт осуществляется по градиенту концентрации Г) понятие «фармакодинамика» включает всасывание, распределение, метаболизм и выведение ЛВ @	А
405.	ДЕ-1. Вопрос-405 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) парентеральные пути введения: в/м, п/к, в/в Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) средняя доза вызывает максимальный фармакологический эффект Г) понятие «фармакодинамика» включает всасывание, распределение, метаболизм и выведение ЛВ @	А
406.	ДЕ-1. Вопрос-406 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) материальная кумуляция – это накопление ЛВ при повторных введениях Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) активный транспорт осуществляется по градиенту концентрации Г) понятие «фармакодинамика» включает всасывание, распределение, метаболизм и выведение ЛВ @	А
407.	ДЕ-1. Вопрос-407 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) привыкание – это снижение эффекта ЛВ на повторное введение одной и той же дозы Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) понятие «фармакодинамика» включает всасывание, распределение, метаболизм и выведение ЛВ @	А
408.	ДЕ-1. Вопрос-408 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) терапевтическая широта – диапазон доз от минимальной до высшей Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) виды кумуляции: физическая и психическая @	А
409.	ДЕ-1. Вопрос-409 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) лекарственную зависимость могут вызвать наркотические анальгетики	А

	Б) симптоматические средства устраняют причину болезни В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) виды кумуляции: физическая и психическая @	
410.	ДЕ-1. Вопрос-410 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) полипрагмазия – необоснованное назначение множества ЛС Б) антагонизм – реакция на повторное введение ЛС В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) виды кумуляции: физическая и психическая @	А
411.	ДЕ-1. Вопрос-411 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) аллергическая реакция на ЛВ не зависит от дозы Б) потенцирование развивается при повторном введении ЛС В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) виды кумуляции: физическая и психическая @	А
412.	ДЕ-1. Вопрос-412 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) виды лекарственной зависимости: физическая и психическая Б) потенцирование развивается при повторном введении ЛС В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) хорошо переходят гематоэнцефалический барьер гидрофильные и полярные соединения @	А
413.	ДЕ-1. Вопрос-413 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) при пероральном введении ЛВ проходит барьер печени Б) потенцирование развивается при повторном введении ЛС В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) хорошо переходят гематоэнцефалический барьер гидрофильные и полярные соединения @	А
414.	ДЕ-1. Вопрос-414 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) хорошо переходят гематоэнцефалический барьер липофильные и неполярные соединения Б) потенцирование развивается при повторном введении ЛС В) пассивная диффузия осуществляется против градиента концентрации Г) при внутримышечном введении ЛВ проходит барьер печени @	А
415.	ДЕ-1. Вопрос-415 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) у детей младших возрастных групп дозу ЛВ снижают Б) потенцирование развивается при повторном введении ЛС В) гематоэнцефалический барьер не переходят липофильные и неполярные соединения Г) при внутримышечном введении ЛВ проходит барьер печени @	А
416.	ДЕ-1. Вопрос-416 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Ототоксичность – это нарушение слуха Б) Мутагенность – это нарушение образования скелета и внутренних органов (появление уродств) В) Тератогенность – это изменение генетического аппарата соматических клеток Г) Ульцерогенность – это нарушение полезной микрофлоры кишечника и слизистых оболочек @	А
417.	ДЕ-1. Вопрос-417 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Мутагенность – это изменение генетического аппарата соматических клеток Б) Тератогенность – это нарушение полезной микрофлоры кишечника и слизистых оболочек В) Канцерогенность – это нарушение развития эмбриона Г) Ототоксичность – это нарушение функции нервной системы @	А
418.	ДЕ-1. Вопрос-418 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Тератогенность – это нарушение образования скелета и внутренних органов (появление уродств) Б) Мутагенность – это нарушение слуха В) Канцерогенность – это нарушение развития эмбриона Ототоксичность – это изменение генетического аппарата соматических клеток @	А
419.	ДЕ-1. Вопрос-419 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Ульцерогенность – это изъязвление слизистой ЖКТ Б) Мутагенность – это нарушение образования скелета и внутренних органов (появление уродств) В) Канцерогенность – это нарушение развития эмбриона	А

	Г) Ототоксичность – это нарушение полезной микрофлоры кишечника и слизистых оболочек @	
420.	ДЕ-1. Вопрос-420 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Канцерогенность – это развитие злокачественных новообразований Б) Тератогенность – это изменение генетического аппарата соматических клеток В) Ульцерогенность – это нарушение полезной микрофлоры кишечника и слизистых оболочек Г) Ототоксичность – это нарушение слуха @	А
421.	ДЕ-1. Вопрос-421 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Терапевтическая широта – это диапазон доз от минимальной терапевтической (пороговой) до максимальной терапевтической Б) Т _{1/2} – время, в течение которого в кровь поступит 50% от введенной дозы лекарственного вещества В) Минимальная (пороговая) доза вызывает выраженный эффект у большинства пациентов Г) Гидрофильные соединения хорошо переходят гематоэнцефалический барьер @	А
422.	ДЕ-1. Вопрос-422 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Т _{1/2} – время, в течение которого концентрация ЛВ в крови снижается на половину) Б) Терапевтическая широта – это диапазон доз от минимальной терапевтической (пороговой) до летальной В) Минимальная (пороговая) доза вызывает выраженный эффект у большинства пациентов Г) Гидрофильные соединения хорошо проходят гематоэнцефалический барьер @	А
423.	ДЕ-1. Вопрос-423 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Минимальная (пороговая) доза вызывает минимальный регистрируемый эффект Б) Терапевтическая широта – это диапазон доз от минимальной терапевтической (пороговой) до летальной В) Т _{1/2} – время, в течение которого в кровь поступит 50% от введенной дозы лекарственного вещества Г) Гидрофильные соединения хорошо переходят гематоэнцефалический барьер @	А
424.	ДЕ-1. Вопрос-424 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Гидрофильные соединения плохо переходят гематоэнцефалический барьер Б) Терапевтическая широта – это диапазон доз от минимальной терапевтической (пороговой) до летальной В) Канцерогенность – это нарушение развития эмбриона Г) Минимальная (пороговая) доза вызывает выраженный эффект у большинства пациентов @	А
425.	ДЕ-1. Вопрос-425 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: А) Т _{1/2} - время, в течение которого концентрация ЛВ в крови снижается наполовину Б) Мутагенность – это нарушение образования скелета и внутренних органов (появление уродств) В) Минимальная (пороговая) доза вызывает выраженный эффект у большинства пациентов Г) Привыкание – это необоснованное одновременное назначение нескольких лекарственных средств @	А
426.	ДЕ-1. Вопрос-426 ПРОЦЕСС ВСАСЫВАНИЯ ЛВ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОКИНЕТИКЕ? А) Да Б) Нет @	А
427.	ДЕ-1. Вопрос-427 ПРОЦЕСС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛВ ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакокинетике Б) Фармакодинамике @	А
428.	ДЕ-1. Вопрос-428 ПРОЦЕСС МЕТАБОЛИЗМА ЛВ ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакокинетике Б) Фармакодинамике @	А
429.	ДЕ-1. Вопрос-429 ПРОЦЕСС ВЫВЕДЕНИЯ ЛВ ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакокинетике Б) Фармакодинамике @	А
430.	ДЕ-1. Вопрос-430 ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА С РЕЦЕПТОРАМИ ОТНОСИТСЯ К:	А

	А) Фармакодинамике Б) Фармакокинетике @	
431.	ДЕ-1. Вопрос-431 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакодинамике Б) Фармакокинетике @	А
432.	ДЕ-1. Вопрос-432 ПРОЦЕСС БЛОКАДЫ ФЕРМЕНТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакодинамике Б) Фармакокинетике @	А
433.	ДЕ-1. Вопрос-433 ПРОЦЕСС БЛОКАДЫ ИОННЫХ КАНАЛОВ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакодинамике Б) Фармакокинетике @	А
434.	ДЕ-1. Вопрос-434 ПРОЦЕСС ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакодинамике Б) Фармакокинетике @	А
435.	ДЕ-1. Вопрос-435 ПРОЦЕСС БЛОКАДЫ РЕЦЕПТОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ ОТНОСИТСЯ К: А) Фармакодинамике Б) Фармакокинетике @	А

Дидактическая единица №2. Лекарственные средства, влияющие на периферическую нервную систему

№	Текст вопроса	Ответ (буквенный)
	ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АФФЕРЕНТНУЮ ИННЕРВАЦИЮ	
1.	ДЕ-2П. Вопрос-1 ПРОКАИН (НОВОКАИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для инъекций 5 мг/мл, №10 - ампула 2 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) суппозиторий 500 мг @	А
2.	ДЕ-2П. Вопрос-2 МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Бензокаин (Анестезин) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
3.	ДЕ-2П. Вопрос-3 МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Прокаин (Новокаин) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
4.	ДЕ-2П. Вопрос-4 МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Артикаин Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
5.	ДЕ-2П. Вопрос-5 МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Лидокаин Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
6.	ДЕ-2П. Вопрос-6 МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Тетракаин (Дикаин) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
7.	ДЕ-2П. Вопрос-7 ТЕТРАКАИН (ДИКАИН) А) местный анестетик Б) нейролептик В) анальгетик Г) анксиолитик @	А
8.	ДЕ-2П. Вопрос-8 БЕНЗОКАИН (АНЕСТЕЗИН) А) местный анестетик Б) нейролептик В) анальгетик Г) анксиолитик @	А
9.	ДЕ-2П. Вопрос-9 ПРОКАИН (НОВОКАИН) А) местный анестетик Б) нейролептик В) анальгетик Г) Гемостатик	А

	@	
10.	ДЕ-2П. Вопрос-10 АРТИКАИН (УЛЬТРАКАИН) А) местный анестетик Б) нейролептик В) анальгетик Г) анксиолитик @	А
11.	ДЕ-2П. Вопрос-11 ЛИДОКАИН А) местный анестетик Б) нейролептик В) анальгетик Г) анксиолитик @	А
12.	ДЕ-2П. Вопрос-12 К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ОТНОСЯТСЯ А) лидокаин и артикаин Б) артикаин и неостигмин В) лидокаин и галантамин Г) галантамин и артикаин @	А
13.	ДЕ-2П. Вопрос-13 АРТИКАИН ЦЕЛЕСООБРАЗНО КОМБИНИРОВАТЬ С А) адреналином Б) галантамином В) атропином Г) тропикамидом @	А
14.	ДЕ-2П. Вопрос-14 ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ А) лидокаин Б) пропофол В) кетамин Г) закись азота @	А
15.	ДЕ-2П. Вопрос-15 К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ОТНОСЯТСЯ: А) лидокаин и артикаин Б) артикаин и неостигмин В) лидокаин и галантамин Г) галантамин и добутамин @	А
16.	ДЕ-2П. Вопрос-16 К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ: А) лидокаин Б) доксазозин В) азаметоний Г) добутамин @	А
17.	ДЕ-2П. Вопрос-17 ДЛЯ ПРОЛОНГИРОВАНИЯ ЭФФЕКТА АРТИКАИНА ЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО КОМБИНИРОВАТЬ С: А) эпинефрином Б) галантамином В) атропином Г) пилокарпином @	А
18.	ДЕ-2П. Вопрос-18 КОМБИНИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ С ЭПИНЕФРИНОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ДЛЯ: А) пролонгирования эффекта местного анестетика Б) потенцирования анаболического действия В) антагонизма (снижения действия эпинефрина) Г) снижения анестезирующего действия @	А
19.	ДЕ-2П. Вопрос-19 КОМБИНИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ С ЭПИНЕФРИНОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ДЛЯ: А) снижения токсичности местного анестетика Б) потенцирования анаболического действия	А

	В) антагонизма (снижения действия эпинефрина) Г) снижения анестезирующего действия @	
20.	ДЕ-2П. Вопрос-20 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЛИДОКАИНА: А) местноанестезирующий Б) гипертензивный В) бронхолитический Г) желчегонный @	А
21.	ДЕ-2П. Вопрос-21 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЛИДОКАИНА: А) антиаритмический Б) гипертензивный В) бронхолитический Г) кардиотонический @	А
22.	ДЕ-2П. Вопрос-22 ПРИ ОБМОРОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ПРИМЕНЯЮТ А) раствор аммиака Б) пероксид водорода В) настойку полыни Г) борную кислоту @	А
23.	ДЕ-2П. Вопрос-23 РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА: А) раствор аммиака Б) морфин В) налоксон Г) никетамид @	А
24.	ДЕ-2П. Вопрос-24 ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО А) Дуба коры отвар Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
25.	ДЕ-2П. Вопрос-25 ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО А) Препараты дуба Б) Лидокаин В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
26.	ДЕ-2П. Вопрос-26 ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО А) Препарат коры дуба Б) Налоксон В) Лидокаин Г) Кофеин @	А
27.	ДЕ-2П. Вопрос-27 ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ: А) бензокаин Б) прокаин В) бупивакаин Г) артикаин @	А
28.	ДЕ-2П. Вопрос-28 ДЛЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ЦЕНТРОВ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА ПРИМЕНЯЮТ: А) раствор аммиака Б) ментол В) лигнин Г) танин @	А
29.	ДЕ-2П. Вопрос-29 АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ПРИМЕНЯЮТ:	А

	А) внутрь при отравлениях Б) местно при поражениях кожи В) для лечения ожогов Г) при консервировании крови @	
30.	ДЕ-2П. Вопрос-30 СЛИЗЬ ИЗ СЕМЯН ЛЬНА ПОСЕВНОГО ОКАЗЫВАЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: А) обволакивающий Б) адсорбирующий В) вяжущий Г) раздражающий @	А
31.	ДЕ-2П. Вопрос-31 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ВЯЖУЩИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ: А) острые отравления алкалоидами Б) язвенные поражения слизистой оболочки В) обезжиривание кожи Г) промывание желудка @	А
32.	ДЕ-2П. Вопрос-32 ВЯЖУЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) дуба кора Б) ментол В) льна семена Г) уголь активированный @	А
33.	ДЕ-2П. Вопрос-33 ОБВОЛАКИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) льна семена Б) ментол В) дуба кора Г) уголь активированный @	А
34.	ДЕ-2П. Вопрос-34 АДСОРБИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) уголь активированный Б) дуба кора В) льна семена Г) ментол @	А
35.	ДЕ-2П. Вопрос-35 РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) перца стручкового плоды Б) зверобоя трава В) слизи крахмала Г) уголь активированный @	А
36.	ДЕ-2П. Вопрос-36 ОБВОЛАКИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) слизи крахмала Б) ментол В) дуба кора Г) уголь активированный @	А
37.	ДЕ-2П. Вопрос-37 РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) камфорный спирт Б) зверобоя трава В) льна семена Г) уголь активированный @	А
38.	ДЕ-2П. Вопрос-38 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ РАЗДРАЖАЮЩИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ: А) рефлекторная стимуляция центров продолговатого мозга Б) метеоризм В) отравления Г) промывание желудка @	А

39.	ДЕ-2П. Вопрос-39 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ РАЗДРАЖАЮЩИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ: А) рефлексорное улучшение трофики мышц, суставов Б) метеоризм В) отравления солями тяжёлых металлов Г) промывание желудка @	А
40.	ДЕ-2П. Вопрос-40 МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ: А) инфильтрационной анестезии Б) общей анестезии В) восстановления гемодинамического равновесия Г) доставки кислорода в ткани @	А
41.	ДЕ-2П. Вопрос-41 ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРОКАИН ИСПОЛЬЗУЮТ В КОНЦЕНТРАЦИИ: А) 0,25% - 0,5% Б) 1% - 2% В) 2,5% - 5% Г) 10% @	А
42.	ДЕ-2П. Вопрос-42 ДЛЯ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ЛИДОКАИН ИСПОЛЬЗУЮТ В КОНЦЕНТРАЦИИ: А) 1% - 2% Б) 5% В) 0,125% - 0,5% Г) 10% @	А
43.	ДЕ-2П. Вопрос-43 ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИМЕНЯЮТ: А) лидокаин Б) артикаин В) бупивакаин @	А
44.	ДЕ-2П. Вопрос-44 ТАНИН ОКАЗЫВАЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: А) вяжущий Б) адсорбирующий В) болеутоляющий Г) обволакивающий @	А
45.	ДЕ-2П. Вопрос-45 КАМФОРНЫЙ СПИРТ ОКАЗЫВАЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: А) раздражающий Б) адсорбирующий В) вяжущий Г) обволакивающий @	А
46.	ДЕ-2П. Вопрос-46 ПРИ МЕТЕОРИЗМЕ (ИЗБЫТОЧНОМ СКОПЛЕНИИ ГАЗОВ В КИШЕЧНИКЕ) ПРИМЕНЯЮТ: А) активированный уголь Б) танин В) слизь из крахмала Г) ментол @	А
47.	ДЕ-2П. Вопрос-47 ПРИ МЕТЕОРИЗМЕ (ИЗБЫТОЧНОМ СКОПЛЕНИИ ГАЗОВ В КИШЕЧНИКЕ) ПРИМЕНЯЮТ: А) смектит диоктаэдрический (смекта) Б) танин В) слизь из крахмала Г) ментол @	
48.	ДЕ-2П. Вопрос-48 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВЯЖУЩИХ СРЕДСТВ СВЯЗАН С: А) коагуляцией поверхностных белков слизи, раневого экссудата Б) адсорбцией токсических веществ В) снижением острой воспалительной реакции Г) раздражением чувствительных нервных окончаний	А

	@	
49.	ДЕ-2П. Вопрос-49 РЕФЛЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) 10% раствор аммиака Б) танин В) лигнин Г) прокаин @	А
50.	ДЕ-2П. Вопрос-50 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ: А) блокируют Na-каналы чувствительных нервных окончаний и нервных волокон Б) коагулирует белки, образуя защитную пленку В) нарушает проницаемость мембран нервных клеток для ионов натрия Г) в нервно-мышечных волокнах нарушает процесс деполяризации @	А
51.	ДЕ-2П. Вопрос-51 ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ, ЗАМЕЩЕННЫМ АМИДОМ КИСЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ: А) лидокаин Б) новокаин В) бензокаин Г) тетракаин @	А
52.	ДЕ-2П. Вопрос-52 ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ, К СЛОЖНЫМ ЭФИРАМ ОТНОСИТСЯ: А) новокаин Б) лидокаин В) артикаин Г) мепивакаин @	А
	ОБЩИЕ ВОПРОСЫ	
53.	ДЕ-2П. Вопрос-53 ЛОКАЛИЗАЦИЯ М 1-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Б) клетки сердца (синоатриальный узел) В) клетки скелетной мускулатуры Г) цилиарная мышца глаза @	А
54.	ДЕ-2П. Вопрос-54 ЛОКАЛИЗАЦИЯ М 2-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) клетки сердца (синоатриальный узел) Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) цилиарная мышца глаза @	А
55.	ДЕ-2П. Вопрос-55 ЛОКАЛИЗАЦИЯ М 3-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) цилиарная (ресничная) мышца глаза Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	А
56.	ДЕ-2П. Вопрос-56 ЛОКАЛИЗАЦИЯ М 3-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) циркулярная (круговая) мышца радужки глаза Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	А
57.	ДЕ-2П. Вопрос-57 ЛОКАЛИЗАЦИЯ М 3-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) гладкие мышцы бронхов, кишечника, желчного пузыря и протоков Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	А
58.	ДЕ-2П. Вопрос-58 ЛОКАЛИЗАЦИЯ М 3-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) экзокринные железы (бронхиальные, слюнные, желудка и кишечника)	А

	Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	
59.	ДЕ-2П. Вопрос-59 ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕИННЕРВИРУЕМЫХ МЗ-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) эндотелиальные клетки кровеносных сосудов Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	А
60.	ДЕ-2П. Вопрос-60 ЛОКАЛИЗАЦИЯ Nп-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) постганглионарные нейроны Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	А
61.	ДЕ-2П. Вопрос-61 ЛОКАЛИЗАЦИЯ Nп-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) мозговой слой надпочечников Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	А
62.	ДЕ-2П. Вопрос-62 ЛОКАЛИЗАЦИЯ Nп-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) каротидные клубочки Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки скелетной мускулатуры Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	А
63.	ДЕ-2П. Вопрос-63 ЛОКАЛИЗАЦИЯ Nm-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц Б) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) В) клетки сердца (синоатриальный узел) Г) цилиарная мышца глаза @	А
64.	ДЕ-2П. Вопрос-64 ЛОКАЛИЗАЦИЯ АЛЬФА1-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) постсинаптические эффекторные клетки Б) пресинаптические адренергические нервные окончания @	А
65.	ДЕ-2П. Вопрос-65 ЛОКАЛИЗАЦИЯ АЛЬФА1-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) гладкие мышцы сосудов Б) пресинаптические адренергические нервные окончания В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) клетки скелетной мускулатуры @	А
66.	ДЕ-2П. Вопрос-66 ЛОКАЛИЗАЦИЯ АЛЬФА1-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) радиальная мышца радужной оболочки Б) пресинаптические адренергические нервные окончания В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) клетки скелетной мускулатуры @	А
67.	ДЕ-2П. Вопрос-67 ЛОКАЛИЗАЦИЯ АЛЬФА2-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) пресинаптические адренергические нервные окончания Б) бронхиоларные гладкие мышцы В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц @	А
68.	ДЕ-2П. Вопрос-68 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕТА1-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) клетки сердца (синоатриальный узел)	А

	Б) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) матка при беременности @	
69.	ДЕ-2П. Вопрос-69 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕТА1-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) юстагломерулярный аппарат почек Б) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) матка при беременности @	A
70.	ДЕ-2П. Вопрос-70 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕТА2-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) бронхиоллярные гладкие мышцы Б) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	
71.	ДЕ-2П. Вопрос-71 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕТА2-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) сосуды скелетных мышц Б) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	A
72.	ДЕ-2П. Вопрос-72 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕТА2-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) матка при беременности Б) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	A
73.	ДЕ-2П. Вопрос-73 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕТА2-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) печень Б) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	A
74.	ДЕ-2П. Вопрос-74 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕТА 3-АДРЕНOREЦЕПТОРОВ: А) жировые клетки (адипоциты) Б) нервно-мышечные пластинки скелетных мышц В) энтерохромаффиноподобные клетки желудка (ECL-клетки) Г) клетки сердца (синоатриальный узел) @	A
75.	ДЕ-2П. Вопрос-75 ЭФФЕКТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕЛЕКТИВНОГО М1-ХОЛИНОБЛОКАТОРА: А) антисекреторный (снижение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка) Б) отрицательный хронотропный В) положительный инотропный @	A
76.	ДЕ-2П. Вопрос-76 ЭФФЕКТ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ М2-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) увеличение частоты сердечных сокращений Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	A
77.	ДЕ-2П. Вопрос-77 ЭФФЕКТ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ ПРЕСИНАПТИЧЕСКИХ М2-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ: А) снижение высвобождения ацетилхолина Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) увеличение частоты сердечных сокращений Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	A
78.	ДЕ-2П. Вопрос-78	A

	ЭФФЕКТ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ ПРЕСИНАПТИЧЕСКИХ АЛЬФА2-АДРЕНорецепторов: А) снижение высвобождения норадреналина Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) увеличение частоты сердечных сокращений Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	
79.	ДЕ-2П. Вопрос-79 ЭФФЕКТ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ ПРЕСИНАПТИЧЕСКИХ БЕТА2-АДРЕНорецепторов: А) увеличение высвобождения норадреналина Б) снижение выработки адреналина В) увеличение частоты сердечных сокращений Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
80.	ДЕ-2П. Вопрос-80 ЭФФЕКТ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ М3-ХОЛИНорецепторов КРУГОВОЙ МЫШЦЫ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ХОЛИНОМИМЕТИКАМИ: А) сокращение, сужение зрачков (миоз) Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
81.	ДЕ-2П. Вопрос-81 ЭФФЕКТ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ М3-ХОЛИНорецепторов ЦИЛИАРНОЙ (РЕСНИЧНОЙ) МЫШЦЫ ГЛАЗА ХОЛИНОМИМЕТИКАМИ: А) сокращение, спазм аккомодации (глаз устанавливается на ближнюю точку видения) Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
82.	ДЕ-2П. Вопрос-82 ЭФФЕКТ ПРИ БЛОКИРОВАНИИ М3-ХОЛИНорецепторов КРУГОВОЙ МЫШЦЫ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ХОЛИНОЛИТИКАМИ: А) расширение зрачков (мидриаз) Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
83.	ДЕ-2П. Вопрос-83 ЭФФЕКТ ПРИ БЛОКИРОВАНИИ М3-ХОЛИНорецепторов ЦИЛИАРНОЙ (РЕСНИЧНОЙ) МЫШЦЫ ГЛАЗА ХОЛИНОЛИТИКАМИ: А) паралич аккомодации (установка глаза на дальнее видение) Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
84.	ДЕ-2П. Вопрос-84 ЭФФЕКТ ПРИ БЛОКАДЕ М2-ХОЛИНорецепторов: А) увеличение частоты сердечных сокращений и повышение атриовентрикулярной проводимости Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
85.	ДЕ-2П. Вопрос-85 ЭФФЕКТ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ М3-ХОЛИНорецепторов ХОЛИНОМИМЕТИКАМИ: А) повышение тонуса и перистальтики гладких мышц (искл. - сфинктеры), усиление моторики желудка, кишечника и мочевого пузыря Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
86.	ДЕ-2П. Вопрос-86 ЭФФЕКТ ПРИ БЛОКАДЕ М3-ХОЛИНорецепторов: А) снижение секреторной функции экзокринных желез (бронхиальных, слюнных, желудка и кишечника) Б) повышение выделения гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) снижение частоты сердечных сокращений и угнетение атриовентрикулярной проводимости Г) рефлекторное возбуждение сосудодвигательного и дыхательного центров @	А
87.	ДЕ-2П. Вопрос-87	А

	СТИМУЛИРОВАНИЕ НЕ ИННЕРВИРУЕМЫХ МЗ-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ ПРИВОДИТ К: А) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению адреналина мозговым слоем надпочечников Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	
88.	ДЕ-2П. Вопрос-88 ПРИМЕНЕНИЕ ГАНГЛИОБЛОКАТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА Nn РЕЦЕПТОРЫ, МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ: А) снижению выделения адреналина мозговым слоем надпочечников Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
89.	ДЕ-2П. Вопрос-89 ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛЕПТИКОВ (СТИМУЛЯТОРОВ ДЫХАНИЯ), ДЕЙСТВУЮЩИХ НА Nn РЕЦЕПТОРЫ, ПРИВОДИТ К: А) рефлекторному возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
90.	ДЕ-2П. Вопрос-90 ПРИМЕНЕНИЕ ДЕПОЛЯРИЗУЮЩИХ МИОРЕЛАКСАНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА Nm РЕЦЕПТОРЫ, ПРИВОДИТ К: А) расслаблению скелетных мышц Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
91.	ДЕ-2П. Вопрос-91 ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬФА-МИМЕТИКОВ ПРИВОДИТ К: А) сужению кровеносных сосудов Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
92.	ДЕ-2П. Вопрос-92 ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА1-МИМЕТИКОВ ПРИВОДИТ К: А) увеличению концентрации кальция в клетках сердца Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
93.	ДЕ-2П. Вопрос-93 ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА1-МИМЕТИКОВ: А) положительный инотропный (увеличивается сила сердечных сокращений) Б) отрицательный хронотропный (снижается частота сердечных сокращений) В) отрицательный инотропный (увеличивается сила сердечных сокращений) Г) увеличение артериального давления (гипертензивный) @	А
94.	ДЕ-2П. Вопрос-94 ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА1-БЛОКАТОРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К: А) снижению выделения ренина юкстагломерулярным аппаратом почек Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) увеличению концентрации кальция в клетках сердца @	А
95.	ДЕ-2П. Вопрос-95 ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА-БЛОКАТОРОВ: А) антиаритмический, антиангинальный, антигипертензивный, снижение внутриглазного давления Б) антиаритмический, антиангинальный, антацидный, антигипертензивный	А

	В) антиаритмический, антиаллергический, антиангинальный, антигипертензивный Г) антиаритмический, антиаллергический, антиангинальный, гипертензивный @	
96.	ДЕ-2П. Вопрос-96 ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА2-МИМЕТИКОВ ПРИВОДИТ К: А) расслаблению гладкомышечных органов (бронхи и миометрий) Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
97.	ДЕ-2П. Вопрос-97 ПРИМЕНЕНИЕ НЕСЕЛЕКТИВНЫХ БЕТА-БЛОКАТОРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К: А) бронхоконстрикции вследствие спазма бронхиальной мускулатуры Б) выделению гистамина, стимулирующего секрецию HCl париетальными клетками желудка В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
98.	ДЕ-2П. Вопрос-98 ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА2-МИМЕТИКОВ ПРИВОДИТ К: А) бронхолитическому и токолитическому эффектам Б) бронхолитическому и антацидному эффектам В) токолитическому и антипротозойному Г) бронхолитическому и снижению внутриглазного давления @	А
99.	ДЕ-2П. Вопрос-99 СТИМУЛЯЦИЯ БЕТА 3-РЕЦЕПТОРОВ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИВОДИТ К: А) активации липолиза Б) снижению гликогенолиза В) выделению эндотелиального релаксирующего фактора (NO), который вызывает расслабление гладких мышц сосудов Г) выделению ренина юкстагломерулярным аппаратом почек @	А
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
100.	ДЕ-2П. Вопрос-100 АТРОПИН (АТРОПИНА СУЛЬФАТ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для инъекций 0.5 мг/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) суппозиторий 500 мг @	А
101.	ДЕ-2П. Вопрос-101 ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВОЗНИКАЕТ ЭФФЕКТ: А) повышение тонуса гладких мышц Б) повышение внутриглазного давления В) снижение секреции слюнных, потовых желез @	А
102.	ДЕ-2П. Вопрос-102 МИОРЕЛАКСАНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВПРАВЛЕНИЯ ВЫВИХОВ: А) суксаметония йодид Б) пипекурония бромид В) неостигмина метилсульфат Г) азаметония бромид @	А
103.	ДЕ-2П. Вопрос-103 ПИЛОКАРПИН А) М-холиномиметик Б) Н-холиномиметик В) М-холиноблокатор Г) Альфа-адреномиметик @	А
104.	ДЕ-2П. Вопрос-104 НЕОСТИГМИНА МЕТИЛСУЛЬФАТ А) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Б) Ганглиоблокатор В) М-холиноблокатор	А

	Г) Альфа-адреномиметик @	
105.	ДЕ-2П. Вопрос-105 АТРОПИН А) М-холиноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
106.	ДЕ-2П. Вопрос-106 ПИРЕНЗЕПИН (ГАСТРОЦЕПИН) А) М1-холиноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
107.	ДЕ-2П. Вопрос-107 ИПРАТРОПИЯ БРОМИД А) М3-холиноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Симпатомиметик Г) Альфа-адреномиметик @	А
108.	ДЕ-2П. Вопрос-108 АЗАМЕТОНИЯ БРОМИД А) Ганглиоблокатор Б) Ингибитор ацетилхолинэстеразы В) М3-холиноблокатор Г) Альфа-адреномиметик @	А
109.	ДЕ-2П. Вопрос-109 ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИД А) Миорелаксант (Курареподобное средство) Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
110.	ДЕ-2П. Вопрос-110 СУКСАМЕТОНИЙ А) Миорелаксант (Курареподобное средство) Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
111.	ДЕ-2П. Вопрос-111 ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВПРАВЛЕНИЯ ВЫВИХОВ ПРИМЕНЯЮТ МИОРЕЛАКСАНТ А) суксаметония йодид Б) пипекурония бромид В) неостигмина метилсульфат Г) азаметония бромид @	А
112.	ДЕ-2П. Вопрос-112- РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКА ВЫЗЫВАЕТ ПРЕПАРАТ А) тропикамид Б) пилокарпин В) неостигмина метилсульфат Г) тимолол @	А
113.	ДЕ-2П. Вопрос-113 ПИЛОКАРПИН ВЫПУСКАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ А) глазные капли Б) мазь В) таблетки Г) капсулы @	А
114.	ДЕ-2П. Вопрос-114	А

	ПРИРОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭФЕДРИНА ЯВЛЯЕТСЯ РАСТЕНИЕ А) эфедра хвощевидная Б) дурман индийский В) красавка обыкновенная Г) белена черная @	
115.	ДЕ-2П. Вопрос-115 СЕКРЕЦИЮ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ЖЕЛУДКА ПОДАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ А) пирензепин Б) ксилометазолин В) эфедрин Г) эпинефрин @	А
116.	ДЕ-2П. Вопрос-116 ПИРЕНЗЕПИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ А) холиноблокаторы Б) холиномиметики В) адреномиметики Г) адреноблокаторы @	А
117.	ДЕ-2П. Вопрос-117 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРЕПАРАТ А) пропранолол Б) фенотерол В) сальбутамол Г) будесонид @	А
118.	ДЕ-2П. Вопрос-118 ЗАТРУДНЯЮТ ОТТОК ВНУТРИГЛАЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПРЕПАРАТЫ А) м-холиноблокаторы Б) альфа-адреноблокаторы В) антихолинэстеразные средства Г) м-холиномиметики @	А
119.	ДЕ-2П. Вопрос-119 ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ АТРОПИНА ЯВЛЯЕТСЯ А) паралич аккомодации Б) выраженная брадикардия В) атриовентрикулярная блокада Г) ортостатическая гипотензия @	А
120.	ДЕ-2П. Вопрос-120 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ А) атропин Б) пирензепин В) галантамин Г) пилокарпин @	А
121.	ДЕ-2П. Вопрос-121 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ НИКОТИНА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ А) отвыкании от курения Б) закрытоугольной глаукоме В) нарушениях липидного обмена Г) спазмах гладкой мускулатуры @	А
122.	ДЕ-2П. Вопрос-122 ГИОСЦИНА БУТИЛБРОМИД (БУСКОПАН) ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ А) спазмах гладкой мускулатуры Б) закрытоугольной глаукоме В) вазомоторном рините Г) конъюнктивитах @	А
123.	ДЕ-2П. Вопрос-123	А

	ГИОСЦИНА БУТИЛБРОМИД (БУСКОПАН) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ А) антихолинергические средства Б) наркотические анальгетики В) местные анестетики Г) обволакивающие средства @	
124.	ДЕ-2П. Вопрос-124 ИПРАТРОПИЯ БРОМИД (АТРОВЕНТ) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ А) холиноблокаторы Б) адреномиметики В) холиномиметики Г) адреноблокаторы @	А
125.	ДЕ-2П. Вопрос-125 В КАЧЕСТВЕ СПАЗМОЛИТИКА ПРИМЕНЯЮТ А) гиосцина бутилбромид Б) пирензепин В) фенилэфрин Г) карведилол @	А
126.	ДЕ-2П. Вопрос-126 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗНОГО ДНЯ ПРИМЕНЯЮТ А) тропикамид Б) неостигмина метилсульфат В) азаметония бромид Г) тамсулозин @	А
127.	ДЕ-2П. Вопрос-127 СУКСАМЕТОНИЯ ЙОДИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ А) миорелаксанты Б) ганглиоблокаторы В) адреноблокаторы Г) холинолитики @	А
128.	ДЕ-2П. Вопрос-128 АНТИДОТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩИМИ КУРАРЕПОДОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ А) неостигмина метилсульфат Б) заметония бромид В) атропина сульфат Г) суксаметония иодид @	А
129.	ДЕ-2П. Вопрос-129 ПАРАЛИЧ АККОМОДАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ ПРЕПАРАТ А) атропин Б) пилокарпин В) неостигмин Г) суксаметония @	А
130.	ДЕ-2П. Вопрос-130 ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ХОККЕИСТ ВЫВИХНУЛ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ. КОМАНДНЫЙ ВРАЧ НЕ СМОГ ВПРАВИТЬ ВЫВИХ ИЗ-ЗА СИЛЬНО РАЗВИТОЙ МУСКУЛАТУРЫ СПОРТСМЕНА. КАКИМ ПРЕПАРАТОМ СЛЕДУЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПОРТИВНОМУ ВРАЧУ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВПРАВЛЕНИЯ ВЫВИХА? А) суксаметония йодид (дитилин) Б) пипекурония бромид (ардуан) В) гиосцина бутилбромид (бускопан) Г) азаметония бромид (пентамин) @	А
131.	ДЕ-2П. Вопрос-131 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АТРОПИНА: А) паралич аккомодации, сухость во рту, запор, тахикардия, нарушение мочеиспускания Б) паралич аккомодации, гиперсаливация, диарея, брадикардия, нарушение мочеиспускания В) спазм аккомодации, миоз, сухость во рту, тахикардия, нарушение мочеиспускания Г) спазм аккомодации, мидриаз, сухость во рту, диарея, нарушение мочеиспускания @	А
132.	ДЕ-2П. Вопрос-132 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИМЕНЯЮТ: А) тропикамид Б) неостигмина метилсульфат	А

	В) азаметония бромид Г) тамсулозин @	
133.	ДЕ-2П. Вопрос-133 АТРОПИН ЯВЛЯЕТСЯ АНТАГОНИСТОМ: А) М ₁ -, М ₂ -, М ₃ -холинорецепторов Б) М ₃ -холинорецепторов В) М ₁ -холинорецепторов Г) N _m -холинорецепторов @	А
134.	ДЕ-2П. Вопрос-134 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГАНГЛИОБЛОКАТОРОВ: А) снижение АД Б) сужение зрачка (миоз) В) гиперсаливация Г) бронхоспазм @	А
135.	ДЕ-2П. Вопрос-135 ГИОСЦИНА БУТИЛБРОМИД (БУСКОПАН) НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ: А) спазмах верхних отделов ЖКТ Б) почечной колике В) спазмах периферических сосудов Г) печеночной колике @	А
136.	ДЕ-2П. Вопрос-136 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИРЕНЗЕПИНА (ГАСТРОЦЕПИНА) СВЯЗАН С БЛОКАДОЙ: А) М ₁ -холинорецепторов Б) М ₂ -холинорецепторов В) М ₃ -холинорецепторов Г) N _p -холинорецепторов @	А
137.	ДЕ-2П. Вопрос-137 К М-ХОЛИНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСЯТ: А) атропин Б) пилокарпин В) неостигмин Г) адреналин @	А
138.	ДЕ-2П. Вопрос-138 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ АТРОПИНА: А) устранение спазмов гладкомышечных органов Б) расслабление скелетных мышц В) спазм аккомодации Г) расширение периферических сосудов @	А
139.	ДЕ-2П. Вопрос-139 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ АТРОПИНА: А) паралич аккомодации Б) повышение тонуса гладких мышц В) сужение зрачков (миоз) Г) уменьшение частоты сердечных сокращений @	А
140.	ДЕ-2П. Вопрос-140 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ АТРОПИНА: А) сухость во рту Б) брадикардия В) сужение зрачков (миоз) Г) повышение секреции бронхиальных желез @	А
141.	ДЕ-2П. Вопрос-141 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПИЛОКАРПИНА: А) глаукома Б) ишемическая болезнь сердца В) острая сердечная недостаточность Г) язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки @	А
142.	ДЕ-2П. Вопрос-142 ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСНОЙ КИШКИ ПРИМЕНЯЮТ:	А

	А) пирензепин Б) нафазолин В) эфедрин Г) адреналин @	
143.	ДЕ-2П. Вопрос-143 ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСНОЙ КИШКИ ПРИМЕНЯЮТ: А) гастропепин Б) нафазолин В) эфедрин Г) адреналин @	А
144.	ДЕ-2П. Вопрос-144 ОРТОСТАТИЧЕСКУЮ ГИПОТЕНЗИЮ ВЫЗЫВАЕТ: А) азаметония бромид Б) тамсулозин В) добутамин Г) фенилэфрин @	А
145.	ДЕ-2П. Вопрос-145 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ: А) для расширения зрачков при исследовании глазного дна Б) миастения В) купирование гипертонического криза Г) гипертоническая болезнь, ИБС @	А
146.	ДЕ-2П. Вопрос-146 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕОСТИГМИНА МЕТИЛСУЛЬФАТА ЯВЛЯЕТСЯ: А) миастения Б) для расширения зрачков при исследовании глазного дна В) купирование гипертонического криза Г) гипертоническая болезнь, ИБС @	А
147.	ДЕ-2П. Вопрос-147 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ АЗАМЕТОНИЯ БРОМИДА ЯВЛЯЕТСЯ: А) купирование гипертонического криза Б) для расширения зрачков при исследовании глазного дна В) миастения Г) гипертоническая болезнь, ИБС @	А
148.	ДЕ-2П. Вопрос-148 ГИОСЦИНА БУТИЛБРОМИД (БУСКОПАН) В СРЕДНИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДОЗАХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЛОКИРУЕТ: А) М ₃ -холинорецепторы Б) М ₂ -холинорецепторы В) Nm-холинорецепторы Г) Nn-холинорецепторы @	А
149.	ДЕ-2П. Вопрос-149 В ГРУППУ ГАНГЛИОБЛОКАТОРЫ ВХОДИТ: А) азаметония бромид Б) суксаметония йодид В) пипекурония бромид Г) неостигмина метилсульфат @	А
150.	ДЕ-2П. Вопрос-150 МИОРЕЛАСАНТ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ: А) пипекурония бромид Б) суксаметония йодид В) азаметония бромид Г) неостигмина метилсульфат @	А
151.	ДЕ-2П. Вопрос-151 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ СУКСАМЕТОНИЯ ЙОДИДА: А) мышечные боли Б) сухость во рту В) снижение артериального давления Г) атония ЖКТ	А

	@	
152.	ДЕ-2П. Вопрос-152 ПИРЕНЗЕПИН (ГАСТРОЦЕПИН) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ: А) М ₁ -холиноблокаторы Б) α -адреномиметики В) β - адреномиметики Г) курареподобные средства @	А
153.	ДЕ-2П. Вопрос-153 ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИД ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ: А) курареподобные средства (антидеполяризующего типа действия) Б) курареподобные средства (деполяризующие миорелаксанты) В) М-холиноблокаторы Г) β-адреномиметики @	А
154.	ДЕ-2П. Вопрос-154 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА: А) бронхолитический Б) сосудорасширяющий В) сосудосуживающий Г) спазмолитический @	А
155.	ДЕ-2П. Вопрос-155 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГИОСЦИНА БУТИЛБРОМИДА (БУСКОПАНА): А) спазмолитический Б) сосудорасширяющий В) бронхолитический Г) сосудосуживающий @	А
156.	ДЕ-2П. Вопрос-156 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АТРОПИНА: А) блокирует неселективно М-холинорецепторы Б) стимулирует М ₃ -холинорецепторы В) блокирует N-холинорецепторы вегетативных ганглиев Г) блокирует N-холинорецепторы скелетных мышц @	А
157.	ДЕ-2П. Вопрос-157 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИДА: А) блокирует N _m -холинорецепторы Б) стимулирует М-холинорецепторы В) блокирует М-холинорецепторы Г) блокирует N _n -холинорецепторы @	А
158.	ДЕ-2П. Вопрос-158 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИЛОКАРПИНА: А) стимулирует М-холинорецепторы Б) блокирует М-холинорецепторы В) блокирует N _n -холинорецепторы Г) блокирует N _m -холинорецепторы @	А
159.	ДЕ-2П. Вопрос-159 ОТЛИЧИЕ ДЕПОЛЯРИЗУЮЩИХ МИОРЕЛАКСАНТОВ ОТ АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩИХ: А) не имеют специфического антидота Б) имеют специфический антидот В) в средних терапевтических дозах уменьшают жизненную емкость легких более, чем на 25% Г) блокируют N _m -холинорецепторы @	А
160.	ДЕ-2П. Вопрос-160 ТУБОКУРАРИНА ХЛОРИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ: А) антидеполяризующие миорелаксанты Б) деполяризующие миорелаксанты В) ганглиоблокаторы Г) М-холиноблокаторы @	А
161.	ДЕ-2П. Вопрос-161 ГАНГЛИОБЛОКАТОРЫ: А) понижают АД Б) вызывают спазм аккомодации	А

	В) вызывают брадикардию Г) повышают перистальтику ЖКТ @	
162.	ДЕ-2П. Вопрос-162 ПРИ ГЛАУКОМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА: А) атропина Б) бетаксолола В) неостигмина Г) клонидина @	А
163.	ДЕ-2П. Вопрос-163 ПРИ ГЛАУКОМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА: А) тропикамида Б) фенилэфрина В) неостигмина Г) бетаксолола @	А
164.	ДЕ-2П. Вопрос-164 МИОРЕЛАКСАНТ АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ: А) пипекурония бромид Б) ипротропия бромид В) азаметония бромид Г) суksamетония хлорид @	А
165.	ДЕ-2П. Вопрос-165 ПИРЕНЗЕПИН (ГАСТРОЦЕПИН) ОТНОСЯТ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ: А) М ₁ -Холиноблокаторы Б) М ₃ -Холиноблокаторы В) Ганглиоблокаторы Г) Миорелаксанты @	А
166.	ДЕ-2П. Вопрос-166 КУРАРЕПОДОБНЫЕ СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) интубации трахеи, эндоскопических процедурах, вправление вывихов Б) спазмах периферических сосудов В) коликах Г) купировании гипертонических кризов @	А
167.	ДЕ-2П. Вопрос- КУРАРЕПОДОБНЫЕ СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ: А) расслабления скелетных мышц при хирургических вмешательствах Б) купирования гипертонических кризов В) пролонгирования действия местных анестетиков Г) устранения спазмов периферических сосудов @	А
168.	ДЕ-2П. Вопрос-168 ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЮТ: А) азаметоний Б) суksamетоний В) пипекуроний Г) векуроний @	А
169.	ДЕ-2П. Вопрос-169 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГАНГЛИОБЛОКАТОРОВ: А) ортостатический коллапс Б) миоз В) повышение тонуса мочевого пузыря Г) увеличение солификации @	А
170.	ДЕ-2П. Вопрос-170 М-ХОЛИНОБЛОКАТОР: А) атропин Б) пилокарпин В) неостигмин Г) суksamетоний @	А
171.	ДЕ-2П. Вопрос-171 АТРОПИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ:	А

	А) спазмах гладкомышечных органов Б) глаукоме В) атонии кишечника и мочевого пузыря Г) угнетение дыхания @	
172.	ДЕ-2П. Вопрос-172 АТРОПИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) отравлении антихолинэстеразными средствами Б) глаукоме В) атонии кишечника и мочевого пузыря Г) угнетение дыхания @	А
173.	ДЕ-2П. Вопрос-173 АТРОПИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) воспалительных заболеваниях глаз (ирит, иридоциклит, кератит) Б) глаукоме В) атонии кишечника и мочевого пузыря Г) угнетение дыхания @	А
174.	ДЕ-2П. Вопрос-174 АТРОПИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) спазмах кишечника и мочевых путей Б) глаукоме В) атонии кишечника и мочевого пузыря Г) угнетение дыхания @	А
175.	ДЕ-2П. Вопрос-175 АТРОПИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) отравлении холиномиметиками, грибами Б) глаукоме В) атонии кишечника и мочевого пузыря Г) тахикардии @	А
176.	ДЕ-2П. Вопрос-176 ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ: А) глаукома Б) бронхиальная астма В) брадикардия Г) паркинсонизм @	А
177.	ДЕ-2П. Вопрос-177 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЮТ: А) ипратропия бромид Б) пирензепин В) пипекурония бромид Г) тропикамид @	А
178.	ДЕ-2П. Вопрос-178 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЮТ: А) тиотропия бромид Б) пирензепин В) пипекурония бромид Г) тропикамид @	А
179.	ДЕ-2П. Вопрос-179 ПИРЕНЗЕПИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСНОЙ КИШКИ, ТАК КАК ОН: А) селективно блокирует М ₁ -холинорецепторы Б) неселективно блокирует М-холинорецепторы В) блокирует экзоцитоз ацетилхолина Г) оказывает центральное холинолитическое действие @	А
180.	ДЕ-2П. Вопрос-180 ПИРЕНЗЕПИН ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСНОЙ КИШКИ, ТАК КАК ОН: А) избирательно угнетает секрецию соляной кислоты и пепсиногена Б) избирательно угнетает секрецию слюнных, потовых и бронхиальных желез В) блокирует экзоцитоз ацетилхолина	А

	Г) проходит через гематоэнцефалический барьер @	
181.	ДЕ-2П. Вопрос-181 ОПРЕДЕЛИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ: М-ХОЛИНОБЛОКАТОР, ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ, ВЫЗЫВАЕТ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ МИДРИАЗ (2-4 ЧАСА). А) тропикамид Б) ипратропия бромид В) гиосцина бутилбромид Г) платифиллин @	А
182.	ДЕ-2П. Вопрос-182 М-ХОЛИНОБЛОКАТОР: А) тропия хлорид Б) ботулинический токсин В) аллоксим Г) дистигмина бромид @	А
183.	ДЕ-2П. Вопрос-183 М-ХОЛИНОБЛОКАТОР: А) платифиллина гидротартрат Б) ботулинический токсин В) азаметония бромид Г) дистигмина бромид @	А
184.	ДЕ-2П. Вопрос-184 РЕАКТИВАТОРЫ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПРИМЕНЯЮТ: А) при отравлении ФОС Б) при отравлении М-холиноблокаторами В) для лечения глаукомы Г) для лечения бронхиальной астмы @	А
185.	ДЕ-2П. Вопрос-185 ОПРЕДЕЛИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ: М ₁ -ХОЛИНОБЛОКАТОР. ПРИ ПРИЕМЕ ВНУТРЬ СНИЖАЕТ СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА, В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ЧЕМ АТРОПИН, ВЫЗЫВАЕТ ТАХИКАРДИЮ И СУХОСТЬ ВО РТУ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ. А) пирензепин Б) тиотропия бромид В) оксибутинин Г) тропикамид @	А
186.	ДЕ-2П. Вопрос-186 ВЫСВОБОЖДЕНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРА АЦЕТИЛХОЛИНА БЛОКИРУЕТ ПРЕПАРАТ: А) ботулинический токсин Б) прокаин В) прозерин Г) лигнин @	А
187.	ДЕ-2П. Вопрос-187 МИОРЕЛАКСАНТОМ ДЕПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: А) суksamетония бромид Б) пипекурония бромид В) добутамин Г) норадреналин @	А
188.	ДЕ-2П. Вопрос-188 ПИЛОКАРПИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ: А) глаукома Б) понос В) гипертензия Г) подагра @	А
189.	ДЕ-2П. Вопрос-189 КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ БЛОКИРУЕТ ПРЕССОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОДНАКО НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЭТОГО НЕЙРОТРАНСМИТТЕРА? А) Добутамин Б) Эфедрин В) Празозин	А

	Г) Пиндолол @	
190.	ДЕ-2П. Вопрос-190 СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ МИАСТЕНИИ: А) галантамин Б) атропин В) неостигмин Г) изонитрозин @	А
191.	ДЕ-2П. Вопрос-191 АТРОПИН БЛОКИРУЕТ ДЕЙСТВИЕ: А) ацетилхолина Б) адреналина В) сальбутамола Г) гиосцина бромид @	А
192.	ДЕ-2П. Вопрос-192 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗУ, ПРИМЕНЯЮТ: А) атропин Б) нитроглицерин В) фенилэфрин Г) суксаметоний @	А
193.	ДЕ-2П. Вопрос-193 ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИДА ПРИМЕНЯЮТ: А) неостигмина метилсульфат Б) нитроглицерин В) фенилэфрин Г) изонитрозин @	А
194.	ДЕ-2П. Вопрос-194 ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СУКСАМЕТОНΙΑ ПРИМЕНЯЮТ: А) переливание крови Б) неостигмина метилсульфат В) перитониальный диализ Г) изонитрозин @	А
195.	ДЕ-2П. Вопрос-195 ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩИХ МИОРЕЛАКСАНТОВ ПРИМЕНЯЮТ СРЕДСТВА: А) антихолинэстеразные Б) М-холинолитики В) бета-адренолитики Г) симпатолитики @	А
196.	ДЕ-2П. Вопрос-196 ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО БЛОКА, ВЫЗВАННОГО КУРАРЕПОДОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЮТ: А) антихолинэстеразные Б) М-холинолитики В) бета-адренолитики Г) симпатолитики @	А
197.	ДЕ-2П. Вопрос-197 ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО БЛОКА, ВЫЗВАННОГО КУРАРЕПОДОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ АНТИДЕПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЮТ: А) неостигмина метилсульфат Б) тропикамид В) азаметония бромид Г) суксаметония иодид @	А
198.	ДЕ-2П. Вопрос-198 БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА А ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) спастической кривошее Б) миастении В) при интубации трахеи Г) повышенной саливации @	А
199.	ДЕ-2П. Вопрос-199	А

	ДЛЯ СУКСАМЕТОНИЯ ИОДИДА ХАРАКТЕРНО: А) мышечные фасцикуляции Б) миорелаксация продолжается 60 минут В) антихолинэстеразные средства устраняют его действие Г) всасывается из ЖКТ @	
200.	ДЕ-2П. Вопрос-200 ДЛЯ СУКСАМЕТОНИЯ ИОДИДА ХАРАКТЕРНО: А) после восстановления тонуса мышц возникают мышечные боли Б) миорелаксация продолжается 120 минут В) ингибиторы холинэстеразы устраняют действие Г) всасывается из ЖКТ @	A
201.	ДЕ-2П. Вопрос-201 ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ – ОБРАТИМО ИНГИБИРУЕТ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗУ В ЦНС, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА: А) ривастигмин Б) неостигмина метилсульфат В) ипратропия бромид Г) изонитрозин @	A
202.	ДЕ-2П. Вопрос-202 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПЕРЕНЕСЕННОГО ПОЛИОМИЕЛИТА ПРИМЕНЯЮТ: А) галантамина гидробромид Б) дистигмина бромид В) неостигмина метилсульфат Г) изонитрозин @	A
203.	ДЕ-2П. Вопрос-203 ПРОНИКАЕТ ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР В ТКАНИ МОЗГА ПРЕПАРАТ: А) галантамин Б) дистигмин В) дофамин Г) неостигмин @	A
204.	ДЕ-2П. Вопрос-204 МИДРИАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВЫРАЖЕН У ПРЕПАРАТА: А) тропикамид Б) пилокарпин В) неостигмин Г) фенотерол @	A
205.	ДЕ-2П. Вопрос-205 КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ПИРЕНЗЕПИНА: А) гастроцепин Б) партусистен В) нафтизин Г) прозерин @	A
206.	ДЕ-2П. Вопрос-206 ПРИ БЛОКАДЕ M ₂ -ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ: А) тахикардия Б) брадикардия В) сердечный ритм не изменяется Г) угнетение атриовентрикулярной блокады @	A
207.	ДЕ-2П. Вопрос-207 ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВОЗНИКАЕТ: А) миоз Б) мидриаз В) понижение секреторной функции экзокринных желез Г) глаз устанавливается на дальнюю точку зрения @	A
208.	ДЕ-2П. Вопрос-208 РЕАКТИВИРУЕТ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗУ ПРЕПАРАТ: А) изонитрозин Б) добутамин В) неостигмин	A

	Г) добутамин @	
209.	ДЕ-2П. Вопрос-209 ПРИ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ М-ХОЛИНОМИМЕТИКИ ПОНИЖАЮТ ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗА СЧЁТ: А) усиление оттока водянистой влаги из передней камеры глаза Б) уменьшения образования внутриглазной жидкости ресничным эпителием В) ингибирования карбангидразы в цилиарном теле Г) спазма аккомодации @	А
210.	ДЕ-2П. Вопрос-210 ПРИ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ АЦЕТАЗОЛАМИД ПОНИЖАЮТ ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗА СЧЁТ: А) ингибирования карбангидразы в цилиарном теле Б) уменьшения образования внутриглазной жидкости ресничным эпителием В) усиление оттока водянистой влаги из передней камеры глаза Г) спазма аккомодации @	А
АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
211.	ДЕ-2П. Вопрос-211 ЭПИНЕФРИН (АДРЕНАЛИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для инъекций 1 мг/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
212.	ДЕ-2П. Вопрос-212 КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 0.075 мг, №50 Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
213.	ДЕ-2П. Вопрос-213 КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капли глазные 0.125%, или 0,25%, или 0,5%, флакон-капельница полимерная 5 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
214.	ДЕ-2П. Вопрос-214 НАФАЗОЛИН (НАФИТИЗИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капли назальные 0.05%, флакон-капельница 15 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	А
215.	ДЕ-2П. Вопрос-215 КСИЛОМЕТАЗОЛИН (ОТРИВИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капли назальные 0.1%, флакон (флакончик) пластиковый 10 мл Б) раствор для инфузий 15% В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	А
216.	ДЕ-2П. Вопрос-216 ПРОПРАНОЛОЛ (АНАПРИЛИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 10 мг или 40 мг Б) раствор для инфузий 15% В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	А
217.	ДЕ-2П. Вопрос-217 МЕТОПРОЛОЛ (ЭГИЛОК) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 100 мг / 50 мг / 25 мг Б) раствор для инфузий 19% В) капсулы 250 мг	А

	Г) ТТС @	
218.	ДЕ-2П. Вопрос-218 МЕТОПРОЛОЛ (БЕТАЛОК ЗОК) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой 100 мг, №30 (или 50 мг / 25 мг) Б) раствор для инфузий 12% В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	А
219.	ДЕ-2П. Вопрос-219 КАРВЕДИЛОЛ (ДИЛАТРЕНД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 6,25 мг / 12.5 мг / 25 мг Б) раствор для инфузий 12% В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	
220.	ДЕ-2П. Вопрос-220 ЭПИНЕФРИН А) Адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курарепоподобное средство) @	А
221.	ДЕ-2П. Вопрос-221 ФЕНИЛЭФРИН А) Адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курарепоподобное средство) @	А
222.	ДЕ-2П. Вопрос-222 ОКСИМЕТАЗОЛИН (НАЗИВИН) А) Альфа-адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Симпатолитик Г) Миорелаксант (Курарепоподобное средство) @	А
223.	ДЕ-2П. Вопрос-223 ДОБУТАМИН А) Бета 1-адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курарепоподобное средство) @	А
224.	ДЕ-2П. Вопрос-224 ФЕНОТЕРОЛ А) Бета2-адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курарепоподобное средство) @	А
225.	ДЕ-2П. Вопрос-225 ЭФЕДРИН А) Симпатомиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курарепоподобное средство) @	А
226.	ДЕ-2П. Вопрос-226 НИЦЕРГОЛИН А) Альфа-адреноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Симпатолитик @	А
227.	ДЕ-2П. Вопрос-227 ПРОПРАНОЛОЛ А) Неселективный бета-адреноблокатор	А

	Б) Селективный бета-адреноблокатор В) Ганглиоблокатор Г) Симпатолитик @	
228.	ДЕ-2П. Вопрос-228 МЕТОПРОЛОЛ А) Селективный бета-адреноблокатор Б) Неселективный бета-адреноблокатор В) Ганглиоблокатор Г) Симпатолитик @	А
229.	ДЕ-2П. Вопрос-229 КАРВЕДИЛОЛ А) Альфа,бета-адреноблокатор Б) Миорелаксант В) Ганглиоблокатор Г) Симпатолитик @	А
230.	ДЕ-2П. Вопрос-230 ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АТОНИИ КИШЕЧНИКА ПРИМЕНЯЮТ А) неостигмина метилсульфат Б) ипратропия бромид В) суксаметония йодид Г) азаметония бромид @	А
231.	ДЕ-2П. Вопрос-231 АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗУ ИНГИБИРУЕТ ПРЕПАРАТ А) неостигмина метилсульфат Б) ипратропия бромид В) суксаметония йодид Г) азаметония бромид @	А
232.	ДЕ-2П. Вопрос-232 К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ А) атропин Б) пилокарпин В) галантамин Г) фенилэфрин @	А
233.	ДЕ-2П. Вопрос-233 ПРЯМЫМ СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ А) фенилэфрин Б) атропин В) тимолол Г) доксазозин @	А
234.	ДЕ-2П. Вопрос-234 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ А) клонидин Б) оксиметазолин В) фенилэфрин Г) тетризолин @	А
235.	ДЕ-2П. Вопрос-235 ПРЯМУЮ ВАЗОДИЛАТАЦИЮ ВЫЗЫВАЕТ: А) доксазозин Б) фенилэфрин В) добутамин Г) пропранолол @	А
236.	ДЕ-2П. Вопрос-236 ДОКСАЗОЗИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ А) альфа-адреноблокаторы Б) м-холиноблокаторы В) антихолинэстеразные средства Г) миорелаксанты @	А

237.	ДЕ-2П. Вопрос-237 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОКСАЗОЗИНА А) артериальная гипертензия Б) ортостатическая гипотензия В) исследование глазного дна Г) недержание мочи @	А
238.	ДЕ-2П. Вопрос-238 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТАМСУЛОЗИНА СВЯЗАН С А) блокадой альфа-1а-адренорецепторов Б) стимуляцией бета-2-адренорецепторов В) ингибированием ацетилхолинэстеразы Г) неконкурентной блокадой никотиновых рецепторов @	А
239.	ДЕ-2П. Вопрос-239 ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ А) ксилометазолин Б) тропикамид В) доксазозин Г) галантамин @	А
240.	ДЕ-2П. Вопрос-240 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА ВКЛЮЧАЕТ А) стимуляцию альфа-2-адренорецепторов Б) блокаду альфа-2-адренорецепторов В) ингибирование ацетилхолинэстеразы Г) блокаду бета-1-адренорецепторов @	А
241.	ДЕ-2П. Вопрос-241 ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА А) атрофия слизистой оболочки носа Б) накопление жидкости в слизистой оболочке носа В) нарушения функции печени Г) угнетение кроветворения @	А
242.	ДЕ-2П. Вопрос-242 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛЬБУТАМОЛА ВКЛЮЧАЕТ А) стимуляцию бета-2-адренорецепторов бронхов Б) блокаду альфа-1а-адренорецепторов В) ингибирование ацетилхолинэстеразы Г) неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов @	А
243.	ДЕ-2П. Вопрос-243 ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ САЛЬБУТАМОЛА ЯВЛЯЮТСЯ А) купирования бронхоспазма Б) лечения миастении В) исследования глазного дна Г) снижения АД @	А
244.	ДЕ-2П. Вопрос-244 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФЕНОТЕРОЛА ВКЛЮЧАЕТ А) стимуляцию бета-2-адренорецепторов бронхов Б) блокаду альфа-1а-адренорецепторов В) ингибирование ацетилхолинэстеразы Г) неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов @	А
245.	ДЕ-2П. Вопрос-245 ФЕНОТЕРОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ А) купирования бронхоспазма Б) лечения миастении В) исследования глазного дна Г) снижения АД @	А
246.	ДЕ-2П. Вопрос-246 РЕФЛЕКТОРНУЮ ТАХИКАРДИЮ ВЫЗЫВАЕТ ПРЕПАРАТ А) доксазозин Б) метопролол В) верапамил	А

	Г) ивабрадин @	
247.	ДЕ-2П. Вопрос-247 ВАЗОДИЛАТИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫЙ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР А) небивалол Б) метопролол В) пропранолол Г) карведилол @	А
248.	ДЕ-2П. Вопрос-248 НЕСЕЛЕКТИВНЫЙ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР А) пропранолол Б) метопролол В) бисопролол Г) небивалол @	А
249.	ДЕ-2П. Вопрос-249 КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫЙ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР А) метопролол Б) тимолол В) пропранолол Г) карведилол @	А
250.	ДЕ-2П. Вопрос-250 ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ А) тамсулозин Б) атропин В) салбутамол Г) фенилэфрин @	А
251.	ДЕ-2П. Вопрос-251 ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНУЮ ЖЕЛЕЗУ ОКАЗЫВАЕТ ПРЕПАРАТ А) тамсулозин Б) атропин В) салбутамол Г) фенилэфрин @	А
252.	ДЕ-2П. Вопрос-252 АЛЬФА-2-АДРЕНОМИМЕТИК С ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ А) клонидин Б) ксилометазолин В) оксиметазолин Г) тетризолин @	А
253.	ДЕ-2П. Вопрос-253 КСИЛОМЕТАЗОЛИН ВЫПУСКАЮТ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ А) капли назальные Б) ректальные суппозитории В) суспензия Г) раствор для инъекций @	А
254.	ДЕ-2П. Вопрос-254 ПРИ ГЕМОРРОЕ ПРИМЕНЯЮТ РЕКТАЛЬНЫЕ СУППОЗИТОРИИ С А) фенилэфрин Б) адреналин В) норадреналин Г) ксилометазолин @	А
255.	ДЕ-2П. Вопрос-255 КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО НЕГЛИКОЗИДНОЙ ПРИРОДЫ А) добутамин Б) пилокарпин В) галантамин Г) фенилэфрин @	А
256.	ДЕ-2П. Вопрос-256	А

	РИНОРЕЮ ПРИ ОРВИ УСТРАНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ А) антиконгестанты Б) нестероидные противовоспалительные препараты В) антибактериальные препараты Г) местные анестетики @	
257.	ДЕ-2П. Вопрос-257 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АНТИКОНГЕСТАНТАМИ ВОЗНИКАЕТ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ А) сухость слизистой оболочки Б) искривление носовой перегородки В) бактериальный конъюнктивит Г) аллергические реакции @	А
258.	ДЕ-2П. Вопрос-258 АГОНИСТОМ ВНЕСИНАПТИЧЕСКИХ АЛЬФА-2 АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПАРАТ А) оксиметазолин Б) ипратропия бромид В) фенилэфрин Г) сальбутамол @	А
259.	ДЕ-2П. Вопрос-259 В ВИДЕ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ: А) оксиметазолин Б) сальбутамол В) неостигмин Г) галантамин @	А
260.	ДЕ-2П. Вопрос-260 В ВИДЕ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ: А) ксилометазолин Б) сальбутамол В) галантамин Г) азаметония бромид @	А
261.	ДЕ-2П. Вопрос-261 ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ: А) добутамин Б) метопролол В) атропин Г) сальбутамол @	А
262.	ДЕ-2П. Вопрос-262 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ: А) сальбутамол Б) клонидин В) галазолин Г) добутамин @	А
263.	ДЕ-2П. Вопрос-263 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ: А) сальбутамол Б) пропранолол В) нафазолин Г) добутамин @	А
264.	ДЕ-2П. Вопрос-264 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ β - АДРЕНОБЛОКАТОРОВ: А) гипертоническая болезнь Б) расстройство периферических сосудов В) бронхиальная астма Г) сердечная недостаточность @	А
265.	ДЕ-2П. Вопрос-265 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ФЕНОТЕРОЛА: А) гипертонус матки, угрожающий выкидыш Б) спазмы периферических сосудов В) аденома простаты (начальная стадия) Г) гипертоническая болезнь	А

	@	
266.	ДЕ-2П. Вопрос-266 ФОРМА ВЫПУСКА КАРВЕДИЛОЛА: А) таблетки Б) гель В) мазь Г) пластыри @	А
267.	ДЕ-2П. Вопрос-267 ТАХИФИЛАКСИЮ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРИМЕНЕНИИ ВЫЗЫВАЕТ: А) эфедрин Б) суксаметоний В) лидокаин Г) тамсулозин @	А
268.	ДЕ-2П. Вопрос-268 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАН: А) пропранолол Б) салбутамол В) фенотерол Г) эфедрин @	А
269.	ДЕ-2П. Вопрос-269 ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ: А) тамсулозин Б) фенотерол В) клонидин Г) пилокарпин @	А
270.	ДЕ-2П. Вопрос-270 ВЫБЕРЕТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: А) фенилэфрин Б) тамсулозин В) лидокаин Г) атенолол @	А
271.	ДЕ-2П. Вопрос-271 СРЕДНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ КЛОНИДИНА: А) 0.000075 - 0.00015 Б) 0.001 - 0.002 В) 0.01 - 0.02 Г) 0.1 - 0.2 @	А
272.	ДЕ-2П. Вопрос-272 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ НАФАЗОЛИНА: А) нафтизин Б) анаприлин В) клофелин Г) дилатренд @	А
273.	ДЕ-2П. Вопрос-273 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРОПРАНОЛОЛА: А) анаприлин Б) клофелин В) нафазолин Г) дилатренд @	А
274.	ДЕ-2П. Вопрос-274 МНН У «ДИЛАТRENДА»: А) карведилол Б) омник В) клофелин Г) нафтизин @	А
275.	ДЕ-2П. Вопрос-275 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ФЕНИЛЭФРИНА: А) мезатон Б) анаприлин	А

	3) клофелин 4) адреналин @	
276.	ДЕ-2П. Вопрос-276 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ БИСОПРОЛОЛА ЯВЛЯЕТСЯ: А) гипертоническая болезнь, ИБС Б) исследование глазного дна В) купирование гипертонического криза Г) миастения @	А
277.	ДЕ-2П. Вопрос-277 НЕСЕЛЕКТИВНЫМ β -АДРЕНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) пропранолол Б) бисопролол В) ксилометазолин Г) сальбутамол @	А
278.	ДЕ-2П. Вопрос-278 СЕЛЕКТИВНЫМ β -АДРЕНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) бисопролол Б) пропранолол В) ксилометазолин Г) карведилол @	А
279.	ДЕ-2П. Вопрос-279 САЛЬБУТАМОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ: А) β_2 - адреномиметики Б) α_1 -адреномиметики В) M_1 -холиноблокаторы Г) курареподобные средства @	А
280.	ДЕ-2П. Вопрос-280 ФЕНИЛЭФРИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ А) α_1 -адреномиметики Б) β_2 - адреномиметики В) M_1 -холиноблокаторы Г) деполяризующие миорелаксанты @	А
281.	ДЕ-2П. Вопрос-281 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДОКСАЗОЛИНА: А) сосудорасширяющий Б) сосудосуживающий В) бронхолитический Г) спазмолитический @	А
282.	ДЕ-2П. Вопрос-282 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА: А) сосудосуживающий Б) сосудорасширяющий В) бронхолитический Г) спазмолитический @	А
283.	ДЕ-2П. Вопрос-283 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ТОЛТЕРОДИНА (ДЕТРУЗИТОЛА) ЯВЛЯЕТСЯ: А) недержание мочи Б) ринит В) острая сердечная недостаточность Г) ишемическая болезнь сердца @	А
284.	ДЕ-2П. Вопрос-284 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НАФАЗОЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) ринит Б) острая сердечная недостаточность В) недержание мочи Г) ишемическая болезнь сердца @	А
285.	ДЕ-2П. Вопрос-285 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОБУТАМИНА ЯВЛЯЕТСЯ:	А

	А) острая сердечная недостаточность Б) ринит В) недержание мочи Г) ишемическая болезнь сердца @	
286.	ДЕ-2П. Вопрос-286 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОПРОЛОЛА ЯВЛЯЕТСЯ: А) ишемическая болезнь сердца Б) ринит В) недержание мочи Г) острая сердечная недостаточность @	А
287.	ДЕ-2П. Вопрос-287 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АЗАМЕТОНИЯ БРОМИДА: 1) блокирует Nп-холинорецепторы вегетативных ганглиев 2) блокирует M ₁ -холинорецепторы 3) блокирует M ₃ -холинорецепторы 4) блокирует Nm-холинорецепторы скелетных мышц @	А
288.	ДЕ-2П. Вопрос-288 РЕЛАКСАЦИЮ БРОНХОВ ВЫЗЫВАЕТ СТИМУЛЯЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ: А) β ₂ -адренергических Б) α ₁ -адренергических В) α ₂ -адренергических Г) β ₁ -адренергических @	А
289.	ДЕ-2П. Вопрос-289 54-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА, СТРАДАЮЩИЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОЛУЧАЕТ ПРЕПАРАТ: А) тамсулозин Б) атропин В) суксаметоний Г) Пипекуроний @	А
290.	ДЕ-2П. Вопрос-290 УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ НОРЭПИНЕФРИНА ИЗ ПРЕСИНАПТИЧЕСКИХ ОКОНЧАНИЙ ПРОИСХОДИТ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ РЕЦЕПТОРОВ: А) α ₂ -адренергических Б) α ₁ -адренергических В) β ₁ -адренергических Г) β ₂ -адренергических @	А
291.	ДЕ-2П. Вопрос-291 СТИМУЛЯЦИЯ КАКИХ РЕЦЕПТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, УСИЛЕНИЮ СИЛЫ СОКРАЩЕНИЯ И СКОРОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ: А) β ₁ -адренергических Б) α ₁ -адренергических В) α ₂ -адренергических Г) β ₂ -адренергических @	А
292.	ДЕ-2П. Вопрос-292 АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ КЛОНИДИНА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ АКТИВАЦИИ: А) центральных пресинаптических α ₂ -адренорецепторов Б) α ₁ -постсинаптических адренорецепторов В) пресинаптических β ₂ -адренорецепторов Г) β ₁ постсинаптических адренорецепторов @	А
293.	ДЕ-2П. Вопрос-293 ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ: А) нафазолин Б) фенилэфрин В) фенотерол Г) сальбутамол @	А
294.	ДЕ-2П. Вопрос-294 ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ: А) адреналин Б) атропин	А

	В) метопролол Г) нафтизин @	
295.	ДЕ-2П. Вопрос-295 ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СИМПАТОЛИТИКОМ: А) резерпин Б) адреналин В) мезатон Г) эфедрин @	А
296.	ДЕ-2П. Вопрос-296 К НЕСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСЯТ: А) пропранолол Б) небиволол В) метопролол Г) празозин @	А
297.	ДЕ-2П. Вопрос-297 ДОКСАЗОЗИН (КАРДУРУ) ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) гипертонии различной этиологии Б) для облегчения мочеотделения при гипертрофии предстательной железы В) сердечной недостаточности Г) мигренях @	А
298.	ДЕ-2П. Вопрос-298 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА: А) фенилэфрина Б) метопролол В) доксазозина Г) небивалола @	А
299.	ДЕ-2П. Вопрос-299 ТОНУС МУСКУЛАТУРЫ МАТКИ ПОНИЖАЮТ: А) токолитики Б) аденолитики В) симпатолитики Г) ганглиоблокаторы @	А
300.	ДЕ-2П. Вопрос-300 МУСКУЛАТУРА БРОНХОВ РАССЛАБЛЯЕТСЯ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ РЕЦЕПТОРОВ: А) β_2 -адренергических Б) β_1 -адренергических В) α_2 -адренергических Г) α_1 -адренергических @	А
301.	ДЕ-2П. Вопрос-301 АГОНИСТОМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ α_2 -АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ: А) клонидин Б) резерпин В) фенилэфрин Г) эфедрин @	А
302.	ДЕ-2П. Вопрос-302 РЕЗЕРПИН ОКАЗЫВАЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: А) гипотензивный Б) спазмолитический В) бронхолитический Г) миорелаксирующий @	А
303.	ДЕ-2П. Вопрос-303 МЕТОПРОЛОЛ ОКАЗЫВАЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: А) гипотензивный Б) гипертензивный В) бронхолитический Г) спазмолитический @	А
304.	ДЕ-2П. Вопрос-304	А

	ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ АДРЕНАЛИНА ЯВЛЯЮТСЯ: А) выраженный атеросклероз, сахарный диабет Б) бронхиальная астма, эпилепсия В) артериальная гипотония, беременность Г) аллергические реакции, глаукома @	
305.	ДЕ-2П. Вопрос-305 ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ АЛКАЛОИДОВ СПОРЫШЫ, УВЕЛИЧИВАЕТ ДОСТАВКУ КИСЛОРОДА И ГЛЮКОЗЫ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ, УЛУЧШАЕТ МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ: А) ницерголин Б) клонидин В) фенилэфрин Г) доксазозин @	A
306.	ДЕ-2П. Вопрос-306 УСТРАНЯЕТ ГИПЕРТОНУС МАТКИ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ ПРЕПАРАТ: А) сальбутамол Б) тамсулозин В) фенилэфрин Г) доксазозин @	A
307.	ДЕ-2П. Вопрос-307 В ОКОНЧАНИЯХ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ НЕРВОВ ВЫДЕЛЯЕТСЯ МЕДИАТОР: А) норадреналин Б) адреналин В) серотонин Г) ацетилхолин @	A
308.	ДЕ-2П. Вопрос-308 НЕЙРОТРАНСМИТТЕР - НОРАДРЕНАЛИН ВЫДЕЛЯЮТ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА: А) постганглионарные симпатические Б) преганглионарные симпатические В) постганглионарные парасимпатические Г) преганглионарные парасимпатические @	A
309.	ДЕ-2П. Вопрос-309 НЕЙРОМЕДИАТОР АЦЕТИЛХОЛИН РАЗРУШАЕТСЯ ФЕРМЕНТОМ: А) ацетилхолинэстеразой Б) моноаминоксидазой В) катехолметилтрансферазой Г) дигидропептидазой @	A
310.	ДЕ-2П. Вопрос-310 НЕЙРОМЕДИАТОР- НОРАДРЕНАЛИН ПОДВЕРГАЕТСЯ ФЕРМЕНТАТИВНОМУ РАЗРУШЕНИЮ: А) моноаминоксидазой Б) ацетилхолинэстеразой В) декарбоксилазой Г) дигидропептидазой @	A
311.	ДЕ-2П. Вопрос-311 ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФТАЛЬМОСКОПИИ У БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) фенилэфрин Б) атропин В) тропикамид Г) нафазолин @	A
312.	ДЕ-2П. Вопрос-312 ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ (БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ) А) салметерол Б) эпинефрин В) нафазолин Г) фенотерол @	A
313.	ДЕ-2П. Вопрос-313 ТОКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ (ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ) ОБЛАДАЕТ: А) фенотерол Б) добутамин	A

	В) клонидин Г) нафазолин @	
314.	ДЕ-2П. Вопрос-314 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И КУПИРУЕТ БРОНХОСПАЗМ ПРЕПАРАТ: А) салметерол Б) эпинефрин В) нафазолин Г) пропранолол @	А
315.	ДЕ-2П. Вопрос-315 СЕЛЕКТИВНЫМ АЛЬФА _{1А} -АДРЕНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) тамсулозин Б) эфедрин В) карведилол Г) ницерголин @	А
316.	ДЕ-2П. Вопрос-316 АГОНИСТОМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРЕСИНАПТИЧЕСКИХ АЛЬФА ₂ -АДРЕНорецепторов ЯВЛЯЕТСЯ: А) клонидин Б) фенилэфин В) ксилометазолин Г) добутамин @	А
317.	ДЕ-2П. Вопрос-317 МУСКУЛАТУРА БРОНХОВ РАССЛАБЛЯЕТСЯ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ РЕЦЕПТОРОВ: А) бета ₂ -адренергических Б) бета ₁ -адренергических В) альфа ₂ -адренергических Г) альфа ₁ -адренергических @	А
318.	ДЕ-2П. Вопрос-318 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ: А) фенилэфин Б) доксазозин В) клонидин Г) сальбутамол @	А
319.	ДЕ-2П. Вопрос-319 ТОНУС МУСКУЛАТУРЫ МАТКИ ПОНИЖАЮТ: А) токолитики Б) симпатолитики В) адренолитики Г) миорелаксанты @	А
320.	ДЕ-2П. Вопрос-320 НИЦЕРГОЛИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: А) нарушениях периферического кровообращения Б) подборе очков В) бронхиальной астме Г) гипертонической болезни @	А
321.	ДЕ-2П. Вопрос-321 В ОБЛАСТИ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ СИНАПСОВ ДЕЙСТВУЮТ СРЕДСТВА: А) симпатомиметики Б) холиномиметики В) ганглиоблокаторы Г) миорелаксанты @	А
322.	ДЕ-2П. Вопрос-322 АНТИКОНГЕСТАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ: А) оксиметазолин Б) толтеродин В) тамсулозин Г) пирензепин @	А
323.	ДЕ-2П. Вопрос-323 АЛЬФА _{1А} - АДРЕНорецепторы ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В:	А

	А) гладкой мускулатуре предстательной железы Б) гладких мышцах сосудов В) юкстагломерулярном аппарате почек Г) радиальной мышце радужной оболочки @	
324.	ДЕ-2П. Вопрос-324 АЛЬФА _{1A} - АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В: А) шейке мочевого пузыря Б) гладких мышцах сосудов В) юкстагломерулярном аппарате почек Г) радиальной мышце радужной оболочки @	А
325.	ДЕ-2П. Вопрос-325 АЛЬФА _{1A} - АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В: А) простатической части уретры Б) гладких мышцах сосудов В) юкстагломерулярном аппарате почек Г) радиальной мышце радужной оболочки @	А
326.	ДЕ-2П. Вопрос-326 ЭПИНЕФРИН КОМБИНИРУЮТ С МЕСТНЫМИ АНЕСТЕТИКАМИ ДЛЯ: А) усиления и удлинения местноанестезирующего действия Б) увеличения секреции слюнных желез В) улучшения функционального состояния скелетных мышц Г) уменьшения продукции внутриглазной жидкости @	А
327.	ДЕ-2П. Вопрос-327 У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СПАЗМ БРОНХОВ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ: А) анаприлин Б) пилокарпин В) сальбутамол Г) тропикамид @	А
328.	ДЕ-2П. Вопрос-328 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОНИЖАЕТ ПРЕПАРАТ: А) доксазозин Б) пилокарпин В) сальбутамол Г) добутамин @	А
329.	ДЕ-2П. Вопрос-329 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОНИЖАЕТ ПРЕПАРАТ: А) клофелин Б) мезатон В) сальбутамол Г) добутамин @	А
330.	ДЕ-2П. Вопрос-330 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОНИЖАЕТ ПРЕПАРАТ: А) карведилол Б) тропикамид В) сальбутамол Г) добутамин @	А
331.	ДЕ-2П. Вопрос-331 ВАЗОДИЛАТИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР: А) карведилол Б) пропранолол В) метопролол Г) атенолол @	А
332.	ДЕ-2П. Вопрос-332 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ АЛЬФА ₁ -АДРЕНОМИМЕТИКОВ: А) сужение кровеносных сосудов Б) расширение кровеносных сосудов	А

	В) сужение зрачков Г) спазм аккомодации @	
333.	ДЕ-2П. Вопрос-333 НЕСЕЛЕКТИВНЫЙ БЕТА _{1,2} -АДРЕНОБЛОКАТОР: А) пропранолол Б) доксазозин В) метопролол Г) атенолол @	А
334.	ДЕ-2П. Вопрос-334 МЕХАНИЗМ ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕТА ₁ -АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВКЛЮЧАЕТ: А) уменьшение продукции ренина Б) сужение сосудов брюшной полости В) увеличение ударного и минутного объёма сердца Г) снижение тонуса и моторики ЖКТ @	А
335.	ДЕ-2П. Вопрос-335 МЕХАНИЗМ ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕТА ₁ -АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВКЛЮЧАЕТ: А) уменьшение выделения норадреналина Б) сужение сосудов брюшной полости В) увеличение ударного и минутного объёма сердца Г) снижение тонуса и моторики ЖКТ @	А
336.	ДЕ-2П. Вопрос-336 МЕХАНИЗМ ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕТА ₁ -АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВКЛЮЧАЕТ: А) снижение сердечного выброса Б) повышение потребления кислорода миокардом В) понижение тонуса периферических сосудов Г) мембраностабилизирующий эффект @	А
337.	ДЕ-2П. Вопрос-337 МЕХАНИЗМ ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕТА ₁ -АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВКЛЮЧАЕТ: А) угнетение центральных звеньев симпатической регуляции сосудистого тонуса Б) повышение потребления кислорода миокардом В) уменьшение уровня сахара в крови Г) повышение силы и частоты сердечных сокращений @	А
338.	ДЕ-2П. Вопрос-338 ПРИ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ БЕТА ₁ -АДРЕНОБЛОКАТОРЫ Понижают Внутриглазное Давление за счёт: А) уменьшения образования внутриглазной жидкости ресничным эпителием Б) усиление оттока внутриглазной жидкости через венозный синус склеры В) раскрытия пространства радужно-роговичного угла Г) спазма аккомодации @	А
339.	ДЕ-2П. Вопрос-339 ПРИ Внезапной Остановке Сердца Внутрисердечно Вводят: А) эпинефрин Б) эфедрин В) карведилол Г) доксазозин @	А
340.	ДЕ-2П. Вопрос-340 Показанием к применению Карведилола является: А) гипертоническая болезнь Б) миастения В) эпилепсия Г) гипергликемия @	А

Дидактическая единица №3. Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную и дыхательную системы, НПВС (350)

№	Текст вопроса	А
1.	ДЕ-3. Вопрос-1 НИТРАЗЕПАМ ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 5 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	А
2.	ДЕ-3. Вопрос-2 ФЕНОБАРИТАЛ ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 5 мг / 50 мг / 100 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	А
3.	ДЕ-3. Вопрос-3 ЛАМОТРИДЖИН (ЛАМИКАЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 100 мг / 50 мг / 25 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) ТТС @	А
4.	ДЕ-3. Вопрос-4 МОРФИН (МСТ Континус) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 10 мг / 100 мг Б) шипучих таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
5.	ДЕ-3. Вопрос-5 ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 25 мг Б) шипучих таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
6.	ДЕ-3. Вопрос-6 ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для инъекций 20 мг/мл - ампула 1 мл Б) шипучих таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
7.	ДЕ-3. Вопрос-7 НАЛТРЕКСОН (ВИВИТРОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 380 мг, флакон 430 мг Б) шипучих таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
8.	ДЕ-3. Вопрос-8 НАЛТРЕКСОН (ВИВИТРОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсулы, таблетки Б) спиртовой раствор В) ТТС Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
9.	ДЕ-3. Вопрос-9 ПРЕНОКСДИАЗИН (ЛИБЕКСИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 100 мг Б) шипучих таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
10.	ДЕ-3. Вопрос-10 АЦЕТИЛЦИСТЕИН (АЦЦ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) сироп 20 мг/мл Б) раствор для инъекций 75 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
11.	ДЕ-3. Вопрос-11 АЦЕТИЛЦИСТЕИН (АЦЦ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 500 мг	А

	Б) раствор для инъекций 75 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	
12.	ДЕ-3. Вопрос-12 МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 500 мг Б) раствор для инъекций 75 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
13.	ДЕ-3. Вопрос-13 МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл, №5 - ампула 2 мл (и 500 мг/мл) Б) раствор для инъекций 75 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
14.	ДЕ-3. Вопрос-14 ПАРАЦЕТАМОЛ (ПАНАДОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки растворимые 500 мг Б) раствор для инъекций 75 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
15.	ДЕ-3. Вопрос-15 АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (АСПИРИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 500 мг Б) раствор для инъекций 75 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) жевательные таблетки 35 мг @	А
16.	ДЕ-3. Вопрос-16 АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (АСПИРИН КАРДИО) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 100 мг / 300 мг Б) раствор для инъекций 75 мг/1 мл В) ТТС Г) раствор для инъекций 500 мг/мл @	А
17.	ДЕ-3. Вопрос-17 ДИКЛОФЕНАК (ВОЛЬТАРЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) суппозитории ректальные 100 мг / 50 мг / 25 мг Б) порошок для приготовления инъекций 273 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
18.	ДЕ-3. Вопрос-18 ДИКЛОФЕНАК (ВОЛЬТАРЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 25 мг / 50 мг Б) порошок для приготовления инъекций 273 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
19.	ДЕ-3. Вопрос-19 ДИКЛОФЕНАК (ВОЛЬТАРЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) пластырь трансдермальный 15 мг/сут Б) порошок для приготовления инъекций 273 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
20.	ДЕ-3. Вопрос-20 ДИКЛОФЕНАК (ВОЛЬТАРЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) пластырь трансдермальный 15 мг/сут или 30 мг/сут Б) порошок для приготовления инъекций 273 мг/1 мл В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
21.	ДЕ-3. Вопрос-21 ДИКЛОФЕНАК (ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) гель для наружного применения 2% или 1% Б) суспензия для приема внутрь №20 В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл	А

	@	
22.	ДЕ-3. Вопрос-22 ДИКЛОФЕНАК (ОРТОФЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) мазь для наружного применения 2% Б) суспензия для приема внутрь №20 В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
23.	ДЕ-3. Вопрос-23 ДИКЛОФЕНАК (ОРТОФЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) гель для наружного применения 5% Б) суспензия для приема внутрь №20 В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
24.	ДЕ-3. Вопрос-24 ДИКЛОФЕНАК (ОРТОФЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой 25 мг Б) суспензия для приема внутрь №20 В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
25.	ДЕ-3. Вопрос-25 ДИКЛОФЕНАК (ОРТОФЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл, №5 - ампула 3 мл Б) суспензия для приема внутрь №20 В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
26.	ДЕ-3. Вопрос-26 ХЛОПРОМАЗИН (АМИНАЗИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг / 50 мг / 25 мг Б) суспензия для приема внутрь №20 В) капсулы 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
27.	ДЕ-3. Вопрос-27 ХЛОПРОМАЗИН (АМИНАЗИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл, №5 - ампула 1 мл (или 2/10/5 мл в одной ампуле) Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
28.	ДЕ-3. Вопрос-28 ХЛОПРОМАЗИН (АМИНАЗИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) драже 25 мг, №10 или 50 мг Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
29.	ДЕ-3. Вопрос-29 ДИАЗЕПАМ (СЕДУКСЕН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 5 мг, №20 Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
30.	ДЕ-3. Вопрос-30 ПИРАЦЕТАМ (НООТРОПИЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсулы 400 мг, №60 Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
31.	ДЕ-3. Вопрос-31 ПИРАЦЕТАМ (НООТРОПИЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для приема внутрь 200 мг/мл, флакон темного стекла 125 мл Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
32.	ДЕ-3. Вопрос-32 ПИРАЦЕТАМ (НООТРОПИЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутривенного введения 200 мг/мл, №4 - ампула 15 мл	А

	Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	
33.	ДЕ-3. Вопрос-33 ПИРАЦЕТАМ (НООТРОПИЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки, покрытые оболочкой 1200 мг и 800 мг Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
34.	ДЕ-3. Вопрос-34 НИКЕТАМИД (КОРДИАМИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капли для приема внутрь 25%, флакон-капельница темного стекла 25 мл Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
35.	ДЕ-3. Вопрос-35 НИКЕТАМИД (КОРДИАМИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для инъекций 200 мг/мл, №5 - ампула 2 мл Б) суспензия для приема внутрь №20 В) саше 500 мг Г) масляный раствор для инъекций 130 мг/мл @	А
36.	ДЕ-3. Вопрос-36 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА: А) ацедипол Б) юмекс В) наком Г) кеппра @	А
37.	ДЕ-3. Вопрос-37 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЛАМОТРИДЖИН: А) ламиктал Б) юмекс В) наком Г) кеппра @	А
38.	ДЕ-3. Вопрос-38 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ: А) кеппра Б) циклодол В) наком Г) юмекс @	А
39.	ДЕ-3. Вопрос-39 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЭТОСУКСИМИБ: А) суксилеп Б) юмекс В) кеппра Г) наком @	А
40.	ДЕ-3. Вопрос-40 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА: А) наком Б) циклодол В) юмекс Г) кеппра @	А
41.	ДЕ-3. Вопрос-41 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН СЕЛЕГИЛИН: А) юмекс Б) наком В) циклодол Г) кеппра @	А
42.	ДЕ-3. Вопрос-42 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ: А) циклодол Б) юмекс В) наком Г) суксилеп @	А
43.	ДЕ-3. Вопрос-43 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ТРИМЕПЕРИДИН: А) промедол Б) дюрогезик	А

	В) трамал Г) вивитрол @	
44.	ДЕ-3. Вопрос-44 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ФЕНТАНИЛ: А) дюрогезик Б) промедол В) трамал Г) вивитрол @	А
45.	ДЕ-3. Вопрос-45 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ТРАМАДОЛ: А) трамал Б) промедол В) дюрогезик Г) вивитрол @	А
46.	ДЕ-3. Вопрос-46 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН НАЛТРЕКСОН: А) вивитрол Б) промедол В) дюрогезик Г) трамал @	А
47.	ДЕ-3. Вопрос-47 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ПРЕНОКСДИАЗИН: А) либексин Б) АЦЦ В) анальгин Г) панадол @	А
48.	ДЕ-3. Вопрос-48 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АЦЕТИЛЦИСТЕИН: А) АЦЦ Б) либексин В) анальгин Г) панадол @	А
49.	ДЕ-3. Вопрос-216 СООТНЕСИТЕ МНН С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ СЕДУКСЕН: А) Диазепам Б) Диклофенак В) Никетамид Г) Ацетилсалициловая к-та @	А
50.	ДЕ-3. Вопрос-217 СООТНЕСИТЕ МНН С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ПРОМЕДОЛ А) Триметеридин Б) Диклофенак В) Пирацетам Г) Хлорпромазин @	А
51.	ДЕ-3. Вопрос-49 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ: А) анальгин Б) либексин В) АЦЦ Г) панадол @	А
52.	ДЕ-3. Вопрос-50 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ПАРАЦЕТАМОЛ: А) панадол Б) либексин В) АЦЦ Г) анальгин @	А
53.	ДЕ-3. Вопрос-51 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА: А) аспирин Б) вольтарен В) найз Г) ортофен @	А
54.	ДЕ-3. Вопрос-52 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА: А) аспирин кардио Б) вольтарен В) ортофен	А

	Г) найз @	
55.	ДЕ-3. Вопрос-53 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ДИКЛОФЕНАК: А) вольтарен Б) аспирин кардио В) панадол Г) найз @	А
56.	ДЕ-3. Вопрос-54 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ДИКЛОФЕНАК: А) ортофен Б) аспирин кардио В) панадол Г) найз @	А
57.	ДЕ-3. Вопрос-55 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН НИМЕСУЛИД: А) найз Б) аспирин кардио В) панадол Г) ортофен @	А
58.	ДЕ-3. Вопрос-56 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН НИМЕСУЛИД: А) найз Б) аспирин кардио В) панадол Г) ортофен @ зипрекса	А
59.	ДЕ-3. Вопрос-57 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ХЛОРПРОМАЗИН: А) аминазин Б) зипрекса В) седуксен Г) аурорикс @	А
60.	ДЕ-3. Вопрос-58 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ОЛАНЗАПИН: А) зипрекса Б) аминазин В) седуксен Г) аурорикс @	А
61.	ДЕ-3. Вопрос-59 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ДИАЗЕПАМ: А) седуксен Б) аминазин В) зипрекса Г) аурорикс @	А
62.	ДЕ-3. Вопрос-60 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН МОКЛОБЕМИД: А) аурорикс Б) аминазин В) зипрекса Г) седуксен @	А
63.	ДЕ-3. Вопрос-61 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН МАПРОТИЛИН: А) людимил Б) аминазин В) зипрекса Г) седуксен @	А
64.	ДЕ-3. Вопрос-62 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ФЛУОКСЕТИН: А) прозак Б) аминазин В) зипрекса Г) седуксен @	А
65.	ДЕ-3. Вопрос-63 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ПИРАЦЕТАМ: А) ноотропил Б) аминазин В) зипрекса Г) седуксен	А

	@	
66.	ДЕ-3. Вопрос-64 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН НИКЕТАМИД: А) кордиамин Б) аминазин В) зипрекса Г) седуксен @	А
67.	ДЕ-3. Вопрос-65 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ЛАМИКТАЛ: А) ламотриджин Б) леводопа В) либексин Г) лирика @	А
68.	ДЕ-3. Вопрос-66 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ПРОМЕДОЛ: А) тримеперидин Б) трамадол В) тригексифенидил Г) фентанил @	А
69.	ДЕ-3. Вопрос-67 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ВИВИТРОЛ: А) налтрексон Б) никетамид В) нафазолин Г) налоксон @	А
70.	ДЕ-3. Вопрос-68 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ АМИНАЗИН: А) хлорпромазин Б) хлоропирамин В) хлоргексидин Г) хлорамин Б @	А
71.	ДЕ-3. Вопрос-69 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ СЕДУКСЕН: А) диазепам Б) диклофенак В) дюрогезик Г) нитразепам @	А
72.	ДЕ-3. Вопрос-70 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ НООТРОПИЛ: А) пирацетам Б) пирензепин В) преноксдиазин Г) пропранолол @	А
73.	ДЕ-3. Вопрос-199 ПРЕПАРАТОМ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Парацетамол Б) Флуоксетин В) Галоперидол Г) Хлорпромазин (Аминазин) @	А
74.	ДЕ-3. Вопрос-199 РЕЦЕПТУРНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) Морфин Б) Парацетамол В) Ацетилсалициловая кислота Г) Метамизол натрия @	А
75.	ДЕ-3. Вопрос-201 УКАЖИТЕ, В КАКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ ДИКЛОФЕНАК А) Спрей Б) Мазь и гель В) Растворы для инъекций в ампулах Г) Свечи ректальные @	А
	Средства для наркоза.	А
76.	ДЕ-3. Вопрос-71 ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И БОЛЕЗНЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ИСПОЛЬЗУЮТ А) кетамин Б) галотан	А

	В) диэтиловый эфир Г) закись азота @	
77.	ДЕ-3. Вопрос-72 ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ И ПЕРЕВЯЗКАХ ИСПОЛЬЗУЮТ А) кетамин Б) ксенон В) нитразепам Г) атенолол @	А
78.	ДЕ-3. Вопрос-155 ИНГАЛЯЦИОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА А) галотан Б) кетамин В) пропофол Г) тиопентал натрия @	А
79.	ДЕ-3. Вопрос-190 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КЕТАМИНА А) Блокирует NMDA-рецепторы Б) Блокирует AMPA-рецепторы В) Блокирует μ -опиоидные рецепторы Г) Блокирует κ -опиоидные рецепторы @	А
80.	ДЕ-3. Вопрос-202 УКАЖИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА: А) Ксенон Б) Парацетамол В) Кофеин Г) Трамадол @	А
81.	ДЕ-3. Вопрос-483 ГАЛОТАН А) Общий анестетик Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
82.	ДЕ-3. Вопрос-484 АЗОТА ЗАКИСЬ А) Общий анестетик Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
83.	ДЕ-3. Вопрос-485 ПРОПОФОЛ А) Общий анестетик Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
84.	ДЕ-3. Вопрос-486 ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ А) Средство для наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
85.	ДЕ-3. Вопрос-487 НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ А) Средство для наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
86.	ДЕ-3. Вопрос-488 ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ А) Средство неингаляционного наркоза для Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Средство для ингаляционного наркоза @	А
87.	ДЕ-3. Вопрос-489 ПРОПОФОЛ А) Средство для неингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик	А

	Г) Средство для ингаляционного наркоза @	
88.	ДЕ-3. Вопрос-490 ГАЛОТАН А) Средство для ингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Средство для неингаляционного наркоза Г) Аналептик @	A
89.	ДЕ-3. Вопрос-491 АЗОТА ЗАКИСЬ А) Средство для ингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Средство для неингаляционного наркоза Г) Аналептик @	A
90.	ДЕ-3. Вопрос-492 НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ А) Средство для неингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Средство для ингаляционного наркоза @	A
91.	ДЕ-3. Вопрос-460 НАРКОЗНОЕ СРЕДСТВО А) Галотан Б) Резерпин В) Амидарон Г) Дигоксин @	A
92.	ДЕ-3. Вопрос-461 НАРКОЗНОЕ СРЕДСТВО А) Пропофол Б) Резерпин В) Амидарон Г) Дигоксин @	A
93.	ДЕ-3. Вопрос-462 НАРКОЗНОЕ СРЕДСТВО А) Тиопентал натрия Б) Резерпин В) Амидарон Г) Дигоксин @	A
94.	ДЕ-3. Вопрос-463 НАРКОЗНОЕ СРЕДСТВО А) Натрия оксибутират Б) Резерпин В) Амидарон Г) Дигоксин @	A
	Снотворные.	A
95.	ДЕ-3. Вопрос-94 К СНОТВОРНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) доксиламин Б) пропофол В) кетамин Г) эфир диэтиловый @	A
96.	ДЕ-3. Вопрос-466 СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО А) Нитразепам Б) Атропин В) Кофеин Г) Кеторолак @	A
97.	ДЕ-3. Вопрос-214 СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО: А) Нитразепам Б) Мелоксикам В) Пирацетам Г) Налоксон @	A
98.	ДЕ-3. Вопрос-494 НИТРИПЗЕПАМ А) Снотворное средство Б) Местный анестетик	A

	В) Антибиотик Г) Гемостатик @	
99.	ДЕ-3. Вопрос-166 КАКОЕ ЛС ЯВЛЯЕТСЯ АГОНИСТОМ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ? А) золпидем Б) доксиламин В) мелатонин Г) дифенгидрамин @	А
100.	ДЕ-3. Вопрос-208 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ДИАЗЕПАМА: А) Антипсихотический Б) Анксиолитический В) Противосудорожный Г) Миорелаксирующий @	А
101.	ДЕ-3. Вопрос-235 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФЕНАЗЕПАМА А) Является неселективным агонистом бензодиазепиновых рецепторов Б) Является селективным агонистом бензодиазепиновых рецепторов 1 типа В) Является агонистом барбитуратных рецепторов Г) Блокирует центральные гистаминовые H1-рецепторы @	А
102.	ДЕ-3. Вопрос-189 АГОНИСТОМ КАКИХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФЕНОБАРБИТАЛ? А) барбитуратных Б) бензодиазепиновых В) гистаминовых Г) серотониновых @	А
	Противосудорожные и противопаркинсонические средства	А
103.	ДЕ-3. Вопрос-97 КАРБИДОПУ КОМБИНИРУЮТ С ЛЕВОДОПОЙ ДЛЯ А) предотвращения превращения леводопы в дофамин в периферических тканях Б) усиления всасывания леводопы В) усиления действия леводопы на периферические ткани Г) более быстрого выведения леводопы @	А
104.	ДЕ-3. Вопрос-218 СООТНЕСИТЕ ПРЕПАРАТ ТРИГКСИФЕНИДИЛ (ЦИКЛОДОЛ) С ХАРАКТЕРНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ А) Противопаркинсонический Б) Анальгетический В) Ноотропный Г) Противосудорожный @	А
105.	ДЕ-3. Вопрос-496 ЛЕВОДОПА А) Противопаркинсоническое средство Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Снотворное средство @	А
106.	ДЕ-3. Вопрос-203 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, НЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ: А) Тригексифенидил Б) Леводopa В) Селегилин Г) Леводopa + Карбидopa (Наком) @	А
107.	ДЕ-3. Вопрос-468 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО А) Леводopa Б) Кофеин В) Кеторолак Г) Вальпроевая кислота @	А
108.	ДЕ-3. Вопрос-188 КАКОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЮТ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА? А) леводopa + карбидopa Б) флуоксетин В) галоперидол Г) вальпроевая кислота @	А

109.	ДЕ-3. Вопрос-115 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ АМАНТАДИН? А) адамантаны Б) предшественники дофамина В) ингибиторы МАО Г) агонисты дофаминовых рецепторов @	А
110.	ДЕ-3. Вопрос-116 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ЛЕВОДОПА? А) предшественники дофамина Б) адамантаны В) ингибиторы МАО Г) агонисты дофаминовых рецепторов @	А
111.	ДЕ-3. Вопрос-117 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ПРАМИПЕКСОЛ? А) агонисты дофаминовых рецепторов Б) адамантаны В) ингибиторы МАО Г) предшественники дофамина @	А
112.	ДЕ-3. Вопрос-118 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ СЕЛЕГИЛИН? А) ингибиторы МАО Б) адамантаны В) агонисты дофаминовых рецепторов Г) предшественники дофамина @	А
113.	ДЕ-3. Вопрос-212 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, УГНЕТАЮЩЕЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ: А) Тригексифенидил Б) Леводопа В) Селегилин Г) Леводопа + карбидопа @	А
114.	ДЕ-3. Вопрос-213 КАРБИДОПУ КОМБИНИРУЮТ С ЛЕВОДОПОЙ, ПОТОМУ ЧТО КАРБИДОПА: А) Предотвращает декарбоксилирование леводопы в периферических тканях, блокируя ДОФА-декарбоксилазу. Б) Усиливает всасывание леводопы В) Усиливает действие леводопы по механизму угнетения холинергической передачи. Г) Способствует быстрому выведению леводопы. @	А
115.	ДЕ-3. Вопрос-230 КАРБИДОПУ КОМБИНИРУЮТ С ЛЕВОДОПОЙ, ПОТОМУ ЧТО КАРБИДОПА: А) Предотвращает декарбоксилирование леводопы в периферических тканях, блокируя ДОФА-декарбоксилазу. Б) Усиливает всасывание леводопы В) Усиливает действие леводопы по механизму угнетения холинергической передачи. Г) Способствует быстрому выведению леводопы. @	А
116.	ДЕ-3. Вопрос-457 КАКОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЮТ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА? А) леводопа + карбидопа Б) флуоксетин В) галоперидол Г) вальпроевая кислота @	А
117.	ДЕ-3. Вопрос-119 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕВОДОПЫ А) восполняет дефицит дофамина Б) блокирует NMDA-рецепторы В) стимулирует дофаминовые рецепторы Г) ингибирует МАО @	А
118.	ДЕ-3. Вопрос-120 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРАМИПЕКСОЛА А) стимулирует дофаминовые рецепторы Б) блокирует NMDA-рецепторы В) восполняет дефицит дофамина Г) ингибирует МАО @	А
119.	ДЕ-3. Вопрос-121 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СЕЛЕГИЛИНА А) ингибирует МАО Б) блокирует NMDA-рецепторы	А

	В) восполняет дефицит дофамина Г) стимулирует дофаминовые рецепторы @	
120.	ДЕ-3. Вопрос-122 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРАМИПЕКСОЛА А) дискинезии Б) гипокалиемия В) сухой кашель Г) периферические отеки @	А
121.	ДЕ-3. Вопрос-123 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЛЕВОДОПЫ А) галлюцинации Б) гипокалиемия В) сухой кашель Г) периферические отеки @	А
122.	ДЕ-3. Вопрос-125 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ПРАМИПЕКСОЛ? А) противопаркинсонические Б) антиконвульсанты В) антидепрессанты Г) ноотропы @	А
123.	ДЕ-3. Вопрос-130 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ЛЕВОДОПА? А) противопаркинсонические Б) антиконвульсанты В) антидепрессанты Г) ноотропы @	А
124.	ДЕ-3. Вопрос-478 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО А) Тригексифенидил Б) Налоксон В) Кофеин Г) Кларитромицин @	А
125.	ДЕ-3. Вопрос-479 ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ А) Противопаркинсоническое средство Б) Аналептик В) Анксиолитик Г) Анальгетик @	А
126.	ДЕ-3. Вопрос-157 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕВОДОПА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗА СЧЕТ А) превращения в дофамин Б) ингибирования МАО-В В) стимуляции дофаминовых рецепторов Г) ингибирования КОМТ @	А
127.	ДЕ-3. Вопрос-215 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ТОЛЬКО ПРИ МАЛЫХ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКАХ: А) Этосуксимид Б) Фенобарбитал В) Вальпроевая кислота Г) Ламотриджин @	А
128.	ДЕ-3. Вопрос-467 ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО А) Вальпроевая кислота Б) Атропин В) Кофеин Г) Кеторолак @	А
129.	ДЕ-3. Вопрос-223 СООТНЕСИТЕ ПРЕПАРАТ ФЕНОБАРБИТАЛ С ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ: А) Эпилепсия, нарушение сна Б) Депрессия В) Шизофрения Г) Атеросклероз головного мозга и другие заболевания с явлениями нарушения памяти, внимания, головокружения. @	А

130.	ДЕ-3. Вопрос-225 ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ: А) Ламотриджин Б) Вальпроевая кислота В) Диазепам Г) Средства для наркоза @	А
131.	ДЕ-3. Вопрос-226 СРЕДСТВО, УСИЛИВАЮЩИЕ ГАМКЕРГИЧЕСКУЮ НЕЙРОТРАНСМИССИЮ В ЦНС А) Вальпроевая кислота Б) Этосуксимид В) Кофеин Г) Амитриптилин @	А
132.	ДЕ-3. Вопрос-124 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА? А) антиконвульсанты Б) противопаркинсонические В) антидепрессанты Г) ноотропы @	А
133.	ДЕ-3. Вопрос-495 ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА А) Противосудорожное средство Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Снотворное средство @	А
134.	ДЕ-3. Вопрос-191 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛАМОТРИДЖИНА: А) Блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы Б) Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы Т-типа В) Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы N-типа Г) Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы L-типа @	А
135.	ДЕ-3. Вопрос-192 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭТОСУКСИМИДА: А) Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы Т-типа Б) Блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы В) Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы N-типа Г) Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы L-типа @	А
136.	ДЕ-3. Вопрос-193 УКАЖИТЕ, КАКОЙ МЕХАНИЗМ ПРОТИВОСУДОРОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ: А) Активирует калиевые каналы Б) Блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы В) Блокирует потенциал-зависимые кальциевые каналы Т-типа Г) Ингибирует фермент ГАМК-трансаминазу @	А
137.	ДЕ-3. Вопрос-207 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКАХ: А) Фенобарбитал Б) Мелатонин В) Кофеин Г) Этосуксимид @	А
138.	ДЕ-3. Вопрос-156 ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА А) диазепам Б) ламотриджин В) этосуксимид Г) карбамазепин @	А
139.	ДЕ-3. Вопрос-98 ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ПРЕПАРАТАМИ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА ПРИМЕНЯЮТ А) флумазенил Б) кальция гопантенат В) золпидем Г) налоксон @	А
	Анальгетирующие наркотические (опиоидные) средства и их антагонисты.	А
140.	ДЕ-3. Вопрос-96 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ФЕНТАНИЛА СОСТАВЛЯЕТ	А

	А) 0,5 ч Б) 1-2 ч В) 3-4 ч Г) 5-6 ч @	
141.	ДЕ-3. Вопрос-211 ДЛЯ НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО: А) Фентанил Б) Трамадол В) Тримеперидин Г) Морфин @	А
142.	ДЕ-3. Вопрос-159 ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИВОДИТ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ВСЛЕДСТВИИ А) угнетения дыхания Б) спазма гладких мышц ЖКТ В) снижения температуры тела Г) повышенной саливации @	А
143.	ДЕ-3. Вопрос-148 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ БУТОРФАНОЛ? А) наркотические анальгетики Б) ненаркотические анальгетики В) адъювантные анальгетики Г) антиагреганты @	А
144.	ДЕ-3. Вопрос-101 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА А) полный агонист опиоидных рецепторов (μ, κ, δ) Б) антагонист μ- и агонист κ-рецепторов В) агонист μ-рецепторов и ингибитор обратного захвата НА и 5-НТ Г) частичный агонист μ-рецепторов @	А
145.	ДЕ-3. Вопрос-102 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТРАМАДОЛА А) агонист μ-рецепторов и ингибитор обратного захвата моноаминов Б) антагонист μ- и агонист κ-рецепторов В) полный агонист опиоидных рецепторов (μ, κ, δ) Г) частичный агонист μ-рецепторов @	А
146.	ДЕ-3. Вопрос-103 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ БУПРЕНОРФИНА А) частичный агонист μ-рецепторов Б) агонист μ-рецепторов и ингибитор обратного захвата НА и 5-НТ В) антагонист μ- и агонист κ-рецепторов Г) полный агонист опиоидных рецепторов (μ, κ, δ) @	А
147.	ДЕ-3. Вопрос-104 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ БУТОРФАНОЛА А) антагонист μ- и агонист κ-рецепторов Б) агонист μ-рецепторов и ингибитор обратного захвата НА и 5-НТ В) частичный агонист μ-рецепторов Г) полный агонист опиоидных рецепторов (μ, κ, δ) @	А
148.	ДЕ-3. Вопрос-105 КАКОЙ АНАЛЬГЕТИК СПОСОБЕН УГНЕТАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР? А) морфин Б) кеторолак В) парацетамол Г) прегабалин @	А
149.	ДЕ-3. Вопрос-112 В ФОРМЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫПУСКАЕТСЯ А) фентанил Б) пропофол В) кетамин Г) галотан @	А
150.	ДЕ-3. Вопрос-196 НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕНАРКОТИЧЕСКИМИ: А) Угнетают дыхание Б) Обладают противовоспалительным действием В) Обладают жаропонижающим действием Г) Не имеют фармакологических антагонистов @	А

151.	ДЕ-3. Вопрос-200 ПРИ КАКОМ ПОКАЗАНИИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МОРФИН: А) Головная и зубная боль Б) Онкологические боли В) Постопреационные боли Г) Боли при травмах, ранах, ожогах @	A
152.	ДЕ-3. Вопрос-511 ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) А) Наркотический анальгетик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	A
153.	ДЕ-3. Вопрос-512 ФЕНТАНИЛ А) Наркотический анальгетик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	A
154.	ДЕ-3. Вопрос-513 ТРАМАДОЛ А) Анальгетик Б) Гормональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	A
155.	ДЕ-3. Вопрос-514 НАЛОКСОН А) Антагонист наркотических анальгетиков Б) Гормональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	A
156.	ДЕ-3. Вопрос-508 МОРФИН А) Наркотический анальгетик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	A
157.	ДЕ-3. Вопрос-509 КОДЕИН А) Наркотический анальгетик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	A
158.	ДЕ-3. Вопрос-539 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ МОРФИНА ОБУСЛОВЛЕН: А) Связыванием с опиоидными рецепторами по типу агониста Б) Блокадой опиоидных рецепторов В) Блокадой кальциевых каналов Г) Блокадой ЦОГ @	A
159.	ДЕ-3. Вопрос-540 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ТРИМЕПЕРИДИНА (ПРОМЕДОЛА) ОБУСЛОВЛЕН: А) Связыванием с опиоидными рецепторами по типу агониста Б) Блокадой опиоидных рецепторов В) Блокадой натриевых каналов Г) Блокадой ЦОГ @	A
160.	ДЕ-3. Вопрос-541 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ФЕНТАНИЛА ОБУСЛОВЛЕН: А) Связыванием с опиоидными рецепторами по типу агониста Б) Блокадой опиоидных рецепторов В) Блокадой гистаминовых H1-рецепторов Г) Блокадой ЦОГ @	A
161.	ДЕ-3. Вопрос-542 ЭФФЕКТ НАЛОКСОНА СВЯЗАН: А) Блокадой опиоидных рецепторов Б) Блокадой ЦОГ В) Связыванием с опиоидными рецепторами по типу агониста Г) Блокадой гистаминовых H1-рецепторов @	A
162.	ДЕ-3. Вопрос-546 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ МОРФИНА ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ ЦОГ?:	A

	А) Нет Б) Да @	
163.	ДЕ-3. Вопрос-547 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ТРИМЕПЕРИДИНА (ПРОМЕДОЛА) ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ ЦОГ?: А) Нет Б) Да @	А
164.	ДЕ-3. Вопрос-548 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ФЕНТАНИЛА ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ ЦОГ?: А) Нет Б) Да @	А
165.	ДЕ-3. Вопрос-549 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ФЕНТАНИЛА ОБУСЛОВЛЕН СВЯЗЫВАНИЕМ С ОПИОИДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ ПО ТИПУ АГОНИСТА?: А) Да Б) Нет @	А
166.	ДЕ-3. Вопрос-550 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ МОРФИНА ОБУСЛОВЛЕН СВЯЗЫВАНИЕМ С ОПИОИДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ ПО ТИПУ АГОНИСТА?: А) Да Б) Нет @	А
167.	ДЕ-3. Вопрос-197 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ: А) Налоксон Б) Флумазенил В) Феназепам Г) Афобазол @	А
168.	ДЕ-3. Вопрос-147 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НАЛОКСОНА А) передозировка опиоидами Б) биполярное аффективное расстройство В) нарушение дыхания у новорожденных Г) нарушение когнитивной функции @	А
	Ненаркотические анальгетики	А
169.	ДЕ-3. Вопрос-108 КАКОЙ АНАЛЬГЕТИК ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНГИБИРУЕТ ЦОГ-3? А) парацетамол Б) индометацин В) ацетилсалициловая кислота Г) ибупрофен @	А
170.	ДЕ-3. Вопрос-517 МЕАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН) А) Ненаркотических анальгетик Б) Гормональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	А
171.	ДЕ-3. Вопрос-518 ПАРАЦЕТАМОЛ А) Ненаркотических анальгетик Б) Противоглистное средство В) Гормональный препарат Г) Гипотензивное средство @	А
172.	ДЕ-3. Вопрос-519 КЕТОРОЛАК А) Ненаркотических анальгетик Б) Гормональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	А
173.	ДЕ-3. Вопрос-520 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПАРАЦЕТАМОЛА А) Зубная боль Б) Гепатит В) Остановка кровотечений Г) Эпилепсия @	А

174.	ДЕ-3. Вопрос-521 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ (АНАЛЬГИНА) А) Зубная боль Б) Гепатит В) Остановка кровотечений Г) Эпилепсия @	А
175.	ДЕ-3. Вопрос-543 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПАРАЦЕТАМОЛА ОБУСЛОВЛЕН: А) Блокадой ЦОГ Б) Связыванием с опиоидными рецепторами по типу агониста В) Блокадой опиоидных рецепторов Г) Блокадой гистаминовых H1-рецепторов @	А
176.	ДЕ-3. Вопрос-544 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ КАКОГО ПРЕПАРАТА ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ ЦОГ-3?: А) Парацетамола Б) Морфина В) Кодеина Г) Фентанила @	А
177.	ДЕ-3. Вопрос-545 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ КАКОГО ПРЕПАРАТА ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ ЦОГ?: А) Метамизола натрия (Анальгина) Б) Морфина В) Тримеперидина (Промедола) Г) Фентанила @	А
178.	ДЕ-3. Вопрос-551 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ (АНАЛЬГИНА) ОБУСЛОВЛЕН СВЯЗЫВАНИЕМ С ОПИОИДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ ПО ТИПУ АГОНИСТА? А) Нет Б) Да @	А
179.	ДЕ-3. Вопрос-552 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПАРАЦЕТАМОЛА ОБУСЛОВЛЕН СВЯЗЫВАНИЕМ С ОПИОИДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ ПО ТИПУ АГОНИСТА?: А) Нет Б) Да @	А
180.	ДЕ-3. Вопрос-553 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ (АНАЛЬГИНА) ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ ЦОГ? А) Да Б) Нет @	А
181.	ДЕ-3. Вопрос-554 АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПАРАЦЕТАМОЛА ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ ЦОГ? А) Да Б) Нет @	А
182.	ДЕ-3. Вопрос-143 АГРАНУЛОЦИТОЗ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) метамизол натрия Б) нимесулид В) мелоксикам Г) парацетамол @	А
183.	ДЕ-3. Вопрос-195 ПРИ КАКОМ ПОКАЗАНИИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ: А) Болевой синдром на фоне инфаркта миокарда Б) Зубная боль В) Головная боль Г) Ревматические боли @	А
184.	ДЕ-3. Вопрос-300 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ: А) Противокашлевой Б) Жаропонижающий В) Противовоспалительный Г) Анальгетический @	А
185.	ДЕ-3. Вопрос-310 НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ, НЕ ОБЛАДАЮТ ЭТИМ СВОЙСТВОМ: А) Оказывают противокашлевой эффект Б) Не угнетают дыхание	А

	В) Не вызывают миоз Г) Не имеют фармакологических антагонистов @	
	Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)	A
186.	ДЕ-3. Вопрос-73 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НЕСТЕРОИДНОЙ СТРУКТУРЫ /НПВС/ А) диклофенак Б) диазолин В) карбамазепин Г) преднизолон @	A
187.	ДЕ-3. Вопрос-555 ЦЕЛЕКОКСИБ А) НПВС Б) Слабительно средство В) Анксиолитик Г) Гепатопротектор @	A
188.	ДЕ-3. Вопрос-556 МЕЛОКСИКАМ (МОВАЛИС) А) НПВС Б) Слабительно средство В) Анксиолитик Г) Гепатопротектор @	A
189.	ДЕ-3. Вопрос-557 ИБУПРОФЕН (НУРОФЕН) А) НПВС Б) Аналептик В) Анксиолитик Г) Гепатопротектор @	A
190.	ДЕ-3. Вопрос-558 КЕТОПРОФЕН (ОКИ) А) НПВС Б) Аналептик В) Анксиолитик Г) Гепатопротектор @	A
191.	ДЕ-3. Вопрос-559 ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ (ВОЛЬТАРЕН) А) НПВС Б) Аналептик В) Анксиолитик Г) Гепатопротектор @	A
192.	ДЕ-3. Вопрос-560 НПВС А) Целекоксиб Б) Линезолид В) Линекс Г) Кларитромицин @	A
193.	ДЕ-3. Вопрос-515 НПВС А) Мелоксикам (Мовалис) Б) Линезолид В) Линекс Г) Кларитромицин @	A
194.	ДЕ-3. Вопрос-516 АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА А) Ненаркотических анальгетик, НПВС Б) Гормональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	A
195.	ДЕ-3. Вопрос-522 НПВС А) Ибупрофен (Нурофен) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Кларитромицин @	A

196.	ДЕ-3. Вопрос-523 НПВС А) Кетопрофен (ОКИ) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Кларитромицин @	A
197.	ДЕ-3. Вопрос-524 НПВС А) Диклофенак натрия (Вольтарен) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Кларитромицин @	A
198.	ДЕ-3. Вопрос-525 В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА ИМЕЕТ МЕСТО БЛОКАДА ЦОГ1,2? А) Диклофенак натрия Б) Омепразола В) Тазоцина Г) Эритромицина @	A
199.	ДЕ-3. Вопрос-526 В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА ИМЕЕТ МЕСТО БЛОКАДА ЦОГ1,2? А) Диклофенак натрия Б) Инсулина В) Феноболила Г) Водорода пероксид @	A
200.	ДЕ-3. Вопрос-527 ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПОТОМУ ЧТО ОН: А) Ингибирует ЦОГ1,2 Б) Повышает уровень Дофамина в ЦНС В) Блокирует натриевые каналы Г) Блокирует гистаминовые H1-рецепторы @	A
201.	ДЕ-3. Вопрос-528 КЕТОПРОФЕН ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПОТОМУ ЧТО ОН: А) Ингибирует ЦОГ1,2 Б) Повышает уровень Дофамина в ЦНС В) Блокирует натриевые каналы Г) Блокирует гистаминовые H1-рецепторы @	A
202.	ДЕ-3. Вопрос-529 ИБУПРОФЕН ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПОТОМУ ЧТО ОН: А) Ингибирует ЦОГ1,2 Б) Ингибирует АПФ (Ангиотензин превращающий фермент) В) Блокирует натриевые каналы Г) локирует калиевые каналы @	A
203.	ДЕ-3. Вопрос-530 В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА ИМЕЕТ МЕСТО БЛОКАДА ЦОГ2? А) Целикоксиба Б) Омепразола В) Тазоцина Г) Эритромицина @	A
204.	ДЕ-3. Вопрос-531 В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА ИМЕЕТ МЕСТО БЛОКАДА ЦОГ2? А) Целикоксиба Б) Инсулина В) Феноболила Г) Водорода пероксид @	A
205.	ДЕ-3. Вопрос-532 ЦЕЛИКОКСИБ ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПОТОМУ ЧТО ОН: А) Ингибирует ЦОГ2 Б) Повышает уровень Дофамина в ЦНС В) Блокирует натриевые каналы Г) Блокирует гистаминовые H1-рецепторы @	A
206.	ДЕ-3. Вопрос-533 ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВВИДУ, ЧТО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ У ПАЦИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ: А) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки Б) Нарушение слуха В) Образование кристаллов в почечных канальцах Г) Дисбактериоз @	A

207.	ДЕ-3. Вопрос-534 ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ КЕТОПРОФЕНА У ПАЦИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ: А) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки Б) Нарушение слуха В) Образование кристаллов в почечных канальцах Г) Дисбактериоз @	А
208.	ДЕ-3. Вопрос-535 ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ИБУПРОФЕНА У ПАЦИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ: А) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки Б) Нарушение слуха В) Образование кристаллов в почечных канальцах Г) Дисбактериоз @	А
209.	ДЕ-3. Вопрос-536 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ КАКОГО ПРЕПАРАТА МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ: А) Ибупрофена Б) Инсулина В) Феноболила Г) Водорода пероксид @	А
210.	ДЕ-3. Вопрос-537 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ КАКОГО ПРЕПАРАТА МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ: А) Диклофенака натрия Б) Инсулина В) Феноболила Г) Водорода пероксид @	А
211.	ДЕ-3. Вопрос-538 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ КАКОГО ПРЕПАРАТА МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ: А) Кетопрофена Б) Инсулина В) Феноболила Г) Водорода пероксид @	А
212.	ДЕ-3. Вопрос-204 НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ ПО СРАВНЕНИЮ С НАРКОТИЧЕСКИМИ: А) Не имеют фармакологических антагонистов Б) Угнетают дыхание В) Оказывают противокашлевой эффект Г) Вызывают миоз @	А
213.	ДЕ-3. Вопрос-244 НЕСТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНГИБИТОР ЦОГ-2. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. А) Мелоксикам (мовалис) Б) Метамизол натрия (анальгин) В) Ибупрофен (нурофен) Г) Кеторолак (кетанов) @	А
214.	ДЕ-3. Вопрос-243 НЕСТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, НЕСЕЛЕКТИВНЫЙ ИНГИБИТОР ЦОГ-1 И ЦОГ-2, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. А) Диклофенак (вольтарен, ортафен) Б) Мелоксикам (мовалис) В) Метамизол натрия (анальгин) Г) Трамадол (трамал) @	А
215.	ДЕ-3. Вопрос-205 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ: А) Головная и зубная боль Б) Онкологические боли В) Постопреационные боли Г) Боли при травмах, ранах, ожогах @	А
216.	ДЕ-3. Вопрос-113 ВЫРАЖЕННОЕ УЛЬЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ	А

	А) кеторолака Б) пропорола В) морфина Г) нимесулида @	
217.	ДЕ-3. Вопрос-74 КАКОЙ ПРЕПАРАТ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ИНГИБИРУЕТ ЦОГ-1 И ЦОГ-2? А) ибупрофен Б) мелоксикам В) нимесулид Г) целекоксиб @	А
218.	ДЕ-3. Вопрос-75 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНГИБИРУЕТ ЦОГ-2? А) нимесулид Б) индометацин В) ибупрофен Г) кеторолак @	А
219.	ДЕ-3. Вопрос-76 КАКОЙ ПРЕПАРАТ В НИЗКОЙ ДОЗЕ (75-150 М) СЕЛЕКТИВНО ИНГИБИРУЕТ ЦОГ-1? А) ацетилсалициловая кислота Б) ибупрофен В) метамизол натрия Г) диклофенак @	А
220.	ДЕ-3. Вопрос-77 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ВЫРАЖЕННЫМ АНТИПИРЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ? А) парацетамол Б) кеторолак В) индометацин Г) диклофенак @	А
221.	ДЕ-3. Вопрос-78 БАЗИСНЫЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ А) хлорохин Б) ибупрофен В) индометацин Г) кеторолак @	А
222.	ДЕ-3. Вопрос-79 НПВП, ИЗБИРАТЕЛЬНО ИНГИБИРУЮЩИЙ ЦОГ-2 А) мелоксикам Б) бетаметазон В) ацетилсалициловая кислота Г) диклофенак натрия @	А
223.	ДЕ-3. Вопрос-80 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА СВЯЗАН С А) ингибированием ЦОГ-3 Б) стимуляцией опиоидных рецепторов В) блокадой натриевых каналов Г) блокадой NMDA-рецепторов @	А
224.	ДЕ-3. Вопрос-81 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛЬГЕТИКОМ-АНТИПИРЕТИКОМ? А) метамизол натрия Б) диклофенак В) индометацин Г) кеторол @	А
225.	ДЕ-3. Вопрос-82 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НПВС, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ИНГИБИРОВАНИЕМ ЦОГ-1 А) ulcerогенное действие Б) гепатотоксичность В) гематотоксичность Г) синдром Кушинга @	А
226.	ДЕ-3. Вопрос-83 НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ УЛЬЦЕРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ А) кеторолак Б) мелоксикам В) нимесулид Г) целекоксиб @	А

227.	ДЕ-3. Вопрос-85 УКАЖИТЕ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НПВС А) ulcerогенное действие Б) обстипация (запор) В) лекарственная зависимость Г) угнетение дыхания @	А
228.	ДЕ-3. Вопрос-86 ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КИСЛОТЫ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ А) антиагрегантное Б) гемостатическое В) антикоагулянтное Г) эритропоэтическое @	А
229.	ДЕ-3. Вопрос-87 ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НПВС А) язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки Б) ревматоидный артрит В) болезнь Аддисона Г) подагра @	А
230.	ДЕ-3. Вопрос-88 НЕСТЕРОИДНЫЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ А) целекоксиб Б) бромгексин В) бетаметазон Г) атропин @	А
231.	ДЕ-3. Вопрос-90 КАКОЙ НПВС ПРИМЕНЯЮТ В НИЗКОЙ ДОЗЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИБС? А) ацетилсалициловую кислоту Б) нимесулид В) кеторолак Г) диклофенак @	А
232.	ДЕ-3. Вопрос-91 КАКОЙ ПРЕПАРАТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СИНДРОМУ РЕЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ОРВИ? А) ацетилсалициловая кислота Б) диклофенак натрия В) ибупрофен Г) парацетамол @	А
233.	ДЕ-3. Вопрос-92 ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ СИЛЬНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И СИЛЬНОЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, ИМЕЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ (72 ЧАСА), ВЫСОКУЮ БИОДОСТУПНОСТЬ (ВЫШЕ 90%), ХОРОШО ПРОНИКАЮЩИЙ В СИНОВИАЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ А) теноксикам Б) индометацин В) диклофенак натрия Г) напроксен @	А
234.	ДЕ-3. Вопрос-93 ОСНОВНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НПВС А) обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный Б) противовоспалительный, обезболивающий, седативный В) жаропонижающий, обезболивающий, снотворный Г) обезболивающий, седативный, антиагрегантный @	А
235.	ДЕ-3. Вопрос-106 КАКОЙ НПВС ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРОМ ЦОГ-2? А) целекоксиб Б) индометацин В) ибупрофен Г) напроксен @	А
236.	ДЕ-3. Вопрос-107 УЛЬЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КЕТОРОЛАКА ОБУСЛОВЛЕНО А) механизмом действия Б) физико-химическими свойствами В) способом введения Г) особенностями фармакокинетики @	А
237.	ДЕ-3. Вопрос-109	А

	К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ А) бронхоспазм Б) нарушение аккомодации В) синдром Кушинга Г) гиперхолестеринемия @	
	ЛС, влияющие на дыхательную систему	А
238.	ДЕ-3. Вопрос-89 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ КАК ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ СРЕДСТВО А) кодеин Б) морфин В) тримеперидин Г) фентанил @	А
239.	ДЕ-3. Вопрос-111 В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОКАШЛЕВОГО СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТ А) кодеин Б) кофеин В) доксиламин Г) пропофол @	А
240.	ДЕ-3. Вопрос-198 К ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ НЕНАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) Бутамират Б) Ниаламид В) Кодеин Г) Кофеин @	А
241.	ДЕ-3. Вопрос-210 ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) Кодеин Б) Преноксидиазин В) Ацетилцистеин Г) Кофеин @	А
242.	ДЕ-3. Вопрос-246 В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОКАШЛЕВОГО СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТ: А) Кодеин Б) Кофеин В) Пропофол Г) Ацетилсалициловую кислоту @	А
243.	ДЕ-3. Вопрос-304 К ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ НЕНАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) Бутамират Б) Сальбутамол В) Кодеин Г) Кофеин @	А
244.	ДЕ-3. Вопрос-316 ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) Кодеин Б) Ацетилцистеин В) Преноксидиазин Г) Кофеин @	А
245.	ДЕ-3. Вопрос-357 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ КАК ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ СРЕДСТВО А) кодеин Б) морфин В) тримеперидин Г) фентанил @	А
246.	ДЕ-3. Вопрос-379 В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОКАШЛЕВОГО СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТ А) кодеин Б) кофеин В) доксиламин Г) пропофол @	А
247.	ДЕ-3. Вопрос-510 КОДЕИН А) Противокашлевое средство Б) Ноотроп	А

	В) Местный анестетик Г) Ненаркотический анальгетик @	
	ЛС, действующие на психическую деятельность человека.	А
	Антипсихотические, анксиолитические и седативные средства. Нормотимические средства	А
248.	ДЕ-3. Вопрос-144 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТИЯ КАРБОНАТА ЯВЛЯЕТСЯ А) биполярное аффективное расстройство Б) нарушение когнитивной функции В) нарушение дыхания у новорожденных Г) передозировка опиоидами @	А
249.	ДЕ-3. Вопрос-476 НОРМОТИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО А) Лития карбонат Б) Налоксон В) Кофеин Г) Кларитромицин @	А
250.	ДЕ-3. Вопрос-504 ЛИТИЯ КАРБОНАТ А) Нормотимическое средство Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
251.	ДЕ-3. Вопрос-160 АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) УСТРАНЯЮТ А) страх и тревогу Б) бред и галлюцинации В) сонливость и заторможенность Г) рвоту и икоту @	А
252.	ДЕ-3. Вопрос-472 АНКСИОЛИТИК А) Диазепам (Седуксен) Б) Кофеин В) Кларитромицин Г) Сульгин @	А
253.	ДЕ-3. Вопрос-162 КАКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ АНКСИОЛИТИКИ? А) противотревожным Б) ноотропным В) противопаркинсоническим Г) антипсихотическим @	А
254.	ДЕ-3. Вопрос-163 КАКОЙ АНКСИОЛИТИК ОБЛАДАЕТ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ? А) буспирон Б) феназепам В) алпразолам Г) диазепам @	А
255.	ДЕ-3. Вопрос-500 ДИАЗЕПАМ (СЕДУКСЕН) А) Анксиолитик Б) Местный анестетик В) Антипсихотик (Нейролептик) Г) Противопаркинсоническое средство @	А
256.	ДЕ-3. Вопрос-145 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ АНКСИОЛИТИКОМ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА? А) феназепам Б) буспирон В) афобазол Г) пароксетин @	А
257.	ДЕ-3. Вопрос-434 КАКОЙ АНКСИОЛИТИК БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА ОБЛАДАЕТ ДЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ? А) диазепам	А

	Б) буспирон В) афобазол Г) мидазолам @	
258.	ДЕ-3. Вопрос-165 КАКОЙ АНКСИОЛИТИК БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА ОБЛАДАЕТ ДЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ? А) диазепам Б) буспирон В) афобазол Г) мидазолам @	А
259.	ДЕ-3. Вопрос-429 АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) УСТРАНЯЮТ А) страх и тревогу Б) бред и галлюцинации В) сонливость и заторможенность Г) рвоту и икоту @	А
260.	ДЕ-3. Вопрос-431 КАКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ АНКСИОЛИТИКИ? А) противотревожным Б) ноотропным В) противопаркинсоническим Г) антипсихотическим @	А
261.	ДЕ-3. Вопрос-432 КАКОЙ АНКСИОЛИТИК ОБЛАДАЕТ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ? А) буспирон Б) феназепам В) алпразолам Г) диазепам @	А
262.	ДЕ-3. Вопрос-95 КАКОЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ТИПИЧНЫХ НЕЙРОЛЕПТИКОВ? А) лекарственный паркинсонизм Б) судороги В) галлюцинации Г) гипертонический криз @	А
263.	ДЕ-3. Вопрос-480 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДРОПЕРИДОЛА А) Шизофрения Б) Гепатит В) Стенокардия Г) Глаукома @	А
264.	ДЕ-3. Вопрос-433 КАКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ НЕЙРОЛЕПТИКИ? А) антипсихотическим Б) галлюциногенным В) ноотропным Г) психостимулирующим @	А
265.	ДЕ-3. Вопрос-206 КАКОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ХЛОРПРОМАЗИНА (АМИНАЗИНА): А) Противопаркинсоническое Б) Антипсихотическое В) Центральное миорелаксирующее Г) Гипотермическое @	А
266.	ДЕ-3. Вопрос-209 КАКОЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ТИПИЧНЫХ НЕЙРОЛЕПТИКОВ (АНТИПСИХОТИКОВ): А) Экстрапирамидные расстройства (лекарственный паркинсонизм) Б) Гипертонический криз В) Спазм бронхов Г) Судороги @	А
267.	ДЕ-3. Вопрос-481 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ХЛОРПРОМАЗИНА (АМИНАЗИНА) А) Шизофрения Б) Гепатит В) Стенокардия	А

	Г) Глаукома @	
268.	ДЕ-3. Вопрос-497 ХЛОПРОМАЗИН (АМИНАЗИН) А) Антипсихотик (Нейролептик) Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Противопаркинсоническое средство @	А
269.	ДЕ-3. Вопрос-498 ДРОПЕРИДОЛ А) Антипсихотик (Нейролептик) Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Противопаркинсоническое средство @	А
270.	ДЕ-3. Вопрос-499 КЛОЗАПИН А) Антипсихотик (Нейролептик) Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Противопаркинсоническое средство @	А
271.	ДЕ-3. Вопрос-164 КАКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ НЕЙРОЛЕПТИКИ? А) антипсихотическим Б) галлюциногенным В) ноотропным Г) психостимулирующим @	А
272.	ДЕ-3. Вопрос-99 К ТИПИЧНЫМ НЕЙРОЛЕПТИКАМ ОТНОСЯТСЯ А) хлорпромазин и галоперидол Б) хлорпромазин и арипипразол В) галоперидол и арипипразол Г) клозапин и кветиапин @	А
273.	ДЕ-3. Вопрос-114 ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) галоперидол Б) лития карбонат В) кветиапин Г) клозапин @	А
274.	ДЕ-3. Вопрос-141 КАКОЙ НЕЙРОЛЕПТИК ОБЛАДАЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ СЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ? А) хлорпромазин Б) галоперидол В) рисперидон Г) клозапин @	А
275.	ДЕ-3. Вопрос-142 АГРАНУЛОЦИТОЗ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ А) клозапин Б) галоперидол В) тиоридазин Г) хлорпромазин @	А
276.	ДЕ-3. Вопрос-149 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ГАЛОПЕРИДОЛ? А) типичные нейролептики Б) атипичные нейролептики В) анксиолитики Г) антидепрессанты @	А
277.	ДЕ-3. Вопрос-150 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ХЛОПРОМАЗИН? А) типичные нейролептики Б) атипичные нейролептики	А

	В) анксиолитики Г) антидепрессанты @	
278.	ДЕ-3. Вопрос-151 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ АРИПИПРАЗОЛ? А) атипичные нейролептики Б) типичные нейролептики В) анксиолитики Г) антидепрессанты @	А
279.	ДЕ-3. Вопрос-152 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ КЛОЗАПИН? А) атипичные нейролептики Б) типичные нейролептики В) анксиолитики Г) антидепрессанты @	А
280.	ДЕ-3. Вопрос-153 БЛОКАДОЙ КАКИХ РЕЦЕПТОРОВ ОБУСЛОВЛЕН АНТИПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГАЛОПЕРИДОЛА? А) дофаминовых Б) гистаминовых В) барбитуратных Г) серотониновых @	А
281.	ДЕ-3. Вопрос-154 БЛОКАДОЙ КАКИХ РЕЦЕПТОРОВ ОБУСЛОВЛЕН АНТИПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ХЛОРПРОМАЗИНА? А) дофаминовых Б) гистаминовых В) барбитуратных Г) серотониновых @	А
282.	ДЕ-3. Вопрос-469 АНТИПСИХОТИК (НЕЙРОЛЕПТИК) А) Хлорпромазин (Аминазин) Б) Кофеин В) Кеторолак Г) Вальпроевая кислота @	А
283.	ДЕ-3. Вопрос-470 АНТИПСИХОТИК (НЕЙРОЛЕПТИК) А) Дроперидол Б) Кофеин В) Кеторолак Г) Вальпроевая кислота @	А
284.	ДЕ-3. Вопрос-471 АНТИПСИХОТИК (НЕЙРОЛЕПТИК) А) Клозапин Б) Кофеин В) Кларитромицин Г) Сульгин @	А
285.		А
286.		А
287.	ДЕ-3. Вопрос-473 СЕДАТИВНОЕ СРЕДСТВО А) Валокордин Б) Кофеин В) Кларитромицин Г) Сульгин @	А
288.	ДЕ-3. Вопрос-175 КАКОЕ СРЕДСТВО ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ СЕДАТИВНЫХ? А) экстракт валерьяны Б) гопантеновая кислота В) пирацетам Г) афобазол @	А
289.	ДЕ-3. Вопрос-501 ВАЛОКОРДИН А) Седативное средство Б) Местный анестетик	А

	В) Антибиотик Г) Антисептик @	
	Антидепрессанты. Психостимуляторы. Ноотропы. Адаптогены. Аналептики	А
290.	ДЕ-3. Вопрос-100 К НООТРОПНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) гопантенат кальция Б) парацетамол В) суматриптан Г) лития карбонат @	А
291.	ДЕ-3. Вопрос-167 НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НООТРОПОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) патология мнестических функций Б) состояние физиологической нормы в ЦНС В) прием ударной дозы Г) только однократный прием @	А
292.	ДЕ-3. Вопрос-168 ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ БЫТЬ А) бессонница Б) ортостатическая гипотензия В) лекарственный паркинсонизм Г) дискинезии @	А
293.	ДЕ-3. Вопрос-169 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ КОСВЕННЫМ НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ? А) циннаризин Б) гопантенат кальция В) пирацетам Г) фенотропил @	А
294.	ДЕ-3. Вопрос-146 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПИРАЦЕТАМА А) нарушение когнитивной функции Б) биполярное аффективное расстройство В) нарушение дыхания у новорожденных Г) передозировка опиоидами @	А
295.	ДЕ-3. Вопрос-237 К НООТРОПНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) Пирацетам Б) Лития карбонат В) Парацетамол Г) Доксиламин @	А
296.	ДЕ-3. Вопрос-255 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПИРАЦЕТАМА А) Ноотропное Б) Антипсихотическое В) Антидепрессивное Г) Антигипоксическое @	А
297.	ДЕ-3. Вопрос-368 К НООТРОПНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) гопантенат кальция Б) парацетамол В) суматриптан Г) лития карбонат @	А
298.	ДЕ-3. Вопрос-400 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ПИРАЦЕТАМ? А) ноотропы Б) антиконвульсанты В) антидепрессанты Г) противопаркинсонические @	А
299.	ДЕ-3. Вопрос-401 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ГОПАНТЕНОВАЯ КИСЛОТА? А) ноотропы Б) антиконвульсанты	А

	В) антидепрессанты Г) противопаркинсонические @	
300.	ДЕ-3. Вопрос-436 НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НООТРОПОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) патология мнестических функций Б) состояние физиологической нормы в ЦНС В) прием ударной дозы Г) только однократный прием @	А
301.	ДЕ-3. Вопрос-437 ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ БЫТЬ А) бессонница Б) ортостатическая гипотензия В) лекарственный паркинсонизм Г) дискинезии @	А
302.	ДЕ-3. Вопрос-438 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ КОСВЕННЫМ НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ? А) циннаризин Б) гопантеновая кислота В) пирацетам Г) фенотропил @	А
303.	ДЕ-3. Вопрос-324 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ПИРАЦЕТАМА: А) Ноотропный Б) Анальгетический В) Противопаркинсонический Г) Противосудорожный @	А
304.	ДЕ-3. Вопрос-132 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ГОПАНТЕНОВАЯ КИСЛОТА? А) ноотропы Б) антиконвульсанты В) антидепрессанты Г) противопаркинсонические @	А
305.	ДЕ-3. Вопрос-131 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ПИРАЦЕТАМ? А) ноотропы Б) антиконвульсанты В) антидепрессанты Г) противопаркинсонические @	А
306.	ДЕ-3. Вопрос-505 ПИРАЦЕТАМ А) Ноотроп Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Седативное средство @	А
307.	ДЕ-3. Вопрос-477 НООТРОПНОЕ СРЕДСТВО А) Пирацетам Б) Налоксон В) Кофеин Г) Кларитромицин @	А
308.	ДЕ-3. Вопрос-506 КОФЕИН А) Психостимулятор Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
309.	ДЕ-3. Вопрос-507 КОФЕИН А) Аналептик Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А

310.	ДЕ-3. Вопрос-459 АНАЛЕПТИК А) Аммиака раствор Б) Атропин В) Кеторолак Г) Азота закись @	А
311.	ДЕ-3. Вопрос-464 АНАЛЕПТИК А) Никетамид Б) Атропин В) Кеторолак Г) Азота закись @	А
312.	ДЕ-3. Вопрос-465 АНАЛЕПТИК А) Кофеин Б) Атропин В) Кеторолак Г) Азота закись @	А
313.	ДЕ-3. Вопрос-493 НИКЕТАМИД (КОРДИАМИН) А) Аналептик Б) Местный анестетик В) Средство для неингаляционного наркоза Г) Средство для ингаляционного наркоза @	А
314.	ДЕ-3. Вопрос-482 АММИАКА РАСТВОР А) Аналептик Б) нейролептик В) анальгетик Г) анксиолитик @	А
315.	ДЕ-3. Вопрос-110 В КАЧЕСТВЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ А) кофеин Б) кетамин В) трамадол Г) кодеин @	А
316.	ДЕ-3. Вопрос-161 КОФЕИН В МАЛЫХ ДОЗАХ А) активирует ЦНС Б) угнетает ЦНС В) снижает АД Г) вызывает гипоксию @	А
317.	ДЕ-3. Вопрос-126 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ПАРОКСЕТИН? А) антидепрессанты Б) антиконвульсанты В) противопаркинсонические Г) ноотропы @	А
318.	ДЕ-3. Вопрос-127 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ ФЛУВОКСАМИН? А) антидепрессанты Б) антиконвульсанты В) противопаркинсонические Г) ноотропы @	А
319.	ДЕ-3. Вопрос-128 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ АМИТРИПТИЛИН? А) антидепрессанты Б) антиконвульсанты В) противопаркинсонические Г) ноотропы @	А
320.	ДЕ-3. Вопрос-129 К КАКОЙ ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ СЕРТРАЛИН? А) антидепрессанты Б) антиконвульсанты	А

	В) противопаркинсонические Г) ноотропы @	
321.	ДЕ-3. Вопрос-133 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ АМИТРИПТИЛИН? А) средства, нарушающие обратный захват моноаминов Б) ингибиторы МАО В) антидепрессанты рецепторного действия Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
322.	ДЕ-3. Вопрос-134 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ ФЛУОКСЕТИН? А) средства, нарушающие обратный захват моноаминов Б) ингибиторы МАО В) антидепрессанты рецепторного действия Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
323.	ДЕ-3. Вопрос-135 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ ФЛУВОКСАМИН? А) средства, нарушающие обратный захват моноаминов Б) ингибиторы МАО В) антидепрессанты рецепторного действия Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
324.	ДЕ-3. Вопрос-136 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ ПАРОКСЕТИН? А) средства, нарушающие обратный захват моноаминов Б) ингибиторы МАО В) антидепрессанты рецепторного действия Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
325.	ДЕ-3. Вопрос-137 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ СЕРТРАЛИН? А) средства, нарушающие обратный захват моноаминов Б) ингибиторы МАО В) антидепрессанты рецепторного действия Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
326.	ДЕ-3. Вопрос-138 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ ИМИПРАМИН? А) средства, нарушающие обратный захват моноаминов Б) ингибиторы МАО В) антидепрессанты рецепторного действия Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
327.	ДЕ-3. Вопрос-139 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ МОКЛОБЕМИД? А) ингибиторы МАО Б) средства, нарушающие обратный захват моноаминов В) антидепрессанты рецепторного действия Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
328.	ДЕ-3. Вопрос-140 К КАКОЙ ГРУППЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОТНОСИТСЯ МИРТАЗАПИН? А) антидепрессанты рецепторного действия Б) средства, нарушающие обратный захват моноаминов В) ингибиторы МАО Г) стимуляторы обратного захвата моноаминов @	А
329.	ДЕ-3. Вопрос-219 СООТНЕСИТЕ ПРЕПАРАТ МОКЛОБЕМИД С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ А) Антидепрессанты Б) Психомоторные стимулятор В) Аналептики Г) Ноотропы @	А
330.	ДЕ-3. Вопрос-228 МЕХАНИЗМ РЕЦЕПТОРНОГО КОМПОНЕНТА ДЕЙСТВИЯ АМИТРИПТИЛИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ: А) Блокаду бета-адренорецепторов Б) Блокаду мускариновых холинорецепторов В) Блокаду H1-гистаминовых рецепторов Г) Блокаду серотониновых рецепторов @	А

331.	ДЕ-3. Вопрос-234 УКАЖИТЕ КАКОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АМИТРИПТИЛИНА А) блокирует дофаминовые рецепторы Б) ингибирует обратный захват норадреналина В) ингибирует обратный захват серотонина Г) блокирует М-холинорецепторы @	А
332.	ДЕ-3. Вопрос-221 СООТНЕСИТЕ ПРЕПАРАТ АМИТРИПТИЛИН С МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ: А) Неизбирательно угнетает нейрональный захват серотонина и норадреналина Б) Ингибитор МАО-А В) Избирательно угнетает нейрональный захват норадреналина Г) Избирательно угнетает нейрональный захват серотонина @	А
333.	ДЕ-3. Вопрос-179 ТРИЦИКЛИЧЕСКИЙ АНТИДЕПРЕССАНТ А) амитриптилин Б) флуоксетин В) пароксетин Г) флувоксамин @	А
334.	ДЕ-3. Вопрос-180 АНТИДЕПРЕССАНТ ИЗ ГРУППЫ СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА А) флуоксетин Б) мапротилин В) венлафаксин Г) миртазапин @	А
335.	ДЕ-3. Вопрос-181 АНТИДЕПРЕССАНТ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА И НОРАДРЕНАЛИНА А) венлафаксин Б) мапротилин В) флуоксетин Г) миртазапин @	А
336.	ДЕ-3. Вопрос-448 ТРИЦИКЛИЧЕСКИЙ АНТИДЕПРЕССАНТ А) амитриптилин Б) флуоксетин В) пароксетин Г) флувоксамин @	А
337.	ДЕ-3. Вопрос-449 АНТИДЕПРЕССАНТ ИЗ ГРУППЫ СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА А) флуоксетин Б) мапротилин В) венлафаксин Г) миртазапин @	А
338.	ДЕ-3. Вопрос-450 АНТИДЕПРЕССАНТ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА И НОРАДРЕНАЛИНА А) венлафаксин Б) мапротилин В) флуоксетин Г) миртазапин @	А
339.	ДЕ-3. Вопрос-451 ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКИХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ (НАСС) А) миртазапин Б) амитриптилин В) флувоксамин Г) моклобемид @	А
340.	ДЕ-3. Вопрос-452 КАКОЙ АНТИДЕПРЕССАНТ ОБЛАДАЕТ ВЫРАЖЕННЫМ АНТИМУСКАРИНОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ? А) амитриптилин Б) пароксетин В) флуоксетин Г) сертралин @	А
341.	ДЕ-3. Вопрос-474 АНТИДЕПРЕССАНТ	А

	А) Амитриптилин Б) Кофеин В) Кларитромицин Г) Сульгин @	
342.	ДЕ-3. Вопрос-475 АНТИДЕПРЕССАНТ А) Флуоксетин Б) Кофеин В) Кларитромицин Г) Сульгин @	А
343.	ДЕ-3. Вопрос-453 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ИСПОЛЬЗУЮТ В ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАНИЧЕСКИХ АТАК? А) пароксетин Б) алпразолам В) клоназепам Г) феназепам @	А
344.	ДЕ-3. Вопрос-454 СЕРТОНИНОВЫЙ СИНДРОМ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИЕМЕ ФЛУОКСЕТИНА С А) моклобемидом Б) клоназепамом В) алпразоламом Г) феназепамом @	А
345.	ДЕ-3. Вопрос-455 ДЛЯ КАКОГО АНТИДЕПРЕССАНТА ХАРАКТЕРЕН ВЫРАЖЕННЫЙ СЕДАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ? А) амитриптилин Б) моклобемид В) флуоксетин Г) пароксетин @	А
346.	ДЕ-3. Вопрос-456 ГРУППА АНТИДЕПРЕССАНТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, СУХОСТЬ ВО РТУ И ДР.) А) трициклические антидепрессанты Б) ингибиторы МАО В) селективные ингибиторы обратного захвата серотонина Г) НАССА @	А
347.	ДЕ-3. Вопрос-182 ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКИХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ СЕРТОНИНЕРГИЧЕСКИХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ (НАСС) А) миртазапин Б) амитриптилин В) флувоксамин Г) моклобемид @	А
348.	ДЕ-3. Вопрос-183 КАКОЙ АНТИДЕПРЕССАНТ ОБЛАДАЕТ ВЫРАЖЕННЫМ АНТИМУСКАРИНОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ? А) амитриптилин Б) пароксетин В) флуоксетин Г) сертралин @	А
349.	ДЕ-3. Вопрос-184 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ИСПОЛЬЗУЮТ В ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАНИЧЕСКИХ АТАК? А) пароксетин Б) алпразолам В) клоназепам Г) феназепам @	А
350.	ДЕ-3. Вопрос-185 СЕРТОНИНОВЫЙ СИНДРОМ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИЕМЕ ФЛУОКСЕТИНА С А) моклобемидом Б) клоназепамом В) алпразоламом Г) феназепамом @	А

351.	ДЕ-3. Вопрос-186 ДЛЯ КАКОГО АНТИДЕПРЕССАНТА ХАРАКТЕРЕН ВЫРАЖЕННЫЙ СЕДАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ? А) амитриптилин Б) моклобемид В) флуоксетин Г) пароксетин @	А
352.	ДЕ-3. Вопрос-187 ГРУППА АНТИДЕПРЕССАНТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, СУХОСТЬ ВО РТУ И ДР.) А) трициклические антидепрессанты Б) ингибиторы МАО В) селективные ингибиторы обратного захвата серотонина Г) НАССА @	А
353.	ДЕ-3. Вопрос-502 АМИТРИПТИЛИН А) Антидепрессант Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
354.	ДЕ-3. Вопрос-503 ФЛУОКСЕТИН А) Антидепрессант Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
355.	ДЕ-3. Вопрос-176 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ? А) экстракт элеутерококка Б) алкалоиды барвинка малого В) экстракт сенны Г) экстракт валерианы @	А
356.	ДЕ-3. Вопрос-177 КАКИЕ ЭФФЕКТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АДАПТОГЕНОВ? А) повышение резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды Б) улучшение общего самочувствия и аппетита, сильное возбуждающее действие В) активация жизненно важных центров головного мозга, противосудорожное действие Г) снотворное и седативное действие @	А
357.	ДЕ-3. Вопрос-178 НАЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ (АДАПТОГЕНОВ) ПОКАЗАНО ПРИ А) астенических расстройствах Б) шизофрении В) бессоннице Г) эпилепсии @	А

№	Текст вопроса	Ответ
	СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА	
1.	ДЕ-4. Вопрос-1 ДИГОКСИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 0.25 мг, №30 - 10 шт. и для детей 0,1 мг Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
2.	ДЕ-4. Вопрос-2 ДИГОКСИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного введения 0.25 мг/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
3.	ДЕ-4. Вопрос-3 АМИОДАРОН (КОРДАРОН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного введения 0.25 мг/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
4.	ДЕ-4. Вопрос-4 АМИОДАРОН (КОРДАРОН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 200 мг, №30 - 10 шт. Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
5.	ДЕ-4. Вопрос-5 АМИОДАРОН (КОРДАРОН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного введения 50 мг/мл, №6 - ампула 3 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
6.	ДЕ-4. Вопрос-6 ВЕРАПАМИЛ (ИЗОПТИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытых оболочкой 40 мг и 80 мг, №20 Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
7.	ДЕ-4. Вопрос-7 ВЕРАПАМИЛ (ИЗОПТИН СР240 или Isoptin® SR 240) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой 240 мг, №10 Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) пластырь 500/10 мг @	А
8.	ДЕ-4. Вопрос-8 НИТРОГЛИЦЕРИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного введения 1 мг/мл, флакон 50 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
9.	ДЕ-4. Вопрос-9 НИТРОГЛИЦЕРИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток сублингвальные 0.5 мг, №10 - 10 шт. Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг	А

	В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	
10.	ДЕ-4. Вопрос-10 НИТРОГЛИЦЕРИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсулы подъязычные 0.5 мг, №120 - 20 шт. Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
11.	ДЕ-4. Вопрос-11 НИТРОГЛИЦЕРИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) спрей подъязычный дозированный 0.4 мг/доза, флакон (200 доз) Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
12.	ДЕ-4. Вопрос-12 НИТРОГЛИЦЕРИН (НИТРОДЕРМ ТТС 10)ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) 30 пластырей в виде терапевтической транс-дермальной системы Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
13.	ДЕ-4. Вопрос-13 ЭНАЛАПРИЛ (РЕНИТЕК) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 5 мг / 10 мг / 30 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
14.	ДЕ-4. Вопрос-14 ЭНАЛАПРИЛ (ЭНАП) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 2,5 мг / 5 мг / 10 мг / 20 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
15.	ДЕ-4. Вопрос-15 ПЕРИНДОПРИЛ (ПРЕСТАРИУМ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 2 мг / 4 мг / 8 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
16.	ДЕ-4. Вопрос-16 ЛОЗАРТАН (КОЗААР) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг / 100 мг, №14 Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
17.	ДЕ-4. Вопрос-17 СИМВАСТАТИН (ЗОКОР) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг / 20 мг, №14 Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
18.	ДЕ-4. Вопрос-18 ГЕПАРИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного и подкожного введения 5000 МЕ/мл, №5 - ампула 5 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30%	А

	Г) саше 500/10 мг @	
19.	ДЕ-4. Вопрос-19 ГЕПАРИН (ТРОМБЛЕСС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) геля для наружного применения 1000 ЕД/г, туба алюминиевая 30 г Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
20.	ДЕ-4. Вопрос-20 ФУРОСЕМИД (ЛАЗИКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 40 мг, №45 - 15 шт. Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
21.	ДЕ-4. Вопрос-21 ФУРОСЕМИД (ЛАЗИКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, №10 - ампула 2 мл Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
22.	ДЕ-4. Вопрос-22 ГИДРОХЛОРТИАЗИД (ГИПОТИАЗИД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 25 мг / 100 мг, №20 - 20 шт. Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
23.	ДЕ-4. Вопрос-23 ВИНПОЦЕТИН (КАВИНТОН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 5 мг, №25 - 25 шт. Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
24.	ДЕ-4. Вопрос-24 АЛЛОПУРИНОЛ ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 100 мг / 300 мг , №50 - 10 шт. Б) капсул 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
25.	ДЕ-4. Вопрос-25 АМИНОФИЛЛИН (ЭУФИЛЛИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 150 мг, №10 - 10 шт. Б) капсул 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
26.	ДЕ-4. Вопрос-26 АМИНОФИЛЛИН (ЭУФИЛЛИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного введения 24 мг/мл, №5 - ампула 10 мл Б) капсул 500 мг В) гель 30% Г) саше 500/10 мг @	А
27.	ДЕ-4. Вопрос-27 ФОРМА ВЫПУСКА ГЕПАРИНА:	А

	А) мазь Б) таблетки для приема внутрь В) капсулы в масле Г) спрей сублингвальный @	
28.	ДЕ-4. Вопрос-28 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА НИТРОГЛИЦЕРИНА: А) спрей сублингвальный Б) суппозитории ректальные В) гель для наружного применения Г) спрей назальный @	А
29.	ДЕ-4. Вопрос-29 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ПРОКАИНАМИД: А) новокаиномид Б) кордарон В) изоптин Г) коринфар @	А
30.	ДЕ-4. Вопрос-30 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АМИОДАРОН: А) кордарон Б) новокаиномид В) изоптин Г) коринфар @	А
31.	ДЕ-4. Вопрос-31 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ВЕРАПАМИЛ: А) изоптин Б) кордарон В) новокаиномид Г) коринфар @	А
32.	ДЕ-4. Вопрос-32 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН НИФЕДИПИН: А) коринфар Б) кордарон В) изоптин Г) новокаиномид @	А
33.	ДЕ-4. Вопрос-33 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АМЛОДИПИН: А) норваск Б) кордарон В) изоптин Г) коринфар @	А
34.	ДЕ-4. Вопрос-34 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ: А) моночинкве Б) кордарон В) изоптин Г) новокаиномид @	А
35.	ДЕ-4. Вопрос-35 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН МОЛСИДАМИН: А) карватон Б) кордарон В) изоптин Г) новокаиномид @	А
36.	ДЕ-4. Вопрос-36 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ИВАБРАДИН: А) кораксан Б) кордарон В) изоптин Г) новокаиномид @	А
37.	ДЕ-4. Вопрос-37	А

	ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ДИПИРИДАМОЛ: А) курантил Б) кордарон В) изоптин Г) новокаиномид @	
38.	ДЕ-4. Вопрос-38 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ТРИМЕТАЗИДИН: А) предуктал Б) кордарон В) изоптин Г) новокаиномид @	А
39.	ДЕ-4. Вопрос-39 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЭНАЛАПРИЛ: А) ренитек Б) козаар В) зокор Г) престариум @	А
40.	ДЕ-4. Вопрос-40 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЭНАЛАПРИЛ: А) энап Б) козаар В) зокор Г) престариум @	А
41.	ДЕ-4. Вопрос-41 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ПЕРИНДОПРИЛ: А) престариум Б) козаар В) зокор Г) энап @	А
42.	ДЕ-4. Вопрос-42 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЛОЗАРТАН: А) козаар Б) ренитек В) зокор Г) престариум @	А
43.	ДЕ-4. Вопрос-43 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН СИМВАСТАТИН: А) зокор Б) козаар В) энап Г) престариум @	А
44.	ДЕ-4. Вопрос-44 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ФЕНОФИБРАТ: А) трайкор Б) козаар В) зокор Г) престариум @	А
45.	ДЕ-4. Вопрос-45 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ДИОСМИН+ГЕСПИРИДИН: А) детралекс Б) дицинон В) тардиферон Г) эритропозтин @	А
46.	ДЕ-4. Вопрос-46 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЭТАМЗИЛАТ: А) дицинон Б) детралекс В) тардиферон Г) эритропозтин	А

	@	
47.	ДЕ-4. Вопрос-47 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЖЕЛЕЗА СУЛЬФАТ: А) тардиферон Б) детралекс В) дицинон Г) эритропозтин @	А
48.	ДЕ-4. Вопрос-48 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЭПОЭТИН-БЕТА: А) эритропозтин Б) детралекс В) тардиферон Г) дицинон @	А
49.	ДЕ-4. Вопрос-49 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН МОЛГРАМОСТИМ: А) лейкомакс Б) детралекс В) тардиферон Г) дицинон @	А
50.	ДЕ-4. Вопрос-50 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЭНОКСАПРИН НАТРИЯ: А) клексан Б) плавикс В) актилизе Г) циклокапрон @	А
51.	ДЕ-4. Вопрос-51 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН КЛОПИДОГРЕЛ: А) плавикс Б) клексан В) актилизе Г) циклокапрон @	А
52.	ДЕ-4. Вопрос-52 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АЛТЕПЛАЗА: А) актилизе Б) плавикс В) клексан Г) циклокапрон @	А
53.	ДЕ-4. Вопрос-53 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АПРОТИНИН: А) контрикал Б) плавикс В) актилизе Г) циклокапрон @	А
54.	ДЕ-4. Вопрос-54 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ФУРОСЕМИД: А) лазикс Б) гипотиазид В) арифон Г) престариум @	А
55.	ДЕ-4. Вопрос-55 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ГИДРОХЛОРТИАЗИД: А) гипотиазид Б) лазикс В) арифон Г) престариум @	А
56.	ДЕ-4. Вопрос-56 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ИНДАПАМИД: А) арифон Б) гипотиазид	А

	В) лазикс Г) престариум @	
57.	ДЕ-4. Вопрос-57 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АЛИСКИРЕН: А) расилез Б) гипотиазид В) лазикс Г) престариум @	А
58.	ДЕ-4. Вопрос-58 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АЦЕТАЗОЛАМИД: А) диакарб Б) гипотиазид В) лазикс Г) престариум @	А
59.	ДЕ-4. Вопрос-59 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН СПИРОНОЛАКТОН: А) верошпирон Б) гипотиазид В) лазикс Г) престариум @	А
60.	ДЕ-4. Вопрос-60 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН МАННИТОЛ: А) маннит Б) гипотиазид В) лазикс Г) престариум @	А
61.	ДЕ-4. Вопрос-61 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН НИЦЕРГОЛИН: А) сермион Б) гипотиазид В) лазикс Г) престариум @	А
62.	ДЕ-4. Вопрос-62 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ПЕНТОКСИФИЛЛИН: А) трентал Б) гипотиазид В) лазикс Г) престариум @	А
63.	ДЕ-4. Вопрос-63 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН НИМОДИПИН: А) нимотоп Б) гипотиазид В) лазикс Г) престариум @	А
64.	ДЕ-4. Вопрос-64 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИНОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ ПОВЫШЕНИЕ: А) силы сердечных сокращений Б) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) В) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца Г) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца @	А
65.	ДЕ-4. Вопрос-65 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ БАТМОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ ПОВЫШЕНИЕ: А) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) Б) силы сердечных сокращений В) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца Г) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца @	А

66.	ДЕ-4. Вопрос-66 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ХРОНОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ ПОВЫШЕНИЕ: А) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца Б) силы сердечных сокращений В) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) Г) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца @	А
67.	ДЕ-4. Вопрос-67 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДРОМОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ ПОВЫШЕНИЕ: А) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца Б) силы сердечных сокращений В) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) Г) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца @	А
68.	ДЕ-4. Вопрос-68 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИНОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ СНИЖЕНИЕ: А) силы сердечных сокращений Б) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) В) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца Г) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца @	А
69.	ДЕ-4. Вопрос-69 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ БАТМОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ СНИЖЕНИЕ: А) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) Б) силы сердечных сокращений В) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца Г) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца @	А
70.	ДЕ-4. Вопрос-70 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ХРОНОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ СНИЖЕНИЕ: А) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца Б) силы сердечных сокращений В) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) Г) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца @	А
71.	ДЕ-4. Вопрос-71 ЕСЛИ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДРОМОТРОПНЫМ ЭФФЕКТОМ, ТО ЕГО ЭФФЕКТОМ БУДЕТ СНИЖЕНИЕ: А) проводимости электрических импульсов по проводящей системе сердца Б) силы сердечных сокращений В) автоматизма Р - клеток (пейсмекеров или пейсмекерных клеток) Г) частоты генерации потенциалов действия и сокращений сердца @	А
72.	ДЕ-4. Вопрос-72 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКАТОРОВ β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ А) ИБС Б) бронхиальная астма В) артериальная гипотензия Г) сахарный диабет I типа @	А
73.	ДЕ-4. Вопрос-73 ВЛИЯНИЕ ДИГОКСИНА НА РАБОТУ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: А) увеличение силы сердечных сокращений Б) увеличение частоты сердечных сокращений В) увеличение одышки Г) снижение диуреза @	А
74.	ДЕ-4. Вопрос-74 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ: А) симвастатин Б) валидол В) амиодарон Г) аллопуринол @	А

75.	ДЕ-4. Вопрос-75 БЛОКАТОР Са-КАНАЛОВ: А) верапамил Б) прокаинамид В) нитроглицерин Г) алискирен @	A
76.	ДЕ-4. Вопрос-76 ОСНОВНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БЛОКАТОРОВ Са-КАНАЛОВ: А) гипотензивный Б) антиагрегантный В) противовоспалительный Г) анальгезирующий @	A
77.	ДЕ-4. Вопрос-77 ПРЕПАРАТ ГРУППЫ НИТРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ИБС: А) нитроглицерин Б) ивабрадин В) триметазидин Г) каптоприл @	A
78.	ДЕ-4. Вопрос-78 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: А) винпоцетин Б) коргликон В) тромбин Г) протамина сульфат @	A
79.	ДЕ-4. Вопрос-79 КАЛИЙВЫВОДЯЩИЙ ДИУРЕТИК: А) фуросемид Б) спиронолактон В) верошпирон Г) ацетазоламид @	A
80.	ДЕ-4. Вопрос-80 ГИПОТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ: А) эналаприл Б) доксазозин В) магния сульфат Г) лозартан @	A
81.	ДЕ-4. Вопрос-81 ЭТАМЗИЛАТ: А) ангиопротектор Б) антиаритмическое средство В) препятствует свертыванию крови Г) применяется для профилактики тромбозов мелких сосудов @	A
82.	ДЕ-4. Вопрос-82 МЕХАНИЗМ КАРДИОТОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ: А) ингибирование Na^+/K^+ -АТФ-азы мембран кардиомиоцитов Б) стимуляция β_1 -адренорецепторов сердца В) блокада ангиотензинпревращающего фермента Г) стимуляция М-холинорецепторов сердца @	A
83.	ДЕ-4. Вопрос-83 ИНГИБИРУЕТ 3-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛ-ГЛУТАРИЛ КОЭНЗИМ А-РЕДУКТАЗУ (ГМГ-КО-А-РЕДУКТАЗУ): А) симвастатин Б) валидол В) мексидол Г) аллопуринол @	A
84.	ДЕ-4. Вопрос-84 БЛОКАТОР АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ: А) лозартан Б) эналаприл В) каптоприл Г) периндоприл @	A
85.	ДЕ-4. Вопрос-85 ДИУРЕТИК – АНТАГОНИСТ АЛЬДОСТЕРОНА: А) спиронолактон Б) фуросемид В) маннитол	A

	Г) ацетазоламид @	
86.	ДЕ-4. Вопрос-86 КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИЙ ДИУРЕТИК: А) спиронолактон Б) фуросемид В) гидрохлортиазид Г) ацетазоламид @	А
87.	ДЕ-4. Вопрос-87 ОСМОТИЧЕСКИЙ ДИУРЕТИК: А) маннитол Б) фуросемид В) гидрохлортиазид Г) ацетазоламид @	А
88.	ДЕ-4. Вопрос-88 ПРЕПАРАТ, У КОТОРОГО ДИУРЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ НА 2–3 СУТКИ: А) спиронолактон Б) фуросемид В) маннитол Г) гидрохлортиазид @	А
89.	ДЕ-4. Вопрос-89 БЛОКАТОР РЕНИНА ПОЧЕК: А) алискирен Б) каптоприл В) лозартан Г) периндоприл @	А
90.	ДЕ-4. Вопрос-90 ПРИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИМЕНЯЮТ: А) силденафила цитрат (виагра) Б) симвастатин В) валидол Г) аллопуринол @	А
91.	ДЕ-4. Вопрос-91 ЛС, БЛОКИРУЮЩЕЕ К-КАНАЛЫ И УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД: А) амиодарон Б) триметазидин В) дипиридамола Г) прокаинамид @	А
92.	ДЕ-4. Вопрос-92 КАРДИОПРОТЕКТОР, НОРМАЛИЗУЮЩИЙ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИОКАРДЕ ПРИ ИБС: А) триметазидин Б) дипиридамола В) прокаинамид Г) амиодарон @	А
93.	ДЕ-4. Вопрос-93 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО И КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: А) мексидол Б) дипиридамола В) прокаинамид Г) амиодарон @	А
94.	ДЕ-4. Вопрос-94 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ: А) аллопуринол Б) симвастатин В) коргликон Г) мексидол @	А
95.	ДЕ-4. Вопрос-95 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ КОРГЛИКОНА: А) хроническая сердечная недостаточность Б) стенокардия В) гипертензия Г) тромбоз вен нижних конечностей @	А
96.	ДЕ-4. Вопрос-96 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИВАБРАДИНА:	А

	А) блокирует If-каналы синусового узла Б) блокирует Na-каналы волокон Пуркинье В) блокирует Са-каналы синусового и атриовентрикулярного узлов Г) блокирует β_1 -адренорецепторы сердца @	
97.	ДЕ-4. Вопрос-97 МЕХАНИЗМ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ: А) ингибирует фермент ТАГ-липазу Б) ингибирует фермент ГМГ-КоА-редуктазу В) активирует фермент ЛП-липазу Г) нарушает всасывание холестерина в кишечнике @	А
98.	ДЕ-4. Вопрос-98 БОЛЬНОМУ А. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТЕЧНОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ БЫЛ НАЗНАЧЕН ФУРОСЕМИД. ВМЕСТО ФУРОСЕМИДА БОЛЬНОМУ ПО ОШИБКЕ ВВЕЛИ ДРУГОЕ МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО, ПОСЛЕ ЧЕГО У НЕГО РАЗВИЛСЯ ОТЕК ЛЕГКИХ. КАКОЕ МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО ВВЕЛИ БОЛЬНОМУ? А) маннитол Б) спиронолактон В) гидрохлортиазид Г) все неверно @	А
99.	ДЕ-4. Вопрос-99 МЕХАНИЗМ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА СИМВАСТАТИНА (ЗОКОР) ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП: А) компенсаторное увеличение плотности ЛПНП-рецепторов печени и последующий захват ЛПНП из крови в печень Б) активация фермента ГМГ-КоА-редуктазы В) ингибирование фермента ЛП-липазы Г) нарушение образования холестерина в печени на стадии мевалоновой кислоты @	А
100.	ДЕ-4. Вопрос-100 МЕХАНИЗМ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ФЕНОФИБРАТА (ЛИПАНИЛ 200М) ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП: А) усиление катаболизма ЛПОНП и ЛППП в кровеносном русле Б) ингибирование фермента ЛП-липазы В) ингибирование фермента ГМГ-КоА-редуктазы Г) компенсаторное увеличение плотности ЛПНП-рецепторов печени и последующий захват ЛПНП из крови в печень @	А
101.	ДЕ-4. Вопрос-101 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭНАЛАПРИЛА: А) хроническая сердечная недостаточность Б) артериальная гипотензия В) мерцательная аритмия Г) глаукома @	А
102.	ДЕ-4. Вопрос-102 ПЛЕЙОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ: А) восполнение дефицита витамина РР Б) сильное антикоагулянтное действие В) вазоконстрикция мелких сосудов Г) снижение уровня ТАГ и ЛПОНП в крови @	А
103.	ДЕ-4. Вопрос-103 ЭНАЛАПРИЛ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ СУХОЙ КАШЕЛЬ ВСЛЕДСТВИЕ: А) нарушения катаболизма брадикинина Б) прямого раздражения слизистых дыхательных путей В) активации АПФ Г) ингибирования калликрейна @	А
104.	ДЕ-4. Вопрос-104 БОЛЬНОЙ А. СТРАДАЕТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ. КАКОЕ АНТИАНГИНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВОПОКАЗАНО ДАННОМУ БОЛЬНОМУ? А) пропранолол Б) ивабрадин В) амлодипин Г) нитроглицерин @	А
105.	ДЕ-4. Вопрос-105 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ: А) нитроглицерин Б) метопролол В) дигоксин Г) допамин @	А
106.	ДЕ-4. Вопрос-106	А

	БОЛЬНОМУ С. ПО ПОВОДУ СТЕНОКАРДИИ НАЗНАЧЕНЫ КАПСУЛЫ НИТРОГЛИЦЕРИНА. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО КУПИРОВАТЬ ПРИСТУПЫ СТЕНОКАРДИИ? А) сидя Б) стоя В) лежа на спине Г) лежа на боку @	
107.	ДЕ-4. Вопрос-107 БОЛЬНОЙ А. СТРАДАЕТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ. СРЕДСТВО КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПРОТИВОПОКАЗАНО ДАННОМУ БОЛЬНОМУ? А) β-адреноблокаторы Б) блокаторы медленных кальциевых каналов В) миотропные коронарорасширяющие средства Г) органические нитраты @	А
108.	ДЕ-4. Вопрос-108 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИВАБРАДИНА: А) блокирует If-каналы синусового узла Б) блокирует Na-каналы волокон Пуркинье В) блокирует Са-каналы синусового и атриовентрикулярного узлов Г) блокирует β ₁ -адренорецепторы сердца @	А
109.	ДЕ-4. Вопрос-109 β-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРИ ИБС: А) снижают потребность миокарда в кислороде Б) увеличивают доставку кислорода к миокарду В) снижают потребность и увеличивают доставку кислорода к миокарду Г) увеличивают потребность миокарда в кислороде @	А
110.	ДЕ-4. Вопрос-110 БЛОКАТОРЫ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ИБС: А) снижают потребность и увеличивают доставку кислорода к миокарду Б) снижают потребность миокарда в кислороде В) увеличивают доставку кислорода к миокарду Г) увеличивают потребность миокарда в кислороде @	А
111.	ДЕ-4. Вопрос-111 ОРГАНИЧЕСКИЕ НИТРАТЫ ПРИ ИБС: А) снижают потребность и увеличивают доставку кислорода к миокарду Б) снижают потребность миокарда в кислороде В) увеличивают потребность миокарда в кислороде Г) увеличивают доставку кислорода к миокарду @	А
112.	ДЕ-4. Вопрос-112 АНТИАНГИНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОБУСЛОВЛЕН: А) расширением коронарных сосудов и увеличением доставки кислорода к миокарду Б) сужением коронарных сосудов и уменьшением доставки кислорода к миокарду В) расширением емкости сосудов и увеличением преднагрузки на сердце Г) сужением резистивных сосудов и уменьшением постнагрузки на сердце @	А
113.	ДЕ-4. Вопрос-113 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КАПТОПРИЛА: А) ингибирует АПФ Б) ингибирует ренин В) блокирует рецепторы ангиотензина II Г) блокирует медленные кальциевые каналы @	А
114.	ДЕ-4. Вопрос-114 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АЛИСКИРЕНА: А) ингибирует ренин Б) ингибирует АПФ В) блокирует рецепторы ангиотензина II Г) блокирует медленные кальциевые каналы @	А
115.	ДЕ-4. Вопрос-115 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВЕРАПАМИЛА: А) блокирует медленные кальциевые каналы Б) ингибирует ренин В) ингибирует АПФ Г) блокирует рецепторы ангиотензина II @	А
116.	ДЕ-4. Вопрос-116 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИФЕДИПИНА: А) блокирует медленные кальциевые каналы Б) ингибирует ренин В) ингибирует АПФ	А

	Г) блокирует рецепторы ангиотензина II @	
117.	ДЕ-4. Вопрос-117 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АМЛОДИПИНА: А) блокирует медленные кальцевые каналы Б) ингибирует ренин В) ингибирует АПФ Г) блокирует рецепторы ангиотензина II @	А
118.	ДЕ-4. Вопрос-118 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НИФЕДИПИНА: А) синдром обкрадывания Б) сухой кашель В) гипогликемия Г) рефлекторная брадикардия @	А
119.	ДЕ-4. Вопрос-119 АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО – ПРЯМОЙ ИНГИБИТОР РЕНИНА: А) алискирен Б) валсартан В) каптоприл Г) эналаприл @	А
120.	ДЕ-4. Вопрос-120 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДОКСАЗОЗИНА: А) гипотензивный Б) гипертензивный В) гипергликемический Г) ухудшение оттока мочи при доброкачественной гиперплазии предстательной железы @	А
121.	ДЕ-4. Вопрос-121 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ДОКСАЗОЗИНА: А) ортостатическая гипотензия при первых приемах Б) артериальная гипертензия В) спазм мелких сосудов слизистой носа Г) брадикардия @	А
122.	ДЕ-4. Вопрос-122 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ИНГИБИТОРОВ АПФ: А) сухой кашель Б) гипокалиемия В) гипертензия Г) задержка натрия и воды @	А
123.	ДЕ-4. Вопрос-123 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ОРГАНИЧЕСКИХ НИТРАТОВ: А) метгемоглобинемия Б) брадикардия В) цианоз кожи лица Г) артериальная гипертензия @	А
124.	ДЕ-4. Вопрос-124 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ Фуросемида: А) угнетает ко-транспорт ионов натрия, калия, хлора в толстом сегменте восходящей части петли Генле Б) ингибирует фермент карбоангидразу В) ингибирует симпорт ионов натрия и хлора в дистальных канальцах Г) повышает осмотическое давление в просвете почечных канальцев @	А
125.	ДЕ-4. Вопрос-125 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ Маннитола: А) повышает осмотическое давление в просвете почечных канальцев Б) ингибирует фермент карбоангидразу В) ингибирует симпорт ионов натрия и хлора в дистальных канальцах Г) угнетает ко-транспорт ионов натрия, калия, хлора в толстом сегменте восходящей части петли Генле @	А
126.	ДЕ-4. Вопрос-126 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ Спиронолактона: А) блокирует альдостероновые рецепторы в конечном отделе дистальных канальцев и собирательных трубочках Б) ингибирует фермент карбоангидразу В) ингибирует симпорт ионов натрия и хлора в дистальных канальцах Г) угнетает ко-транспорт ионов натрия, калия, хлора в толстом сегменте восходящей части петли Генле @	А
127.	ДЕ-4. Вопрос-127 КАЛИЙВЫВОДЯЩИЙ ДИУРЕТИК:	А

	А) фуросемид Б) маннитол В) спиронолактон Г) аминофиллин @	
128.	ДЕ-4. Вопрос-128 КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИЙ ДИУРЕТИК, АНТАГОНИСТ АЛЬДОСТЕРОНА, ДИУРЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КОТОРОГО РАЗВИВАЕТСЯ НА 2–5 ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОМБИНАЦИИ С ТИАЗИДНЫМИ И ПЕТЛЕВЫМИ ДИУРЕТИКАМИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИПОКАЛИЕМИИ. А) спиронолактон Б) ацетазоламид В) фуросемид Г) торасемид @	А
129.	ДЕ-4. Вопрос-129 ДИУРЕТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ: А) ацетазоламид Б) маннитол В) спиронолактон Г) индапамид @	А
130.	ДЕ-4. Вопрос-130 В БОЛЬНИЦУ ГОРОДА С. ПОСТУПИЛ БОЛЬНОЙ С ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ НЕИЗВЕСТНЫМ ПРЕПАРАТОМ. СИМПТОМЫ: ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, СПУТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ, ДВОЕНИЕ В ГЛАЗАХ, ТОШНОТА, РВОТА, БОЛИ В ЖИВОТЕ, ПОНОС, СБОИ В РАБОТЕ СЕРДЦА – ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛИЯ. ПРИ СБОРЕ АНАМНЕЗА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО БОЛЬНОЙ СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ПРИНИМАЕТ «СЕРДЕЧНЫЙ ПРЕПАРАТ», КОТОРЫЙ ПО ЗАБЫВЧИВОСТИ ПРИНЯЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ. КАКИМ ЛС ПРОИЗОШЛО ОТРАВЛЕНИЕ? А) дигоксин Б) клонидин В) амиодарон Г) добутамин @	А
131.	ДЕ-4. Вопрос-131 МЕХАНИЗМ КАРДИОТОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ: А) ингибирование Na^+/K^+ -АТФ-азы мембран кардиомиоцитов Б) стимуляция β_1 -адренорецепторов сердца В) ингибирование АПФ Г) стимуляция М-холинорецепторов сердца @	А
132.	ДЕ-4. Вопрос-132 КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО НЕГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ: А) добутамин Б) дигоксин В) атропин Г) дипиридамола @	А
133.	ДЕ-4. Вопрос-133 ПРИ МИГРЕНИ ПРИМЕНЯЮТ: А) суматриптан (имигран) Б) диосмин+гесперидин (детралекс) В) этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) Г) пентоксифиллин (трентал) @	А
134.	ДЕ-4. Вопрос-134 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СУМАТРИПТАНА: А) агонист серотониновых 5-HT_1 -рецепторов Б) агонист серотониновых 5-HT_2 -рецепторов В) блокатор α -адренорецепторов Г) агонист дофаминовых D_1 -рецепторов @	А
135.	ДЕ-4. Вопрос-135 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИЦЕРГОЛИНА: А) блокатор α -адренорецепторов Б) агонист серотониновых 5-HT_2 -рецепторов В) агонист серотониновых 5-HT_1 -рецепторов Г) агонист дофаминовых D_1 -рецепторов @	А
136.	ДЕ-4. Вопрос-136 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФЕНОФИБРАТА: А) активирует фермент ЛП-липазу Б) ингибирует фермент ГМГ-КоА-редуктазу В) ингибирует фермент ТАГ-липазу Г) является ионообменной смолой и связывает желчные кислоты в просвете кишечника @	А

137.	ДЕ-4. Вопрос-137 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛИДОЛА: А) функциональная кардиалгия Б) бронхиальная астма В) сахарный диабет Г) тахикардия @	А
138.	ДЕ-4. Вопрос-138 БЛОКАТОР НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ ПОДГРУППЫ I В: А) фенитоин Б) ивабрадин В) амлодипин Г) метопролол @	А
139.	ДЕ-4. Вопрос-139 БЛОКАТОР НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ ПОДГРУППЫ I А: А) прокаинамид Б) лидокаин В) норваск Г) триметазидин @	А
140.	ДЕ-4. Вопрос-140 ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ НАДЖЕЛУДОЧКОВЫХ ЭКСТРАСИСТОЛИЯХ И ТАХИКАРДИЯХ: А) пропранолол Б) фенитоин В) лидокаин Г) валидол @	А
141.	ДЕ-4. Вопрос-141 ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИКАРДИЯХ И ЭКСТРАСИСТОЛИЯХ: А) фенитоин Б) верапамил В) прокаинамид Г) ризерпин @	А
142.	ДЕ-4. Вопрос-142 ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, СПОСОБНОЕ ПРОЛОНГИРОВАТЬ РЕПОЛЯРИЗАЦИЮ: А) амиодарон Б) верапамил В) нифедипин Г) лидокаин @	А
143.	ДЕ-4. Вопрос-143 КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ: А) дигоксин Б) добутамин В) милринон Г) атропин @	А
144.	ДЕ-4. Вопрос-144 ПРЕПАРАТ, НАЗНАЧАЕМЫЙ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ: А) панангин Б) нифедипин В) дигоксин Г) коргликон @	А
145.	ДЕ-4. Вопрос-145 СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИБС: А) β-блокаторы Б) М-холиноблокаторы В) сердечные гликозиды Г) психостимуляторы центрального действия @	А
146.	ДЕ-4. Вопрос-146 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: А) ингибиторы АПФ Б) α-адреномиметики В) стимуляторы ангиотензиновых рецепторов Г) кардиотонические средства гликозидной структуры @	А
147.	ДЕ-4. Вопрос-147 КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) добутамин Б) метопролол	А

	В) атропин Г) сульбутамол @	
148.	ДЕ-4. Вопрос-148 ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИНОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ: А) добутамин Б) метопролол В) верапамил Г) карведилол @	А
149.	ДЕ-4. Вопрос-149 ПРЕПАРАТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ТОЛСТОМ СЕГМЕНТЕ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ПЕТЛИ ГЕНЛЕ: А) фуросемид Б) маннитол В) ацетазоламид Г) спиронолактон @	А
150.	ДЕ-4. Вопрос-150 ПРЕПАРАТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ТОЛСТОМ СЕГМЕНТЕ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ПЕТЛИ ГЕНЛЕ: А) торасемид Б) маннитол В) ацетазоламид Г) спиронолактон @	А
151.	ДЕ-4. Вопрос-151 ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ТИАЗИДОПОДОБНЫМ ДИУРЕТИКАМ: А) индапамин Б) маннитол В) фуросемид Г) гидрохлортиазид @	А
152.	ДЕ-4. Вопрос-152 ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ПЕТЛЕВЫМ ДИУРЕТИКАМ: А) фуросемид Б) маннитол В) индапамид Г) гидрохлортиазид @	А
153.	ДЕ-4. Вопрос-153 ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ОСМОТИЧЕСКИМ ДИУРЕТИКАМ: А) маннитол Б) фуросемид В) индапамид Г) гидрохлортиазид @	А
154.	ДЕ-4. Вопрос-154 ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКАМ: А) спиронолактон Б) торасемид В) ацетазоламид Г) гидрохлортиазид @	А
155.	ДЕ-4. Вопрос-155 ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МАННИТОЛА: А) застойная сердечная недостаточность Б) отек мозга В) острый приступ глаукомы Г) повышение внутричерепного давления @	А
156.	ДЕ-4. Вопрос-156 АНТАГОНИСТ КАЛЬЦИЯ, В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА СЕРДЦЕ, ЧЕМ НА СОСУДЫ: А) верапамил Б) нифедипин В) амлодипин Г) фелодипин @	А
157.	ДЕ-4. Вопрос-157 ПРЕПАРАТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ БРАДИКАРДИЮ: А) верапамил Б) нифедипин В) амлодипин Г) фелодипин @	А
158.	ДЕ-4. Вопрос-158 ПРЕПАРАТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ОТЕК ЛОДЫЖЕК И ГОЛЕНИ:	А

	А) нифедипин Б) метопролол В) ивабрадин Г) амиодарон @	
159.	ДЕ-4. Вопрос-159 ПРЕПАРАТ, НАРУШАЮЩИЙ ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: А) амиодарон Б) метопролол В) лидокаин Г) фенитоин @	А
160.	ДЕ-4. Вопрос-160 АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД: А) амиодарон Б) верапамил В) лидокаин Г) фенитоин @	А
161.	ДЕ-4. Вопрос-161 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ДИГОКСИНА: А) кардиотонический Б) антиишемический В) гипотензивный Г) гиполипидемический @	А
162.	ДЕ-4. Вопрос-162 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АТОРВАСТАТИНА: А) ингибирует ГМГ-КоА-редуктазу Б) активирует ЛП-липазу В) ингибирует ТАГ-липазу Г) нарушает всасывание холестерина @	А
163.	ДЕ-4. Вопрос-163 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СИМВАСТАТИНА: А) ингибирует ГМГ-КоА-редуктазу Б) активирует ЛП-липазу В) ингибирует ТАГ-липазу Г) нарушает всасывание холестерина @	А
164.	ДЕ-4. Вопрос-164 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РОЗУВАСТАТИНА: А) ингибирует ГМГ-КоА-редуктазу Б) активирует ЛП-липазу В) ингибирует ТАГ-липазу Г) нарушает всасывание холестерина @	А
165.	ДЕ-4. Вопрос-165 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФЕНОФИБРАТА: А) активирует ЛП-липазу Б) ингибирует ГМГ-КоА-редуктазу В) ингибирует ТАГ-липазу Г) нарушает всасывание холестерина @	А
166.	ДЕ-4. Вопрос-166 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭЗЕТИМИБА: А) нарушает всасывание холестерина Б) активирует ЛП-липазу В) ингибирует ТАГ-липазу Г) ингибирует ГМГ-КоА-редуктазу @	А
167.	ДЕ-4. Вопрос-167 ПРЕПАРАТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ МИАЛГИЮ И РАБДОМИОЛИЗ: А) аторвастатин Б) эзетимб В) никотиновая кислота Г) колестирамин @	А
168.	ДЕ-4. Вопрос-168 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ СТАТИНОВ: А) гепатотоксичность Б) проаритмогенное действие В) почернение стула Г) стеаторея @	А

169.	ДЕ-4. Вопрос-169 ПРЕПАРАТ, ИНГИБИРУЮЩИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЛИПАЗЫ: А) орлистат Б) аторвастатин В) никотиновая кислота Г) коlestирамин @	А
170.	ДЕ-4. Вопрос-170 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ОРЛИСТАТА: А) стеаторея Б) проаритмогенное действие В) почернение стула Г) фотодерматоз @	А
171.	ДЕ-4. Вопрос-171 СЕКВЕСТРАНТ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ: А) коlestирамин Б) аторвастатин В) никотиновая кислота Г) орлистат @	А
172.	ДЕ-4. Вопрос-172 ПРЕПАРАТ, ВОСПОЛНЯЮЩИЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА РР: А) никотиновая кислота Б) аторвастатин В) орлистат Г) коlestирамин @	А
173.	ДЕ-4. Вопрос-173 ПРЕПАРАТ, ИНГИБИРУЮЩИЙ АПФ: А) эналаприл Б) валсартан В) алискирен Г) метопролол @	А
174.	ДЕ-4. Вопрос-174 ПРЕПАРАТ, БЛОКИРУЮЩИЙ РЕЦЕПТОРЫ АНГИОТЕНЗИНА: А) валсартан Б) эналаприл В) алискирен Г) метопролол @	А
175.	ДЕ-4. Вопрос-175 ПРЕПАРАТ, УМЕНЬШАЮЩИЙ СЕКРЕЦИЮ РЕНИНА ПОЧКАМИ: А) метопролол Б) эналаприл В) алискирен Г) валсартан @	А
176.	ДЕ-4. Вопрос-176 ПРЕПАРАТ, ИНГИБИРУЮЩИЙ РЕНИН: А) алискирен Б) эналаприл В) метопролол Г) валсартан @	А
177.	ДЕ-4. Вопрос-177 ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ЭНАЛАПРИЛ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ СУХОЙ КАШЕЛЬ: А) нарушение инактивации брадикинина Б) блокада ангиотензиновых рецепторов В) блокада β_2 -адренорецепторов бронхов Г) ингибирование печеночных трансаминаз @	А
178.	ДЕ-4. Вопрос-178 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ БЛОКАТОРОВ АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ: А) сартаны Б) кирены В) фибраты Г) статины @	А
179.	ДЕ-4. Вопрос-179 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ ГМГ-КоА РЕДУКТАЗЫ: А) статины Б) кирены В) фибраты	А

	Г) сартаны @	
180.	ДЕ-4. Вопрос-180 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ АКТИВАТОРОВ ЛП-ЛИПАЗЫ: А) фибраты Б) кирены В) сартаны Г) статины @	А
181.	ДЕ-4. Вопрос-181 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА: А) каптоприл Б) индапамид В) ацетазоламид Г) гидрохлортиазид @	А
182.	ДЕ-4. Вопрос-182 ПРЕПАРАТ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРОГО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ НАКОПЛЕНИЕ ЦИАНИДОВ И ТИОЦИАНАТОВ: А) нитропруссид натрия Б) индапамид В) ацетазоламид Г) гидрохлортиазид @	А
183.	ДЕ-4. Вопрос-183 ПРЕПАРАТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ОРТОСТАТИЧЕСКУЮ ГИПОТЕНЗИЮ ПРИ ПРИЕМЕ ПЕРВОЙ ДОЗЫ: А) доксазозин Б) валсартан В) ацетазоламид Г) мексидол @	А
184.	ДЕ-4. Вопрос-184 АНТИАРИТМИК, БЛОКИРУЮЩИЙ ТОЛЬКО НАТРИЕВЫЕ КАНАЛЫ: А) лидокаин Б) амиодарон В) дилтиазем Г) верапамил @	А
185.	ДЕ-4. Вопрос-185 ПРЕПАРАТ В СУБЛИНГВАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ: А) нитроглицерин Б) метопролол В) нитропруссид натрия Г) дигоксин @	А
186.	ДЕ-4. Вопрос-186 ПРЕПАРАТ, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРЕН СИНДРОМ ОБКРАДЫВАНИЯ: А) нифедипин Б) верапамил В) метопролол Г) нитроглицерин @	А
187.	ДЕ-4. Вопрос-187 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИФЕДИПИНА: А) блокада медленных кальциевых каналов Б) ингибирование АПФ В) блокада рецепторов ангиотензина Г) ингибирование ренина @	А
188.	ДЕ-4. Вопрос-188 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АМЛОДИПИНА: А) блокирует медленные кальциевые каналы Б) ингибирует АПФ В) блокирует рецепторы ангиотензина Г) ингибирует ренин @	А
189.	ДЕ-4. Вопрос-189 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВЕРАПАМИЛА: А) блокирует медленные кальциевые каналы Б) ингибирует АПФ В) блокирует рецепторы ангиотензина Г) ингибирует ренин @	А
190.	ДЕ-4. Вопрос-190	А

	ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ НАРУШЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: А) пентоксифиллин Б) суматриптан В) индапамид Г) нимодипин @	
191.	ДЕ-4. Вопрос-191 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ: А) нимодипин Б) дигоксин В) валсартан Г) периндоприл @	А
192.	ДЕ-4. Вопрос-192 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ: А) допамин Б) нимодипин В) дипиридамол Г) дигоксин @	А
193.	ДЕ-4. Вопрос-193 КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО НЕГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ: А) добутамин Б) дигоксин В) ивабрадин Г) атропин @	А
194.	ДЕ-4. Вопрос-194 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НИТРОПРУССИДА НАТРИЯ: А) гипертонический криз Б) ортостатическая гипотензия В) мерцательная аритмия Г) синусовая тахикардия @	А
195.	ДЕ-4. Вопрос-195 КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: А) добутамин Б) верапамил В) эналаприл Г) амиодарон @	А
196.	ДЕ-4. Вопрос-196 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ДИГОКСИНА: А) кардиотонические средства Б) антиаритмические средства В) антиангинальные средства Г) антигипертензивные средства @	А
197.	ДЕ-4. Вопрос-197 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА БИСОПРОЛОЛА: А) β-адреноблокаторы Б) диуретики В) ингибиторы АПФ Г) сартаны @	А
198.	ДЕ-4. Вопрос-198 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА МЕТОПРОЛОЛА: А) β-адреноблокаторы Б) диуретики В) ингибиторы АПФ Г) сартаны @	А
199.	ДЕ-4. Вопрос-199 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА НЕБИВАЛОЛА: А) β-адреноблокаторы Б) диуретики В) ингибиторы АПФ Г) сартаны @	А
200.	ДЕ-4. Вопрос-200 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРОПРАНОЛОЛА: А) β-адреноблокаторы Б) диуретики В) ингибиторы АПФ Г) сартаны @	А

201.	ДЕ-4. Вопрос-201 СТРУКТУРА СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ: А) стероидная Б) аминокислотная В) алифатическая Г) полипептидная @	
202.	ДЕ-4. Вопрос-202 ПРЕПАРАТ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА: А) морфин Б) кеторолак В) пропофол Г) парацетамол @	
203.	ДЕ-4. Вопрос-203 ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) симвастатин Б) амиодарон В) верапамил Г) дилтиазем @	
204.	ДЕ-4. Вопрос-204 СРЕДСТВА, ПРИ ПРИЕМЕ КОТОРЫХ ВНУТРЬ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ СУХОГО КАШЛЯ: А) ингибиторы АПФ Б) антагонисты кальция В) α -адреноблокаторы Г) глюкокортикостероиды @	
205.	ДЕ-4. Вопрос-205 ИНГИБИТОР АПФ, СОДЕРЖАЩИЙ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ SH-ГРУППУ: А) каптоприл Б) периндоприл В) эналаприл Г) лизиноприл @	
206.	ДЕ-4. Вопрос-206 ПРЕПАРАТ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ГИПОКАЛИЕМИЯ: А) фуросемид Б) спиронолактон В) эналаприл Г) валсартан @	
207.	ДЕ-4. Вопрос-207 ДИУРЕТИК, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА: А) фуросемид Б) гидрохлортиазид В) индапамид Г) спиронолактон @	
208.	ДЕ-4. Вопрос-208 АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ДИАБЕТОМ: А) ингибиторы АПФ Б) β -адреноблокаторы В) диуретики Г) антагонисты кальция @	
209.	ДЕ-4. Вопрос-209 АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ I КЛАССА: А) прокаинамид Б) метопролол В) амиодарон Г) верапамил @	
210.	ДЕ-4. Вопрос-210 АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ II КЛАССА: А) метопролол Б) прокаинамид В) амиодарон Г) верапамил @	
211.	ДЕ-4. Вопрос-211 АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ III КЛАССА: А) амиодарон Б) пропранолол	

	В) прокаинамид Г) верапамил @	
212.	ДЕ-4. Вопрос-212 АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ IV КЛАССА: А) верапамил Б) карведилол В) амиодарон Г) лидокаин @	
213.	ДЕ-4. Вопрос-213 ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ БЛОКАТОРОВ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ, В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА СОСУДЫ, ЧЕМ НА СЕРДЦЕ: А) амлодипин Б) верапамил В) нитроглицерин Г) дилтиазем @	
214.	ДЕ-4. Вопрос-214 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ВЕРАПАМИЛА: А) выраженная брадикардия Б) рефлекторная тахикардия В) сухой кашель Г) симптом обкрадывания @	
215.	ДЕ-4. Вопрос-215 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭНАЛАПРИЛА: А) ингибирование АПФ Б) блокада рецепторов к ангиотензину II В) прямое ингибирование ренина Г) блокада β_1 -адренорецепторов @	
216.	ДЕ-4. Вопрос-216 ПОКАЗАНИЕ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА: А) артериальная гипертензия Б) ортостатическая гипотензия В) отек мозга Г) форсированный диурез @	
217.	ДЕ-4. Вопрос-217 ПРЯМОЙ ИНГИБИТОР РЕНИНА: А) алискирен Б) каптоприл В) валсартан Г) метопролол @	
218.	ДЕ-4. Вопрос-218 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ: А) фуросемид Б) спиронолактон В) ацетазоламид Г) индапамид @	
219.	ДЕ-4. Вопрос-219 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ АРИТМИИ, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА: А) лидокаин Б) верапамил В) атропин Г) ивабрадин @	А
220.	ДЕ-4. Вопрос-220 ПРЕПАРАТ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ: А) клонидин Б) доксазозин В) каптоприл Г) капотен @	А
221.	ДЕ-4. Вопрос-221 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: А) лозартан Б) протамина сульфат В) метотрексат Г) допамин @	А

222.	ДЕ-4. Вопрос-222 ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: А) петлевые диуретики Б) эфедрин В) ангиотензинамид Г) апротинин @	А
223.	ДЕ-4. Вопрос-223 ПРЕПАРАТ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРОГО ВОЗМОЖЕН СИНДРОМ «ОБКРАДЫВАНИЯ»: А) дипиридамол Б) мексидол В) молграмостин Г) спиронолактон @	А
224.	ДЕ-4. Вопрос-224 СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ «ФИБРАТАМИ» ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: А) гиполипидемическое Б) тромболитическое В) антиангинальное Г) гипотензивное @	А
225.	ДЕ-4. Вопрос-225 СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ «САРТАНАМИ» ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: А) гипотензивное Б) тромболитическое В) антиангинальное Г) гиполипидемическое @	А
226.	ДЕ-4. Вопрос-226 ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ АНТИАНГИНАЛЬНОЕ, АНТИАРИТМИЧЕСКОЕ, АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: А) пропранолол Б) нифедипин В) амлодипин Г) сальбутамол @	А
227.	ДЕ-4. Вопрос-227 СРЕДСТВО, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ АНТИАНГИНАЛЬНОЕ И АНТИАРИТМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: А) амиодарон Б) нифедипин В) амлодипин Г) абциксимаб @	А
228.	ДЕ-4. Вопрос-228 ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ: А) лечение артериальной гипертензии Б) застойная хроническая сердечная недостаточность В) блокада сердца Г) нарушение мозгового кровообращения @	А
229.	ДЕ-4. Вопрос-229 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ НАДЖЕЛУДОЧКОВЫХ ЭКСТРАСИСТОЛИЯХ, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И СТЕНОКАРДИИ: А) метопролол Б) лидокаин В) варфарин Г) протамина сульфат @	А
230.	ДЕ-4. Вопрос-230 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: А) ницерголин Б) нифедипин В) коргликон Г) верапамил @	А
231.	ДЕ-4. Вопрос-231 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: А) сердечные гликозиды Б) α -адреномиметики В) средства, повышающие свертывание крови Г) антифибринолитики @	А
232.	ДЕ-4. Вопрос-232 ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА СЕРДЦЕ: А) добутамин Б) апротинин В) валидол	А

	Г) гепарин @	
233.	ДЕ-4. Вопрос-233 СРЕДСТВА, СНИЖАЮЩИЕ ПРЕД- И ПОСТНАГРУЗКУ НА СЕРДЦЕ: А) органические нитраты Б) блокаторы кальциевых каналов В) активаторы калиевых каналов Г) ингибиторы ФДЭ тромбоцитов @	А
234.	ДЕ-4. Вопрос-234 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БЛОКАДАХ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА: А) М-холиноблокаторы Б) β-адреноблокаторы В) сердечные гликозиды Г) α-адреномиметики @	А
235.	ДЕ-4. Вопрос-235 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: А) сердечные гликозиды Б) нитриты и нитраты В) осмотические диуретики Г) М-холиноблокаторы @	А
236.	ДЕ-4. Вопрос-236 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ТАХИАРИТМИЯХ И ЭКСТРАСИСТОЛИЯХ: А) блокаторы кальциевых каналов Б) активаторы калиевых каналов В) бета-адреномиметики Г) активаторы натриевых каналов @	А
237.	ДЕ-4. Вопрос-237 СРЕДСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: А) статины Б) адреноблокаторы В) диуретики Г) блокаторы натриевых каналов @	А
238.	ДЕ-4. Вопрос-238 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ: А) добутамин Б) фуросемид В) диазепам Г) азаметония бромид @	А
239.	ДЕ-4. Вопрос-239 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: А) коргликон Б) дигоксин В) панангин Г) маннитол @	А
240.	ДЕ-4. Вопрос-240 ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ СРЕДСТВ: А) стенокардия Б) артериальная гипертензия В) тахикардии и экстрасистолы Г) блокады сердца @	А
241.	ДЕ-4. Вопрос-241 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ: А) нитроглицерин Б) дигидроэрготамин В) кофеин Г) изопроterenalin @	А
242.	ДЕ-4. Вопрос-242 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ: А) нитроглицерин Б) пропранолол В) фенотерол Г) спиронолактон @	А
243.	ДЕ-4. Вопрос-243 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА: А) ацетилсалициловая кислота Б) метамизол натрия	А

	В) верапамил Г) магния сульфат @	
244.	ДЕ-4. Вопрос-244 НЕЙРОТРОПНЫЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ УМЕНЬШАЮТ: А) тонус сосудов Б) объем циркулирующей крови В) влияние на Н-холинорецепторы мозгового вещества надпочечников Г) влияние на β -адренорецепторы сердца @	А
245.	ДЕ-4. Вопрос-245 ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ МИОТРОПНЫХ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ: А) уменьшение тонуса сосудов Б) снижение сердечного выброса В) снижение объема циркулирующей крови Г) увеличение тонуса сосудов @	А
246.	ДЕ-4. Вопрос-246 ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ АКТИВНОСТЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ: А) каптоприл Б) амиодарон В) дигоксин Г) лидокаин @	А
247.	ДЕ-4. Вопрос-247 МЕХАНИЗМ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ β -АДРЕНОБЛОКАТОРОВ: А) уменьшение выделения норадренолина симпатическими волокнами Б) миотропное сосудорасширяющее действие В) увеличение сердечного выброса Г) увеличение секреции ренина юкстагломерулярными клетками почек @	А
248.	ДЕ-4. Вопрос-248 ПРЕПАРАТ, СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ ОРТОСТАТИЧЕСКУЮ ГИПОТЕНЗИЮ: А) клонидин Б) валидол В) лидокаин Г) молграмостим @	А
249.	ДЕ-4. Вопрос-249 ПРЕПАРАТ, РЕАЛИЗУЮЩИЙ СВОЕ СОСУДОРАСШИРЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЗА СЧЕТ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА (NO): А) натрия нитропруссид Б) расилез В) нифедипин Г) амлодипин @	А
250.	ДЕ-4. Вопрос-250 ПРЕПАРАТ, БЛОКИРУЮЩИЙ КАЛЬЦИЕВЫЕ КАНАЛЫ: А) амлодипин Б) diazoxid В) празозин Г) миноксидил @	А
251.	ДЕ-4. Вопрос-251 ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ СОСУДОРАСШИРЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЗА СЧЕТ БЛОКАДЫ α -АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ: А) доксазозин Б) фенилэфрин В) эpineфрин Г) эфедрин @	А
252.	ДЕ-4. Вопрос-252 СИМПАТОЛИТИКИ: А) истощают запасы норадреналина в пресинаптическом нервном окончании Б) увеличивают артериальное давление В) блокируют постсинаптические α -адренорецепторы Г) не влияют на артериальное давление @	А
253.	ДЕ-4. Вопрос-253 ХАРАКТЕРНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ: А) отек лодыжек Б) головная боль В) выпадение волос на голове (аллопеция) Г) спазм аккомодации @	А

254.	ДЕ-4. Вопрос-254 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА: А) гипотензия Б) бронхоспазм В) рефлекторная брадикардия Г) эйфория @	A
255.	ДЕ-4. Вопрос-255 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПЕРИНДОПРИЛА: А) сухой кашель Б) артериальная гипертензия В) головная боль Г) синдром «обкрадывания» @	A
256.	ДЕ-4. Вопрос-256 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АМИОДАРОНА: А) блокирует натриевые, калиевые, кальциевые каналы и неконкурентно β -адренорецепторы Б) блокирует β_1 -адренорецепторы В) ингибирует АПФ Г) блокирует AT_1 -рецепторы @	A
257.	ДЕ-4. Вопрос-257 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ДИГОКСИНА: А) блокирует Na^+K^+ -АТФ-азу кардиомиоцитов Б) ингибирует ФДЭ III типа В) стимулирует β_1 -адренорецепторы Г) стимулирует β_1 -адренорецепторы и дофаминовые рецепторы @	A
258.	ДЕ-4. Вопрос-258 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ Фуросемида: А) отеки Б) аритмии В) артериальная гипотензия Г) гиповолемия @	A
259.	ДЕ-4. Вопрос-259 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ Фуросемида: А) ингибирует $Na-K-2Cl$ ко-транспортёр Б) ингибирует $Na-Cl$ ко-транспортёр В) повышает осмотическое давление в нефроне Г) блокирует рецепторы альдостерона @	A
260.	ДЕ-4. Вопрос-260 ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ГЛИКОЗИДЫ ИЗ ЛИСТЬЕВ ЛАНДЫША: А) коргликон Б) дигоксин В) ницерголин Г) мексидол @	A
261.	ДЕ-4. Вопрос-261 ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ГЛИКОЗИДЫ НАПЕРСТЯНКИ: А) дигоксин Б) коргликон В) ницерголин Г) мексидол @	A
262.	ДЕ-4. Вопрос-262 ДИГОКСИН СОДЕРЖИТ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ: А) наперстянки Б) ландыша В) строфанта Г) желтушника @	A
263.	ДЕ-4. Вопрос-263 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МАННИТОЛА: А) острое отравление химическими веществами Б) сердечная недостаточность В) геморрагический инсульт Г) гипокалиемия @	A
264.	ДЕ-4. Вопрос-264 ДИУРЕТИК, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОТЕКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ МИНЕРАЛКОРТИКОИДОВ И ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ГИНЕКОМАСТИИ, ИМПОТЕНЦИИ, НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ:	A

	А) спиронолактон Б) фуросемид В) маннитол Г) ацетазоламид @	
265.	ДЕ-4. Вопрос-265 ГРУППА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЛОЗАРТАН: А) блокатор ангиотензиновых рецепторов Б) ингибитор АПФ В) симпатолитик Г) ганглиоблокатор @	А
266.	ДЕ-4. Вопрос-266 ГРУППА ДИУРЕТИКОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ АЦЕТАЗОЛАМИД: А) ингибиторы карбоангидразы Б) антагонист альдостерона В) осмотические Г) петлевые @	А
267.	ДЕ-4. Вопрос-267 ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРНЫМ АНАЛОГОМ ГИПОКСАНТИНА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ КОНКУРЕНТНО УГНЕТАЕТ АКТИВНОСТЬ КСАНТИНОКСИДАЗЫ, И ЗА СЧЕТ ЭТОГО УМЕНЬШАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ. ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ВОЗРАСТАЕТ РИСК ОСТРОГО ПРИСТУПА ПОДАГРЫ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) аллопуринол Б) маннитол В) транексамовая кислота Г) ацетазоламид @	А
268.	ДЕ-4. Вопрос-268 ГРУППА ДИУРЕТИКОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ФУРОСЕМИД: А) петлевые Б) осмотические В) ингибитора карбоангидразы Г) антагонисты альдостерона @	А
269.	ДЕ-4. Вопрос-269 ГРУППА ДИУРЕТИКОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ СПИРОНОЛАКТОН: А) антагонисты альдостерона Б) ингибиторы карбоангидразы В) осмотические Г) петлевые @	А
270.	ДЕ-4. Вопрос-270 ГРУППА ДИУРЕТИКОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ МАННИТОЛ: А) осмотические Б) петлевые В) ингибиторы карбоангидразы Г) антагонисты альдостерона @	А
271.	ДЕ-4. Вопрос-271 СУХОЙ КАШЕЛЬ ВЫЗЫВАЮТ: А) ингибиторы АПФ Б) блокаторы ангиотензиновых рецепторов В) блокаторы кальциевых каналов Г) сердечные гликозиды @	А
272.	ДЕ-4. Вопрос-272 ОТНОСИТСЯ К БЛОКАТОРАМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ L-ТИПА. ДЕЙСТВУЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА АРТЕРИАЛЬНЫЕ СОСУДЫ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ВНУТРЬ ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. ПРИНИМАЕТСЯ ОДИН РАЗ В СУТКИ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) амлодипин Б) нифедипин В) лозартан Г) эналаприл @	А
273.	ДЕ-4. Вопрос-273 ОТНОСИТСЯ К БЛОКАТОРАМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ. ПРОИЗВОДНОЕ ФЕНИЛАЛКИЛАМИНА. ОБЛАДАЕТ АНТИАНГИНАЛЬНЫМ, АНТИАРИТМИЧЕСКИМ И ГИПОТЕНЗИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) верапамил Б) нифедипин В) эналаприл Г) лозартан @	А
274.	ДЕ-4. Вопрос-274	А

	СЕРДЕЧНЫЙ ГЛИКОЗИД — ПРЕПАРАТ НАПЕРСТЯНКИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ, ТРЕПЕТАНИИ ПРЕДСЕРДИЙ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) дигоксин Б) коргликон В) амиодарон Г) прокаинамид @	
275.	ДЕ-4. Вопрос-275 ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ СРЕДСТВ: А) стенокардия Б) венозная недостаточность В) артериальная гипертензия Г) аритмии @	А
276.	ДЕ-4. Вопрос-276 ПРЕПАРАТ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ РЕФЛЕКТОРНАЯ ТАХИКАРДИЯ: А) нитроглицерин Б) верапамил В) коргликон Г) прокаинамид @	А
277.	ДЕ-4. Вопрос-277 ПРЕПАРАТ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРОГО ВОЗНИКАЮТ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, СУХОЙ КАШЕЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: А) каптоприл Б) лозартан В) алискирен Г) маннитол @	А
278.	ДЕ-4. Вопрос-278 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: А) лозартан Б) нитроглицерин В) дигоксин Г) допамин @	А
279.	ДЕ-4. Вопрос-279 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ: А) нитроглицерин Б) каптоприл В) пропранолол Г) небивалол @	А
280.	ДЕ-4. Вопрос-280 ДИГОКСИН А) Кардиотоническое средство Б) Желчегонное средство В) Бронхолитическое средство Г) Противоглистное средство @	А
281.	ДЕ-4. Вопрос-281 ДИГОКСИН А) Кардиотоническое средство гликозидной структуры Б) Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Противоглистное средство @	А
282.	ДЕ-4. Вопрос-282 ВЕРАПАМИЛ А) Антиаритмическое средство Б) Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Кардиотоническое средство гликозидной структуры @	А
283.	ДЕ-4. Вопрос-283 ВЕРАПАМИЛ А) Гипотензивное средство Б) Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Кардиотоническое средство гликозидной структуры @	А

284.	ДЕ-4. Вопрос-284 ВЕРАПАМИЛ А) Антиангинальное средство Б) Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Кардиотоническое средство гликозидной структуры @	A
285.	ДЕ-4. Вопрос-285 АМИОДАРОН А) Антиаритмическое средство Б) Кардиотоническое средство негликозидной структуры В) Кардиотоническое средство гликозидной структуры Г) Анальгетик @	A
286.	ДЕ-4. Вопрос-286 ФУРОСЕМИД А) Диуретик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Анальгетик @	A
287.	ДЕ-4. Вопрос-287 ФУРОСЕМИД А) Калийвыводящий диуретик Б) Калийсберегающий диуретик В) Аналептик Г) Анальгетик @	A
288.	ДЕ-4. Вопрос-288 СПИРОНОЛАКТОН А) Калийсберегающий диуретик Б) Калийвыводящий диуретик В) Аналептик Г) Анальгетик @	A
289.	ДЕ-4. Вопрос-289 СПИРОНОЛАКТОН А) Диуретик Б) Ноотроп В) Слабительное средство Г) Бронхолитическое средство @	A
290.	ДЕ-4. Вопрос-290 МАННИТОЛ А) Диуретик Б) Ноотроп В) Слабительное средство Г) Бронхолитическое средство @	A
291.	ДЕ-4. Вопрос-291 МАННИТОЛ А) Осмотический диуретик Б) Ноотроп В) Слабительное средство Г) Бронхолитическое средство @	A
292.	ДЕ-4. Вопрос-292 НИТРОГЛИЦЕРИН А) Антиангинальное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Бронхолитическое средство @	A
293.	ДЕ-4. Вопрос-293 ИВАБРАДИН А) Антиангинальное, брадикардитическое средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик	A

	Г) Бронхолитическое средство @	
294.	ДЕ-4. Вопрос-294 ДИПИРИДАМОЛ А) Антиангинальное, антиагрегантное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Бронхолитическое средство @	A
295.	ДЕ-4. Вопрос-295 ТРИМЕАЗИДИН (ПРЕДУКТАЛ) А) Кардиопротектор Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Бронхолитическое средство @	A
296.	ДЕ-4. Вопрос-296 АЛИСКИРЕН А) Гипотензивное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Кардиопротектор @	A
297.	ДЕ-4. Вопрос-297 ЭНАЛАПРИЛ А) Гипотензивное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Кардиопротектор @	A
298.	ДЕ-4. Вопрос-298 ЛОЗАРТАН А) Гипотензивное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Кардиопротектор @	A
299.	ДЕ-4. Вопрос-299 ПАЦИЕНТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИНИМАЕТ ДИГОКСИН. КАКУЮ ГРУППУ СРЕДСТВ ДОЛЖНО НАЗНАЧАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ? А) Препараты кальция Б) Иммуностимуляторы В) Антисептики Г) Антиагреганты @	A
	СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ	
300.	ДЕ-4. Вопрос-300 К ОСТЕОПОРОЗУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПРИМЕНЕНИЕ : А) гепарина Б) амоксициллина В) цефалексина Г) амлодипина @	A
301.	ДЕ-4. Вопрос-301 СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА: А) железа закисного сульфат Б) этамзилат В) метотрексат Г) детралекс @	A
302.	ДЕ-4. Вопрос-302 СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА: А) эритропозтин бета Б) мексидол В) пентоксил Г) молграмостим @	A

303.	ДЕ-4. Вопрос-303 ДЕТРАЛЕКС: А) комбинированный препарат, содержащий биофлавоноиды (диосмин и гесперидин) Б) повышает проницаемость капилляров и увеличивает венозный застой В) понижает венозный тонус Г) стимулирует эритропоэз @	A
304.	ДЕ-4. Вопрос-304 АНТИКОАГУЛЯНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: А) эноксапарин натрия Б) протамина сульфат В) алтеплаза Г) варфарин @	A
305.	ДЕ-4. Вопрос-305 АНТИАГРЕГАНТ: А) клопидогрел Б) урокиназа В) протамина сульфат Г) транексамовая кислота @	A
306.	ДЕ-4. Вопрос-306 ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) протамина сульфат Б) клопидогрел В) абциксимаб Г) аценокумарол @	A
307.	ДЕ-4. Вопрос-307 ПРЕПАРАТ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ГЕПАРИНА: А) эноксапарин Б) протамина сульфат В) клопидогрел Г) алтеплаза @	A
308.	ДЕ-4. Вопрос-308 ИНГИБИТОР ФИБРИНОЛИЗА: А) транексамовая кислота Б) клопидогрел В) абциксимаб Г) протамина сульфат @	A
309.	ДЕ-4. Вопрос-309 АНТИКОАГУЛЯНТ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: А) варфарин Б) гепарин В) протамина сульфат Г) эноксапарин @	A
310.	ДЕ-4. Вопрос-310 АНТАГОНИСТ ГЕПАРИНА: А) протамина сульфат Б) варфарин В) эноксапарин Г) алтеплаза @	A
311.	ДЕ-4. Вопрос-311 ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) алтеплаза Б) протамина сульфат В) варфарин Г) эноксапарин @	A
312.	ДЕ-4. Вопрос-312 АНТАГОНИСТ ВИТАМИНА К: А) варфарин Б) протамина сульфат В) эноксапарин	A

	Г) алтеплаза @	
313.	ДЕ-4. Вопрос-313 ВЕНОТРОПНОЕ (ФЛЕБОТРОПНОЕ) СРЕДСТВО: А) детралекс Б) железа закисного сульфат В) мексидол Г) эритропоэтин бета @	А
314.	ДЕ-4. Вопрос-314 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: А) детралекс Б) винпоцетин В) клопидогрел Г) нифедипин @	А
315.	ДЕ-4. Вопрос-315 ОБЛАДАЕТ ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИМ И АНГИОПРОТЕКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ. УМЕНЬШАЕТ РАСТЯЖИМОСТЬ ВЕН И ВЕНОЗНЫЙ ЗАСТОЙ, СНИЖАЕТ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ И ИХ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) детралекс Б) мексидол В) молграмостим Г) этамзилат @	А
316.	ДЕ-4. Вопрос-316 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДИОСМИНА+ГЕСПЕРИДИНА (ДЕТРАЛЕКСА): А) вено-tonизирующий Б) кардиопротективный В) нефропротективный Г) церебропротективный @	А
317.	ДЕ-4. Вопрос-317 СТИМУЛЯТОР ЛЕЙКОПОЭЗА: А) молграмостим (лейкомакс) Б) железа закисного сульфат В) этамзилат Г) эритропоэтин бета @	А
318.	ДЕ-4. Вопрос-318 АНТАГОНИСТОМ ВИТАМИНА К ЯВЛЯЕТСЯ: А) Варфарин Б) Гепарин В) Стрептокиназа Г) Кислота аминакапроновая @	
319.	ДЕ-4. Вопрос-319 ГЕПАРИН НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ В ФОРМЕ: А) Таблеток для приема внутрь Б) Мази В) Раствора для инъекций во флаконах Г) Геля @	
320.	ДЕ-4. Вопрос-320 АНТИАГРЕГАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ: А) Кислота ацетилсалициловая Б) Адреналин В) Кодеин Г) Каптоприл @	
321.	ДЕ-4. Вопрос-321 ПРЯМОЙ АНТИКОАГУЛЯНТ: А) Гепарин Б) Варфарин В) Кислота ацетилсалициловая Г) Стрептокиназа	

	@	
322.	ДЕ-4. Вопрос-322 НЕПРЯМОЙ АНТИКОАГУЛЯНТ: А) Варфарин Б) Гепарин В) Кислота ацетилсалициловая Г) Стрептокиназа @	
323.	ДЕ-4. Вопрос-323 ФИБРИНОЛИТИК: А) Стрептокиназа Б) Варфарин В) Гепарин Г) Кислота ацетилсалициловая @	
324.	ДЕ-4. Вопрос-324 ФИБРИНОЛИТИК: А) Алтеплаза Б) Гепарин В) Фитоменадион @	
325.	ДЕ-4. Вопрос-325 ИНГИБИТОР ФИБРИНОЛИЗА: А) Кислота аминокaproновая Б) Варфарин В) Гепарин Г) Стрептокиназа @	
326.	ДЕ-4. Вопрос-326 СТИМУЛЯТОРЫ ЛЕЙКОПОЭЗА: А) Молграмостин Б) Аминокaproновая кислота В) Эпопростенол Г) Урокиназа @	
327.	ДЕ-4. Вопрос-327 ГЕМОСТАТИК: А) Каптофер Б) Гепарин В) Стрептокиназа @	
328.	ДЕ-4. Вопрос-328 ГЕМОСТАТИК: А) Тромбин Б) Гепарин В) Стрептокиназа @	
329.	ДЕ-4. Вопрос-329 ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СВОЙСТВОМ НЕПРЯМЫХ КОАГУЛЯНТОВ: А) Снижают агрегацию тромбоцитов Б) По строению сходны с витамином К В) Тормозят синтез факторов свертывания крови Г) Действуют в печени @	А
330.	ДЕ-4. Вопрос-330 МЕХАНИЗМ АНТИАГРЕГАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ: А) Угнетение биосинтеза тромбосана Б) Уменьшение цАМФ В) Уменьшение биосинтеза простациклина Г) Уменьшение биосинтеза лейкотриенов @	А
331.	ДЕ-4. Вопрос-331 МЕХАНИЗМ АНТИАГРЕГАНТНОГО ЭФФЕКТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (АСПИРИН, АСПИРИН-КАРДИО) А) селективное ингибирование ЦОГ-1 в малых дозах Б) образование тромбосана А2 В) ингибирование ЦОГ-1 и ЦОГ-2 в малых дозах	А

	Г) ингибирование тромбоксан-А ₂ -синтетазы в малых дозах @	
332.	ДЕ-4. Вопрос-332 СТРЕПТОКИНАЗА: А) Лизирует образовавшиеся свежие тромбы Б) Повышает свертываемость крови В) Переводит протромбин в тромбин @	А
333.	ДЕ-4. Вопрос-333 СТРЕПТОКИНАЗА: А) Активирует переход профибринолизина в фибринолизин Б) Повышает свертываемость крови В) Переводит протромбин в тромбин @	А
334.	ДЕ-4. Вопрос-334 АНТИКОАГУЛЯНТ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: А) варфарин Б) эноксапарин В) клопидогрел Г) абциксимаб @	А
335.	ДЕ-4. Вопрос-335 ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) алтеплаза Б) абциксимаб В) этамзилат Г) варфарин @	А
336.	ДЕ-4. Вопрос-336 СТИМУЛЯТОР ЛЕЙКОПОЭЗА: А) филграстим Б) железа закисного сульфат В) эпоэтин-бета Г) этамзилат @	А
337.	ДЕ-4. Вопрос-337 СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА: А) эпоэтин-бета Б) филграстим В) алтеплаза Г) этамзилат @	А
338.	ДЕ-4. Вопрос-338 ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА НАЗНАЧАЮТ ПРИ А) железодефицитной анемии Б) тромбозам В) лейкопении Г) мегалобластной анемии @	А
339.	ДЕ-4. Вопрос-339 ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА МОГУТ ВОЗНИКАТЬ А) диспептические явления: тошнота, рвота, запор, диарея Б) повышение АД, брадикардия В) аритмия, экстрасистолия Г) судороги, гипертермия, отеки @	
340.	ДЕ-4. Вопрос-340 ИНГИБИТОР ФИБРИНОЛИЗА: А) транексамовая кислота Б) абциксимаб В) алтеплаза Г) протамина сульфат @	А
341.	ДЕ-4. Вопрос-341 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ АЛТЕПАЗА: А) фибринолитики Б) антикоагулянты В) антиагреганты	А

	Г) антифибринолитики @	
342.	ДЕ-4. Вопрос-342 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА: А) антифибринолитики Б) антикоагулянты В) фибринолитики Г) антиагреганты @	А
343.	ДЕ-4. Вопрос-343 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ВАРФАРИНА: А) непрямые антикоагулянты Б) прямые антикоагулянты В) гемостатические средства Г) антиагреганты @	А
344.	ДЕ-4. Вопрос-344 ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) транексамовая кислота Б) гепарин В) варфарин Г) клопидогрел @	А
345.	ДЕ-4. Вопрос-345 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ: А) клопидогрел Б) протамина сульфат В) аминокaproновая кислота Г) транексамовая кислота @	А
346.	ДЕ-4. Вопрос-346 СНИЖАЕТ СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ. ВВОДИТСЯ ПОД КОЖУ И ВНУТРИВЕННО. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ И ТРОМБОЦИТОПЕНИЮ. АНТАГОНИСТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) гепарин натрия Б) ацетилсалициловая кислота В) эноксапарин натрия Г) варфарин @	А
347.	ДЕ-4. Вопрос-347 УМЕНЬШАЕТ АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ: А) абциксимаб Б) гепарин В) варфарин Г) эноксапарин натрия @	А
348.	ДЕ-4. Вопрос-348 УМЕНЬШАЕТ СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ: А) гепарин Б) абциксимаб В) клопидогрел Г) викасол @	А
349.	ДЕ-4. Вопрос-349 ПРЕПЯТСТВУЕТ ФИБРИНОЛИЗУ И ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ: А) транексамовая кислота Б) протамина сульфат В) варфарин Г) аprotинин @	А
350.	ДЕ-4. Вопрос-350 АНТИКОАГУЛЯНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: А) эноксапарин Б) варфарин В) клопидогрел Г) аценокумарол @	А

351.	ДЕ-4. Вопрос-351 НАЗНАЧАЕТСЯ ВНУТРИ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЯХ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ. В КАЧЕСТВЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ВЫЗЫВАЕТ БОЛИ В ЖИВОТЕ, ТОШНОТУ, РВОТУ И ДИАРЕЮ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) тардиферон Б) варфарин В) эпоэтин-бета Г) молграмостим @	А
352.	ДЕ-4. Вопрос-352 ПРЕПАРАТ РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГРАНУЛОЦИТАРНОГО-МАКРОФАГАЛЬНОГО КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА. ПОВЫШАЕТ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КОЛИЧЕСТВО НЕЙТРОФИЛОВ, ЭОЗИНОФИЛОВ, БАЗОФИЛОВ, МАКРОФАГОВ, ЭРИТРОЦИТОВ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) молграмостим Б) варфарин В) эпоэтин-бета Г) тардиферон @	А
353.	ДЕ-4. Вопрос-353 ЯВЛЯЕТСЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ ГЕПАРИНОМ. ОКАЗЫВАЕТ ПРЯМОЕ АНТИКОАГУЛЯЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ. ОСНОВНЫМИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И КРОВОТЕЧЕНИЯ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕПАРАТ: А) эноксапарин Б) варфарин В) аprotинин Г) абциксимаб @	А
354.	ДЕ-4. Вопрос-354 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕГЛИКОЗИЛИРОВАННЫМ ВОДОРАСТВОРИМЫМ ПЕПТИДОМ, АНАЛОГОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГРАНУЛОЦИТАРНО-МАКРОФАГАЛЬНОГО КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ГЕМОПОЭЗ? А) молграмостин Б) тардиферон В) мальтофер Г) эпоэтин В @	А
355.	ДЕ-4. Вопрос-355 СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА: А) Железа закисного сульфат Б) Филграстим В) Эноксапарин Г) Этамзилат @	А
356.	ДЕ-4. Вопрос-356 СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА: А) Эпоэтин-бета Б) Филграстим В) Эноксапарин Г) Этамзилат @	А
357.	ДЕ-4. Вопрос-357 СТИМУЛЯТОР ЛЕЙКОПОЭЗА: А) молграмостин Б) железа закисного сульфат В) эпоэтин-бета Г) этамзилат @	А
358.	ДЕ-4. Вопрос-358 К АНТИАГРЕГАНТАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ КРОМЕ: А) Алтеплаза Б) Ацетилсалициловая кислота В) Абциксимаб Г) Клопидогрель @	А
359.	ДЕ-4. Вопрос-359 ГЕПАРИН	

	А) Антикоагулянт Б) Осмотический диуретик В) Кардиопротектор Г) Гипотензивное средство @	А
360.	ДЕ-4. Вопрос-360 ОТЛИЧИЯ В МЕХАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ГЕПАРИНА – ФРАКСИПАРИНА ОТ АНАЛОГА ЭНДОГЕННОГО ГЕПАРИНА, ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ: А) не ингибирует ферментативную активность тромбина крови Б) ингибирует ферментативную активность тромбина крови @	А
361.	ДЕ-4. Вопрос-361 ОТЛИЧИЯ В МЕХАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ГЕПАРИНА – ФРАКСИПАРИНА ОТ АНАЛОГА ЭНДОГЕННОГО ГЕПАРИНА, ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ: А) не взаимодействует в крови с антитромбином III Б) взаимодействует в крови с антитромбином III @	А
362.	ДЕ-4. Вопрос-362 ОТЛИЧИЯ В МЕХАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ГЕПАРИНА – ФРАКСИПАРИНА ОТ АНАЛОГА ЭНДОГЕННОГО ГЕПАРИНА, ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ: А) является более сильным антиагрегантом Б) является более слабым антиагрегантом @	А
363.	ДЕ-4. Вопрос-363 ВАРФАРИН А) Антикоагулянт Б) Осмотический диуретик В) Кардиопротектор Г) Гипотензивное средство @	А
364.	ДЕ-4. Вопрос-364 КАКОЙ АНТИКОАГУЛЯНТ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ? А) Гепарин Б) Абциксимаб В) Этамзилат Г) Аминокапроновая кислота @	А
365.	ДЕ-4. Вопрос-365 ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ НЕ УГНЕТАЕТ АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ: А) Викасол Б) Ацетилсалициловая кислота В) Дипиридамол Г) Клопидогрел @	А
366.	ДЕ-4. Вопрос-366 СТРЕПТОКИНАЗА А) Фибринолитическое средство Б) Осмотический диуретик В) Кардиопротектор Г) Гипотензивное средство @	А
367.	ДЕ-4. Вопрос-367 ТРОМБИН А) Гемостатическое средство Б) Фибринолитическое средство В) Осмотический диуретик Г) Гипотензивное средство @	А
368.	ДЕ-4. Вопрос-368 ВИТАМИН К А) Гемостатическое средство Б) Фибринолитическое средство В) Осмотический диуретик Г) Гипотензивное средство @	А

369.	ДЕ-4. Вопрос-369 ВИТАМИН К: А) Жирорастворимый витамин Б) Плазменный фактор коагуляции В) Синтезируется в печени Г) Антикоагулянт @	А
370.	ДЕ-4. Вопрос-370 ВИТАМИН К: А) Жирорастворимый витамин Б) Плазменный фактор коагуляции В) Синтезируется в печени Г) Антикоагулянт @	Б
371.	ДЕ-4. Вопрос-371 ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ А) Гемостатическое средство резорбтивного действия Б) Фибринолитическое средство В) Осмотический диуретик Г) Гипотензивное средство @	А
372.	ДЕ-4. Вопрос-372 АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА А) Ингибитор фибринолиза Б) Осмотический диуретик В) Антисептик Г) Гипотензивное средство @	А
373.	ДЕ-4. Вопрос-373 НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КИСЛОТЫ АМИНОКАПРОНОВОЙ: А) Стимулирование активностъ фибринолизина Б) Назначение при кровотечениях В) Угнетение активности фибринолизина Г) Торможение перехода профибринолизина в фибринолизин @	А
374.	ДЕ-4. Вопрос-374 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ВАРФАРИНА А) Профилактика тромбообразования Б) Гепатит В) Болезнь Паркинсона Г) Эпилепсия @	А
375.	ДЕ-4. Вопрос-375 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОТАМИНА СУЛЬФАТА А) Прекращение действия Гепарина Б) Гепатит В) Болезнь Паркинсона Г) Эпилепсия @	А
376.	ДЕ-4. Вопрос-376 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ВИТАМИНА К А) Остановка кровотечений Б) Гепатит В) Болезнь Паркинсона Г) Эпилепсия @	А
377.	ДЕ-4. Вопрос-377 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ А) Остановка кровотечений в стоматологии Б) Гепатит В) Болезнь Паркинсона Г) Эпилепсия @	А
378.	ДЕ-4. Вопрос-378 К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ГЕПАРИН?: А) Антикоагулянты Б) НПВС В) Противосудорожные Г) Адреномиметики	А

	@	
379.	ДЕ-4. Вопрос-379 АНТИКОАГУЛЯНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: А) Гепарин Б) Варфарин В) Гентамицин Г) Циклоспорин А @	А
380.	ДЕ-4. Вопрос-380 АНТИКОАГУЛЯНТ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: А) Варфарин Б) Гепарин В) Гентамицин Г) Циклоспорин А @	А
381.	ДЕ-4. Вопрос-381 ГЕПАРИН СВЯЗЫВАЕТ: А) Ха фактор и тромбин Б) Только тромбин В) Все факторы свертывания крови Г) Гликопротеины IIa и IIIb @	А
382.	ДЕ-4. Вопрос-382 НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЕПАРИНЫ СВЯЗЫВАЮТ: А) Только Ха фактор Б) Ха фактор и тромбин В) Все факторы свертывания крови Г) Гликопротеины IIa и IIIb @	А
383.	ДЕ-4. Вопрос-383 ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ АНТИКОАГУЛЯНТНОГО ДЕЙСТВИЯ ГЕПАРИНА: А) Связывает Ха фактор и тромбин Б) Связывает только Ха фактор В) Блокирует К/Na насос Г) Усиливает образование тромбосана @	А
384.	ДЕ-4. Вопрос-384 ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ АНТИКОАГУЛЯНТНОГО ДЕЙСТВИЯ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ БЛОКИРОВКА СИНТЕЗА ВИТАМИНА К В ПЕЧЕНИ?: А) Нет Б) Да @	А
385.	ДЕ-4. Вопрос-385 ВАРФАРИН А) Непрямой антикоагулянт Б) Осмотический диуретик В) Прямой антикоагулянт Г) Противотуберкулезное средство @	А
386.	ДЕ-4. Вопрос-386 ГЕПАРИН – ЭТО АНТИАГРЕГАНТ? А) Нет Б) Да @	А
387.	ДЕ-4. Вопрос-387 ГЕПАРИН – ЭТО АНТИКОАГУЛЯНТ? А) Да Б) Нет @	А
388.	ДЕ-4. Вопрос-388 ГЕПАРИН НЕ ПРИНИМАЮТ ПЕРОРАЛЬНО, Т.К.: А) разрушается в желудочно-кишечном тракте Б) повышается токсичность В) повышается биодоступность Г) риск ulcerогенного действия @	А
389.	ДЕ-4. Вопрос-389 ПРИ ПРИЕМЕ ВАРФАРИНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ МНО. ЧТО ЭТО ТАКОЕ: @	А

	А) международное нормализованное отношение (протромбиновое время пациента/ протромбиновое время в норме) в степени международного индекса чувствительности) Б) международное непатентованное отношение (протромбиновое время пациента/ протромбиновое время в норме) в степени международного индекса чувствительности) В) международное непатентованное отношение (протромбиновое время норма / протромбиновое время пац.) в степени международного индекса чувствительности) @	
390.	ДЕ-4. Вопрос-390 ПРИ ПРИЕМЕ ВАРФАРИНА САМЫМ ГЛАВНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОСТЕОПОРОЗ: А) нет Б) да @	А

Дидактическая единица №5. Иммунотропные и антиаллергические средства (130)

№	Текст вопроса	Ответ (буквенный)
1.	ДЕ-5. Вопрос-1 ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 25 мг, №20 - 20 шт. Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
2.	ДЕ-5. Вопрос-2 ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
3.	ДЕ-5. Вопрос-3 ДИФЕНГИДРАМИН (ДИМЕДРОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 50 мг, №10 - 10 шт. Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
4.	ДЕ-5. Вопрос-4 ДИФЕНГИДРАМИН (ДИМЕДРОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
5.	ДЕ-5. Вопрос-5 ДЕЗЛОРАТАДИН (ЭРИУС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) сиропа 0.5 мг/мл, флакон темного стекла 225 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
6.	ДЕ-5. Вопрос-6 ДЕЗЛОРАТАДИН (ЭРИУС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытых пленочной оболочкой 5 мг, №3 Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
7.	ДЕ-5. Вопрос-7 ДЕЗЛОРАТАДИН (ЭРИУС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток для рассасывания 2.5 мг и 5 мг Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
8.	ДЕ-5. Вопрос-8 ПРЕПАРАТЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ ТУЧНЫХ КЛЕТОК МЕДИАТОРОВ АЛЛЕРГИИ И ВОСПАЛЕНИЯ: А) Кромоглициевая кислота (Интал) Б) Хлоропирамин (Супрастин) В) Тимуса экстракт (Тималин) Г) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) @	А

9.	ДЕ-5. Вопрос-9 ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, НЕ БЛОКИРУЮЩИЙ H₁-ГИСТАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ: А) Кромоглициевая кислота (Интал) Б) Дезлоратадин (Эриус) В) Дифенгидрамин (Димедрол) Г) Хлоропирамин (Супрастин) @	А
10.	ДЕ-5. Вопрос-10 К ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Циклоспорин Б) Экстракт тимуса (Тималин) В) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) Г) Эхинацеи пурпурной сок (Иммунал) @	А
11.	ДЕ-5. Вопрос-11 ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКАТОРОВ H₁-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЁ, КРОМЕ: А) Подавление реакции отторжения трансплантата Б) Бронхиальная астма (в составе комплексной терапии) В) Аллергический ринит, конъюнктивит Г) Профилактика аллергических реакций при применении лекарственных средств @	А
12.	ДЕ-5. Вопрос-12 КАКОЙ ПРЕПАРАТ НЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ЛИЦАМ, ЧЬЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ НАПРЯЖЕННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАПРИМЕР: ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ): А) Хлоропирамин (Супрастин) Б) Лоратадин (Кларитин) В) Цетиризин (Зиртек) Г) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал) @	А
13.	ДЕ-5. Вопрос-13 ПРЕПАРАТ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ВЫСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ ТУЧНЫХ КЛЕТОК МЕДИАТОРОВ АЛЛЕРГИИ И ВОСПАЛЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННО БЛОКИРУЮЩИЙ ГИСТАМИНОВЫЕ H₁-РЕЦЕПТОРЫ: А) Кетотифен Б) Дезлоратадин (Эриус) В) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал) Г) Дифенгидрамин (Димедрол) @	А
14.	ДЕ-5. Вопрос-14 ИММУНОСТИМУЛЯТОР, СОДЕРЖАЩИЙ КОМПЛЕКС ПОЛИПЕПТИДНЫХ ФРАКЦИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: А) Экстракт тимуса (Тималин) Б) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) В) Циклоспорин А Г) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал) @	А
15.	ДЕ-5. Вопрос-15 ПОД КАКИМ КОММЕРЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ ВЫПУСКАЕТСЯ ПРЕПАРАТ ХЛОРОПИРАМИН? А) Супрастин Б) Эриус В) Задитен Г) Димедрол @	А
16.	ДЕ-5. Вопрос-16 БЛОКАТОР ГИСТАМИНОВЫХ H₁-РЕЦЕПТОРОВ, С НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ СЕДАТИВНЫМ И СНОТВОРНЫМ ЭФФЕКТОМ: А) Дифенгидрамин (Димедрол) Б) Дезлоратадин (Эриус) В) Хлоропирамин (Супрастин) Г) Кетотифен @	А
17.	ДЕ-5. Вопрос-17 ИММУНОСУПРЕССОР (ИММУНОДЕПРЕССАНТ): А) Азотиоприн (Имуран)	А

	Б) Экстракт тимуса (Тималин) В) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) Г) Кетотифен @	
18.	ДЕ-5. Вопрос-18 ИММУНОСТИМУЛЯТОР - СИНТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ФРАГМЕНТОВ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ БАКТЕРИЙ: А) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) Б) Экстракт тимуса (Тималин) В) Левамизол В) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал) @	А
19.	ДЕ-5. Вопрос-19 ЭКЗОГЕННЫЙ ИММУНОСТИМУЛЯТОР РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: А) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал) Б) Экстракт тимуса (Тималин) В) Левамизол Г) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) @	А
20.	ДЕ-5. Вопрос-20 АНТИГИСТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ НАИМЕНЬШЕЙ СЕДАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ: А) Дезлоратадин (Эриус) Б) Кетотифен В) Хлоропирамин (Супрастин) Г) Дифенгидрамин (Димедрол) @	А
21.	ДЕ-5. Вопрос-21 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЦИКЛОСПОРИНА А: А) Профилактика отторжения трансплантата при пересадке почки, легких, сердца и других органов Б) Только профилактика приступов бронхиальной астмы В) Иммунодефицитное состояние при хронических и вялотекущих инфекционно-воспалительных заболеваниях различной локализации (органы дыхания, кожи и мягких тканей, псориазе и др.) Г) Аллергический ринит и конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, зудящие дерматозы и др. @	А
22.	ДЕ-5. Вопрос-22 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА (ИНТАЛ): А) Профилактика отторжения трансплантата при пересадке почки, легких, сердца и других органов Б) Только профилактика приступов бронхиальной астмы В) Комплексная терапия заболеваний, сопровождающаяся снижением клеточного иммунитета (острые и хронические гнойные процессы, ожоговая болезнь, трофические язвы, лучевая и химиотерапия у онкологических больных) Г) Аллергический ринит и конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, зудящие дерматозы и др. @	А
23.	ДЕ-5. Вопрос-23 АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ II ПОКОЛЕНИЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕПАРАТОВ I ПОКОЛЕНИЯ: А) Не оказывают снотворно-седативное действие Б) Оказывают снотворно-седативное действие В) Угнетают выработку антител Г) Оказывают психостимулирующее действие @	А
24.	ДЕ-5. Вопрос-24 К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛОСПОРИНА А НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Нарушает передачу сигнала с рецепторов ИЛ-2 в ядро Б) Ингибирует фермент кальцинейрин В) Нарушает образование ИЛ-2 Г) Связывается с белком иммунофиллином @	А
25.	ДЕ-5. Вопрос-25 К ЭКЗОГЕННЫМ ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМ ОТНОСИТСЯ: А) Рибомунил Б) рекомбинантный ИЛ-2 (ронколейкин) В) Интерферон-альфа (интерферон человеческий лейкоцитарный) Г) рекомбинантный ИЛ-1-бета (беталейкин)	А

	@	
26.	ДЕ-5. Вопрос-26 К ЭКЗОГЕННЫМ ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМ ОТНОСИТСЯ: А) Смесь бактериальных лизатов (ИРС-19) Б) рекомбинантный ИЛ-2 (ронколейкин) В) Интерферон-альфа (интерферон человеческий лейкоцитарный) Г) рекомбинантный ИЛ-1-бета (беталейкин) @	А
27.	ДЕ-5. Вопрос-27 АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, СОЧЕТАЮЩЕЕ В СПЕКТРЕ СВОЕГО ДЕЙСТВИЯ СТАБИЛИЗАЦИЮ МЕМБРАН ТУЧНЫХ КЛЕТОК С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛОКАДОЙ H₁-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ: А) Кетотифен (Задитен) Б) Дезлоратадин (Эриус) В) Кромоглициевая кислота (Интал) Г) Хлоропирамин (Супрастин) @	А
28.	ДЕ-5. Вопрос-28 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН): А) Аллергический ринит и конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, зудящие дерматозы и др. Б) Только профилактика приступов бронхиальной астмы В) Комплексная терапия заболеваний, сопровождающаяся понижением клеточного иммунитета (острые и хронические гнойные процессы, ожоговая болезнь, трофические язвы, лучевая и химиотерапия у онкологических больных) Г) Профилактика отторжения трансплантата при пересадке почки, легких, сердца и других органов @	А
29.	ДЕ-5. Вопрос-29 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭКСТРАКТ ТИМУСА (ТИМАЛИН): А) Комплексная терапия заболеваний, сопровождающаяся понижением клеточного иммунитета (острые и хронические гнойные процессы, ожоговая болезнь, трофические язвы, лучевая и химиотерапия у онкологических больных) Б) Только профилактика приступов бронхиальной астмы В) Профилактика отторжения трансплантата при пересадке почки, легких, сердца и других органов Г) Аллергический ринит и конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, зудящие дерматозы и др. @	А
30.	ДЕ-5. Вопрос-30 К ЭНДОГЕННЫМ ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Сок эхинацеи пурпурной травы (иммунал) Б) рекомбинантный ИЛ-2 (ронколейкин) В) Интерферон-альфа (интерферон человеческий лейкоцитарный) Г) рекомбинантный ИЛ-1-бета (беталейкин) @	А
31.	ДЕ-5. Вопрос-31 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕТОТРЕКСАТА: А) Ингибирует дигидрофолатредуктазу Б) Ингибирует дигидрооротат дегидрогеназу В) Нарушает образование ИЛ-2 Г) Связывает тимочиты по типу реакции «антиген-антитело» @	А
32.	ДЕ-5. Вопрос-32 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛОСПОРИНА А: А) Нарушает образование ИЛ-2 Б) Ингибирует дигидрооротат дегидрогеназу В) Ингибирует дигидрофолатредуктазу Г) Связывает ко-рецептор CD-20 по типу реакции «антиген-антитело» @	А
33.	ДЕ-5. Вопрос-33 К СИНТЕТИЧЕСКИМ ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМ ОТНОСИТСЯ: А) Левамизол Б) рекомбинантный ИЛ-2 В) сок эхинацеи пурпурной Г) Ликопид @	А
34.	ДЕ-5. Вопрос-34 К ИММУНОСТИМУЛЯТОРУ НЕ ИМЕЮЩИЙ БЕЛКОВО-ПЕПТИДНУЮ ПРИРОДУ А) Тилорон (Амиксин)	А

	Б) Рекомбинантный ИЛ-2 (Альдеслейкин) В) Интерферон-альфа Г) Экстракт тимуса (Тималин) @	
35.	ДЕ-5. Вопрос-35 ДЕЗЛОРАТАДИН ОТНОСИТСЯ К: А) Противоаллергическим средствам Б) Иммуносупрессором В) Иммуностимуляторам Г) Стимуляторам кроветворения @	А
36.	ДЕ-5. Вопрос-36 МЕТОТРЕКСАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ: А) иммунодепрессанты Б) Иммуностимуляторы В) Противоаллергические средства Г) Стимуляторы кроветворения @	А
37.	ДЕ-5. Вопрос-37 М-ХОЛИНОБЛОКАТОР ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: А) Тиотропия бромид Б) Сальбутамол В) Пирензепин Г) Атропин @	А
38.	ДЕ-5. Вопрос-38 К ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ: А) Беклометазон Б) Преднизолон В) Метилпреднизолон Г) Бетаметазон @	А
39.	ДЕ-5. Вопрос-39 К АНТИЛЕЙКОТРЕНОВАМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) Монтелукаст Б) омализумаб В) рофлумиласт Г) аминофиллин @	А
40.	ДЕ-5. Вопрос-40 ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРОНХОСПАЗМОВ ПРИМЕНЯЮТ: А) Сальбутамол Б) Будесонид В) Зафирлукаст Г) Омализумаб @	А
41.	ДЕ-5. Вопрос-41 К СТАБИЛИЗАТОРАМ МЕМБРАН ТУЧНЫХ КЛЕТОК ОТНОСИТСЯ: А) Кромоглициевая кислота Б) Аминофиллин В) Сальбутамол Г) Преднизолон @	А
42.	ДЕ-5. Вопрос-42 H ₁ -ГИСТАМИНОБЛОКАТОР I ПОКОЛЕНИЯ: АНТИГИСТАМИННОЕ СРЕДСТВО I ПОКОЛЕНИЯ А) Хлоропирамин Б) Лоратадин В) Галавит Г) Дезлоратадин @	А
43.	ДЕ-5. Вопрос-43 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ИЛИ ПРИМЕНЯЮТСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: А) β-адреноблокаторы Б) Глюкокортикостероиды В) М-холиноблокаторы	А

	Г) β-адреномиметики @	
44.	ДЕ-5. Вопрос-44 ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПРИМЕНЯЮТ: А) Циклоспорин А Б) Интерферон альфа В) Кромоглициевую кислоту Г) Дифенгидрамин @	А
45.	ДЕ-5. Вопрос-45 БЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙСТВИЕ КРОМОГЛИЦИЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СВЯЗАНО С: А) Стабилизацией мембран тучных клеток Б) Прямым миорелаксирующим влиянием на мускулатуру бронхов В) М-холиноблокирующим действием Г) Адреномиметическим действием @	А
46.	ДЕ-5. Вопрос-46 НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ: А) Ротоглоточный кандидоз Б) Увеличение массы тела В) Синдром Кушинга Г) Отеки и повышение АД @	А
47.	ДЕ-5. Вопрос-47 ПРЕПАРАТ ДЛЯ СНЯТИЯ БРОНХОСПАЗМА: А) Сальбутамол Б) Метотрексат В) Кетотифен Г) Кромоглициевая кислота @	А
48.	ДЕ-5. Вопрос-48 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ: А) Эпинефрин Б) Кромоглициевая кислота В) Бетаметазон Г) Левамизол @	А
49.	ДЕ-5. Вопрос-49 К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ: А) Будесонид Б) Сальбутамол В) Кромогликат натрия Г) Ипратропия бромид @	А
50.	ДЕ-5. Вопрос-50 В КАЧЕСТВЕ БРОНХОЛИТИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЗОВАНЫ: А) Бета-адреномиметики Б) М-холиномиметики В) альфа-адреномиметики Г) бета-адреноблокаторы @	А
51.	ДЕ-5. Вопрос-51 САЛЬБУТАМОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ: А) бета-2-адреномиметиков Б) м-холинолитиков В) стабилизаторов клеточных мембран Г) Антилейкотриеновых средств @	А
52.	ДЕ-5. Вопрос-52 ИНДУКТОР ИНТЕРФЕРОНА: А) Тилорон Б) Циклоспорин В) Тималин Г) Осельтамивир @	А
53.	ДЕ-5. Вопрос-53	А

	ИММУНОСТИМУЛЯТОР: А) Полиоксидоний Б) Циклоспорин В) Азатиоприн Г) Преднизолон @	
54.	ДЕ-5. Вопрос-54 ИММУНОДЕПРЕССАНТ: А) Циклоспорин Б) Ципрофлоксацин В) Тилорон Г) Левамизол @	А
55.	ДЕ-5. Вопрос-55 К ИММУНОСУПРЕССОРАМ НЕ ОТНОСИТСЯ А) Левамизол. Б) Даклизумаб В) Азатиоприн Г) Циклоспорин. @	А
56.	ДЕ-5. Вопрос-56 НЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОР: А) Азатиоприн. Б) Полиоксидоний В) Левамизол Г) Интерферон-альфа @	А
57.	ДЕ-5. Вопрос-57 БЛОКАТОРЫ H ₁ -ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ I ПОКОЛЕНИЯ НЕ ОБЛАДАЮТ СВОЙСТВОМ: А) Оказывают психостимулирующее действие Б) Могут блокировать М-холинорецепторы, 5НТ-рецепторы, α-адренорецепторы, D-рецепторы В) Проявляют центральные эффекты (седативное действие, стимуляция аппетита). Г) Проникают через ГЭБ @	А
58.	ДЕ-5. Вопрос-58 ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЙ СНОВЕРНОГО ДЕЙСТВИЯ: А) Кетотифен (Задитен) Б) Дифенгидрамин (Димедрол) В) Хлорпирамин (Супрастин) Г) Прометазин (Пипольфен) @	А
59.	ДЕ-5. Вопрос-59 ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА ПОКАЗАНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ: А) Иммуномодуляторы Б) Стабилизаторы мембран тучных клеток В) Глюкокортикостероиды Г) Блокаторы гистаминовых H ₁ -рецепторов. @	А
60.	ДЕ-5. Вопрос-60 К МЕХАНИЗМАМ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Репрессия генов синтеза ЦОГ-2 Б) Снижение синтеза лейкотриенов C ₄ , D ₄ , E ₄ и фактора активации тромбоцитов. В). Индукция генов синтеза липокортина 1 Г) Стабилизация мембран тучных клеток. @	А
61.	ДЕ-5. Вопрос-61 ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: А) Беклометазон. Б) Дексаметазон. В) Гидрокортизона ацетат. Г) Преднизолон. @	А
62.	ДЕ-5. Вопрос-62 ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ НАРУЖНО В ВИДЕ МАЗЕЙ И КРЕМОВ.	А

	А) Флуоциналон.. Б) Триамцинолон В) Будесонид. Г) Флунизолид. @	
63.	ДЕ-5. Вопрос-63 ПРЕПАРАТ, НЕ ОБЛАДАЮЩИЙ ПСИХОСЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ: А) Лоратадин. Б) Дифенгидрамин В) Прометазин. Г) Хлоропирамин. @	А
64.	ДЕ-5. Вопрос-64 НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ СНОТВОРНЫМ И ПСИХОСЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Дифенгидрамин Б) Лоратадин В) Мебгидролин Г) Кетотифен @	А
65.	ДЕ-5. Вопрос-65 СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ ИНТЕРФЕРОНА: А) Тилорон. Б) Левамизол. В) Ронколейкин. Г) Тактивин. @	А
66.	ДЕ-5. Вопрос-66 НЕ ПОКАЗАН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: А) Такролимус. Б) Тилорон. В) Бронхомунал. Г) Рибомунил @	А
67.	ДЕ-5. Вопрос-67 НЕ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА: А) Альдеслейкин. Б) Даклизумаб В) Циклоспорин. Г) Преднизолон @	А
68.	ДЕ-5. Вопрос-68 В ФОРМИРОВАНИИ ИММУНОДЕПРЕССИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ УЧАСТВУЕТ, В ЧАСТНОСТИ: А) Снижение пролиферации и дифференцировки Т-и В-клонов лимфоцитов. Б) Индукция генов синтеза липокортина 1 В) Репрессия генов синтеза ЦОГ-2. Г) Снижение синтеза простагландинов группы Е. @	А
69.	ДЕ-5. Вопрос-69 ПРЕПАРАТ ПОЛИПЕПТИДНОЙ ПРИРОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЙ ИЗ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. ВОССТАНАВЛИВАЕТ ИММУНОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ, РЕГУЛИРУЯ КОЛИЧЕСТВО И СООТНОШЕНИЕ Т И В ЛИМФОЦИТОВ И СТИМУЛИРУЯ РЕАКЦИИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА. А) Тималин Б) Ликопид В) Иммунал Г) Динопростон @	А
70.	ДЕ-5. Вопрос-70 АНТИГИСТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ I ПОКОЛЕНИЯ: А) Хлоропирамин Б) Лоратадин В) Кетотифен Г) Цетиризин @	А

71.	ДЕ-5. Вопрос-71 К ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Азатиоприн Б) Тималин В) Ликопид Г) Иммунал @	А
72.	ДЕ-5. Вопрос-72 ИММУНОСУПРЕССОР: А) Циклоспорин Б) Тималин В) Ликопид Г) Цефазолин @	А
73.	ДЕ-5. Вопрос-73 ЭНДОГЕННЫЙ ИММУНОСТИМУЛЯТОР: А) Тималин Б) Сандиммун В) Ликопид Г) Иммунал @	А
74.	ДЕ-5. Вопрос-74 ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОСПОРИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ А) Аллергические реакции Б) Пересадка костного мозга В) Аутоиммунные заболевания Г) Предупреждение реакции отторжения трансплантата при аллогенной трансплантации внутренних органов @	А
75.	ДЕ-5. Вопрос-75 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛИКОПИДА, В ЧАСТНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ А) Профилактика ОРВИ Б) Аутоиммунные заболевания В) Бронхиальная астма Г) Аллергические реакции @	А
76.	ДЕ-5. Вопрос-76 СРЕДСТВО, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ ДЕГРАДУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК А) Кетотифен Б) Дезлоратадин В) Дифенгидрамин Г) Молграмостим @	А
77.	ДЕ-5. Вопрос-77 Н ₁ -ГИСТАМИНОБЛОКАТОР III ПОКОЛЕНИЯ А) Дезлоратадин Б) Дифенгидрамин В) Клемастин Г) Кислота кромоглициевая @	А
78.	ДЕ-5. Вопрос-78 К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТАМ ДИФЕНГИДРАМИНА НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Иммуносупрессивный Б) Противорвотный В) Снотворный Г) Седативный @	А
79.	ДЕ-5. Вопрос-79 К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ХЛОРОПИРАМИНА НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Желудочковые аритмии Б) Сухость во рту В) Констипация Г) Сонливость @	А
80.	ДЕ-5. Вопрос-80 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗЛОРАТАДИНА, В ЧАСТНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ: А) Аллергический ринит Б) Аутоиммунные заболевания	А

	В) Реакция отторжения трансплантата Г) Диарея @	
81.	ДЕ-5. Вопрос-81 Н ₁ БЛОКАТОР III ПОКОЛЕНИЯ. ОКАЗЫВАЕТ АНТИГИСТАМИННОЕ, ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ. ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОНЛИВОСТЬ. ПРИНИМАЕТСЯ 1 РАЗ В СУТКИ. А) Дезлоратадин Б) Кетотифен В) Димедрол Г) Кромоглициевая кислота @	А
82.	ДЕ-5. Вопрос-82 ХЛОРОПИРАМИН НЕ ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ: А) Антисеротониновым Б) Снотворным В) Седативным Г) Холиноблокирующим @	А
83.	ДЕ-5. Вопрос-83 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ А) Иммунал Б) Сандиммун В) Имуран Г) Кромоглициевая кислота @	А
84.	ДЕ-5. Вопрос-84 ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА НЕ ПРИМЕНЯЮТ А) Ликопид Б) Циклоспорин В) Преднизолон Г) Имуран @	А
85.	ДЕ-5. Вопрос-85 ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ КРОМОГЛИЦИЕВОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ: А) Профилактика приступов бронхиальной астмы Б) Крапивница В) Аутоиммунные заболевания Г) Сывороточная болезнь @	А
86.	ДЕ-5. Вопрос-86 К ЭНДОГЕННЫМ ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ: А) Индукторы интерферона Б) Цитокины В) Иммуноглобулины Г) Интерфероны @	А
87.	ДЕ-5. Вопрос-87 К АНТИБИОТИКАМ С ВЫРАЖЕННОЙ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ: А) Циклоспорин Б) Цефазолин В) Циклофосфамид Г) Ципрофлоксацин @	А
88.	ДЕ-5. Вопрос-88 К ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВАМ КУПИРОВАНИЯ БРОНХОСПАЗМА НЕ ОТНОСИТСЯ: А) Кромоглициевая кислота Б) Сальбутамол В) Эпинефрин Г) Аминофиллин @	А
89.	ДЕ-5. Вопрос-89 АНТИГИСТАМИННОЕ СРЕДСТВО, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО САМО ВЫЗЫВАЮЩЕЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ: А) Дифенгидрамин	А

	Б) Кетотифен В) Цетиризин Г) Хлорпирамин @	
90.	ДЕ-5. Вопрос-90 ГЛЮКОКОРТИКОИД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: А) Беклометазона дипропионат Б) Кромоглициевая кислота В) Теофиллин Г) Зафирлукаст @	А
91.	ДЕ-5. Вопрос-91 ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРЯМЫМ МИОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА БРОНХИ: А) Метилксантины Б) Бета-адреномиметики В) М-холинолитики Г) Стабилизаторы мембран тучных клеток @	А
92.	ДЕ-5. Вопрос-92 АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ I ПОКОЛЕНИЯ, КРОМЕ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ: А) Потенцирования действия анальгетиков Б) Профилактики инфекционных заболеваний органов дыхания В) Лечения диареи Г) Предупреждения лекарственного паркинсонизма @	А
93.	ДЕ-5. Вопрос-93 АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ I ПОКОЛЕНИЯ, КРОМЕ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, В КАЧЕСТВЕ: А) Седативных и снотворных средств Б) Иммуносупрессоров В) Антидиарейных средств Г) Аналептиков @	А
94.	ДЕ-5. Вопрос-94 ПРИ ПРИЁМЕ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПОТОМУ, ЧТО: А) Ряд препаратов этой группы потенцирует действие веществ, угнетающих ЦНС Б) Повышается гепатотоксичность этанола В) Антигистаминные средства обладают сульфирамоподобным действием Г) Снижается эффективность гистаминоблокирующего действия @	А
95.	ДЕ-5. Вопрос-95 БРОНХОЛИТИК С БЕТА2-АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ: А) Сальбутамол Б) Теофиллин В) Кетотифен Г) Кромоглициевая кислота @	А
96.	ДЕ-5. Вопрос-96 К АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ: А) Индукторы интерферона Б) Антигистаминные средства В) Стабилизаторы мембран тучных клеток Г) Глюкокортикоиды @	А
97.	ДЕ-5. Вопрос-97 БЛОКАТОР ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ: А) Зафирлукаст Б) Беклометазон В) Преднизолон Г) Кромоглициевая кислота @	А
98.	ДЕ-5. Вопрос-98 ПРЕПАРАТЫ, ЭФФЕКТИВНО ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, НО НЕ КУПИРУЮЩИЕ, ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ:	А

	А) Стабилизаторы мембран тучных клеток Б) Антигистаминные средства В) Метилксантины Г) Глюкокортикоиды @	
99.	ДЕ-5. Вопрос-99 ЭКЗОГЕННЫЙ ИММУНОСТИМУЛЯТОР, СОДЕРЖАЩИЙ РИБОСОМЫ БАКТЕРИЙ – ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ: А) Рибомунил Б) Бронхомунал В) Липопид Г) Тималин @	А
100.	ДЕ-5. Вопрос-100 ИММУНОСУПРЕССОР: А) Азатиоприн (Имуран) Б) Левамизол В) Динопростон Г) Лоперамид @	А
101.	ДЕ-5. Вопрос-101 АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО: А) Кетотифен Б) Пирезепин В) Бисакодил Г) Фуросемид @	А
102.	ДЕ-5. Вопрос-102 ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ А) адреналин Б) добутамин В) фенилэфрин Г) ксилометазолин @	А
103.	ДЕ-5. Вопрос-103 ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ПРИМЕНЯЮТ А) преднизолон Б) кетотифен В) кромоглициевую кислоту Г) недокромил @	А
104.	ДЕ-5. Вопрос-104 ПРОДИГИОЗАН А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
105.	ДЕ-5. Вопрос-105 ИМУДОН А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
106.	ДЕ-5. Вопрос-106 ЛИКОПИД А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
107.	ДЕ-5. Вопрос-107 ТИМАЛИН А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат	А

	@	
108.	ДЕ-5. Вопрос-108 ИММУНАЛ А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	A
109.	ДЕ-5. Вопрос-109 ЦИКЛОСПОРИН А А) Иммуносупрессор Б) Иммуностимулятор В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	A
110.	ДЕ-5. Вопрос-110 ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) А) Антиаллергическое средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Синтетическое гипогликемическое средство @	A
111.	ДЕ-5. Вопрос-111 ЛОРАТАДИН (КЛАРИТИН) А) Антиаллергическое средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Синтетическое гипогликемическое средство @	A
112.	ДЕ-5. Вопрос-112 ЛЕВОЦИТИРИЗИН (КСИЗАЛ) А) Антиаллергическое средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Синтетическое гипогликемическое средство @	A
113.	ДЕ-5. Вопрос-113 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТИМАЛИНА: А) Гнойно-воспалительные постоперационные заболевания Б) Тризма В) Бруксизм Г) Аллергические реакции на введение местноанестезирующих средств @	A
114.	ДЕ-5. Вопрос-114 ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИМЕНЯЮТ: А) Тималин Б) Доксирубин В) Мебендазол Г) Сульгин @	A
115.	ДЕ-5. Вопрос-115 ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛ СТОМАТОЛОГ, КОГДА НАЗНАЧИЛ ПАЦИЕНТУ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТИМАЛИН?: А) Да Б) Нет @	A
116.	ДЕ-5. Вопрос-116 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИММУНАЛ: А) Комплексная терапия герпетического стоматита Б) Тризма В) Бруксизм Г) Аллергические реакции на введение местноанестезирующих средств @	A
117.	ДЕ-5. Вопрос-117 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИММУНАЛ: А) Комплексная терапия герпетического стоматита Б) Тризма	A

	В) Бруксизм Г) Аллергические реакции на введение местноанестезирующих средств @	
118.	ДЕ-5. Вопрос-118 В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ПРИМЕНЯЮТ: А) Иммунал Б) Доксирубин В) Мебендазол Г) Сульгин @	А
119.	ДЕ-5. Вопрос-119 В МЕХАНИЗМЕ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ КЕТОТИФЕНА ИМЕЕТ МЕСТО: А) Стабилизация мембран тучных клеток и блокада гистаминовых H1-рецепторов Б) Только стабилизирование мембран тучных клеток В) Блокада гистаминовых рецепторов в ЦНС Г) Блокада гастриновых рецепторов @	А
120.	ДЕ-5. Вопрос-120 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ТИМОГЕН: А) иммуномодуляторы Б) иммуносупрессоры В) противоаллергические средства Г) стимуляторы кровотока @	А
121.	ДЕ-5. Вопрос-121 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЦИКЛОСПОРИН А: А) сандимун Б) димедрол В) зиртек Г) эриус @	А
122.	ДЕ-5. Вопрос-122 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ХЛОРОПИРАМИН: А) супрастин Б) димедрол В) зиртек Г) эриус @	А
123.	ДЕ-5. Вопрос-123 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ДИФЕНГИДРАМИН: А) димедрол Б) супрастин В) зиртек Г) эриус @	А
124.	ДЕ-5. Вопрос-124 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЦЕТИРИЗИН: А) зиртек Б) димедрол В) супрастин Г) эриус @	А
125.	ДЕ-5. Вопрос-125 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ДЕЗЛОРАТАДИН: А) эриус Б) димедрол В) зиртек Г) супрастин @	А
126.	ДЕ-5. Вопрос-126 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН КЕТОТИФЕН: А) задитен Б) димедрол В) зиртек Г) эриус @	А
127.	ДЕ-5. Вопрос-127 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА: А) интал	А

	Б) димедрол В) зиртек Г) эриус @	
128.	ДЕ-5. Вопрос-128 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ СУПРАСТИН: А) хлоропирамин Б) дифенгидрамин В) дезлоратадин Г) кетотифен @	А
129.	ДЕ-5. Вопрос-129 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ДИМЕДРОЛ: А) дифенгидрамин Б) хлоропирамин В) дезлоратадин Г) кетотифен @	А
130.	ДЕ-5. Вопрос-130 МНН У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ЭРИУС: А) дезлоратадин Б) хлоропирамин В) дифенгидрамин Г) кетотифен @	А

Дидактическая единица №6. Гормональные лекарственные средства. Средства, влияющие на миометрий (203)

№	Текст вопроса	Ответ (буквенный)
1.	ДЕ-6. Вопрос-1 КАЛЬЦИТОНИН (МИОКАЛЬЦИК) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для инъекций 100 МЕ/мл, №5 - ампула 1 мл (5) Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
2.	ДЕ-6. Вопрос-2 ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ (ЭУТИРОКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 100 мкг / 112 мкг / 125 мкг / 137 мкг / 150 мкг, №50 - 25 шт. Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
3.	ДЕ-6. Вопрос-3 ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ (ЭУТИРОКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 25 мкг / 50 мкг / 75 мкг / 88 мкг , №50 - 25 шт. Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
4.	ДЕ-6. Вопрос-4 ИНСУЛИН ГЛАРГИН (ЛАНТУС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл, №5 - картридж 3 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
5.	ДЕ-6. Вопрос-5 МЕТФОРМИН (ГЛЮКОФАЖ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытых пленочной оболочкой 500 мг / 850 мг / 1000 мг Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
6.	ДЕ-6. Вопрос-6 ПРЕДНИЗОЛОН (МЕДОПРЕД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, №10 - ампула темного стекла 1 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
7.	ДЕ-6. Вопрос-7 ДЕКСАМЕТАЗОН (ДЕКСАМЕД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутривенного и внутримышечного введения 4 мг/мл, №10 - ампула темного стекла 1 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
8.	ДЕ-6. Вопрос-8 В ФОРМЕ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ ПРИ ВАЗОМОТОРНОМ РИНИТЕ ПРИМЕНЯЮТ А) мометазон Б) гидрокортизон В) пиридоксин Г) октреотид @	А
9.	ДЕ-6. Вопрос-9 ПРЕПАРАТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ВИДЕ МАЗИ А) бетаметазон Б) октреотид В) летрозол Г) финастерид @	А
10.	ДЕ-6. Вопрос-10 КАКИЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИМЕНЯЮТ ИНГАЛЯЦИОННО	А

	А) беклометазон Б) флуметазон В) преднизолон Г) триамцинолон @	
11.	ДЕ-6. Вопрос-11 КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ КАК ИНГАЛЯЦИОННО, ТАК И МЕСТНО В ВИДЕ МАЗЕЙ А) будесонид Б) беклометазон В) флуоцинолон Г) флунизол @	А
12.	ДЕ-6. Вопрос-12 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОКТРЕОТИДА ЭТО: А) соматостатин Б) мелаксен В) миакальцик Г) эутирокс @	А
13.	ДЕ-6. Вопрос-13 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕЛАТОНИНА ЭТО: А) мелаксен Б) соматостатин В) миакальцик Г) эутирокс @	А
14.	ДЕ-6. Вопрос-14 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КАЛЬЦИТОНИНА ЭТО: А) миакальцик Б) соматостатин В) мелаксен Г) эутирокс @	А
15.	ДЕ-6. Вопрос-15 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕВОТИРОКСИНА НАТРИЯ ЭТО: А) эутирокс Б) соматостатин В) мелаксен Г) миакальцик @	А
16.	ДЕ-6. Вопрос-16 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТИАМАЗОЛА ЭТО: А) мерказолил Б) лантус В) манинил Г) галвус @	А
17.	ДЕ-6. Вопрос-17 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИНСУЛИНА ГЛАРГИН ЭТО: А) лантус Б) мерказолил В) манинил Г) галвус @	А
18.	ДЕ-6. Вопрос-18 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛИБЕНКЛАМИДА ЭТО: А) манинил Б) мерказолил В) лантус Г) галвус @	А
19.	ДЕ-6. Вопрос-19 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕТФОРМИНА ЭТО: А) глюкофаж Б) мерказолил В) лантус Г) галвус @	А
20.	ДЕ-6. Вопрос-20 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ЭТО: А) медопред Б) мерказолил В) лантус Г) галвус @	А
21.	ДЕ-6. Вопрос-21 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БЕТАМЕТАЗОНА ЭТО:	А

	А) целестодерм-В Б) мерказолил В) лантус Г) галвус @	
22.	ДЕ-6. Вопрос-22 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ФЛУДРОКОРТИЗОНА ЭТО: А) кортинефф Б) мерказолил В) лантус Г) галвус @	А
23.	ДЕ-6. Вопрос-23 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НАНДРОЛОНА ЭТО: А) ретаболил Б) мерказолил В) лантус Г) галвус @	А
24.	ДЕ-6. Вопрос-24 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭСТРАДИОЛ+ЛЕВОНГЕСТРЕЛ ЭТО: А) климонорм Б) мерказолил В) лантус Г) галвус @	А
25.	ДЕ-6. Вопрос-25 АКТГ А) гормональное средство Б) осмотический диуретик В) антисептик Г) гипотензивное средство @	А
26.	ДЕ-6. Вопрос-26 ОКСИТОЦИН А) гормональное средство Б) осмотический диуретик В) антисептик Г) гипотензивное средство @	А
27.	ДЕ-6. Вопрос-27 ТИРЕОИДИН А) гормональное средство Б) осмотический диуретик В) антисептик Г) гипотензивное средство @	А
28.	ДЕ-6. Вопрос-28 ТИАМАЗОЛ А) антигормональное средство Б) осмотический диуретик В) антисептик Г) гипотензивное средство @	А
29.	ДЕ-6. Вопрос-29 ГЛИБЕНКЛАМИД А) синтетическое гипогликемическое средство Б) противовирусное средство В) осмотический диуретик Г) гипотензивное средство @	А
30.	ДЕ-6. Вопрос-30 МЕТФОРМИН А) синтетическое гипогликемическое средство Б) противовирусное средство В) осмотический диуретик Г) гипотензивное средство @	А
31.	ДЕ-6. Вопрос-31 ПРЕДНИЗОЛОН А) глюкокортикостероид Б) противовирусное средство В) осмотический диуретик Г) синтетическое гипогликемическое средство @	А
32.	ДЕ-6. Вопрос-32 ДЕКСАМЕТАЗОН А) глюкокортикостероид	А

	Б) противовирусное средство В) осмотический диуретик Г) синтетическое гипогликемическое средство @	
33.	ДЕ-6. Вопрос-33 ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ А) препарат женских половых гормонов Б) противовирусное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) глюкокортикостероид @	A
34.	ДЕ-6. Вопрос-34 ПРОГЕСТЕРОН А) препарат женских половых гормонов Б) противовирусное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) глюкокортикостероид @	A
35.	ДЕ-6. Вопрос-35 КЛОМИФЕНА ЦИТРАТ А) антагонист эстрогенов Б) противовирусное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) глюкокортикостероид @	A
36.	ДЕ-6. Вопрос-36 ТЕСТОСТЕРОНА ПРОПИОНАТ А) препарат мужских половых гормонов Б) противовирусное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) глюкокортикостероид @	A
37.	ДЕ-6. Вопрос-37 ЦИПРОТЕРОНА АЦЕТАТ А) антагонист мужских половых гормонов (тестостерона) Б) противовирусное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) глюкокортикостероид @	A
38.	ДЕ-6. Вопрос-38 ФЕНОБОЛИЛ А) анаболическое средство Б) противовирусное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) глюкокортикостероид @	A
39.	ДЕ-6. Вопрос-39 ФЕНОБОЛИЛ А) анаболическое средство Б) противовирусное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) глюкокортикостероид	A
40.	ДЕ-6. Вопрос-40 ИНСУЛИН - СРЕДСТВО: А) заместительной терапии Б) этиотропной терапии В) патогенетической терапии Г) симптоматической терапии @	A
41.	ДЕ-6. Вопрос-41 ФЕНОБОЛИЛ АНАБОЛИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО? А) да Б) нет @	A
42.	ДЕ-6. Вопрос-42 ПРОГЕСТЕРОН А) препарат женских половых гормонов Б) противоопухолевое андрогенное средство В) синтетическое гипогликемическое средство Г) антагонист морфина @	A
43.	ДЕ-6. Вопрос-43 ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ЭПИФИЗА, РЕГУЛИРУЮЩИЙ БИОРИТМЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ СНОВТОРНОГО СРЕДСТВА А) мелатонин Б) тиамазол В) тестостерон	A

	Г) мифепристон @	
44.	ДЕ-6. Вопрос-44 ПРЕПАРАТ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ-ГЕСТАГЕН А) прогестерон Б) мифепристон В) этинилэстрадиол Г) кломифена цитрат @	А
45.	ДЕ-6. Вопрос-45 К ПРЕПАРАТАМ ГОРМОНОВ СТЕРОИДНОГО СТРОЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ: А) инсулин Б) преднизолон В) прогестерон Г) метилтестостерон @	А
46.	ДЕ-6. Вопрос-46 ГОРМОН БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ: А) инсулин Б) прогестерон В) метилтестостерон Г) синестрол @	А
47.	ДЕ-6. Вопрос-47 ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРМОНОВ ГИПОТАЛАМУСА И НЕЙРОГИПОФИЗА А) пептиды Б) производные аминокислот В) полипептиды Г) белки @	А
48.	ДЕ-6. Вопрос-48 ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРМОНОВ ЭПИФИЗА А) производные аминокислот Б) пептиды В) полипептиды Г) белки @	А
49.	ДЕ-6. Вопрос-49 ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ А) производные аминокислот Б) пептиды В) полипептиды Г) белки @	А
50.	ДЕ-6. Вопрос-50 ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРМОНОВ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ А) стероидные соединения Б) пептиды В) полипептиды Г) белки @	А
51.	ДЕ-6. Вопрос-51 ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРМОНОВ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ А) стероидные соединения Б) пептиды В) полипептиды Г) белки @	А
52.	ДЕ-6. Вопрос-52 ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОРМОНОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: А) вещества белкового и пептидного строения Б) стероидные соединения В) производные аминокислот @	А
53.	ДЕ-6. Вопрос-53 СТЕРОИДНУЮ СТРУКТУРУ ИМЕЮТ ГОРМОНЫ А) коры надпочечников Б) щитовидной железы В) поджелудочной железы Г) гипофиза @	А
54.	ДЕ-6. Вопрос-54 АМИНОКИСЛОТНУЮ СТРУКТУРУ ИМЕЮТ ГОРМОНЫ А) щитовидной железы Б) поджелудочной железы В) коры надпочечников Г) гипофиза @	А

55.	ДЕ-6. Вопрос-55 ПЕПТИДНУЮ СТРУКТУРУ ИМЕЮТ ГОРМОНЫ А) гипофиза Б) половые гормоны В) щитовидной железы Г) коры надпочечников @	A
56.	ДЕ-6. Вопрос-56 В ПЕРЕДНЕЙ ДОЛЕ ГИПОФИЗА ОБРАЗУЮТСЯ ТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ, КОТОРЫЕ А) стимулируют соответствующие эндокринные железы Б) подавляют работу соответствующих эндокринных желез В) снижают артериальное давление Г) усиливают синтез жирных кислот @	A
57.	ДЕ-6. Вопрос-57 ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ЭПИФИЗА, РЕГУЛИРУЮЩИЙ БИОРИТМЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ СНОТВОРНОГО СРЕДСТВА А) мелатонин Б) тестостерон В) мифепристо Г) тиамазол @	A
58.	ДЕ-6. Вопрос-58 АНАЛОГОМ СОМАТОСТАТИНА ЯВЛЯЕТСЯ А) октреотид Б) гестринон В) гозерелин Г) ганиреликс @	A
59.	ДЕ-6. Вопрос-59 ПРИ АКРОМЕГАЛИИ ПРИМЕНЯЮТ : А) октреотид Б) финастерид В) соматотропин Г) прогестерон @	A
60.	ДЕ-6. Вопрос-60 ОКТРЕОТИД ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: А) рефрактерной диареи Б) тиреотоксикозе В) гиперальдостеронизме Г) синдроме Иценко-Кушинга @	A
61.	ДЕ-6. Вопрос-61 АНТАГОНИСТ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (АНТИТИРЕОИДНОЕ СРЕДСТВО) А) тиамазол Б) мелатонин В) тестостерон Г) мифепристон @	A
62.	ДЕ-6. Вопрос-62 АНТАГОНИСТ ЭСТРОГЕНОВ (АНТИЭСТРОГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ) А) кломифена цитрат Б) мелатонин В) кокарбоксилаза Г) гидрокортизон @	A
63.	ДЕ-6. Вопрос-63 ПРЕПАРАТ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ-ГЕСТАГЕН А) прогестерон Б) мифепристон В) кломифена цитрат Г) этинилэстрадиол @	A
64.	ДЕ-6. Вопрос-64 АНТИАНДРОГЕННОЕ СРЕДСТВО, ИНГИБИТОР 5А-РЕДУКТАЗЫ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ : А) финастерид Б) тамсулозин В) тамоксифен Г) летрозол @	A
65.	ДЕ-6. Вопрос-65 АТОМ ГАЛОГЕНА В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ СОДЕРЖИТ А) дексаметазон Б) преднизолон В) метилпреднизолон	A

	Г) гидрокортизон @	
66.	ДЕ-6. Вопрос-66 АТОМ ГАЛОГЕНА В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ СОДЕРЖИТ А) бетаметазон Б) преднизолон В) метилпреднизолон Г) гидрокортизон @	А
67.	ДЕ-6. Вопрос-67 К ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ (Т1/2 ~ 36-54 Ч) ОТНОСЯТСЯ А) дексаметазон Б) гидрокортизон В) преднизолон Г) тиамазол @	А
68.	ДЕ-6. Вопрос-68 К ФТОРИРОВАННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСИТСЯ А) бетаметазон Б) преднизолон В) гидрокортизон Г) даназол @	А
69.	ДЕ-6. Вопрос-69 К ГАЛОГЕНИРОВАННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСЯТСЯ А) дексаметазон Б) гидрокортизон В) преднизолон Г) метилпреднизолон @	А
70.	ДЕ-6. Вопрос-70 К ЭНДОКРИНОЛОГУ ОБРАТИЛСЯ БОЛЬНОЙ И. СО СЛЕДУЮЩИМИ ЖАЛОБАМИ: ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО ЖАРА, СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА, СЕРДЦЕБИЕНИЕ, ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ. ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО ВЫЯВИЛО: АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ, ТАХИКАРДИЮ, ЭКЗОФТАЛЬМ. ДИАГНОЗ – ТИРЕОТОКСИКОЗ. КАКОЙ ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ БОЛЬНОМУ? А) тиамазол Б) левотироксин натрия В) октреотид Г) метилпреднизолон @	А
71.	ДЕ-6. Вопрос-71 БОЛЬНОМУ В., СТРАДАЮЩЕМУ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, БЫЛО НАЗНАЧЕНО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО СТАЛИ БЕСПОКОИТЬ НАРУШЕНИЯ СНА, БОЛИ В ЖИВОТЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ: АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, ОТЁКИ, ГИПЕРГЛИКЕМИЯ, ГЛЮКОЗУРИЯ, ЛИМФОЦИТОПЕНИЯ, ЭОЗИНОПЕНИЯ. КАКОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПОЛУЧАЛ БОЛЬНОЙ? А) преднизолон Б) метотрексат В) диклофенак Г) индометацин @	А
72.	ДЕ-6. Вопрос-72 ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА (НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ) ПРИМЕНЯЮТ А) мифепристон Б) этинилэстрадиол В) финастерид Г) летрозол @	А
73.	ДЕ-6. Вопрос-73 КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ АМЕНОРЕЕ А) этинилэстрадиол Б) бетаметазон В) феназепам Г) инсулин @	А
74.	ДЕ-6. Вопрос-74 ПРИ ГИПОТИРЕОИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ А) левотироксин натрия Б) октреотид В) тиамазол Г) соматотропин @	А
75.	ДЕ-6. Вопрос-75	А

	ПРИ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ А) тироксин Б) дезоксикортикостерона ацетат В) кортикотропин Г) инсулин @	
76.	ДЕ-6. Вопрос-76 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ТИАМАЗОЛ ЯВЛЯЕТСЯ А) зоб диффузный токсический Б) гипопитарный нанизм (нарушение роста) В) сахарный диабет 1 типа Г) сахарный диабет 2 типа @	A
77.	ДЕ-6. Вопрос-77 ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ (ГИПЕРФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ) НАЗНАЧАЮТ А) дийодтирозин Б) тироксин В) трийодтиронин Г) инсулин @	A
78.	ДЕ-6. Вопрос-78 ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ ПРИМЕНЯЮТ А) кальцитонин Б) октреотид В) метилпреднизолон Г) тиамазол @	A
79.	ДЕ-6. Вопрос-79 ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ А) преднизолон Б) окситоцин В) тиреоидин Г) инсулин @	A
80.	ДЕ-6. Вопрос-80 ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА А) подкожный Б) пероральный В) сублингвальный Г) трансбуккальный @	A
81.	ДЕ-6. Вопрос-81 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО-ПРОИЗВОДНОЕ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ А) глибенкламид Б) натеглинид В) росиглитазон Г) метформин @	A
82.	ДЕ-6. Вопрос-82 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО-ПРОИЗВОДНОЕ БИГУАНИДА А) метформин Б) росиглитазон В) глибенкламид Г) натеглинид @	A
83.	ДЕ-6. Вопрос-83 ИНКРЕЦИЮ ЭНДОГЕННОГО ИНСУЛИНА ПОВЫШАЮТ А) глибенкламид Б) акарбоза В) фолиевая кислота Г) прогестерон @	A
84.	ДЕ-6. Вопрос-84 КАКОЙ ВИД ИНСУЛИНА ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ В НАРУЖНЫХ НАСОСНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ? А) инсулин-лизпро Б) инсулин-ультраленте В) никотиновая кислота Г) инулин @	A
85.	ДЕ-6. Вопрос-85 КАКОЙ ВИД ИНСУЛИНА МОЖНО ВВОДИТЬ 1 РАЗ В СУТКИ? А) гларгин-инсулин Б) аспарт-инсулин В) инсулин-лизпро Г) инулин	A

	@	
86.	ДЕ-6. Вопрос-86 ОСНОВНОЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ИНСУЛИНА А) гипогликемия Б) гипергликемия В) гипокалиемия Г) брадикардия @	A
87.	ДЕ-6. Вопрос-87 ПРИ ПОВТОРНЫХ ИНЪЕКЦИЯХ ИНСУЛИНА НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ А) липодистрофия Б) меланома В) крапивница Г) сыпь @	A
88.	ДЕ-6. Вопрос-88 ЛС, ПРИМЕНЯЕМОЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА А) инсулин Б) пиоглитазон В) глибенкламид Г) натеглинид @	A
89.	ДЕ-6. Вопрос-89 ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ, <u>КРОМЕ</u> А) инсулин Б) натеглинид В) метформин Г) росиглитазон @	A
90.	ДЕ-6. Вопрос-90 УМЕНЬШАЕТ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ И УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАХВАТ ГЛЮКОЗЫ МЫШЕЧНОЙ ТКАНЬЮ А) метформин Б) глимепирид В) натеглинид Г) пиоглитазон @	A
91.	ДЕ-6. Вопрос-91 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПОНИЖАЕТ АППЕТИТ, А ТАКЖЕ ВЫЗЫВАЕТ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА; МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТОШНОТУ, РВОТУ И ЛАКТАЦИДОЗ А) метформин Б) акарбоза В) глимепирид Г) инсулин @	A
92.	ДЕ-6. Вопрос-92 НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ МЕТФОРМИНУ: А) снижать поглощение глюкозы скелетными мышцами Б) угнетать глюконеогенез В) снижать всасывание глюкозы в кишечнике Г) снижать аппетит @	A
93.	ДЕ-6. Вопрос-93 МЕТЕОРИЗМ И ДИАРЕЮ ВЫЗЫВАЕТ А) акарбоза Б) натеглинид В) метформин Г) глимепирид @	A
94.	ДЕ-6. Вопрос-94 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНСУЛИНА А) увеличение массы тела Б) тератогенное действие В) синдром иценко-кушинга Г) блокада эстрогенных рецепторов @	A
95.	ДЕ-6. Вопрос-95 НЕ ОТНОСИТСЯ К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ИНСУЛИНА А) тератогенное действие Б) гипогликемия В) нарушение рефракции Г) увеличение массы тела @	A
96.	ДЕ-6. Вопрос-96 ИНСУЛИН ПРИМЕНЯЮТ КАК СРЕДСТВО: А) заместительной терапии Б) этиотропной терапии	A

	В) симптоматической терапии Г) профилактики @	
97.	ДЕ-6. Вопрос-97 ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНСУЛИНА УСИЛИВАЮТ А) бета-адреномиметики Б) пероральные гормональные контрацептивы В) трициклические антидепрессанты Г) тиреоидные гормоны @	А
98.	ДЕ-6. Вопрос-98 ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО А) инсулин Б) глибенкламид В) пиоглитазон Г) натеглинид @	А
99.	ДЕ-6. Вопрос-99 АНТИГЕСТАГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРЦИАЛЬНЫМ АГОНИСТОМ ГЕСТАГЕННЫХ РЕЦЕПТОРОВ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ А) мифепристон Б) летрозол В) тамоксифен Г) гозерелин @	А
100.	ДЕ-6. Вопрос-100 ПРЕПАРАТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ А) гидрокортизон Б) тиболон В) натеглинид Г) окситоцин @	А
101.	ДЕ-6. Вопрос-101 К ПРЕПАРАТАМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ОТНОСИТСЯ А) преднизолон Б) инсулин В) пиридоксин Г) метформин @	А
102.	ДЕ-6. Вопрос-102 ПРЕПАРАТОМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) бетаметазон Б) рифафлавин В) инсулин Г) эстрадиол @	А
103.	ДЕ-6. Вопрос-103 ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЭТО: А) противовоспалительный Б) противовирусный В) стимулирование эритропоэза Г) фибринолитический @	А
104.	ДЕ-6. Вопрос-104 ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЭТО: А) противошоковый Б) антибактериальный В) фибринолитический Г) стимулирование эритропоэза @	А
105.	ДЕ-6. Вопрос-105 ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЭТО: А) противоаллергический Б) противовирусный В) стимулирование эритропоэза Г) фибринолитический @	А
106.	ДЕ-6. Вопрос-106 ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЭТО: А) иммуносупрессивный Б) антиаритмический В) фибринолитический Г) стимулирование эритропоэза @	А
107.	ДЕ-6. Вопрос-107 ОСНОВНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В	А

	МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, <u>КРОМЕ</u> А) гиперурикемия Б) противовоспалительный В) противошоковый Г) противоаллергический @	
108.	ДЕ-6. Вопрос-108 ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ГИДРОКОРТИЗОНА В ГОРМОН-ЗАВИСИМЫХ КЛЕТКАХ-МИШЕНЯХ: А) гидрокортизон проникает в цитоплазму и связывается с белками теплового шока Б) гидрокортизон взаимодействует с рецепторами цитоплазматической мембраны (связывающий домен денилатциклазы) В) в цитоплазме активируется фосфорилирование холестерил-эстергидролазы @	А
109.	ДЕ-6. Вопрос-109 ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ГИДРОКОРТИЗОНА В ГОРМОН-ЗАВИСИМЫХ КЛЕТКАХ-МИШЕНЯХ: А) в ядре ген-регулятор ДНК активирует-ингибирует ген транскрипции Б) гидрокортизон взаимодействует с рецепторами цитоплазматической мембраны (связывающий домен денилатциклазы) В) в цитоплазме активируется фосфорилирование холестерил-эстергидролазы @	А
110.	ДЕ-6. Вопрос-110 ФЛУДРОКОРТИЗОН ПРИМЕНЯЮТ А) при болезни аддисона Б) при коллагенозах В) в качестве противовоспалительного средства Г) при дефиците железа @	А
111.	ДЕ-6. Вопрос-111 К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ОТНОСИТСЯ ВСЕ, <u>КРОМЕ</u> А) кристаллурия Б) синдром иценко-кушинга В) повышение АД и отеки Г) старение кожи (при применении топических стероидов) @	А
112.	ДЕ-6. Вопрос-112 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ВСЕ, <u>КРОМЕ</u> : А) кристаллурия Б) синдром иценко-кушинга В) гипергликемия Г) угнетение действия (изъязвление слизистой желудка и 12-перстной кишки) @	А
113.	ДЕ-6. Вопрос-113 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРН ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ А) синдром Кушинга Б) кристаллурия В) синдром Рея Г) паралич аккомодации @	А
114.	ДЕ-6. Вопрос-114 ПРИ СИСТЕМНОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ А) синдром Кушинга Б) синдром Рея В) болезнь Аддисона Г) кессонная болезнь @	А
115.	ДЕ-6. Вопрос-115 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К НАЗНАЧЕНИЮ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЮТСЯ А) сахарный диабет Б) бронхиальная астма В) рассеянный склероз Г) хроническая обструктивная болезнь легких @	А
116.	ДЕ-6. Вопрос-116 СИНДРОМ КУШИНГА ВЫЗЫВАЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ А) метилпреднизолона Б) нимесулида В) фолиевой кислоты Г) пиридоксина @	А
117.	ДЕ-6. Вопрос-117 ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПО ВСЕМ ПОКАЗАНИЯМ, <u>КРОМЕ</u> А) гиперальдостеронизм Б) бронхиальная астма В) коллагенозы	А

	Г) предупреждение реакции отторжения трансплантата @	
118.	ДЕ-6. Вопрос-118 МЕХАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ ОПОСРЕДУЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: А) снижение тахифилаксии β 2-рецепторов гладкой мускулатуры бронхов к симпатической иннервации и агонистам β 2-рецепторов Б) снижение количества α 1-рецепторов на гладкомышечных клетках бронхов В) увеличение количества P1-рецепторов аденозина на гладкомышечных клетках бронхов @	A
119.	ДЕ-6. Вопрос-119 МЕХАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ ОПОСРЕДУЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: А) снижение образования и выделения простагландинов из тучных клеток слизистой оболочки дыхательных путей Б) снижение количества α 1-рецепторов на гладкомышечных клетках бронхов В) увеличение количества P1-рецепторов аденозина на гладкомышечных клетках бронхов @	A
120.	ДЕ-6. Вопрос-120 ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ ВЛИЯЮТ НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН А) оказывая катаболическое действие Б) не влияют В) оказывая анаболическое действие Г) нормализуя липидный обмен @	A
121.	ДЕ-6. Вопрос-121 ПРОТИВОЗУДНЫЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ОБУСЛОВЛЕН А) индукцией фермента гистаминазы Б) ингибированием фермента гистаминазы В) индукцией белка липокортина-1 Г) нарушением экстраклеточного захвата адреналина @	A
122.	ДЕ-6. Вопрос-122 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ОБУСЛОВЛЕН: А) индукцией белка липокортина-1 Б) ингибированием фермента гистаминазы В) индукцией фермента гистаминазы Г) нарушением экстраклеточного захвата адреналина @	A
123.	ДЕ-6. Вопрос-123 ПРОТИВОШОКОВЫЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ОБУСЛОВЛЕН: А) нарушением экстраклеточного захвата адреналина Б) ингибированием фермента гистаминазы В) индукцией фермента гистаминазы Г) индукцией белка липокортина-1 @	A
124.	ДЕ-6. Вопрос-124 ГОРМОНЫ СТЕРОИДНОЙ СТРУКТУРЫ ДЕЙСТВУЮТ НА А) внутриклеточные рецепторы, находящиеся в цитоплазме Б) рецепторы, расположенные в клеточной мембране (на поверхности клетки) В) рецепторы, находящиеся в стенках кровеносных сосудов Г) рецепторы предстательной железы @	A
125.	ДЕ-6. Вопрос-125 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕВАНОРГЕСТРЕЛА А) по принципу отрицательной обратной связи снижает продукцию лг, нарушается образование желтого тела и подавляется инкретия эндогенных гестагенов Б) ингибирует фермент ароматазу В) является блокатором эстрогенных рецепторов Г) является частичным агонистом гестагенных рецепторов @	A
126.	ДЕ-6. Вопрос-126 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛА (КАК КОМПОНЕНТА ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ) А) по принципу отрицательной обратной связи снижает продукцию фсг, нарушается рост фолликулов и подавляется инкретия эндогенных эстрагенов Б) ингибирует фермент ароматазу В) является частичным агонистом гестагенных рецепторов Г) является блокатором эстрогенных рецепторов @	A
127.	ДЕ-6. Вопрос-127 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МИФЕПРИСТОНА А) является частичным агонистом гестагенных рецепторов Б) по принципу отрицательной обратной связи снижает продукцию лг, нарушается образование желтого тела и подавляется инкретия эндогенных гестагенов В) ингибирует фермент ароматазу Г) является блокатором эстрогенных рецепторов	A

	@	
128.	ДЕ-6. Вопрос-128 Антигестагенный препарат, по механизму действия является парциальным агонистом гестагенных рецепторов, применяется для медикаментозного аборта на ранних сроках беременности: А) мифепристон Б) летрозол В) леваноргестрел Г) тамоксифен @	
129.	ДЕ-6. Вопрос-129 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТАМОКСИФЕНА: А) является блокатором эстрогенных рецепторов Б) по принципу отрицательной обратной связи снижает продукцию ЛГ, нарушается образование желтого тела и подавляется инкретия эндогенных гестагенов В) по принципу отрицательной обратной связи снижает продукцию ФСГ, нарушается рост фолликулов и подавляется инкретия эндогенных эстрагенов Г) является парциальным агонистом гестагенных рецепторов @	A
130.	ДЕ-6. Вопрос-130 АНТИЭСТРОГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БЛОКАТОРОМ ЭСТРОГЕННЫХ РЕЦЕПТОРОВ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЭНДОМЕТРИЯ И ДРУГИХ ЭСТРОГЕНЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ А) тамоксифен Б) гозерелин В) финастерид Г) кломифен @	A
131.	ДЕ-6. Вопрос-131 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛА (КАК КОМПОНЕНТА ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ): А) по принципу отрицательной обратной связи снижает продукцию ФСГ, нарушается рост фолликулов и подавляется инкретия эндогенных эстрагенов Б) по принципу отрицательной обратной связи снижает продукцию ЛГ, нарушается образование желтого тела и подавляется инкретия эндогенных гестагенов В) является парциальным агонистом гестагенных рецепторов Г) является блокатором эстрогенных рецепторов @	A
132.	ДЕ-6. Вопрос-132 К ИНГИБИТОРАМ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ-4 ОТНОСЯТ А) вилдаглиптин Б) гликвидон В) глипизид Г) глибенкламид @	A
133.	ДЕ-6. Вопрос-133 ТЕСТОСТЕРОН А) стимулирует развитие половых органов и вторичных половых признаков у мужчин Б) оказывает катаболическое действие (угнетает синтез белка) В) у мужчин вызывает появление женских половых признаков Г) обладает противоаллергическим эффектом @	A
134.	ДЕ-6. Вопрос-134 ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ А) финастерид Б) нандролон В) окситоцин Г) летрозол @	A
135.	ДЕ-6. Вопрос-135 ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ПРИМЕНЯЮТ А) леваноргестрел Б) этинилэстрадиол В) тамоксифен Г) окситоцин @	A
136.	ДЕ-6. Вопрос-136 НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА ЭКСТРЕННАЯ ГЕСТАГЕННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ А) 24-48 часов Б) 72 часов В) 96 часов Г) 120 минут @	A
137.	ДЕ-6. Вопрос-137 БАРЬЕРНОМУ МЕТОДУ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ	A

	А) внутриматочные рилизинг-системы Б) презервативы В) контрацептивные губки Г) шеечные колпачки @	
138.	ДЕ-6. Вопрос-138 В ОТЛИЧИЕ ОТ МОНОФАЗНЫХ МНОГОФАЗНЫЕ КОК А) имеют переменные дозы эстрогена и гестагена в зависимости от фазы цикла Б) содержат только гестагены В) содержат только эстрогены Г) имеют постоянные дозы эстрогена и гестагена @	A
139.	ДЕ-6. Вопрос-139 КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТРАГЕН-ГЕСТАГЕННЫЕ КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА А) препятствуют имплантации яйцеклетки Б) стимулируют овуляцию В) стимулируют продукцию гонадотропных гормонов Г) токсичны @	A
140.	ДЕ-6. Вопрос-140 КАКОЙ ЭСТРОГЕН МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ЭНТЕРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ? А) этинилэстрадиол Б) левоноргестрел В) тестостерон Г) норэтиндрон @	A
141.	ДЕ-6. Вопрос-141 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ + ЭСТРАДИОЛ (КЛИМОНОРМ) А) заместительная гормональная терапия в пре- и постменопаузе Б) пероральный контрацептив В) стимулируют овуляцию Г) у женщин вызывает явления вирилизма (появление мужских половых признаков) @	A
142.	ДЕ-6. Вопрос-142 ЭСТРАДИОЛ МЕТАБОЛИЗИРУЕТСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ А) эстриола Б) эстрагена В) прогестерона Г) норэтиндрона @	A
143.	ДЕ-6. Вопрос-143 НОРГЕСТИМАТ + ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ (СИЛЕСТ) А) препятствует созреванию яйцеклеток в яичниках и овуляции Б) трехфазный пероральный контрацептив В) стимулирует овуляцию Г) применяется при климактерическом синдроме @	A
144.	ДЕ-6. Вопрос-144 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭСТРОГЕН-ГЕСТАГЕННЫХ КОНТРАЦЕПТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ А) задержка жидкости Б) дисбактериоз В) брадикардия Г) бронхоспазм @	A
145.	ДЕ-6. Вопрос-145 ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ НАЗНАЧАЮТ А) метилтестостерон Б) нандролон В) финастерид Г) экслотон @	A
146.	ДЕ-6. Вопрос-146 ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЮТ А) нандролон Б) финастерид В) тамоксифен Г) ливииал @	A
147.	ДЕ-6. Вопрос-147 АНАБОЛИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ А) нандролон Б) метирапон В) тамоксифен Г) постинор @	A
148.	ДЕ-6. Вопрос-148	A

	ТЕСТОСТЕРОН ПРИМЕНЯЮТ КАК СРЕДСТВО: А) заместительной терапии Б) этиотропной терапии В) симптоматической терапии Г) профилактики @	
149.	ДЕ-6. Вопрос-149 ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ : А) тестостерон Б) феназепам В) сальбутамол Г) дротаверин @	А
150.	ДЕ-6. Вопрос-150 НАНДРОЛОН А) увеличивает мышечную массу Б) оказывает катаболическое действие В) противопоказан при различных патологических состояниях, сопровождающихся усиленным распадом белков Г) показан при спазмах гладкой мускулатуры @	А
151.	ДЕ-6. Вопрос-151 ПРЕПАРАТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОПИНГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ: А) анаболические стероиды Б) витаминные биологические добавки В) отхаркивающие средства Г) антибактериальные средства @	А
152.	ДЕ-6. Вопрос-152 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА ПРИМЕНЯЮТ А) андрогенные средства Б) дексаметазон В) гепарин Г) маннитол @	А
153.	ДЕ-6. Вопрос-153 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА А) селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов Б) бета-адреноблокаторы В) блокаторы лейкотриеновых рецепторов Г) блокаторы эндотелиновых рецепторов @	А
	ВИТАМИНЫ	
154.	ДЕ-6. Вопрос-154 НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 0.05 г, №50 - 10 шт. Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
155.	ДЕ-6. Вопрос-155 НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для инъекций 10 мг/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
156.	ДЕ-6. Вопрос-156 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 50 мг / 200 мг / 300 мг / 500 мг Б) спрея 25 мкг/доза В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
157.	ДЕ-6. Вопрос-157 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл или 50 мг/мл Б) спрея 25 мкг/доза В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
158.	ДЕ-6. Вопрос-158 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ:	А

	А) таблеток жевательных 50 мг, №10 - 10 шт Б) спрея 25 мкг/доза В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	
159.	ДЕ-6. Вопрос-159 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) драже 50 мг, №100 - 100 шт. Б) спрея 25 мкг/доза В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
160.	ДЕ-6. Вопрос-160 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошка для приготовления раствора для приема внутрь №20 - пакет (пакетик) 2,5 г Б) спрея 25 мкг/доза В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
161.	ДЕ-6. Вопрос-161 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошок для приема внутрь 1000 мг, №3 - пакет (пакетик) термосвариваемый 1 г Б) спрея 25 мкг/доза В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
162.	ДЕ-6. Вопрос-162 ВИТАМИН В2 – ЭТО А) рибофлавин Б) фолиевая кислота В) пиридоксин Г) кокарбоксилаза @	A
163.	ДЕ-6. Вопрос-163 ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА В6 ПРИМЕНЯЮТ А) пиридоксин Б) рибофлавин В) аскорбиновая кислота Г) фолиевая кислота @	A
164.	ДЕ-6. Вопрос-164 ВИТАМИН В12 – ЭТО А) цианокобаламин Б) пиридоксин В) аскорбиновая кислота Г) рибофлавин @	A
165.	ДЕ-6. Вопрос-165 ВИТАМИН В9 А) фолиевая кислота Б) рибофлавин В) цианокобаламин Г) аскорбиновая кислота @	A
166.	ДЕ-6. Вопрос-166 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИНЕВРИТОВ, ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ ПРИМЕНЯЮТ А) тиамин Б) рибофлавин В) токоферол Г) фолиевую кислоту @	A
167.	ДЕ-6. Вопрос-167 ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОЖОГАХ, ОТМОРОЖЕНИЯХ, ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ, ГЕМЕРАЛОПИИ А) ретинол Б) эргокальциферол В) токоферол Г) рутин @	A
168.	ДЕ-6. Вопрос-168 ДЛЯ НИВЕЛИРОВАНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ИЗОНИАЗИДА ПРИМЕНЯЮТ А) пиридоксин Б) рутин	A

	В) ретинол Г) тиамин @	
169.	ДЕ-6. Вопрос-169 ВИТАМИН, ПОВЫШАЮЩИЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭПИТЕЛИЯ КИШЕЧНИКА ДЛЯ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА А) эргокальциферол Б) ретинол В) рибофлавин Г) токоферол @	А
170.	ДЕ-6. Вопрос-170 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ А) сильное покраснение кожных покровов Б) гипертензия В) возбуждение цнс, бессонница Г) повышение свертываемости крови @	А
171.	ДЕ-6. Вопрос-171 ВИТАМИН, УЧАСТВУЮЩИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПИГМЕНТА, В ПРОЦЕССАХ РОСТА И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭПИТЕЛИЯ А) ретинол Б) тиамин В) рибофлавин Г) эргокальциферол @	А
172.	ДЕ-6. Вопрос-172 ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРОТИВОПЕЛЛАГРИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ А) никотинамид Б) тиамин В) рибофлавин Г) пиридоксин @	А
173.	ДЕ-6. Вопрос-173 ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ НАЗНАЧАЮТ ПРИ А) мегалобластной анемии Б) тромбозам В) железодефицитной анемии Г) лейкопении @	А
174.	ДЕ-6. Вопрос-174 ВИТАМИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) пиридоксин Б) нандролон В) тестостерон Г) инсулин @	А
175.	ДЕ-6. Вопрос-175 К ГРУППЕ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ А) рибофлавин Б) соматотропин В) окситоцин Г) дексаметазон @	А
176.	ДЕ-6. Вопрос-176 К ВИТАМИНАМ ОТНОСИТСЯ А) аскорбиновая кислота Б) эстрадиол В) прогестерон Г) нандролон @	А
177.	ДЕ-6. Вопрос-177 ВИТАМИН В12 А) кобаламин Б) аскорбиновая кислота В) ретинол Г) тиамин @	А
178.	ДЕ-6. Вопрос-178 РЕТИНОЛ А) витамин А Б) витамин С В) витамин D Г) витамин В2 @	А
179.	ДЕ-6. Вопрос-179 КОФЕРМЕНТОМ ОБМЕНА АМИНОКИСЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ	А

	А) витамин В6 Б) витамин А В) витамин В12 Г) витамин Е @	
180.	ДЕ-6. Вопрос-180 МЕМБРАННЫМ АНТИОКСИДАНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) токоферол Б) рибофлавин В) тиамин Г) пиридоксол @	А
181.	ДЕ-6. Вопрос-181 ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ВИТАМИНА К ЯВЛЯЕТСЯ А) свертывание крови Б) метаболизм жирных кислот В) метаболизм кости Г) кофермент обмена аминокислот @	А
182.	ДЕ-6. Вопрос-182 ТОКОФЕРОЛ А) витамин Е Б) витамин В2 В) витамин А Г) витамин К @	А
183.	ДЕ-6. Вопрос-183 ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА ЯВЛЯЕТСЯ А) коферментом метаболизма жирных кислот Б) коферментом метаболизма карбоновых групп В) мембранным антиоксидантом Г) коферментом реакций карбосилирования @	А
184.	ДЕ-6. Вопрос-184 БИОТИН ЯВЛЯЕТСЯ А) коферментом реакций карбосилирования Б) коферментом метаболизма жирных кислот В) коферментом обмена аминокислот Г) коферментом реакции восстановления жирных кислот @	А
	ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАТКИ	
185.	ДЕ-6. Вопрос-185 ОКСИТОЦИН ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл, №5 - ампула 1 мл Б) таблеток 250 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
186.	ДЕ-6. Вопрос-186 ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОКСИТОЦИНА? А) вызывает ритмические сокращения миометрия Б) является препаратом простагландинов В) имеет стероидную структуру Г) снижает тонус и ритмические сокращения миометрия @	А
187.	ДЕ-6. Вопрос-187 ЧТО НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ДИНОПРОСТОНА? А) является препаратом гормона задней доли гипофиза Б) является препаратом простагландинов В) повышает тонус миометрия и расслабляет шейку матки Г) показан для стимуляции родовой деятельности @	А
188.	ДЕ-6. Вопрос-188 ЧТО НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ФЕНОТЕРОЛА (ПАРТУСИСТЕНА)? А) стимулирует родовую деятельность Б) стимулирует β_2 -адренорецепторы миометрия В) расслабляет мускулатуру матки Г) применяется при гипертонусе матки @	А
189.	ДЕ-6. Вопрос-189 В КАКИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ МАТКА ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ДИНОПРОСТОНУ? А) во все сроки беременности Б) непосредственно перед родами В) во время родов Г) в ранние сроки беременности @	А
190.	ДЕ-6. Вопрос-190 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ДИНОПРОСТОНА, В ЧАСТНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ:	А

	А) стимуляция родовой деятельности Б) не вынашиваемая беременность В) остановка послеродовых маточных кровотечений Г) гипертонус матки, угрожающий выкидыш @	
191.	ДЕ-6. Вопрос-191 ТОКОЛИТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ: А) гексопреналин Б) метилэргометри В) динапростон Г) окситоцин @	А
192.	ДЕ-6. Вопрос-192 СТИМУЛИРУЕТ ТОНУС МИОМЕТРИЯ: А) эргометрин Б) омепразол В) сальбутамол Г) гексопреналин @	А
193.	ДЕ-6. Вопрос-193 ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША: А) токоферол Б) никотиновая кислота В) эргокальциферол Г) филлохинон @	А
194.	ДЕ-6. Вопрос-194 ТОНИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ МАТКИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ: А) эргометрин Б) партусистен В) дротаверин Г) сальбутамол @	А
195.	ДЕ-6. Вопрос-195 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РОДОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРЕПАРАТ: А) эрготамин гидротартрат Б) динопростон В) окситоцин Г) вазопрессин @	А
196.	ДЕ-6. Вопрос-196 ПРИ УГРОЗЕ ВЫКИДЫША, СВЯЗАННОГО С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ УСИЛЕНИЕМ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ ПРИМЕНЯЮТ: А) фенотерол (партусистен) Б) алулент В) мифепристон Г) синестрол @	А
197.	ДЕ-6. Вопрос-197 СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАТКИ ПОДАВЛЯЕТ: А) гестагенные препараты Б) кортизол В) окситоцин Г) синестрол @	А
198.	ДЕ-6. Вопрос-198 ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ МАТКИ ПРИМЕНЯЮТ: А) дротаверин Б) динопростон В) синестрол Г) котарнина гидрохлорид @	А
199.	ДЕ-6. Вопрос-199 СРЕДСТВО, ПОВЫШАЮЩЕЕ СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ И ТОНУС МИОМЕТРИЯ: А) динопростон Б) фенотерол В) гидроксипргестерон Г) сальбутамол @	А
200.	ДЕ-6. Вопрос-200 ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОДОВ ПРИМЕНЯЮТ: А) окситоцин Б) фенотерол В) сальбутамол Г) метилтестестерон @	А
201.	ДЕ-6. Вопрос-201 ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИМЕНЯЮТ:	А

	А) окситоцин Б) фенотерол В) сальбутамол Г) динопростон @	
202.	ДЕ-6. Вопрос-202 ОКСИТОЦИН ПРИМЕНЯЮТ, ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ: А) профилактики и остановки маточных кровотечений в послеродовом периоде Б) как контрацептив постфактум В) медицинского прерывания беременности Г) предупреждения и прекращения преждевременной родовой деятельности @	А
203.	ДЕ-6. Вопрос-203 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОТЕРОЛА А) угроза преждевременных родов Б) медицинское прерывание беременности В) стимуляция родовой деятельности Г) маточные кровотечения @	А

Дидактическая единица №7. Лекарственные средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт и средства, применяющиеся при отравлениях (300)

№	Текст вопроса	Отв ет (бук вен ный)
1.	ДЕ-7. Вопрос-1 СИБУТРАМИН (РЕДУКСИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсул желатиновые твердые 10 мг+158.5 мг, №7 Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
2.	ДЕ-7. Вопрос-2 ДОМПЕРИДОН (МОТИЛИУМ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) суспензии для приема внутрь 1 мг/мл, флакон темного стекла 100 мл Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
3.	ДЕ-7. Вопрос-3 ДОМПЕРИДОН (МОТИЛИУМ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытых пленочной оболочкой 10 мг, №10 Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
4.	ДЕ-7. Вопрос-4 РАНИТИДИН (ЗАНТАК) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл, №5 - ампула 2 мл Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
5.	ДЕ-7. Вопрос-5 ОМЕПРАЗОЛ (ОМЕЗ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) лиофилизата для приготовления раствора для инфузий 40 мг, флакон Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
6.	ДЕ-7. Вопрос-6 ОМЕПРАЗОЛ (ОМЕЗ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсул кишечнорастворимые 10 мг / 20 мг / 40 мг, №10 Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
7.	ДЕ-7. Вопрос-7 ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД (НО-ШПА) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 40 мг, №6 - 6 шт Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
8.	ДЕ-7. Вопрос-8 ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД (НО-ШПА) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, №5 - ампула темного стекла 2 мл Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
9.	ДЕ-7. Вопрос-9 НАТРИЯ ПИКосульфат (ГУТТАЛАКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ:	А

	А) таблетки 5 мг, №20 - 20 шт. Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	
10.	ДЕ-7. Вопрос-10 НАТРИЯ ПИКОСУЛЬФАТ (ГУТТАЛАКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капель для приема внутрь 7.5 мг/мл, флакон-капельница пластиковая 15 мл Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
11.	ДЕ-7. Вопрос-11 ЛОПЕРАМИД (ИМОДИУМ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсул 2 мг, №6 - 6 шт. Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
12.	ДЕ-7. Вопрос-12 ЛОПЕРАМИД (ИМОДИУМ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток для рассасывания 2 мг, №6 - 6 шт. Б) таблеток-ретард 250 мг В) саше 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
13.	ДЕ-7. Вопрос-13 К ПРОТИВОРВОТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) домперидон Б) фамотидин В) омепразол Г) симбутрамин @	А
14.	ДЕ-7. Вопрос-14 К ПРОТИВОРВОТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) метоклопрамид Б) омепразол В) панкреатин Г) симбутрамин @	А
15.	ДЕ-7. Вопрос-15 К ПРОТИВОРВОТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) одансетрон Б) фамотидин В) линекс Г) симбутрамин @	А
16.	ДЕ-7. Вопрос-16 ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ ГИСТАМИНОВЫХ H_2 РЕЦЕПТОРОВ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА СНИЖАЕТ А) фамотидин Б) дротаверина гидрохлорид В) омепразол Г) рабепразол @	А
17.	ДЕ-7. Вопрос-17 ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ ГИСТАМИНОВЫХ H_2 РЕЦЕПТОРОВ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА СНИЖАЕТ А) ранитидин Б) атропин В) омепразол Г) рабепразол @	А
18.	ДЕ-7. Вопрос-18 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ «ПРОТОННОЙ ПОМПЫ» - H^+, K^+ -АТФ-АЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ А) омепразол Б) аллохол В) фамотидин Г) ранитидин @	А
19.	ДЕ-7. Вопрос-19 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ	А

	«ПРОТОННОЙ ПОМПЫ» - H^+ , K^+ -АТФ-АЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ А) рабепразол Б) аллохол В) фамотидин Г) ранитидин @	
20.	ДЕ-7. Вопрос-20 СРЕДСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, СОДЕРЖАЩИМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ А) панкреатин Б) висмута трикалия дицитрат В) алюминия гидроокись + магния гидроокись Г) мизопростол @	А
21.	ДЕ-7. Вопрос-21 СПАЗМЫ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖКТ УСТРАНЯЕТ А) мебеверин (Дюспаталин) Б) панкреатин В) омепразол Г) сибутрамин @	А
22.	ДЕ-7. Вопрос-22 СПАЗМЫ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖКТ УСТРАНЯЕТ А) дротаверин (Но-шпа) Б) линекс В) омепразол Г) панкреатин (Фестал) @	А
23.	ДЕ-7. Вопрос-23 СПАЗМЫ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖКТ УСТРАНЯЕТ А) гиосцина бутилбромид (Бускопан) Б) рабепразол В) фамотидин Г) панкреатин (Фестал) @	А
24.	ДЕ-7. Вопрос-24 К ГРУППЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ ОТНОСИТСЯ А) эссенциальные фосфолипиды (Эссенциале Н) Б) рабепразол В) мебеверин (Дюспаталин) Г) панкреатин (Фестал) @	А
25.	ДЕ-7. Вопрос-25 К ГРУППЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ ОТНОСИТСЯ А) адеметионин (Гептрал) Б) омепразол В) мебеверин (Дюспаталин) Г) панкреатин (Фестал) @	А
26.	ДЕ-7. Вопрос-26 ЛОПЕРАМИД А) повышает тонус сфинктеров ЖКТ Б) устраняет икоту и рвоту В) применяется в качестве слабительного препарата Г) оказывает анальгезирующий эффект @	А
27.	ДЕ-7. Вопрос-27 СРЕДСТВОМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ А) линекс Б) фестал В) аллохол Г) магния сульфат @	А
28.	ДЕ-7. Вопрос-28 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТСЯ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА? А) линекс Б) симетикон В) аллохол Г) магния сульфат @	А
29.	ДЕ-7. Вопрос-29 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТСЯ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА? А) хилак форте Б) симетикон В) аллохол Г) магния сульфат	А

	@	
30.	ДЕ-7. Вопрос-30 АЛЛОХОЛ А) желчегонное средство комбинированного состава Б) растворяет холестериновые камни в печени В) обладает противорвотным действием Г) восстанавливает микрофлору кишечника @	А
31.	ДЕ-7. Вопрос-31 АЛЛОХОЛ А) усиливает секреторную функцию печени и двигательную активность ЖКТ Б) растворяет холестериновые камни в печени В) снижает кислотность желудочного сока Г) восстанавливает микрофлору кишечника @	А
32.	ДЕ-7. Вопрос-32 АЛЛОХОЛ А) применяется при хронических гепатитах, холангитах, холециститах Б) восстанавливает микрофлору кишечника В) растворяет холестериновые камни в печени Г) снижает кислотность желудочного сока @	А
33.	ДЕ-7. Вопрос-33 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ ГИСТАМИНОВЫХ H ₂ -РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) фамотидин Б) пирензепин В) омепразол Г) алюминия гидроокись + магния гидроокись @	А
34.	ДЕ-7. Вопрос-34 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ «ПРОТОННОЙ ПОМПЫ» ЯВЛЯЕТСЯ А) омепразол Б) фамотидин В) мизопростол Г) пирензепин @	А
35.	ДЕ-7. Вопрос-35 ПРИ АЛИМЕНТАРНОМ ОЖИРЕНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ А) сибутрамин Б) омепразол В) рабепразол Г) ондансетрон @	А
36.	ДЕ-7. Вопрос-36 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ЗА СЧЕТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ HCL ЯВЛЯЕТСЯ А) алюминия гидроокись + магния гидроокись Б) омепразол В) фамотидин Г) ранитидин @	А
37.	ДЕ-7. Вопрос-37 МЕХАНИЗМ АНТИСЕКРЕТОРНОГО ЭФФЕКТА ПИРЕНЗЕПИНА (ГАСТРОЦЕПИНА) СВЯЗАН С А) блокадой M ₁ -холинорецепторов энтерохромафиноподобных клеток желудка Б) блокадой M ₃ -холинорецепторов париетальных клеток желудка В) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов париетальных клеток желудка Г) ингибированием протонной помпы @	А
38.	ДЕ-7. Вопрос-38 МЕХАНИЗМ АНТИСЕКРЕТОРНОГО ЭФФЕКТА РАБЕПРАЗОЛА (ПАРИЕТА) ОБУСЛОВЛЕН А) ингибированием «протонной помпы» Б) блокадой M ₃ -холинорецепторов париетальных клеток желудка В) блокадой M ₁ -холинорецепторов энтерохромафиноподобных клеток желудка Г) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов париетальных клеток желудка @	А
39.	ДЕ-7. Вопрос-39 ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ А) урсодезоксихолевая кислота Б) макрогол - 4000 В) лактулоза Г) симетикон @	А
40.	ДЕ-7. Вопрос-40 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТ ДЛЯ ЭРРАДИКАЦИИ H. PYORI? А) висмута трикалия дицитрат (Де-нол) Б) фамотидин	А

	В) омепразол Г) рабепразол @	
41.	ДЕ-7. Вопрос-41 МЕХАНИЗМ АНОРЕКСИГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ СИБУТРАМИНА (РЕДУКСИН) ОБУСЛОВЛЕН НАРУШЕНИЕМ ОБРАТНОГО НЕЙРОНАЛЬНОГО ЗАХВАТА А) серотонина и норадреналина Б) серотонина В) норадреналина Г) дофамина @	А
42.	ДЕ-7. Вопрос-42 МЕХАНИЗМ ПРОТИВОРВОТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОНДАНСЕТРОНА (ЗОФРАН) СВЯЗАН С БЛОКАДОЙ СЕРОТОНИНОВЫХ А) 5-НТ ₃ -рецепторов Б) 5-НТ ₁ -рецепторов В) 5-НТ ₂ -рецепторов Г) 5-НТ ₄ -рецепторов @	А
43.	ДЕ-7. Вопрос-43 МЕХАНИЗМ ПРОТИВОРВОТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДОМПЕРИДОНА (МОТИЛИУМ) ВКЛЮЧАЕТ А) блокаду дофаминовых D ₂ -рецепторов триггер-зоны рвотного центра Б) стимуляцию дофаминовых D ₂ -рецепторов триггер-зоны рвотного центра В) стимуляцию серотониновых 5-НТ ₃ -рецепторов триггер-зоны рвотного центра Г) стимуляцию серотониновых 5-НТ ₄ -рецепторов в холинергических синапсах ЖКТ @	А
44.	ДЕ-7. Вопрос-44 МЕХАНИЗМ СПАЗМОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДРОТАВЕРИНА (НО-ШПА) ВКЛЮЧАЕТ А) ингибирование фермента фосфодиэстеразы Б) блокаду М-холинорецепторов гладких мышц В) стимуляцию бета-адренорецепторов гладких мышц Г) стимуляцию М-холинорецепторов гладких мышц @	А
45.	ДЕ-7. Вопрос-45 К АНОРЕКСИГЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) сибутрамин Б) ондансетрон В) гимекромон Г) домперидон @	А
46.	ДЕ-7. Вопрос-46 К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ А) адеметионин Б) домперидон В) висмута субнитрат Г) висмута трикалия дицитрат @	А
47.	ДЕ-7. Вопрос-47 К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ А) эссенциальные фосфолипиды Б) домперидон В) висмута субнитрат Г) висмута трикалия дицитрат @	А
48.	ДЕ-7. Вопрос-48 К ГАСТРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ А) висмута субнитрат Б) ранитидин В) адеметионин Г) эссенциальные фосфолипиды @	А
49.	ДЕ-7. Вопрос-49 К ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМ ГАСТРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ А) висмута трикалия дицитрат Б) панкреатин В) мизопрофол Г) аллохол @	А
50.	ДЕ-7. Вопрос-50 К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) алюминия гидроксид + магния гидроксид Б) смектит диоктаэдрический В) уголь активированный Г) пирензепин @	А
51.	ДЕ-7. Вопрос-51 К СОЛЕВЫМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ ОТНОСИТСЯ А) магния сульфат	А

	Б) лактулоза В) сеннозиды А и В Г) метоклопрамид @	
52.	ДЕ-7. Вопрос-52 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА ОБУСЛОВЛЕН А) ингибированием «протонной помпы» Б) блокадой М ₁ -холинорецепторы энтерохроммафиноподобных клеток желудка В) стимуляцией гастриновых рецепторов Г) блокадой гистаминовых Н ₂ -рецепторов @	А
53.	ДЕ-7. Вопрос-53 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИРЕНЗЕПИНА ОБУСЛОВЛЕН А) блокадой М ₁ -холинорецепторов энтерохроммафиноподобных клеток желудка Б) ингибированием «протонной помпы» В) блокадой гистаминовых Н ₂ -рецепторов Г) блокадой гастриновых рецепторов @	А
54.	ДЕ-7. Вопрос-54 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАМОТИДИНА ОБУСЛОВЛЕН А) блокадой гистаминовых Н ₂ -рецепторов Б) блокадой М ₁ -холинорецепторов энтерохроммафиноподобных клеток желудка В) блокадой гастриновых рецепторов Г) ингибированием «протонной помпы» @	А
55.	ДЕ-7. Вопрос-55 К ПРОТИВОДИАРЕЙНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) лоперамид Б) фестал В) висмута субнитрат Г) мизопростол @	А
56.	ДЕ-7. Вопрос-56 К СПАЗМОЛИТИКАМ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСИТСЯ А) гиосцина бутилбромид Б) дротаверин В) уголь активированный Г) ондансетрон @	А
57.	ДЕ-7. Вопрос-57 К ПРОТИВОРВОТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) ондансетрон Б) гиосцина бутилбромид В) смектит диоктаэдрический Г) уголь активированный @	А
58.	ДЕ-7. Вопрос-58 К СПАЗМОЛИТИКАМ МИОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ А) дротаверин Б) атропин В) уголь активированный Г) ондансетрон @	А
59.	ДЕ-7. Вопрос-59 К ЖЕЛЧЕГОННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) гимекромон Б) эссенциальные фосфолипиды В) лоперамид Г) адеметионин @	А
60.	ДЕ-7. Вопрос-60 К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) алюминия гидроксид + магия гидроксид Б) смектит диоктаэдрический В) уголь активированный Г) пирензепин @	А
61.	ДЕ-7. Вопрос-61 К СОЛЕВЫМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ ОТНОСИТСЯ А) магия сульфат Б) масло вазелиновое В) сеннозиды А и В Г) метоклопрамид @	А
62.	ДЕ-7. Вопрос-62 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА ОБУСЛОВЛЕН А) ингибированием «протонной помпы» Б) блокадой М ₁ -холинорецепторов	А

	В) стимулированием простагландиновых рецепторов Г) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов @	
63.	ДЕ-7. Вопрос-63 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РАБЕПРАЗОЛА ОБУСЛОВЛЕН А) ингибированием «протонной помпы» Б) блокадой M1-холинорецепторов В) стимулированием простагландиновых рецепторов Г) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов @	А
64.	ДЕ-7. Вопрос-64 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭЗОМЕПРАЗОЛА ОБУСЛОВЛЕН А) ингибированием «протонной помпы» Б) блокадой M1-холинорецепторов В) стимулированием простагландиновых рецепторов Г) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов @	А
65.	ДЕ-7. Вопрос-65 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РАНИТИДИНА ОБУСЛОВЛЕН А) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов Б) блокадой M1-холинорецепторов В) стимуляцией простагландиновых рецепторов Г) ингибированием «протонной помпы» @	А
66.	ДЕ-7. Вопрос-66 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МИЗОПРОСТОЛА ОБУСЛОВЛЕН А) стимуляцией простагландиновых рецепторов Б) блокадой M1-холинорецепторов В) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов Г) ингибированием «протонной помпы» @	А
67.	ДЕ-7. Вопрос-67 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИРЕНЗЕПИНА ОБУСЛОВЛЕН А) блокадой M1-холинорецепторов Б) блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов В) стимуляцией простагландиновых рецепторов Г) ингибированием «протонной помпы» @	А
68.	ДЕ-7. Вопрос-68 БЛОКАТОРОМ H ₂ -ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) ранитидин Б) омепразол В) домперидон Г) сенаде @	А
69.	ДЕ-7. Вопрос-69 ИНГИБИТОРОМ «ПРОТОННОЙ ПОМПЫ» ЯВЛЯЕТСЯ А) омепразол Б) фамотидин В) ондансетрон Г) линекс @	А
70.	ДЕ-7. Вопрос-70 АНТИСЕКРЕТОРНЫМ СРЕДСТВО, M ₁ -ХОЛИНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) пирензепин Б) омепразол В) флуконазол Г) сульфатуанидин @	А
71.	ДЕ-7. Вопрос-71 АНТИСЕКРЕТОРНЫЙ ЭФФЕКТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ БЛОКАДОЙ H ₂ -ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ, ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ А) фамотидина Б) омепразола В) флуконазола Г) пиренземина @	А
72.	ДЕ-7. Вопрос-72 АНТИСЕКРЕТОРНЫЙ ЭФФЕКТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ БЛОКАДОЙ M ₁ -ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ А) пиренземина Б) омепразола В) ранитидина Г) фамотидина @	А
73.	ДЕ-7. Вопрос-73 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ АНТАЦИДНЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ А) изжога	А

	Б) констипация (обстипация) В) недостаток пищеварительных ферментов Г) нарушение эвакуации пищи из желудка @	
74.	ДЕ-7. Вопрос-74 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ АНТАЦИДНЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ А) гиперацидные состояния Б) констипация (обстипация) В) недостаток пищеварительных ферментов Г) нарушение эвакуации пищи из желудка @	А
75.	ДЕ-7. Вопрос-75 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ АНТАЦИДНЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ А) гиперацидный гастрит Б) констипация (обстипация) В) недостаток пищеварительных ферментов Г) нарушение эвакуации пищи из желудка @	А
76.	ДЕ-7. Вопрос-76 СТРУКТУРНЫМ АНАЛОГОМ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) мизопропрост Б) висмута субцитрат коллоидный В) сукралфат Г) омепразол @	А
77.	ДЕ-7. Вопрос-77 В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ СОДЕРЖИТ АЛЮМИНИЙ ПРЕПАРАТ А) сукралфат Б) висмута субцитрат коллоидный В) мизопропрост Г) омепразол @	А
78.	ДЕ-7. Вопрос-78 ПРИ ДИСПЕПТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ НА ФОНЕ ЗАМЕДЛЕННОГО ОПОРОЖНЕНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИМЕНЯЮТ А) домперидон Б) ондансетрон В) дротаверин Г) лоперамид @	А
79.	ДЕ-7. Вопрос-79 КАКОЕ ПРОТИВОРВОТНОЕ СРЕДСТВО БЛОКИРУЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕРОТОНИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ? А) ондансетрон Б) домперидон В) метоклопрамид Г) дифенгидрамин @	А
80.	ДЕ-7. Вопрос-80 ТОШНОТУ И РВОТУ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ И ХИМИОТЕРАПИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ А) ондансетрон Б) домперидон В) метоклопрамид Г) дифенгидрамин @	А
81.	ДЕ-7. Вопрос-81 КАКОЕ ПРОТИВОРВОТНОЕ СРЕДСТВО БЛОКИРУЕТ ДОФАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ? А) домперидон Б) ондансетрон В) скополамин Г) дифенгидрамин @	А
82.	ДЕ-7. Вопрос-82 КАКОЕ ПРОТИВОРВОТНОЕ СРЕДСТВО БЛОКИРУЕТ ДОФАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ? А) метоклопрамид Б) ондансетрон В) скополамин Г) дифенгидрамин @	А
83.	ДЕ-7. Вопрос-83 АНОРЕКСИГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ А) флуоксетин Б) пирацетам В) настойка полыни Г) персен @	А
84.	ДЕ-7. Вопрос-84 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЕЧЕЙ СВЯЗАН С А) раздражением вкусовых рецепторов	А

	Б) блокадой гистаминовых рецепторов В) блокадой мускариновых рецепторов Г) раздражением триггерной зоны рвотного центра @	
85.	ДЕ-7. Вопрос-85 АГОНИСТОМ ОPIOИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) лоперамид Б) атропин В) платифиллин Г) пирензепин @	А
86.	ДЕ-7. Вопрос-86 РАСТИТЕЛЬНОМ СРЕДСТВОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ЖЕЛЧЕГОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ А) цветы бессмертника Б) трава фиалки В) плоды малины Г) трава термопсиса @	А
87.	ДЕ-7. Вопрос-87 АНТИСЕКРЕТОРНОЕ СРЕДСТВО – БЛОКАТОР ГИСТАМИНОВЫХ H2-РЕЦЕПТОРОВ А) ранитидин Б) пирензепин В) омепразол Г) мизопростол @	А
88.	ДЕ-7. Вопрос-88 АНТИСЕКРЕТОРНОЕ СРЕДСТВО – ИНГИБИТОР «ПРОТОННОЙ ПОМПЫ» А) омепразол Б) ранитидин В) пирензепин Г) фамотидин @	А
89.	ДЕ-7. Вопрос-89 КАНТАЦИДАМ ОТНОСЯТСЯ СРЕДСТВА А) связывающие (нейтрализующие) соляную кислоту желудочного сока Б) угнетающие секрецию соляной кислоты париетальными клетками В) создающие механическую защиту слизистой оболочки желудка Г) усиливающие образование желудочной слизи @	А
90.	ДЕ-7. Вопрос-90 ГASTРОПРОТЕКТОР – СИНТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ПРОСТАГЛАНДИНА А) мизопростол Б) висмута субнитрат В) сукральфат Г) висмута субцитрат коллоидный @	А
91.	ДЕ-7. Вопрос-91 КА ПРЕПАРАТАМ ГРУППЫ ГASTРОПРОТЕКТОРОВ ОТНОСИТСЯ А) сукральфат Б) омепразол В) фамотидин Г) пирензепин @	А
92.	ДЕ-7. Вопрос-92 КА ПРЕПАРАТАМ, УГНЕТАЮЩИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. PYLORI В ЯЗВЕННОМ ДЕФЕКТЕ, ОТНОСИТСЯ А) висмута трикалия дицитрат Б) стрептомицин В) мизопростол Г) фамотидин @	А
93.	ДЕ-7. Вопрос-93 СРЕДСТВОМ С АНТИФЕРМЕНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, ПРИМЕНЯЕМОМ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ А) аprotинин Б) панкреатин В) пепсин Г) адеметионин @	А
94.	ДЕ-7. Вопрос-94 КА СРЕДСТВАМ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ОТНОСИТСЯ А) панкреатин Б) адеметионин В) соляная кислота разведенная Г) аprotинин @	А
95.	ДЕ-7. Вопрос-95	А

	К СРЕДСТВАМ, УСИЛИВАЮЩИМ ЭВАКУАЦИЮ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА, ОТНОСИТСЯ А) метоклопрамид Б) атропин В) пирензепин Г) лоперамид @	
96.	ДЕ-7. Вопрос-96 КАКОЕ СРЕДСТВО ОТНОСИТСЯ К ПРОТИВОРВОТНЫМ? А) метоклопрамид Б) лоперамид В) натрия пикосульфат Г) дротаверин @	А
97.	ДЕ-7. Вопрос-97 ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕЕ, ЯВЛЯЕТСЯ А) лоперамид Б) сеннозиды А и В В) дротаверин Г) неостигмина метилсульфат @	А
98.	ДЕ-7. Вопрос-98 КАКОЕ ИЗ СЛАБИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОДЕРЖИТ АНТРАГЛИКОЗИДЫ? А) сенназиды А и В Б) бисакодил В) лактулоза Г) масло касторовое @	А
99.	ДЕ-7. Вопрос-99 ПРИ ПИЩЕВЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ В КАЧЕСТВЕ СЛАБИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ А) магния сульфат Б) масло касторовое В) бисакодил Г) сеннозиды А и В @	А
100.	ДЕ-7. Вопрос-100 КАКОЙ ПРЕПАРАТ НЕ ВЛИЯЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЧИ? А) ондансетрон Б) оксафенамид В) кислота дегидрохолевая Г) холензим @	А
101.	ДЕ-7. Вопрос-101 ПРЕПАРАТОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СТИМУЛИРУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЧИ, ЯВЛЯЕТСЯ А) холосас Б) холензим В) кислота дегидрохолевая Г) оксафенамид @	А
102.	ДЕ-7. Вопрос-102 К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ А) эссенциальные фосфолипиды Б) мизопростол В) висмута субнитрат Г) атропин @	А
103.	ДЕ-7. Вопрос-103 К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ А) силибинин Б) адеметионин В) урсодезоксихолевая кислота Г) эссенциальные фосфолипиды @	А
104.	ДЕ-7. Вопрос-104 ОБОСТРЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ А) НВПС Б) ноотропов В) желчегонных Г) ингибиторов АПФ @	А
105.	ДЕ-7. Вопрос-105 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ? А) домперидон	А

	Б) ибупрофен В) лоперамид Г) кеторолак @	
106.	ДЕ-7. Вопрос-106 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ МОТОРНУЮ ФУНКЦИЮ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) дротаверин Б) сенаде В) ацеклидин Г) неостигмин @	А
107.	ДЕ-7. Вопрос-107 ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ НА ЭРОЗИРОВАННОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖКТ ОБРАЗУЕТ А) сукральфат Б) алмагель А В) линекс Г) омепразол @	А
108.	ДЕ-7. Вопрос-108 КАСТОРОВОЕ МАСЛО ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА А) слабительного Б) желчегонного В) антацидного Г) холелитолитического @	А
109.	ДЕ-7. Вопрос-109 СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЕМ РАЗДРАЖЕНИЯ ХЕМОРЕЦЕПТОРОВ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) бисакодил Б) масло вазелиновое В) масло миндальное Г) морская капуста @	А
110.	ДЕ-7. Вопрос-110 СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЕМ РАЗДРАЖЕНИЯ ХЕМОРЕЦЕПТОРОВ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) касторовое масло Б) масло миндальное В) масло вазелиновое Г) укропа огородного плоды @	А
111.	ДЕ-7. Вопрос-111 СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА КИШЕЧНОГО СОДЕРЖИМОГО, ЯВЛЯЕТСЯ А) морская капуста Б) масло миндальное В) укропа огородного плоды Г) лоперамид @	А
112.	ДЕ-7. Вопрос-112 СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В КИШЕЧНИКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ А) натрия сульфат Б) сенаде В) масло вазелиновое Г) масло касторовое @	А
113.	ДЕ-7. Вопрос-113 АНТИДИАРЕЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ А) диосмектит Б) сенаде В) неостигмин Г) ацеклидин @	А
114.	ДЕ-7. Вопрос-114 СРЕДСТВОМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ НОРМАЛЬНУЮ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) линекс Б) панкреатин В) креон Г) мезим-форте @	А
115.	ДЕ-7. Вопрос-115 СРЕДСТВОМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ НОРМАЛЬНУЮ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) бактисубтил Б) панкреатин В) креон Г) мезим-форте @	А

116.	ДЕ-7. Вопрос-116 ФЕРМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) абомин Б) лактулоза В) морская капуста Г) алмагель @	А
117.	ДЕ-7. Вопрос-117 ФЕРМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) мезим-форте Б) масло вазелиновое В) домперидон Г) лактулоза @	А
118.	ДЕ-7. Вопрос-118 ФЕРМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) панзинорм-форте Б) лактулоза В) морская капуста Г) алмагель @	А
119.	ДЕ-7. Вопрос-119 ФЕРМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) фестал Б) лактулоза В) морская капуста Г) алмагель @	А
120.	ДЕ-7. Вопрос-120 К ЖЕЛЧЕГОННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) гимекромон Б) эссенциале В) сенаде Г) панзинорм-форте @	А
121.	ДЕ-7. Вопрос-121 К ЖЕЛЧЕГОННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) аллохол Б) эссенциале В) сенаде Г) мезим-форте @	А
122.	ДЕ-7. Вопрос-122 К ЖЕЛЧЕГОННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) холосас Б) эссенциале В) сенаде Г) мезим-форте @	А
123.	ДЕ-7. Вопрос-123 К ЖЕЛЧЕГОННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) осалмид Б) эссенциале В) сенаде Г) мезим-форте @	А
124.	ДЕ-7. Вопрос-124 К ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) урсодеоксихолевая кислота Б) эссенциале В) адеметионин Г) силибинин @	А
125.	ДЕ-7. Вопрос-125 ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ А) хенодеоксихолевая кислота Б) эссенциале В) адеметионин Г) силибинин @	А
126.	ДЕ-7. Вопрос-126 ПРИ КИШЕЧНЫХ КОЛИКАХ ПРИМЕНЯЮТ А) дротаверин Б) сенаде В) ацеклидин Г) неостигмин @	А
127.	ДЕ-7. Вопрос-127	А

	ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АТОНИИ КИШЕЧНИКА ПРИМЕНЯЮТ А) неостигмин Б) фестал В) дротаверин Г) атропин @	
128.	ДЕ-7. Вопрос-128 СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ, ИЗБИРАТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ В ТОЛСТОМ ОТДЕЛЕ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) сеннозиды А+В Б) натрия сульфат В) магния сульфат Г) макрогол 400 @	А
129.	ДЕ-7. Вопрос-129 СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) натрия сульфат Б) лактулоза В) сеннозиды А+В Г) бисакодил @	А
130.	ДЕ-7. Вопрос-130 К СРЕДСТВАМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ПАРИЕТАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЖЕЛУДКА, ОТНОСИТСЯ А) фамотидин Б) магния оксид В) алмагель А Г) маалокс @	А
131.	ДЕ-7. Вопрос-131 К СРЕДСТВАМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ПАРИЕТАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЖЕЛУДКА, ОТНОСИТСЯ А) омепразол Б) магния оксид В) алмагель А Г) маалокс @	А
132.	ДЕ-7. Вопрос-132 К СРЕДСТВАМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ПАРИЕТАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЖЕЛУДКА, ОТНОСИТСЯ А) пирензепин Б) магния оксид В) алмагель А Г) маалокс @	А
133.	ДЕ-7. Вопрос-133 ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ А) пантрипин Б) холензим В) домперидон Г) маалокс @	А
134.	ДЕ-7. Вопрос-134 ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ ПРИМЕНЯЮТ А) пантрипин Б) холензим В) ондансетрон Г) маалокс @	А
135.	ДЕ-7. Вопрос-135 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПАНТРИПИНА ЯВЛЯЕТСЯ А) острый панкреатит и панкреонекроз Б) хронический запор В) обострение язвенной болезни желудка и 12-п кишки Г) тошнота и рвота @	А
136.	ДЕ-7. Вопрос-136 УДАЛЕНИЕ ГАЗОВ ИЗ КИШЕЧНИКА ОБЛЕГЧАЕТ А) симетикон Б) холензим В) ондансетрон Г) маалокс @	А
137.	ДЕ-7. Вопрос-137 СИМЕТИКОН А) облегчает удаление газов из кишечника Б) нейтрализует соляную кислоту желудка В) устраняет изжогу	А

	Г) устраняет рвоту @	
138.	ДЕ-7. Вопрос-138 КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРУППЕ «ПЕНОГАСИТЕЛЕЙ» - ЭТО А) симетикон Б) холензим В) ондансетрон Г) маалокс @	А
139.	ДЕ-7. Вопрос-139 ПРИ МЕТЕОРИЗМЕ ПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ А) симетикон Б) холензим В) ондансетрон Г) маалокс @	А
140.	ДЕ-7. Вопрос-140 СИМЕТИКОН ПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ А) метеоризме Б) хроническом запор В) остром панкреатите и панкреонекрозе Г) тошноте и рвоте @	А
141.	ДЕ-7. Вопрос-141 УГНЕТАЕТ ЦЕНТР ГОЛОДА И СТИМУЛИРУЕТ ЦЕНТР НАСЫЩЕНИЯ А) сибутрамин Б) домперидон В) ондансетрон Г) метоклопрамид @	А
142.	ДЕ-7. Вопрос-142 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СИБУТРАМИНА ЯВЛЯЕТСЯ А) алиментарное ожирение Б) анорексия В) недостаточность пищеварительных ферментов Г) рвота @	А
143.	ДЕ-7. Вопрос-143 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ДОМПЕРИДОН А) мотилиум Б) де-нол В) гастроцепин Г) омез @	А
144.	ДЕ-7. Вопрос-144 МНН ПРЕПАРАТА МОТИЛИУМ А) домперидон Б) омепразол В) фамотидин Г) аллохол @	А
145.	ДЕ-7. Вопрос-145 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ФАМОТИДИН А) квамател Б) де-нол В) гастроцепин Г) омез @	А
146.	ДЕ-7. Вопрос-146 МНН ПРЕПАРАТА КВАМАТЕЛ А) фамотидин Б) омепразол В) домперидон Г) аллохол @	А
147.	ДЕ-7. Вопрос-147 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА РАБЕПРАЗОЛ А) париет Б) де-нол В) гастроцепин Г) омез @	А
148.	ДЕ-7. Вопрос-148 МНН ПРЕПАРАТА ПАРИЕТ А) рабепразол Б) омепразол В) домперидон Г) аллохол	А

	@	
149.	ДЕ-7. Вопрос-149 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТА ОМЕПРАЗОЛ А) антисекреторный Б) холелитолитический В) анорексигенный Г) противорвотный @	А
150.	ДЕ-7. Вопрос-150 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТА АЛМАГЕЛЬ А) антацидный Б) холелитолитический В) анорексигенный Г) антисекреторный @	А
151.	ДЕ-7. Вопрос-151 КАКОЕ АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО НЕЙТРАЛИЗУЕТ СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ С ОБРАЗОВАНИЕМ CO ₂ ? А) натрия гидрокарбонат Б) алмагель В) магнезия оксид Г) маалокс @	А
152.	ДЕ-7. Вопрос-152 УРОДЕЗОКСИХОЛЕВУЮ КИСЛОТУ НАЗНАЧАЮТ А) для растворения небольших холестериновых камней в желчном пузыре Б) для повышения аппетита В) при недостатке пищеварительных ферментов поджелудочной железы Г) в качестве слабительного средства @	А
153.	ДЕ-7. Вопрос-153 ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ХОЛЕСТЕРИНОВЫХ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ НАЗНАЧАЮТ А) уродезоксихолевую кислоту Б) алмагель В) де-нол Г) фамотидин @	А
154.	ДЕ-7. Вопрос-154 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТА АПОМОРФИН А) рвотный Б) холелитолитический В) анорексигенный Г) противорвотный @	А
155.	ДЕ-7. Вопрос-155 ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ ПРИМЕНЯЮТ А) сеннозиды А+В Б) лоперамид В) алмагель Г) дротаверин @	А
156.	ДЕ-7. Вопрос-156 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ДРОТАВЕРИН ГИДРОХЛОРИД А) но-шпа Б) де-нол В) гастропепин Г) омез @	А
157.	ДЕ-7. Вопрос-157 МНН ПРЕПАРАТА НО-ШПА А) дротаверина гидрохлорид Б) омепразол В) фамотидин Г) аллохол @	А
158.	ДЕ-7. Вопрос-158 ПРИ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ПРИМЕНЯЮТ А) адеметионин Б) пирензепин В) фамотидин Г) ондансетрон @	А
159.	ДЕ-7. Вопрос-159 ПРИ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ПРИМЕНЯЮТ А) силибинин Б) пирензепин В) апоморфин Г) сеннаде	А

	@	
160.	ДЕ-7. Вопрос-160 ПРИ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ПРИМЕНЯЮТ А) эссенциале Б) симетикон В) фамотидин Г) рабепразол @	А
161.	ДЕ-7. Вопрос-161 НЕСЕЛЕКТИВНЫМ БЛОКАТОРОМ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) атропин Б) пирензепин В) фамотидин Г) эзомепразол @	А
162.	ДЕ-7. Вопрос-162 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ А) лоперамид Б) сенаде В) но-шпа Г) фестал @	А
163.	ДЕ-7. Вопрос-163 К ПРЕПАРАТАМ, СЕЛЕКТИВНО БЛОКИРУЮЩИМ М1-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ, ОТНОСИТСЯ А) пирензепин Б) атропин В) скополамин Г) платифиллин @	А
164.	ДЕ-7. Вопрос-164 ГИМЕКРОМОН ОКАЗЫВАЕТ ЭФФЕКТЫ А) желчегонный, спазмолитический, холеретический Б) противорвотный, противоикотный В) ветрогонный Г) антацидный @	А
165.	ДЕ-7. Вопрос-165 СРЕДСТВОМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) хилак-форте Б) фестал В) аллохол Г) магния сульфат @	А
166.	ДЕ-7. Вопрос-166 СРЕДСТВОМ, СОДЕРЖАЩИМ ПОЛЕЗНУЮ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) линекс Б) фестал В) хилак-форте Г) магния сульфат @	А
167.	ДЕ-7. Вопрос-167 СРЕДСТВОМ, СОДЕРЖАЩИМ ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ПОЛЕЗНОЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ А) хилак-форте Б) фестал В) линекс Г) магния сульфат @	А
168.	ДЕ-7. Вопрос-168 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОПЕРАМИД А) имодиум Б) де-нол В) гастроцепин Г) омез @	А
169.	ДЕ-7. Вопрос-169 МНН ПРЕПАРАТА ИМОДИУМ А) лоперамид Б) омепразол В) домперидон Г) аллохол @	А
170.	ДЕ-7. Вопрос-170 ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ, ВЫЗВАННЫМ АНТИБИОТИКАМИ, РАЦИОНАЛЬНО НАЗНАЧАТЬ А) линекс Б) омепразол В) домперидон Г) аллохол	А

	@	
171.	ДЕ-7. Вопрос-171 ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ, ВЫЗВАННЫМ АНТИБИОТИКАМИ, РАЦИОНАЛЬНО НАЗНАЧАТЬ А) хилак форте Б) омепразол В) домперидон Г) аллохол @	А
172.	ДЕ-7. Вопрос-172 ПРИ ГИПОАЦИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ ПРИМЕНЯЮТ А) настойку полыни горькой Б) омепразол В) домперидон Г) аллохол @	А
173.	ДЕ-7. Вопрос-173 НАСТОЙКУ ПОЛЫНИ ГОРЬКУЮ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ А) гипоацидных состояниях Б) гиперацидных состояниях В) рвоте Г) дисбактериозе @	А
174.	ДЕ-7. Вопрос-174 ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКАГОЛИЗМА ПРИМЕНЯЮТ А) апоморфина гидрохлорид Б) омепразол В) домперидон Г) аллохол @	А
175.	ДЕ-7. Вопрос-175 ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ ЭТО ЛС А) повышающие резистентность слизистой оболочки желудка и 12п кишки к воздействию агрессивных факторов желудочного сока Б) защищающие печень и повышающие ее устойчивость к воздействию повреждающих факторов В) оказывающие противорвотное действие Г) нормализующие микрофлору кишечника @	А
176.	ДЕ-7. Вопрос-176 ГАСТРОПРОТЕКТОРОМ, СТИМУЛИРУЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ СЛИЗИ, БИКАРБОНАТОВ И СНИЖАЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ А) мизопростол Б) сукральфат В) викалин Г) висмута трикалия дицитрат @	А
177.	ДЕ-7. Вопрос-177 ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЖКТ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ НПВС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ А) мизопростол Б) эссенциале В) фестал Г) аллохол @	А
178.	ДЕ-7. Вопрос-178 МИЗОПРОСТОЛ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ А) эрозивно-язвенные поражения ЖКТ на фоне применения НПВС Б) рвоту В) газообразование в кишечнике Г) спазмы ЖКТ @	А
179.	ДЕ-7. Вопрос-179 СЛОЖНЫЙ НЕРАСТВОРИМЫЙ КОМПЛЕКС В ВИДЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭРОЗИИ ИЛИ ЯЗВЫ ЖКТ ОБРАЗУЕТ А) сукральфат Б) мизопростол В) алмагель Г) аллохол @	А
180.	ДЕ-7. Вопрос-180 СЛОЖНЫЙ НЕРАСТВОРИМЫЙ КОМПЛЕКС В ВИДЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭРОЗИИ ИЛИ ЯЗВЫ ЖКТ ОБРАЗУЕТ А) викалин Б) мизопростол В) алмагель Г) аллохол @	А
181.	ДЕ-7. Вопрос-181	А

	СЛОЖНЫЙ НЕРАСТВОРИМЫЙ КОМПЛЕКС В ВИДЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭРОЗИИ ИЛИ ЯЗВЫ ЖКТ ОБРАЗУЕТ А) висмута трикалия дицитрат Б) мизопростол В) алмагель Г) аллохол @	
182.	ДЕ-7. Вопрос-182 ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ ЯВЛЯЕТСЯ А) де-нол Б) квамател В) омез Г) но-шпа @	А
183.	ДЕ-7. Вопрос-183 МНН ПРЕПАРАТА ДЕ-НОЛ ЯВЛЯЕТСЯ А) висмута трикалия дицитрат Б) мизопростол В) сукральфат Г) омепразол @	А
184.	ДЕ-7. Вопрос-184 ДЛЯ ЭРАДИКАЦИИ H.PYLORI ПРИМЕНЯЮТ А) висмута трикалия дицитрат Б) мизопростол В) сукральфат Г) омепразол @	А
185.	ДЕ-7. Вопрос-185 ДЕЙСТВИЕ ОСМОТИЧЕСКИХ СЛАБИТЕЛЬНЫХ НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ А) 24-48 час Б) 12 час В) 6 час Г) 1 час @	А
186.	ДЕ-7. Вопрос-186 СЛАБИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТРАГЛИКОЗИДОВ НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ А) 8-12 час Б) 12-18 час В) 24 час Г) 48 час @	А
187.	ДЕ-7. Вопрос-187 К БЛОКАТОРАМ «ПРОТОННОЙ ПОМПЫ» ОТНОСЯТ А) омепразол Б) гептрал В) алмагель Г) фамотидин @	А
188.	ДЕ-7. Вопрос-188 К БЛОКАТОРАМ ГИСТАМИНОВЫХ H2-РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСЯТ А) фамотидин Б) панкреатин В) омепразол Г) фестал @	А
189.	ДЕ-7. Вопрос-189 К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТ А) фосфалогель Б) аллохол В) омепразол Г) ранитидин @	А
190.	ДЕ-7. Вопрос-190 КОМБИНАЦИЕЙ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА МАГНИЯ, ОБЛАДАЮЩАЯ АНТАЦИДНЫМ, ОБВОЛАКИВАЮЩИМ, АБСОРБИРУЮЩИМ, СЛАБИТЕЛЬНЫМ И ЖЕЛЧЕГОННЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ А) алмагель Б) омепразол В) де-нол Г) фестал @	А
191.	ДЕ-7. Вопрос-191 КОМБИНИРОВАННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ЛИПАЗУ, АМИЛАЗУ, ПРОТЕАЗУ И КОМПОНЕНТЫ ЖЕЛЧИ ЯВЛЯЕТСЯ А) фестал	А

	Б) омепразол В) мезим Г) алмагель @	
192.	ДЕ-7. Вопрос-192 ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ А) фестал Б) омепразол В) фамотидин Г) алмагель @	А
193.	ДЕ-7. Вопрос-193 ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ЖЕЛЧЬ А) фестал Б) мезим В) панкреатин Г) креон @	А
194.	ДЕ-7. Вопрос-194 СЛАБИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ЗАДЕРЖИВАЮЩИМИ ВСАСЫВАНИЕ ТОКСИНОВ ИЗ КИШЕЧНИКА, ЯВЛЯЮТСЯ А) солевые слабительные Б) масляные слабительные В) антрагликозиды Г) синтетические слабительные @	А
195.	ДЕ-7. Вопрос-195 АНОРЕКСИГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ А) сибутрамин Б) ондансетрон В) метоклопрамид Г) домперидон @	А
196.	ДЕ-7. Вопрос-196 МОТОРИКУ ЖЕЛУДКА СТИМУЛИРУЕТ А) метоклопрамид Б) ондансетрон В) симетикон Г) сибутрамин @	А
197.	ДЕ-7. Вопрос-197 К ЖЕЛЧЕГОННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) аллохол Б) симетикон В) лоперамид Г) сибутрамин @	А
198.	ДЕ-7. Вопрос-198 ПРИ ЗАПОРАХ ПРИМЕНЯЮТ А) бисакодил Б) симетикон В) мезим Г) лоперамид @	А
199.	ДЕ-7. Вопрос-199 СОЛЕВЫМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ А) натрия пикосульфат (Гутталакс) Б) сеннаде В) лактулоза Г) макрогол @	А
200.	ДЕ-7. Вопрос-200 ПРИ ДИАРЕЕ ПРИМЕНЯЮТ А) лоперамид Б) сеннаде В) лактулоза Г) макрогол 4000 @	А
201.	ДЕ-7. Вопрос-201 СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ, СОДЕРЖАЩИМ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОЛИМЕРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ А) макрогол 4000 Б) лактулоза В) магния сульфат Г) аллохол @	А
202.	ДЕ-7. Вопрос-202 ПРОТИВОДИАРЕЙНЫМ СРЕДСТВОМ (СОРБЕНТОМ) ЯВЛЯЕТСЯ	А

	А) смектит диоктаэдрический Б) лактулоза В) фестал Г) макрогол 4000 @	
203.	ДЕ-7. Вопрос-203 ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ АДЕМЕТИОНИНА ЯВЛЯЮТСЯ А) хронический гепатит, жировая дистрофия печени Б) тошнота, рвота В) диарея Г) усиленное газообразование @	А
204.	ДЕ-7. Вопрос-204 ПРЕПАРАТОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ МИОТРОПНОЕ СПАЗМОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЯЮЩИМСЯ ПРИ СПАЗМАХ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ А) дротаверин Б) лоперамид В) смекта Г) атропин @	А
205.	ДЕ-7. Вопрос-205 К СРЕДСТВАМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА, ОТНОСЯТ А) линекс Б) препараты расторопши пятнистой В) адеметионин Г) эссенциале @	А
206.	ДЕ-7. Вопрос-206 ГЕПАТОПРОТЕКТОРОМ, СОДЕРЖАЩИМ ФОСФОЛИПИДЫ, ЯВЛЯЕТСЯ А) эссенциале Б) гептрал В) аллохол Г) хилак форте @	А
207.	ДЕ-7. Вопрос-207 ПРИ КИШЕЧНЫХ КОЛИКАХ ПРИМЕНЯЮТ А) дротаверин Б) гептрал В) имодиум Г) линекс @	А
208.	ДЕ-7. Вопрос-208 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВКЛЮЧАЕТ А) нарушение всасывания холестерина в кишечнике Б) взаимодействие с опиоидными рецепторами кишечника В) нарушение выделения соляной кислоты Г) повышение моторики ЖКТ @	А
209.	ДЕ-7. Вопрос-209 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВКЛЮЧАЕТ А) подавление синтеза холестерина в печени (вследствие угнетения фермента ГМГ-КоА-редуктазы) Б) взаимодействие с опиоидными рецепторами кишечника В) нарушение выделения соляной кислоты Г) повышение моторики ЖКТ @	А
210.	ДЕ-7. Вопрос-210 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВКЛЮЧАЕТ А) образование с холестерином жидких кристаллов Б) взаимодействие с опиоидными рецепторами кишечника В) нарушение выделения соляной кислоты Г) повышение моторики ЖКТ @	А
211.	ДЕ-7. Вопрос-211 К ХОЛЕРЕТИКАМ ОТНОСЯТ ЛС А) стимулирующие желчеобразование Б) растворяющие камни в желчном пузыре В) повышающие тонус желчного пузыря и снижающие тонус желчных путей и сфинктера Одди Г) повышающие моторику ЖКТ @	А

212.	ДЕ-7. Вопрос-212 К ХОЛЕКИНЕТИКАМ ОТНОСЯТ ЛС А) повышающие тонус желчного пузыря и снижающие тонус желчных путей и сфинктера Одди Б) растворяющие камни в желчном пузыре В) стимулирующие желчеобразование Г) повышающие моторику ЖКТ @	А
213.	ДЕ-7. Вопрос-213 К ХОЛЕСПАЗМОЛИТИКАМ ОТНОСЯТ ЛС А) ослабляющие тонус желчных путей и улучшающие отток желчи Б) растворяющие камни в желчном пузыре В) стимулирующие желчеобразование Г) повышающие моторику ЖКТ @	А
214.	ДЕ-7. Вопрос-214 ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАСТВОРЯЮТ КАМНИ ДИАМЕТРОМ А) 10-15 мм Б) 15-20 мм В) 20-30 мм Г) более 30 мм @	А
215.	ДЕ-7. Вопрос-215 ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕЕ ПОКАЗАН А) смектит диоктаэдрический Б) сенаде В) натрия пикосульфат Г) макрогол 4000 @	А
216.	ДЕ-7. Вопрос-216 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ КИШЕЧНИКА (КОЛОНОСКОПИИ) ПРИМЕНЯЮТ А) макрогол 4000 Б) сенаде В) масло касторовое Г) смектит диоктаэдрический @	А
217.	ДЕ-7. Вопрос-217 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ МАКРОГОЛА 4000 ЯВЛЯЕТСЯ А) подготовка к эндоскопическому исследованию кишечника Б) снижение кислотности желудочного сока В) растворение холестериновых камней Г) предупреждение рвоты после химиотерапии @	А
218.	ДЕ-7. Вопрос-218 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) макрогол 4000 применяют для очищения при подготовке к эндоскопическому исследованию кишечника Б) антациды растворяют холестериновые камни В) сенаде – противодиарейное средство Г) апоморфин предупреждает рвоту после химиотерапии @	А
219.	ДЕ-7. Вопрос-219 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) для лечения ожирения показаны анорексигенные средства Б) антациды растворяют холестериновые камни В) сенаде – противодиарейное средство Г) апоморфин предупреждает рвоту после химиотерапии @	А
220.	ДЕ-7. Вопрос-220 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) настойка полыни горькая рефлекторно возбуждает аппетит Б) антациды растворяют холестериновые камни В) сенаде – противодиарейное средство Г) апоморфин предупреждает рвоту после химиотерапии @	А
221.	ДЕ-7. Вопрос-221 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой дофаминовых D₂-рецепторов триггерной зоны рвотного центра Б) антациды нарушают образование соляной кислоты В) фамотидин – ингибитор «протонной помпы» Г) апоморфин предупреждает рвоту после химиотерапии @	А
222.	ДЕ-7. Вопрос-222 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) ондансетрон предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Б) антациды нарушают образование соляной кислоты	А

	В) фамотидин – ингибитор «протонной помпы» Г) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой М-холинорецепторов триггерной зоны рвотного центра @	
223.	ДЕ-7. Вопрос-223 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) антисекреторное действие фамотидина связано с блокадой гистаминовых H ₂ -рецепторов Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Г) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой М-холинорецепторов триггерной зоны рвотного центра @	А
224.	ДЕ-7. Вопрос-224 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) антисекреторное действие пирензепина связано с блокадой М ₁ -холинорецепторов Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Г) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой М-холинорецепторов триггерной зоны рвотного центра @	А
225.	ДЕ-7. Вопрос-225 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) ондансетрон предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) антисекреторное действие пирензепина связано с блокадой «протонной помпы» Г) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой М-холинорецепторов триггерной зоны рвотного центра @	А
226.	ДЕ-7. Вопрос-226 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) пантрипин ингибирует активность трипсина, химотрипсина и других протеаз поджелудочной железы Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Г) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой М-холинорецепторов триггерной зоны рвотного центра @	А
227.	ДЕ-7. Вопрос-227 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) висмута трикалия дицитрат активен в отношении H.pylori Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Г) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой М-холинорецепторов триггерной зоны рвотного центра @	А
228.	ДЕ-7. Вопрос-228 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) пантрипин применяется при остром панкреатите и панкреонекрозе Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Г) полыни горькой настойка угнетает аппетит @	А
229.	ДЕ-7. Вопрос-229 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) холелитолитические средства растворяют мелкие холестериновые камни Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Г) противорвотное действие метоклопрамида обусловлено блокадой М-холинорецепторов триггерной зоны рвотного центра @	А
230.	ДЕ-7. Вопрос-230 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) морская капуста способствует увеличению объема кишечного содержимого Б) натрия гидрокарбонат нейтрализует соляную кислоту желудочного сока без образования CO ₂ В) мизопростол образует защитную пленку на поверхности язвы Г) омепразол относится к группе антацидных средств @	А
231.	ДЕ-7. Вопрос-231 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) магния оксид нейтрализует соляную кислоту желудочного сока без образования CO ₂ Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии Г) пантрипин противопоказан при панкреонекрозе и остром панкреатите @	А
232.	ДЕ-7. Вопрос-232 ПРАВИЛЬНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ А) аллохол повышает секрецию желчи за счет стимуляции секреторной функции паренхимы печени Б) мизопростол образует пленку на эрозивной поверхности слизистой ЖКТ В) апоморфин предупреждает рвоту у больных после лучевой и химиотерапии	А

	Г) симетикон облегчает отхождения газов по механизму связывания с опиоидными рецепторами кишечника @	
233.	ДЕ-7. Вопрос-233 ТРИПСИН А) Ферментный препарат Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Антиаллергическое средство @	A
234.	ДЕ-7. Вопрос-234 ГИАЛУРОНИДАЗА А) Ферментный препарат Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Антиаллергическое средство @	A
235.	ДЕ-7. Вопрос-235 АЛМАГЕЛЬ А) Антацидное средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Антиаллергическое средство @	A
236.	ДЕ-7. Вопрос-236 ОМЕПРАЗОЛ А) Ингибитор H ⁺ , K ⁺ - АТФазы (протонного насоса) Б) Блокатор гистаминовых рецепторов В) Стимулятор холинорецепторов Г) Ингибитор АПФ @	A
237.	ДЕ-7. Вопрос-237 СЕНАДЕ А) Слабительное средство Б) Желчегонное средство В) Психостимулятор Г) Анорексиген @	A
238.	ДЕ-7. Вопрос-238 ЭССЕНЦИАЛЕ А) Гепатопротектор Б) Гипотензивное средство В) Психостимулятор Г) Слабительное средство @	A
239.	ДЕ-7. Вопрос-239 АЛЛОХОЛ А) Желчегонное средство Б) Психостимулятор В) Анорексиген Г) Слабительное средство @	A
240.	ДЕ-7. Вопрос-240 СЕНАДЕ А) Слабительное средство Б) Желчегонное средство В) Психостимулятор Г) Анорексиген @	A
241.	ДЕ-7. Вопрос-241 В СОСТАВ ПРЕПАРАТА ЛИНЕКС ВХОДЯТ: А) Живые молочнокислые бактерии Б) Сухой экстракт из растительного сырья В) Тиреотропные гормоны Г) Ингибиторозащищенные пенициллины @	A
242.	ДЕ-7. Вопрос-242 В СОСТАВ ПРЕПАРАТА ЛИНЕКС ВХОДЯТ: А) Живые молочнокислые бактерии Б) Антисептики В) Тиреотропные гормоны	A

	Г) Сердечные гликозиды @	
243.	ДЕ-7. Вопрос-243 В СОСТАВ ПРЕПАРАТА ЛИНЕКС ВХОДЯТ: А) Живые молочнокислые бактерии Б) Сухой экстракт из растительного сырья В) Индукторы эндогенного интерферона Г) Анальгетики-антипиретики @	А
244.	ДЕ-7. Вопрос-244 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПРЕПАРАТА ЛИНЕКС: А) Дисбактериоз Б) Артроз височно-нижнечелюстного сустава В) Грипп Г) Аллергические реакции @	А
245.	ДЕ-7. Вопрос-245 ПРЕПАРАТ ЛИНЕКС ПОКАЗАН ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ ПОТОМУ ЧТО: А) Содержит живые молочнокислые бактерии и восполняет недостаток их в ЖКТ Б) Является антибиотиком и подавляет рост гнилостных бактерий В) Прямо стимулирует образование интерферона Г) Обладают антиаллергической активностью @	А
246.	ДЕ-7. Вопрос-246 ЖИВЫЕ МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРЕПАРАТ ЛИНЕКС: А) Восполняют недостаток полезной микрофлоры в ЖКТ Б) Обладают антиаллергической активностью В) Прямо стимулирует образование интерферона Г) Усиливают моторику ЖКТ и оказывают послабляющее действие @	А
247.	ДЕ-7. Вопрос-247 КАКОЙ ПРЕПАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА НА ФОНЕ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ?: А) Линекс Б) Флуоксетин В) Верапамил Г) Доксикалин(Юнидокс) @	А
248.	ДЕ-7. Вопрос-248 ПРЕПАРАТ ЛИНЕКС ПОКАЗАН ПРИ: А) Дисбактериозе Б) Артрозе височно-нижнечелюстного сустава В) Гриппе Г) Аллергических реакциях @	А
249.	ДЕ-7. Вопрос-249 ПРЕПАРАТ ЛИНЕКС ПОКАЗАН ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ?: А) Да Б) Нет @	А
250.	ДЕ-7. Вопрос-250 В СОСТАВ ПРЕПАРАТА ЛИНЕКС ВХОДИТ СУХОЙ ЭКСТРАКТ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ: А) Нет Б) Да @	А
251.	ДЕ-7. Вопрос-251 ЭССЕНЦИАЛЕ ЭТО ГЕПАТОПРОТЕКТОР?: А) Да Б) Нет @	А
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ		
252.	ДЕ-7. Вопрос-252 МЕРЫ, НЕ НАПРАВЛЕННЫЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ ЯДОВ ИЗ ЖКТ: А) Форсированный диурез Б) Промывание желудка В) Введение внутрь сорбентов Г) Назначение солевых слабительных @	А

253.	ДЕ-7. Вопрос-253 КАКИЕ МЕРЫ, НЕ НАПРАВЛЕННЫ НА УМЕНЬШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЯДОВ В ОРГАНИЗМЕ: А) назначение функциональных антагонистов Б) переливание крови В) форсированный диурез Г) гемодиализ @	А
254.	ДЕ-7. Вопрос-254 КАКОЕ МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО НАЗНАЧАЮТ ДЛЯ ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА: А) маннитол Б) верошпирон В) гидрохлортиазид Г) спиронолактон @	А
255.	ДЕ-7. Вопрос-255 ДЛЯ ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА НЕРАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ: А) спиронолактон Б) маннитол В) лазикс Г) фуросемид @	А
256.	ДЕ-7. Вопрос-256 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ НЕОБРАТИМОГО ДЕЙСТВИЯ (ФОС) ПРИМЕНЯЮТ: А) М-холиноблокаторы Б) М-холиномиметики В) Н-холиноблокаторы Г) Ганглиоблокаторы @	А
257.	ДЕ-7. Вопрос-257 ДИМЕРКАПТОПРОПАНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ МОНОГИДРАТ (УНИТИОЛ) не А) является антагонистом барбитуратов Б) образует нетоксичные комплексы с ртутью В) образует комплексы с сердечными гликозидами Г) образует нетоксичные комплексы с мышьяком @	А
258.	ДЕ-7. Вопрос-258 ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СУКСАМЕТОНИЕМ (ДИТИЛИН, ЛИСТЕНОН) НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ: А) Искусственную вентиляцию легких и переливание крови Б) Введение раствора неостигмина метилсульфата В) Введение раствора тримедоксима Г) Введение раствора прозерина @	А
259.	ДЕ-7. Вопрос-259 ПОЛИВИДОН (ГЕМОДЕЗ Н): А) связывает циркулирующие в крови токсины и ускоряет их выведение из организма Б) не является полимерным соединением В) является антагонистом наркотических анальгетиков Г) является антагонистом барбитуратов @	А
260.	ДЕ-7. Вопрос-260 НАЛОКСОН ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЫХАНИИ ПРИ: А) передозировке опиоидными анальгетиками Б) передозировке соединениями бензодиазепинового ряда В) передозировке производными барбитуровой кислоты Г) передозировке М-холиноблокаторами @	А
261.	ДЕ-7. Вопрос-261 ФЛУМАЗЕНИЛ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) передозировке соединениями бензодиазепинового ряда Б) передозировке производными барбитуровой кислоты В) передозировке опиоидными анальгетиками Г) передозировке М-холиноблокаторами @	А
262.	ДЕ-7. Вопрос-262 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБРАТИМОГО ДЕЙСТВИЯ (НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ФОС) ПРИМЕНЯЮТ: А) М-холиноблокаторы Б) М-холиномиметики В) ганглиоблокаторы Г) реактиваторы ацетилхолинэстеразы @	А
263.	ДЕ-7. Вопрос-263 ДЛЯ ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА НЕРАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ: А) гидрохлортиазид Б) маннитол В) лазикс Г) фуросемид	А

	@	
264.	ДЕ-7. Вопрос-264 КАКОЕ МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО НАЗНАЧАЮТ ДЛЯ ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА: А) фуросемид Б) лориста Н В) гидрохлортиазид Г) спиронолактон @	А
265.	ДЕ-7. Вопрос-265 ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ А) адреналин Б) добутамин В) фенилэфрин Г) ксилометазолин @	А
266.	. ДЕ-7. Вопрос-266 ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ПРИМЕНЯЮТ А) преднизолон Б) кетотифен В) кромоглициевую кислоту Г) недокромил @	А
267.	ДЕ-7. Вопрос-267 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИОИДНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ А) налоксон Б) флумазенил В) неостигмина метилсульфат Г) ипратропия бромид @	А
268.	ДЕ-7. Вопрос-268 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КУРАРЕПОДОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ АНТИДОТОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) неостигмина метилсульфат Б) азаметония бромид В) атропин Г) преднизолон @	А
269.	ДЕ-7. Вопрос-269 УНИТИОЛ ОБРАЗУЕТ ТОКСИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СО ВСЕМИ МЕТАЛЛАМИ, КРОМЕ : А) кадмия Б) мышьяка В) железа Г) свинца @	А
270.	ДЕ-7. Вопрос-270 НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДНЫМИ СИНЬЛЬНОЙ КИСЛОТЫ, ПОТОМУ ЧТО: А) переводит производные синильной кислоты в менее ядовитые роданистые соединения. Б) образует нетоксичные комплексоны В) активирует цитохром Р 450 печени Г) является донатором протонов водорода @	А
271.	ДЕ-7. Вопрос-271 ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ А) налоксон Б) дефероксамин В) циклоспорин Г) пентазоцин @	А
272.	ДЕ-7. Вопрос-272 ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОТРАВЛЕНИЙ БЕНЗОДИАЗЕПИНАМИ И БАРБИТУРАТАМИ: А) флумазенил Б) хлорпромазин В) фторотан Г) налоксон @	А
273.	ДЕ-7. Вопрос-273 ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПАРАЦЕТАМОЛОМ: А) АЦЦ	А

	Б) налоксон В) флумазенил Г) нейролептики @	
274.	ДЕ-7. Вопрос-274 ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРОИЗВОДНЫХ ИЗОНИАЗИДА: А) витамин В 6 Б) диазепам В) хлорпромазин Г) тиосульфат натрия @	А
275.	ДЕ-7. Вопрос-275 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТ ВСЕ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ, КРОМЕ : А) гипотипидемические Б) адсорбирующие В) диуретики Г) рвотные @	А
276.	ДЕ-7. Вопрос-276 ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ПРИМЕНЯЮТ: А) унитиол Б) уголь активированный В) анаприлин Г) пропранолол @	А
277.	ДЕ-7. Вопрос-277 КОМПЛЕКСОНЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ : А) опиоидами Б) препаратами железа В) препаратами кальция Г) препаратами свинца @	А
278.	ДЕ-7. Вопрос-278 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОБРАТИМЫМИ ИНГИБИТОРАМИ ХЭ ПРИМЕНЯЮТ: А) атропин Б) прозерин В) ацетилхолин в высоких дозах Г) уголь активированный @	А
279.	ДЕ-7. Вопрос-279 ВЫБЕРИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ УНИТИОЛА: А) сульфгидрильные группы ($-SH$) препарата образуют стойкий комплекс с тяжелыми металлами Б) препарат усиливает диурез В) увеличивает активность симпатического отдела ВНС Г) усиливает активность энзиматических ферментов печени @	А
280.	ДЕ-7. Вопрос-280 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРЕПАРАТАМИ ПАПОРОТНИКА НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ А) касторовое масло в качестве слабительного Б) форсированный диурез В) гемодиализ Г) активированный уголь Д) Промывание желудка @	А
281.	ДЕ-7. Вопрос-281 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТАНОЛОМ ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА: А) этанол Б) малые дозы метанола В) атропин Г) ингибиторы ХЭ @	А
282.	ДЕ-7. Вопрос-282 ПОЛИВИДОН ОТНОСЯТ К: А) дезинтоксикационным препаратам Б) регуляторам водно-солевого баланса В) противошоковым препаратам Д) препаратам для парентерального питания @	А
283.	ДЕ-7. Вопрос-283 ГЕМОДЕЗ-Н НЕ ПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ : А) для лечения шока Б) при токсических формах острых инфекционных кишечных заболеваний В) при печеночной недостаточности Г) при сепсис @	А

284.	ДЕ-7. Вопрос-284 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГЕМОДЕЗА-Н: А) сердечная недостаточность Б) печеночная недостаточность В) сепсис Г) острые инфекционные заболевания @	А
285.	ДЕ-7. Вопрос-285 ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО: А) унитиол Б) поливудон В) висмута нитрат основной Г) уголь активированный @	А
286.	ДЕ-7. Вопрос-286 УНИТИОЛ НЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) сепсисе Б) интоксикации ртутью В) интоксикации сердечными гликозидами Г) интоксикации мышьяком. @	А
287.	ДЕ-7. Вопрос-287 ОПРЕДЕЛИТЕ ЛП. ЯВЛЯЕТСЯ ДЕТОКСИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ТИОЛОВЫМИ ЯДАМИ, ОБРАЗУЯ С НИМИ НЕТОКСИЧНЫЕ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ. А) унитиол Б) поливудон В) уголь активированный Г) изотонический раствор натрия хлорида @	А
288.	ДЕ-7. Вопрос-288 УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ НЕ ОТНОСЯТ К: А) регуляторам водно-солевого баланса Б) дезинтоксикационным средствам В) адсорбентам Г) антидиарейным средствам @	А
289.	ДЕ-7. Вопрос-289 ОПРЕДЕЛИТЕ ЛП. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, СОРБИРУЕТ ГАЗЫ, ТОКСИНЫ, АЛКАЛОИДЫ, ГЛИКОЗИДЫ, СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ. УМЕНЬШАЕТ ИХ ВСАСЫВАНИЕ В ЖКТ И СПОСОБСТВУЕТ ИХ ВЫВЕДЕНИЮ С ФЕКАЛИЯМИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ С ТОКСИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. А) уголь активированный Б) унитиол В) поливудон Г) Де-Нол @	А
290.	ДЕ-7. Вопрос-290 КОМПЛЕКСОНЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ : А) трициклическими антидепрессантами Б) препаратами железа В) препаратами кальция Г) препаратами свинца @	А
291.	ДЕ-7. Вопрос-291 ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ПРИМЕНЯЮТ: А) атропин Б) уголь активированный В) анаприлин Г) пропранолол @	А
292.	ДЕ-7. Вопрос-292 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ НЕОБРАТИМОГО ДЕЙСТВИЯ (ФОС) ПРИМЕНЯЮТ: А) Реактиваторы ацетилхолинэстеразы Б) М-холиномиметики В) Н-холиноблокаторы Г) Ганглиоблокаторы @	А
293.	ДЕ-7. Вопрос-293 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА, КРОМЕ: А) увеличение выведения натрия из организма Б) гипергидратация В) увеличение выведение калия из организма Г) хлоридный ацидоз @	А

294.	ДЕ-7. Вопрос-294 ОПРЕДЕЛИТЕ ЛП. ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННОЕ СРЕДСТВО И СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ. ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ИНФУЗИЯХ. А) изотонический раствор натрия хлорида Б) гемодез-Н В) гипертонический раствор натрия хлорида Г) поливидон @	А
295.	ДЕ-7. Вопрос-295 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИОИДНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ А) налоксон Б) флумазенил В) неостигмина метилсульфат Г) ипратропия бромид @	А
296.	ДЕ-7. Вопрос-296 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КУРАРЕПОДОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ АНТИДОТОМ ЯВЛЯЕТСЯ А) неостигмина метилсульфат Б) азаметония бромид В) атропин Г) преднизолон @	А
297.	ДЕ-7. Вопрос-297 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДИГОКСИНОМ АНТИДОТОМ ЯВЛЯЮТСЯ А) ионы калия Б) ионы кальция В) ионы хлора Г) ионы железа @	А
298.	ДЕ-7. Вопрос-298 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДИГОКСИНОМ АНТИДОТОМ ЯВЛЯЮТСЯ А) специфические антитела Б) азаметония бромид В) атропин Г) преднизолон @	А
299.	ДЕ-7. Вопрос-299 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРЕПАРАТОМ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ ТАБЛЕТКИ В ПЕРВЫЕ 10-15 МИНУТ СКОРОПОМОЩНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) промывание желудка Б) диализ В) гипербарическая камера Г) кислород @	А
300.	ДЕ-7. Вопрос-300 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРЕПАРАТОМ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ ТАБЛЕТКИ В ПЕРВЫЕ 10-15 МИНУТ СКОРОПОМОЩНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) вызвать рвоту Б) диализ В) гипербарическая камера Г) кислород @	А

№	Текст вопроса	Ответ (буквенный)
	АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ	
1.	ДЕ-8. Вопрос-1 ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОКАЗАН: А) Шалфея листьев настой Б) Карведилол В) Протамина сульфат Г) Аминокапроновая кислота @	А
2.	ДЕ-8. Вопрос-2 ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОКАЗАН: А) Ромашки цветков настой Б) Карведилол В) Протамина сульфат Г) Аминокапроновая кислота @	А
3.	ДЕ-8. Вопрос-3 ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОКАЗАН: А) Гексетидин (Гексорал) Б) Карведилол В) Протамина сульфат Г) Аминокапроновая кислота @	А
4.	ДЕ-8. Вопрос-4 ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОКАЗАН: А) Хлоргексидин Б) Карведилол В) Протамина сульфат Г) Аминокапроновая кислота @	А
5.	ДЕ-8. Вопрос-5 ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОКАЗАН: А) Септолете Б) Карведилол В) Протамина сульфат Г) Аминокапроновая кислота @	А
6.	ДЕ-8. Вопрос-6 ХЛОРАМИН Б А) Дезинфицирующее средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
7.	ДЕ-8. Вопрос-7 ПОВИДОН-ЙОД А) Антисептическое средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
8.	ДЕ-8. Вопрос-8 ВОДОРОДА ПЕРОКСИД А) Антисептическое средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
9.	ДЕ-8. Вопрос-9 МИРАМИСТИН А) Антисептическое средство Б) Фторхинолон	А

	В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	
10.	ДЕ-8. Вопрос-10 ГЕКСЕТИДИН (ГЕКСОРАЛ) А) Антисептическое средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
11.	ДЕ-8. Вопрос-11 ХЛОРГЕКСИДИН А) Антисептическое средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
12.	ДЕ-8. Вопрос-12 МИРАМИСТИН В СТОМАТОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТ: А) Местно Б) Перорально В) Инъекционно Г) Ингаляционно @	А
13.	ДЕ-8. Вопрос-13 МИРАМИСТИН В СТОМАТОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ: А) Местного применения Б) Сублингвального применения В) Парентерального применения Г) Субарахноидального применения @	А
14.	ДЕ-8. Вопрос-14 МИРАМИСТИН В СТОМАТОЛОГИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ВИДЕ: А) Аэрозолей Б) Мазей В) Таблеток Г) Суппозиториев @	А
15.	ДЕ-8. Вопрос-15 МИРАМИСТИН НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ РТА: А) Не обладает раздражающим действием Б) Обладает раздражающим действием @	А
16.	ДЕ-8. Вопрос-16 МИРАМИСТИН: А) Практически не обладает аллергизирующим действием Б) Обладает выраженным аллергизирующим действием В) Вызывает кандидозы полости рта Г) Вызывает краткий гриппоподобный синдром @	А
17.	ДЕ-8. Вопрос-17 МИРАМИСТИН: А) Не всасывается и не проникает в кровь через слизистые оболочки Б) Хорошо всасывается и проникает в кровь через слизистые оболочки В) Является высоколипофильным препаратом Г) При местном употреблении может давать побочные эффекты связанные с нарушениями ЦНС @	А
18.	ДЕ-8. Вопрос-18 МИРАМИСТИН ПО СРАВНЕНИЮ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ: А) Обладает противовирусной активностью в терапевтической концентрации Б) Обладает раздражающим действием В) Больше вызывает аллергические реакции Г) Обладает сильным резорбтивным действием @	А
19.	ДЕ-8. Вопрос-19 МИРАМИСТИН ЯВЛЯЕТСЯ: А) Антисептиком детергентом	А

	Б) Антибиотиком пенициллинового ряда. В) Противовирусным средством, ингибитором М2 канала Г) Дезинфицирующим фенольного ряда @	
20.	ДЕ-8. Вопрос-20 МИРАМИСТИН: А) Антисептик детергент Б) Антисептик группы спиртов В) Антисептик краситель Г) Антисептик растительного происхождения @	А
21.	ДЕ-8. Вопрос-21 МИРАМИСТИН АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ: А) Бактерий, грибов, вирусов, простейших Б) Только в отношении бактерий В) Только в отношении вирусов Г) Только в отношении грибов @	А
22.	ДЕ-8. Вопрос-22 МИРАМИСТИН ПРОЯВЛЯЕТ СИНЕРГИЗМ ДЕЙСТВИЯ С АНТИБИОТИКАМИ?: А) Да Б) Нет @	А
23.	ДЕ-8. Вопрос-23 МИРАМИСТИН ПРОЯВЛЯЕТ СИНЕРГИЗМ ДЕЙСТВИЯ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ?: А) Да Б) Нет @	А
24.	ДЕ-8. Вопрос-24 МИРАМИСТИН ПРОЯВЛЯЕТ СИНЕРГИЗМ ДЕЙСТВИЯ С АНТИБИОТИКАМИ, ПРОТИВОГРИБКОВЫМИ И ПРОТИВОВИРУСНЫМИ СРЕДСТВАМИ?: А) Да Б) Нет @	А
25.	ДЕ-8. Вопрос-25 К АНТИСЕПТИКАМ ОТНОСИТСЯ: А) мирамистин Б) линезолид В) азитромицин Г) фуразолидон @	А
26.	ДЕ-8. Вопрос-26 К АНТИСЕПТИКАМ ОТНОСИТСЯ: А) хлоргексидин Б) хлорамфеникол В) ванкомицин Г) фуразидин @	А
АНТИБИОТИКИ		
27.	ДЕ-8. Вопрос-27 АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблетки 0.25 г, №10 - 10 шт. Б) таблеток-депо 450 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
28.	ДЕ-8. Вопрос-28 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытые пленочной оболочкой 250 мг+125 мг, №15 - 5 шт. Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	А
29.		А

	ДЕ-8. Вопрос-29 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытые пленочной оболочкой 500 мг+125 мг, №14 - 7 шт Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	
30.	ДЕ-8. Вопрос-30 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытые пленочной оболочкой 875 мг+125 мг, №10 - 5 шт. Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
31.	ДЕ-8. Вопрос-31 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошка для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+31.25 мг/5 мл, флакон темного стекла 25 г (20 доз) Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
32.	ДЕ-8. Вопрос-32 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошка для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг+62.5 мг/5 мл, флакон темного стекла 25 г (20 доз) Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
33.	ДЕ-8. Вопрос-33 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошка для приготовления суспензии для приема внутрь 400 мг+57 мг/5 мл, флакон 35 г Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
34.	ДЕ-8. Вопрос-34 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошка для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг+200 мг, №5 - флакон Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
35.	ДЕ-8. Вопрос-35 АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (АМОКСИКЛАВ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошка для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг+100 мг, №5 - флакон Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	A
36.		A

	ДЕ-8. Вопрос-36 ЦЕФТАЗИДИМ (ФОРТУМ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) порошка для приготовления раствора для инъекций 1 г / 2 г / 500 мг / 250 мг, флакон - пачка картонная Б) таблеток 550 мг В) капсулы 250 мг Г) пластырь 500/10 мг @	
37.	ДЕ-8. Вопрос-37 АЗИТРОМИЦИН (СУМАМЕД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсул 250 мг, №6 - 6 шт. Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	A
38.	ДЕ-8. Вопрос-38 АЗИТРОМИЦИН (СУМАМЕД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытые пленочной оболочкой 125 мг / 500 мг Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	A
39.	ДЕ-8. Вопрос-39 АЗИТРОМИЦИН (СУМАМЕД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) лиофилизата для приготовления раствора для инфузий 500 мг, №5 Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	A
40.	ДЕ-8. Вопрос-40 АЗИТРОМИЦИН (СУМАМЕД) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток диспергируемых 125 мг / 250 мг / 500 мг, №6 Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	A
41.	ДЕ-8. Вопрос-41 АНТИБИОТИК А) Тазоцин Б) Метфармин В) Натрия фторид Г) Кальция карбонат @	A
42.	ДЕ-8. Вопрос-42 АНТИБИОТИК А) Стрептомицин Б) Метфармин В) Натрия фторид Г) Кальция карбонат @	A
43.	ДЕ-8. Вопрос-43 АНТИБИОТИК А) Гентамицин Б) Метфармин В) Натрия фторид Г) Кальция карбонат @	A
44.	ДЕ-8. Вопрос-44 АНТИБИОТИК	A

	А) Амикацин Б) Метфармин В) Натрия фторид Г) Кальция карбонат @	
45.	ДЕ-8. Вопрос-45 АНТИБИОТИК А) Доксициклин (Юнидокс) Б) Метфармин В) Натрия фторид Г) Кальция карбонат @	А
46.	ДЕ-8. Вопрос-46 АНТИБИОТИК А) Эритромицин Б) Феноболил В) Натрия фторид Г) Лоратадин (Кларитин) @	А
47.	ДЕ-8. Вопрос-47 АНТИБИОТИК А) Кларитромицин Б) Феноболил В) Натрия фторид Г) Лоратадин (Кларитин) @	А
48.	ДЕ-8. Вопрос-48 АНТИБИОТИК А) Джозамицин (Вильпрофен) Б) Феноболил В) Натрия фторид Г) Лоратадин (Кларитин) @	А
49.	ДЕ-8. Вопрос-49 АНТИБИОТИК А) Линкомицин Б) Феноболил В) Вольтарен Г) Натрия фторид @	А
50.	ДЕ-8. Вопрос-50 АНТИБИОТИК А) Хлорамфеникол (Левомецитин) Б) Феноболил В) Резерпин Г) Леводопа @	А
51.	ДЕ-8. Вопрос-51 β – ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ: А) пенициллины Б) тетрациклины В) аминогликозиды Г) хлорамфениколы @	А
52.	ДЕ-8. Вопрос-52 β – ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ: А) цефалоспорины Б) фторхинолоны В) тетрациклины Г) линкозамиды @	А
53.	ДЕ-8. Вопрос-53 β – ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ: А) карбапенемы Б) фторхинолоны В) линкозамиды Г) тетрациклины @	А

54.	ДЕ-8. Вопрос-54 β – ЛАКТАМНЫЙ АНТИБИОТИК: А) бензилпенициллин Б) ко-тримоксазол В) метронидазол Г) эритромицин @	A
55.	ДЕ-8. Вопрос-55 β – ЛАКТАМНЫЙ АНТИБИОТИК: А) имипенем + циластатин (тиенам) Б) ко-тримоксазол В) метронидазол Г) эритромицин @	A
56.	ДЕ-8. Вопрос-56 β – ЛАКТАМНЫЙ АНТИБИОТИК: А) цефалексин Б) ко-тримоксазол В) метронидазол Г) эритромицин @	A
57.	ДЕ-8. Вопрос-57 КОМБИНИРОВАННЫМ β – ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) ампиокс Б) сумамед В) цефуроксим 4) имипенем @	A
58.	ДЕ-8. Вопрос-58 КОМБИНИРОВАННЫМ β – ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ: β – ЛАКТАМНЫЙ АНТИБИОТИК: А) Тиенам Б) ампициллин В) цефуроксим Г) азитромицин @	A
59.	ДЕ-8. Вопрос-59 КОМБИНИРОВАННЫМ β – ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) амоксиклав Б) оксациллин В) цефуроксим Г) циластатин @	A
60.	ДЕ-8. Вопрос-60 В МИКРОБНОЙ КЛЕТКЕ ЦЕФАЛОСПОРИНЫ НАРУШАЮТ: А) синтез клеточной стенки Б) синтез белка на рибосомах В) проницаемость цитоплазматической мембраны Г) ингибируют фермент РНК-полимеразу @	A
61.	ДЕ-8. Вопрос-61 ЦЕФАЛОСПОРИНЫ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ: А) бактерицидное Б) бактериостатическое В) фунгицидное Г) фунгистатическое @	A
62.	ДЕ-8. Вопрос-62 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕНЗАТИНА БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА + БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА ПРОКАИНА (БИЦИЛЛИНА-5) ЯВЛЯЕТСЯ: А) сифилис Б) кандидомикоз В) туберкулез Г) герпес кожи @	
63.	ДЕ-8. Вопрос-63 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕНЗАТИНА БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА + БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА ПРОКАИНА (БИЦИЛЛИНА-5) ЯВЛЯЕТСЯ:	A

	А) профилактика ревматизма Б) кандидомикозы В) туберкулез Г) герпес кожи @	
64.	ДЕ-8. Вопрос-64 ТЕТРАЦИКЛИНЫ НАРУШАЮТ СИНТЕЗ: А) клеточной стенки Б) белка на рибосомах В) нуклеиновых кислот Г) миколовых кислот @	A
65.	ДЕ-8. Вопрос-65 БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН + БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН ПРОКАИН (БИЦИЛЛИНА-5) ВВОДИТСЯ: А) в/м Б) в/в В) эндолумбально Г) per os @	A
66.	ДЕ-8. Вопрос-66 ДЛЯ ПРЕПАРАТОВ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА ХАРАКТЕРНО: А) разрушаются в кислой среде желудка Б) оказывают бактериостатическое действие В) энтеральный путь введения Г) отсутствие аллергических реакций @	A
67.	ДЕ-8. Вопрос-67 ДЛЯ ПРЕПАРАТОВ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА ХАРАКТЕРНО: А) разрушение в кислой среде желудка Б) бактериостатическое действие В) энтеральный путь введения Г) кристаллурия в почках @	A
68.	ДЕ-8. Вопрос-68 ПРЕПАРАТЫ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА ОКАЗЫВАЮТ: А) бактерицидное действие Б) бактериостатическое действие В) фунгицидное Г) фунгистатическое @	A
69.	ДЕ-8. Вопрос-69 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ПЕНИЦИЛЛИНОВ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ: А) дисбактериоз Б) дисфункция слухового нерва В) дисфункция зрительного нерва Г) гепатотоксичность @	A
70.	ДЕ-8. Вопрос-70 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ПЕНИЦИЛЛИНОВ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ: А) аллергические реакции Б) дисфункция слухового нерва В) дисфункция зрительного нерва Г) кристаллурия в почках @	A
71.	ДЕ-8. Вопрос-71 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ: А) аллергические реакции Б) дисфункция слухового нерва В) дисфункция зрительного нерва Г) кристаллурия в почках @	A
72.	ДЕ-8. Вопрос-72 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ:	A

	А) дисбактериоз Б) дисфункция слухового нерва В) дисфункция зрительного нерва Г) гепатотоксичность @	
73.	ДЕ-8. Вопрос-73 ПРИРОДНЫЕ ПЕНИЦИЛЛИНЫ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ: А) бледной трепонемы Б) гонококка В) кандидоза Г) микобактерий @	А
74.	ДЕ-8. Вопрос-74 ПЕНИЦИЛЛИНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ: А) инфекциях верхних дыхательных путей Б) малярии В) гонорей Г) туберкулезе @	А
75.	ДЕ-8. Вопрос-75 ПЕНИЦИЛЛИНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ: А) сифилисе, менингите, сальмонеллезе Б) малярии, гонорей, цистите В) кандидозе кожи, амёбиозе Г) туберкулезе, герпесе @	А
76.	ДЕ-8. Вопрос-76 ПЕНИЦИЛЛИНЫ АКТИВНЫ В ОТНОШЕНИИ: А) грамположительных микроорганизмов Б) микобактерий В) вируса гриппа Г) инфекций, вызванной ВИЧ @	А
77.	ДЕ-8. Вопрос-77 К АНТИБИОТИКАМ ЦЕФАЛОСПОРИНОВОГО РЯДА ОТНОСИТСЯ: А) цефалексин Б) нитроксалин В) метронидазол Г) ципрофлоксацин @	А
78.	ДЕ-8. Вопрос-78 К АНТИБИОТИКАМ ЦЕФАЛОСПОРИНОВОГО РЯДА ОТНОСИТСЯ: А) цефтазидим Б) имипенем В) стрептомицин Г) ципрофлоксацин @	А
79.	ДЕ-8. Вопрос-79 К АНТИБИОТИКАМ ТЕТРАЦИКЛИНОВОГО РЯДА ОТНОСИТСЯ: А) тетрациклин Б) азитромицин В) ципрофлоксацин Г) тербинафин @	А
80.	ДЕ-8. Вопрос-80 К АНТИБИОТИКАМ ТЕТРАЦИКЛИНОВОГО РЯДА ОТНОСИТСЯ: А) доксициклин Б) джозамицин В) ципрофлоксацин Г) тербинафин @	А
81.	ДЕ-8. Вопрос-81 К МАКРОЛИДНЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ: А) азитромицин Б) гентамицин В) ципрофлоксацин Г) линкомицин @	А

82.	ДЕ-8. Вопрос-82 К МАКРОЛИДНЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ: А) кларитромицин Б) гентамицин В) цiproфлоксацин Г) линкомицин @	A
83.	ДЕ-8. Вопрос-83 ЭРИТРОМИЦИН ПРИМЕНЯЕТСЯ: А) перорально Б) только парентерально В) ректально Г) ингаляционно @	A
84.	ДЕ-8. Вопрос-84 ЛИНЕЗОЛИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ: А) оксазолидинонов Б) гликопептидов В) линкозамидов Г) фторхинолонов @	A
85.	ДЕ-8. Вопрос-85 АНТИБИОТИКИ ИЗ ГРУППЫ АМИНОГЛИКОЗИДОВ: А) плохо всасываются из пищеварительного тракта Б) хорошо всасываются из пищеварительного тракта В) проходят через гематоэнцефалический барьер Г) можно смешивать с бета-лактамами в одном шприце @	A
86.	ДЕ-8. Вопрос-86 АНТИБИОТИКИ ИЗ ГРУППЫ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ: А) активностью в отношении микобактерий Б) фунгицидным В) бактериостатическим Г) гематошизонтоцидным @	A
87.	ДЕ-8. Вопрос-87 АНТИБИОТИКИ ИЗ ГРУППЫ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОБЛАДАЮТ: А) ототоксичностью Б) гепатотоксичностью В) гематотоксичностью Г) кардиотоксичностью @	A
88.	ДЕ-8. Вопрос-88 АНТИБИОТИКИ ИЗ ГРУППЫ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОБЛАДАЮТ: А) нефротоксичностью Б) гепатотоксичностью В) гематотоксичностью Г) кардиотоксичностью @	A
89.	ДЕ-8. Вопрос-89 ДЛЯ АМИНОПЕНИЦИЛЛИНОВ ХАРАКТЕРНО: А) расширенный спектр антимикробной активности в отношении кишечных бактерий и гемофильной палочки Б) разрушаются в соляной кислоте желудка В) устойчивость к бета-лактамазам Г) активность в отношении синегнойной палочки @	A
90.	ДЕ-8. Вопрос-90 В ОТНОШЕНИИ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ АКТИВЕН: А) азлоциллин Б) ампициллин В) оксациллин Г) цефалексин @	A
91.	ДЕ-8. Вопрос-91 АНТИСИНЕГНОЙНЫЙ ЦЕФАЛОСПОРИН: А) цефтазидим	A

	Б) цефазолин В) цефуроксим Г) цефалексин @	
92.	ДЕ-8. Вопрос-92 ДЛЯ АМИНОПЕНИЦИЛЛИНОВ ХАРАКТЕРНО: А) устойчивость к соляной кислоте желудка Б) создают высокие концентрации в крови при приёме внутрь В) пища в 2 раза снижает биодоступность Г) активность в отношении синегнойной палочки @	A
93.	ДЕ-8. Вопрос-93 ДЛЯ АМИНОПЕНИЦИЛЛИНОВ ХАРАКТЕРНО: А) подверженность гидролизу бета-лактамазами Б) разрушение соляной кислотой желудка В) устойчивость к бета-лактамазам Г) активность в отношении синегнойной палочки @	A
94.	ДЕ-8. Вопрос-94 ДИСУЛЬФИРАМОПОДОБНАЯ РЕАКЦИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ С ПРЕПАРАТОМ: А) цефоперазон Б) ампициллин В) стрептомицин Г) этамбутол @	A
95.	ДЕ-8. Вопрос-95 АМИНОГЛИКОЗИДЫ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ: А) ототоксичность Б) гепатотоксичность В) гематотоксичность Г) кристаллурия @	A
96.	ДЕ-8. Вопрос-96 АМИНОГЛИКОЗИДЫ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ: А) нефротоксичность Б) фотосенсибилизация В) гепатотоксичность Г) кристаллурия @	A
97.	ДЕ-8. Вопрос-97 АМИНОГЛИКОЗИДЫ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ: А) нервно-мышечная блокада Б) фотосенсибилизация В) гепатотоксичность Г) кристаллурию @	A
98.	ДЕ-8. Вопрос-98 РАЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ: А) ампициллин + оксациллин Б) имипенем + меропенем В) бензилпенициллин + тетрациклин Г) кларитромицин + эритромицин @	A
99.	ДЕ-8. Вопрос-99 РАЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ: А) имипенем + циластатин Б) имипенем + меропенем В) бензилпенициллин + тетрациклин Г) кларитромицин + эритромицин @	A
100.	ДЕ-8. Вопрос-100 РАЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ: А) ампициллин + сульбактам Б) ампициллин + амоксициллин В) Бензилпенициллин + тетрациклин Г) кларитромицин + эритромицин	A

	@	
101.	ДЕ-8. Вопрос-101 К АМИНОГЛИКОЗИДНЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ: А) гентамицин Б) линкомицин В) тетрациклин Г) линезолид @	A
102.	ДЕ-8. Вопрос-102 КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА: А) ингибирует β-лактамазу Б) нарушает биосинтез клеточной стенки В) нарушает синтез белка на рибосомах Г) нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны @	A
103.	ДЕ-8. Вопрос-103 ЦИЛАСТАТИН: А) ингибирует почечную дегидропептидазу Б) ингибирует β-лактамазу В) нарушает синтез белка на рибосомах Г) нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны @	A
104.	ДЕ-8. Вопрос-104 КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА В КОМБИНАЦИИ С ПЕНИЦИЛЛИНАМИ: А) защищает пенициллины от разрушения β-лактамазами Б) усиливает всасывание пенициллинов из ЖКТ В) уменьшает аллергические реакции пенициллинов Г) уменьшает разрушение пенициллинов в печени @	A
105.	ДЕ-8. Вопрос-105 ЛИНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ: А) линкозамидов Б) аминогликозидов В) макролидов Г) амфениколов @	A
106.	ДЕ-8. Вопрос-106 ЦИЛАСТАТИН В КОМБИНАЦИИ С ИМИПЕНЕМОМ: А) защищает имипенем от разрушения дегидропептидазой в почках Б) защищает имипенем от разрушения β-лактамазами В) усиливает всасывание имипенема из ЖКТ Г) уменьшает разрушение имипенема в печени @	A
107.	ДЕ-8. Вопрос-107 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ β-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ: А) нарушение биосинтеза клеточной стенки Б) нарушение биосинтеза бактериального белка на рибосомах В) нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны Г) нарушение синтеза бактериальной РНК @	A
108.	ДЕ-8. Вопрос-108 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МАКРОЛИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ: А) нарушение биосинтеза бактериального белка на рибосомах Б) нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны В) нарушение синтеза бактериальной РНК Г) нарушение синтеза клеточной стенки @	A
109.	ДЕ-8. Вопрос-109 β – ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИЦИДНО, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ:	A

	А) синтез клеточной стенки микроорганизмов Б) синтез белка на уровне рибосом В) проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой Г) синтез фермента ДНК-гиразы @	
110.	ДЕ-8. Вопрос-110 ТЕТРАЦИКЛИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИ, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ СИНТЕЗ: А) белка на уровне рибосом Б) тетрагидрофосфовой кислоты В) клеточной стенки Г) фермента ДНК-гиразы @	А
111.	ДЕ-8. Вопрос-111 ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИЦИДНО, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ СИНТЕЗ: А) клеточной стенки микроорганизмов Б) белка на уровне рибосом В) тетрагидрофосфовой кислоты Г) фермента ДНК-гиразы @	А
112.	ДЕ-8. Вопрос-112 ИЗ ГРУППЫ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ДЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ: А) бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина (бициллин-5) Б) ампициллин + оксациллин (ампиокс) В) бензилпенициллина натриевая соль Г) амоксициллин + клавулановая кислота (амоксиклав) @	А
113.	ДЕ-8. Вопрос-113 К ГРУППЕ КАРБОПЕНЕМОВ ОТНОСИТСЯ: А) имипенем Б) линезолид В) моксифлоксацин Г) линкомицин @	А
114.	ДЕ-8. Вопрос-114 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ «ИМИПЕНЕМ + ЦИЛАСТАТИН» ВЫПУСКАЕТСЯ ПОД ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ: А) тиенам Б) амоксиклав В) ко-тримоксазол Г) ампиокс @	А
115.	ДЕ-8. Вопрос-115 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ «АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА» ВЫПУСКАЕТСЯ ПОД ТОРГОВЫМ НАЗВАНИЕМ: А) амоксиклав Б) тиенам В) ко-тримоксазол Г) ампиокс @	А
116.	ДЕ-8. Вопрос-116 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ «АМПИЦИЛЛИН + ОКСАЦИЛЛИН» ВЫПУСКАЕТСЯ ПОД ТОРГОВЫМ НАЗВАНИЕМ: А) ампиокс Б) тиенам В) амоксиклав Г) ко-тримоксазол @	А
117.	ДЕ-8. Вопрос-117 АКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ ОБЛАДАЕТ: А) цефтазидим Б) цефалексин В) оксациллин Г) амоксициллин	А

	@	
118.	ДЕ-8. Вопрос-118 ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ: А) аллергические реакции Б) нарушение формирования костной ткани В) нарушение формирования хрящевой ткани Г) атрофия зрительного нерва @	A
119.	ДЕ-8. Вопрос-119 ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ: А) диспептические расстройства (тошнота, рвота) Б) нарушение формирования костной ткани В) нарушение формирования хрящевой ткани Г) атрофия зрительного нерва @	A
120.	ДЕ-8. Вопрос-120 ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ТЕТРАЦИКЛИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ: А) образования костной ткани Б) формирования хрящевой ткани В) снижение слуха, шум и звон в ушах Г) атрофия зрительного нерва @	A
121.	ДЕ-8. Вопрос-121 ЦЕФЕПИМ ОТНОСИТСЯ К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ: А) I поколения Б) II поколения В) III поколения Г) IV поколения @	A
122.	ДЕ-8. Вопрос-122 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НЕ ПРОЯВЛЯЕТ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ МЕНИНГОКОККОВ: А) линкозамиды Б) амфениколы В) пенициллины Г) цефалоспорины @	A
123.	ДЕ-8. Вопрос-123 АЗИТРОМИЦИН (СУМАМЕД): А) связываются с 50S субъединицей бактериальных рибосом Б) связываются с 30S субъединицей бактериальных рибосом В) пища в 2 раза уменьшает биодоступность Г) проникает ГЭБ @	A
124.	ДЕ-8. Вопрос-124 БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ: А) гентамицин Б) тетрациклин В) линкомицин Г) эритромицин @	A
125.	ДЕ-8. Вопрос-125 СИНТЕЗ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ БАКТЕРИЙ НАРУШАЕТ: А) ампициллин Б) азитромицин В) ванкомицин Г) доксицилин @	A
126.	ДЕ-8. Вопрос-126 СИНТЕЗ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ БАКТЕРИЙ НАРУШАЕТ: А) цефалексин Б) эритромицин В) амикацин	A

	Г) доксицилин @	
127.	ДЕ-8. Вопрос-127 МИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА ФОРМИРУЕТСЯ ПО ПРИЧИНЕ: А) изменения модификации мишени Б) нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны В) образования метаболического «шунта» Г) выведения антибиотика из клетки @	А
128.	ДЕ-8. Вопрос-128 МИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА ФОРМИРУЕТСЯ ПО ПРИЧИНЕ: А) энзиматической инактивации антибиотика Б) образования метаболического «шунта» В) низкой проницаемости микробной клетки Г) спонтанных мутаций в генотипе микробов @	А
129.	ДЕ-8. Вопрос-129 АНТИБИОТИКИ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА МОГУТ ОБЛАДАТЬ ПЕРЕКРЕСТНОЙ АЛЛЕРГОГЕННОСТЬЮ С А) цефалоспоридами Б) тетрациклинами В) гликопептидами Г) аминогликозидами @	А
130.	ДЕ-8. Вопрос-130 ДЛЯ ЭРАДИКАЦИИ <i>HELICOBACTER PYLORI</i> ПРИМЕНЯЮТ АНТИБИОТИК: А) амоксициллин Б) метронидазол В) пенициллин Г) висмута трикалия дицитрат @	А
131.	ДЕ-8. Вопрос-131 БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ: А) тетрациклин Б) гентамицин В) амоксициллин Г) цефтазидим @	А
132.	ДЕ-8. Вопрос-132 К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСИТСЯ: А) ототоксичность Б) гематотоксичность В) нарушение формирования хрящевой ткани Г) нарушение образования костной ткани @	А
133.	ДЕ-8. Вопрос-133 К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСИТСЯ: А) нефротоксический эффект Б) нарушение образования костной ткани В) нарушение формирования хрящевой ткани Г) гематотоксический эффект @	А
134.	ДЕ-8. Вопрос-134 АНТИБИОТИКИ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) висцеральном сифилисе Б) урогенитальном хламидиозе В) туберкулезе Г) токсоплазмозе @	А
135.	ДЕ-8. Вопрос-135 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ <i>H. PYLORI</i> ПРИМЕНЯЮТ: А) амоксициллин Б) оксациллин В) азлоциллин	А

	Г) пиперацillin @	
136.	ДЕ-8. Вопрос-136 ЦЕФАЛОСПОРИН ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: А) цефтибутен Б) цефозолин В) цефепим Г) цефтазидим @	А
137.	ДЕ-8. Вопрос-137 К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСЯТ: А) ототоксичность, нарушение мышечной блокады, нефротоксичность Б) гепатотоксичность, нарушение формирования костной ткани, фотодерматозы В) нейротоксичность, нарушение формирования хрящевой ткани, вестибулотоксичность Г) гематотоксичность, нейротоксичность, коагулопатии @	А
138.	ДЕ-8. Вопрос-138 КЛАВУЛАНОВУЮ КИСЛОТУ КОМБИНИРУЮТ С АНТИБИОТИКАМИ БЕТА- ЛАКТАМНОГО РЯДА С ЦЕЛЬЮ: А) предотвращения разрушения бета-лактамазами Б) снижение токсичности В) увеличение биодоступности Г) обеспечения транспорта через ГЭБ @	А
139.	ДЕ-8. Вопрос-139 АНТИБИОТИК, ИМЕЮЩИЙ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ БЕТА-ЛАКТАМНОЕ КОЛЬЦО: А) цефалоспорины Б) макролиды В) линкозамиды Г) аминогликозиды @	А
140.	ДЕ-8. Вопрос-140 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К МАКРОЛИДАМ: А) кларитромицин Б) амоксициллин В) доксициклин Г) ципрофлоксацин @	А
141.	ДЕ-8. Вопрос-141 К КАРБАПЕНЕМАМ ОТНОСИТСЯ: А) имипенем Б) азтреонам В) амоксициллин Г) кларитромицин @	А
142.	ДЕ-8. Вопрос-142 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К МАКРОЛИДАМ: А) эритромицин Б) доксициклин В) амикацин Г) цефалексин @	А
143.	ДЕ-8. Вопрос-143 КАКОЙ АНТИБИОТИК ОТНОСИТСЯ К МАКРОЛИДАМ: А) азитромицин Б) доксициклин В) ванкомицин Г) азтреонам @	А
144.	ДЕ-8. Вопрос-144 АНТИБИОТИК ЦЕФАЛОСПОРИНОВОГО РЯДА: А) цефаклор Б) стрептомицин	А

	В) феноксиметилпенициллин Г) эритромицин @	
145.	ДЕ-8. Вопрос-145 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛИНКОЗАМИДОВ: А) клиндамицин Б) гентамицин В) стрептомицин Г) ванкомицин @	А
146.	ДЕ-8. Вопрос-146 ГЛИКОПЕПТИДНЫМ АНТИБИОТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) ванкомицин Б) хлорамфеникол В) неомицин Г) карбенициллин @	А
147.	ДЕ-8. Вопрос-147 К АНТИСТАФИЛОКОККОВЫМ ПЕНИЦИЛЛИНАМ ОТНОСИТСЯ: А) оксациллин Б) амоксициллин В) карбенициллин Г) доксициллин @	А
148.	ДЕ-8. Вопрос-148 ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ АМОКСИЦИЛЛИНА БЕТА-ЛАКТОМАЗАМИ, ЕГО КОМБИНИРУЮТ С: А) клавулановой кислотой Б) циластатином В) цефалексином Г) пиридоксином @	А
149.	ДЕ-8. Вопрос-149 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА: А) выраженное угнетение кроветворения Б) нефротоксичность В) ототоксичность Г) вестибулотоксичность @	А
150.	ДЕ-8. Вопрос-150 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АМИНОГЛИКОЗИДОВ: А) ототоксичность Б) кардиотоксичность В) выраженное угнетение кроветворения Г) гепатотоксичность @	А
151.	ДЕ-8. Вопрос-151 ДЛЯ ЭРАДИКАЦИИ H.PYLORI ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ: А) амоксициллин Б) ванкомицин В) цефалексин Г) линкомицин @	А
152.	ДЕ-8. Вопрос-152 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА, ВЫЗВАННОГО СПОРООБРАЗУЮЩИМ АНАЭРОБНЫМ МИКРОБОМ CLOSTRIDIUM DIFFICILE, ПРИМЕНЯЮТ АНТИБИОТИК: А) ванкомицин Б) амоксициллин В) амикацин Г) цефалексин @	А
153.	ДЕ-8. Вопрос-153 АНТИБИОТИКИ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА ПРИМЕНЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИ: А) сифилисе Б) туберкулезе В) трихомониазе	А

	Г) токсоплазмозе @	
154.	ДЕ-8. Вопрос-154 ПРИРОДНЫЙ ПЕНИЦИЛЛИН, НЕ РАЗРУШАЮЩИЙСЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ ЖЕЛУДКА: А) феноксиметилпенициллин Б) бензатин бензилпенициллин В) амоксициллин Г) азлоциллин @	А
155.	ДЕ-8. Вопрос-155 ТЕРАТОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ АНТИБИОТИК: А) доксициклин Б) азитромицин В) цефалексин Г) амоксициллин @	А
156.	ДЕ-8. Вопрос-156 ОТОТОКСИЧНОСТЬ И ВЕСТИБУЛОТОКСИЧНОСТЬ (НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ) РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ: А) амикацина Б) хлорамфеникола В) тетрациклина Г) доксициклина @	А
157.	ДЕ-8. Вопрос-157 БАКТЕРИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ АНТИБИОТИК: А) гентамицин Б) доксициклин В) эритромицин Г) линкомицин @	А
158.	ДЕ-8. Вопрос-158 ПРИРОДНЫМ ПЕНИЦИЛЛИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) бензилпенициллин прокаин Б) ампициллин В) азлоциллин Г) амоксиклав @	А
159.	ДЕ-8. Вопрос-159 АНТИСИНЕГНОЙНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ ПЕНИЦИЛЛИН: А) азлоциллин Б) оксациллин В) ампициллин Г) амоксициллин @	А
160.	ДЕ-8. Вопрос-160 СИНТЕЗ БАКТЕРИАЛЬНОГО БЕЛКА НАРУШАЕТ АНТИБИОТИК: А) доксициклин Б) цефалексин В) ампициллин Г) рифампицин @	А
161.	ДЕ-8. Вопрос-161 ПРОТИВОПОКАЗАНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДО 8 ЛЕТ АНТИБИОТИКИ: А) тетрациклины Б) макролиды В) линкозамиды Г) пенициллины @	А
162.	ДЕ-8. Вопрос-162 ЦЕФУРОКСИМ (ЗИНАЦЕФ) – ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЙ АНТИБИОТИК II ПОКОЛЕНИЯ: А) Не активен в отношении синегнойной палочки Б) Активен в отношении синегнойной палочкой	А

	@	
163.	ДЕ-8. Вопрос-163 ЦЕФЕПИМ (МАКСИПИМ) – ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЙ АНТИБИОТИК IV ПОКОЛЕНИЯ: А) Активен в отношении синегнойной палочкой Б) Не активен в отношении синегнойной палочки @	A
164.	ДЕ-8. Вопрос-164 АМОКСИКЛАВ ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным ингибиторозащищенным средствам Б) К противомикробным средствам цефалоспоринового ряда В) Анксиолитикам Г) Противовирусным средствам @	A
165.	ДЕ-8. Вопрос-165 АМОКСИКЛАВ- КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ: А) Амоксициллин + клавулановая кислота Б) Амоксициллин + Сульбактам В) Амоксициллин + Тазобактам Г) Ампициллин + Клавулановая кислота @	A
166.	ДЕ-8. Вопрос-166 АМОКСИКЛАВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального комбинированного средства Б) Противоопухолевого средства В) Противобактериального однокомпонентного средства Г) Кардиопротектора @	A
167.	ДЕ-8. Вопрос-167 КОМБИНИРОВАННЫЙ АНТИБИОТИК: А) Амоксиклав Б) Пиперациллин В) Амоксициллин Г) Эритромицин @	A
168.	ДЕ-8. Вопрос-168 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ АМОКСИКЛАВА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Бактериальные инфекции Б) Гельминтозы В) Туберкулез Г) ВИЧ –инфекция @	A
169.	ДЕ-8. Вопрос-169 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ МИКРООРГАНИЗМОВ, БЛОКИРУЯ ФЕРМЕНТ ТРАНСПЕПТИДАЗУ?: А) Бета-лактамы антибиотики Б) Тетрациклины В) Аминогликозиды Г) Макролиды @	A
170.	ДЕ-8. Вопрос-170 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ МИКРООРГАНИЗМОВ, БЛОКИРУЯ ФЕРМЕНТ ТРАНСПЕПТИДАЗУ?: А) Пенициллины Б) Тетрациклины В) Аминогликозиды Г) Макролиды @	A
171.	ДЕ-8. Вопрос-171 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ МИКРООРГАНИЗМОВ, БЛОКИРУЯ ФЕРМЕНТ ТРАНСПЕПТИДАЗУ?: А) Цефалоспорины Б) Тетрациклины В) Аминогликозиды Г) Макролиды	A

	@	
172.	ДЕ-8. Вопрос-172 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ МИКРООРГАНИЗМОВ, БЛОКИРУЯ ФЕРМЕНТ ТРАНСПЕПТИДАЗУ?: А) Карбапенемы Б) Тетрациклины В) Аминогликозиды Г) Макролиды @	A
173.	ДЕ-8. Вопрос-173 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ МИКРООРГАНИЗМОВ, БЛОКИРУЯ ФЕРМЕНТ ТРАНСПЕПТИДАЗУ?: А) Монобактамы Б) Тетрациклины В) Аминогликозиды Г) Макролиды @	A
174.	ДЕ-8. Вопрос-174 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ БЕЛКА НА РИБОСОМАХ?: А) Тетрациклины Б) Цефалоспорины В) Пенициллины Г) Карбапенемы @	A
175.	ДЕ-8. Вопрос-175 КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ БЕЛКА НА РИБОСОМАХ?: А) Аминогликозиды Б) Пенициллины В) Карбапенемы Г) Цефалоспорины @	A
176.	ДЕ-8. Вопрос-176 ЦЕФУРОКСИМ (ЗИНАЦЕФ) – ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЙ АНТИБИОТИК II ПОКОЛЕНИЯ НЕ АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ ?: А) Да Б) Нет @	A
177.	ДЕ-8. Вопрос-177 ЦЕФПИРОМ ОТНОСИТСЯ К: А) Противомикробным средствам группы пенициллинов Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	A
178.	ДЕ-8. Вопрос-178 ЛИНКОМИЦИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Противовирусного средства @	A
179.	ДЕ-8. Вопрос-179 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Доксизиклин (Юнидокс Солютаб) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Аллохол @	A
180.	ДЕ-8. Вопрос-180 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АМИНОГЛИКОЗИДОВ: А) Гентамицин Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен	A

	@	
181.	ДЕ-8. Вопрос-181 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ: А) Цефтазидим (Фортум) Б) Амикацин В) Кальцитонин Г) Феноболил @	A
182.	ДЕ-8. Вопрос-182 ДЖОЗАМИЦИН (ВИЛЬПРАФЕН) ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	A
183.	ДЕ-8. Вопрос-183 ДЖОЗАМИЦИН (ВИЛЬПРАФЕН) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	A
184.	ДЕ-8. Вопрос-184 КЛАРИТРОМИЦИН (КЛАЦИД) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Аналептикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	A
185.	ДЕ-8. Вопрос-185 ИМЕПЕНЕМ ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	A
186.	ДЕ-8. Вопрос-186 БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Антисептического средства @	A
187.	ДЕ-8. Вопрос-187 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Джозамицин (Вильпрафен) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Метоклопрамид (Церукал) @	A
188.	ДЕ-8. Вопрос-188 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Джозамицин (Вильпрафен) Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен @	A
189.	ДЕ-8. Вопрос-189 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Азитромицин (Сумамед) Б) Тестостерона пропионат В) Кальцитонин Г) Феноболил @	A
190.	ДЕ-8. Вопрос-190 ПРИ ГИНГИВИТЕ И БОЛЕЗНИ ПАРОДОНТА ПРИМЕНЯЮТ: А) Джозамицин (Вильпрафен) Б) Дигоксин	A

	В) Мирамистин Г) Иммунал @	
191.	ДЕ-8. Вопрос-191 КЛАРИТРОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	А
192.	ДЕ-8. Вопрос-192 КЛАРИТРОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	А
193.	ДЕ-8. Вопрос-193 КЛАРИТРОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Аналептикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	А
194.	ДЕ-8. Вопрос-194 КЛАРИТРОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) Химиотерапевтическим препаратам Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	А
195.	ДЕ-8. Вопрос-195 КЛАРИТРОМИЦИН ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Противопаркинсонического средства @	А
196.	ДЕ-8. Вопрос-196 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Кларитромицин Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Метоклопрамид @	А
197.	ДЕ-8. Вопрос-197 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Кларитромицин Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен @	А
198.	ДЕ-8. Вопрос-198 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Кларитромицин Б) Метформин В) Кальцитонин Г) Феноболил @	А
199.	ДЕ-8. Вопрос-199 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) Кларитромицин Б) Дигоксин В) Метформин Г) Тетракаин (Дикаин) @	А
200.	ДЕ-8. Вопрос-200 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ КЛАРИТРОМИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ:	А

	А) Инфекции кожи и мягких тканей Б) Гельминтозы В) Туберкулез Г) ВИЧ – инфекция @	
201.	ДЕ-8. Вопрос-201 ЭРИТРОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	А
202.	ДЕ-8. Вопрос-202 ЭРИТРОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	А
203.	ДЕ-8. Вопрос-203 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Пенициллин Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Вальпроевая кислота @	А
204.	ДЕ-8. Вопрос-204 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Эритромицин Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Варфарин @	А
205.	ДЕ-8. Вопрос-205 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Эритромицин Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен @	А
206.	ДЕ-8. Вопрос-206 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Эритромицин Б) Глибенкламид В) Кальцитонин Г) Феноболил @	А
207.	ДЕ-8. Вопрос-207 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) Эритромицин Б) Дигоксин В) Метформин Г) Тетракаин (Дикаин) @	А
208.	ДЕ-8. Вопрос-208 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭРИТРОМИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Инфекции полости рта Б) Гельминтозы В) Туберкулез Г) ВИЧ – инфекция @	А
209.	ДЕ-8. Вопрос-209 ДОКСИЦИКЛИН (ЮНИДОКС) ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам , группе тетрациклинов Б) Анальгетикам наркотического действия В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам, группе адамантанов @	А

210.	ДЕ-8. Вопрос-210 ДОКСИЦИКЛИН (ЮНИДОКС) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам тетрациклинового ряда Б) Антибиотикам макролидного ряда В) Антибиотикам аминогликозидного ряда Г) Синтетикам хиноксалинового ряда @	A
211.	ДЕ-8. Вопрос-211 ДОКСИЦИКЛИН (ЮНИДОКС) УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ПРИ: А) Бактериальных инфекциях Б) Психозах В) Гельминтных инвазиях Г) Грибковых инфекциях @	A
212.	ДЕ-8. Вопрос-212 ДОКСИЦИКЛИН (ЮНИДОКС) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	A
213.	ДЕ-8. Вопрос-213 ДОКСИЦИКЛИН (ЮНИДОКС) ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Противорвотного средства @	A
214.	ДЕ-8. Вопрос-214 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Доксциклин (Юнидокс) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Бензокаин @	A
215.	ДЕ-8. Вопрос-215 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ ТЕТРАЦИКЛИНОВ: А) Доксциклин (Юнидокс) Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен @	A
216.	ДЕ-8. Вопрос-216 ГЕНТАМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	A
217.	ДЕ-8. Вопрос-217 ОТОТОКСИЧЕСКИМ И НЕФРОТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ : А) Гентамицин Б) Азитромицин (Сумамед) В) Пенициллин Г) Ломефлоксацин (Таванник) @	A
218.	ДЕ-8. Вопрос-218 ГЕНТАМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Синтетикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	A
219.	ДЕ-8. Вопрос-219 ГЕНТАМИЦИН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Противовирусным средствам	A

	В) Антипсихотическим средствам Г) Ноотропным средствам @	
220.	ДЕ-8. Вопрос-220 ГЕНТАМИЦИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства группы аминогликозидов Б) Противобактериального средства группы макролидов В) Противобактериального средства группы хинолонов Г) Противобактериального средства группы 8-оксихинолинов @	А
221.	ДЕ-8. Вопрос-221 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Гентамицин Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Дексаметазон @	А
222.	ДЕ-8. Вопрос-222 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ АМИНОГЛИКОЗИДОВ: А) Гентамицин Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Доксициклин (Юнидокс) Г) Кетотифен @	А
223.	ДЕ-8. Вопрос-223 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДЕЙСТВИЯ : А) Гентамицин Б) Глибенкламид В) Кальцитонин Г) Феноболил @	А
224.	ДЕ-8. Вопрос-224 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ИНФЕКЦИЙ (СЕПСИС, ПНЕВМОНИЯ, ЭНДОКАРДИТ), ВЫЗВАННЫХ ГР- БАКТЕРИЯМИ ПРИМЕНЯЮТ: А) Гентамицин Б) Дигоксин В) Метформин Г) Тетракаин (Дикаин) @	А
225.	ДЕ-8. Вопрос-225 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ГЕНТАМИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Тяжелые инфекции (сепсис, пневмония, эндокардит) Б) Гельминтозы В) Острая респираторная вирусная инфекция Г) ВИЧ – инфекция @	А
226.	ДЕ-8. Вопрос-226 ЦЕФЕПИМ (МАКСИПИМ) ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	А
227.	ДЕ-8. Вопрос-227 ЦЕФЕПИМ (МАКСИПИМ) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	А
228.	ДЕ-8. Вопрос-228 ЦЕФЕПИМ (МАКСИПИМ) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Аналептикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам	А

	@	
229.	ДЕ-8. Вопрос-229 ЦЕФЕПИМ (МАКСИПИМ) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам цефалоспоринового ряда Б) Антибиотикам макролидного ряда В) Антибиотикам полиенового ряда Г) Антипсихотическим средствам @	A
230.	ДЕ-8. Вопрос-230 ЦЕФЕПИМ (МАКСИПИМ) ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Противоязвенного средства @	A
231.	ДЕ-8. Вопрос-231 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Цефепим (Максипим) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Диазепам (Седуксен) @	A
232.	ДЕ-8. Вопрос-232 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ: А) Цефепим (Максипим) Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Ципрофлоксацин (Ципробай, Квинтор) Г) Кетотифен @	A
233.	ДЕ-8. Вопрос-233 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ : А) Цефепим (Максипим) Б) Глибенкламид В) Кальцитонин Г) Феноболил @	A
234.	ДЕ-8. Вопрос-234 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Цефуоксим (Зинацеф) Б) Глибенкламид В) Кальцитонин Г) Моксифлоксацин (Авелокс) @	A
235.	ДЕ-8. Вопрос-235 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕФУОКСИМ (ЗИНАЦЕФ) ЯВЛЯЕТСЯ: А) Бактериальные инфекции дыхательных путей, кожи, мягких тканей Б) Гельминтозы В) Туберкулез Г) ВИЧ –инфекция @	A
236.	ДЕ-8. Вопрос-236 ЛИНЕЗОЛИД ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	A
237.	ДЕ-8. Вопрос-237 ЛИНЕЗОЛИД ОТНОСИТСЯ К: А) Оксазолидинонам (противомикробное средство) Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	A
238.	ДЕ-8. Вопрос-238 ЛИНЕЗОЛИД ОТНОСИТСЯ К:	A

	А) Оксазолидинонам (противомикробное средство) Б) Аналептикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	
239.	ДЕ-8. Вопрос-239 ЛИНЕЗОЛИД ОТНОСИТСЯ К: А) Оксазолидинонам (противомикробное средство) Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	А
240.	ДЕ-8. Вопрос-240 ЛИНЕЗОЛИД ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Антигистаминного средства @	А
241.	ДЕ-8. Вопрос-241 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Цефтазидим (Фортум) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Унитол @	А
242.	ДЕ-8. Вопрос-242 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ: А) Эритромицин (Сумамед) Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен @	А
243.	ДЕ-8. Вопрос-243 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ.: А) Цефтазидим (Фортум) Б) Амикацин В) Спарфлоксацин (Спарфло) Г) Феноболил @	А
244.	ДЕ-8. Вопрос-244 ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ И ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ: А) Линезолид Б) Ко-тримоксазол В) Мирамистин Г) Сульгин @	А
245.	ДЕ-8. Вопрос-245 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛИНЕЗОЛИДА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Тяжелая госпитальная и внебольничная пневмония Б) Грипп В) Туберкулез Г) Дизентерия @	А
246.	ДЕ-8. Вопрос-246 ХЛОРАМФЕНИКОЛ (ЛЕВОМИЦЕТИН) ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	А
247.	ДЕ-8. Вопрос-247 ХЛОРАМФЕНИКОЛ (ЛЕВОМИЦЕТИН) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам	А

	@	
248.	ДЕ-8. Вопрос-248 АМОКСИКЛАВ (АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Аналептикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	А
249.	ДЕ-8. Вопрос-249 ХЛОРАМФЕНИКОЛ (ЛЕВОМИЦЕТИН) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибиотикам Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	А
250.	ДЕ-8. Вопрос-250 ЦЕФАЛЕКСИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Ноотропного средства @	А
251.	ДЕ-8. Вопрос-251 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ: А) Ампиокс (Оксациллин + Ампициллин) Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен @	А
252.	ДЕ-8. Вопрос-252 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ АНТИБИОТИКОВ.: А) Кларитромицин Б) Фуразолидон В) Спарфлоксацин (Спарфло) Г) Метронидазол @	А
253.	ДЕ-8. Вопрос-253 АНТИБИОТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ВИДЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ, ЛИНИМЕНТОВ, МАЗЕЙ: А) Хлорамфеникол (Левомецетин) Б) Ко-тримаксозол В) Диклофенак Г) Преднизолон @	А
254.	ДЕ-8. Вопрос-254 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА СВЯЗАН С БЛОКАДОЙ СИНТЕЗА БЕЛКА НА РИБОСОМАХ?: А) Хлорамфеникол Б) Тиамазол В) Эналаприл Г) Прокаин @	А
255.	ДЕ-8. Вопрос-255 ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ БАКТЕРИЙ НАРУШАЮТ: А) полимиксины Б) азалиды В) монобактамы Г) карбапенемы @	А
256.	ДЕ-8. Вопрос-256 ИНГИБИРУЮТ СИНТЕЗ БЕЛКА НА РИБОСОМАХ БАКТЕРИЙ И ПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН АНТИБИОТИКИ: А) аминогликозиды Б) цефалоспорины В) монобактамы Г) амфениколы	А

	@	
257.	ДЕ-8. Вопрос-257 АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ АНТИБИОТИК: А) бензилпенициллина калиевая соль Б) цефотаксим В) полимиксин В Г) азтреонам @	A
258.	ДЕ-8. Вопрос-258 АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ АНТИБИОТИК: А) полимиксин В Б) бензилпенициллина калиевая соль В) цефалексин Г) нистатин @	A
259.	ДЕ-8. Вопрос-259 НАРУШАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ, НАКАПЛИВАЕТСЯ В ЗУБНОЙ ЭМАЛИ И ПРОТИВОПОКАЗАН ДЕТАМ ДО 8 ЛЕТ АНТИБИОТИК: А) тетрациклин Б) азитромицин В) кларитромицин Г) линезолид @	A
260.	ДЕ-8. Вопрос-260 В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦВЕТА ЗУБОВ НА ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКА А) тетрациклина Б) ампициллина В) полимиксина В Г) линезолида @	A
261.	ДЕ-8. Вопрос-261 К ИЗМЕНЕНИЮ ЦВЕТА ЗУБОВ НА ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ ПРИВОДИТ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКА А) доксициклина Б) амикацина В) полимиксина В Г) линезолида @	A
262.	ДЕ-8. Вопрос-262 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ АЗИТРОМИЦИНА А) сумамед Б) вильпрофен В) макропен Г) клацид @	A
263.	ДЕ-8. Вопрос-263 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ КЛАРИТРОМИЦИНА А) клацид Б) вильпрофен В) макропен Г) сумамед @	A
264.	ДЕ-8. Вопрос-264 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ИНГИБИТОРОЗАЩИЩЕННОГО ПЕНИЦИЛЛИНА С КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТОЙ: А) амоксиклав Б) уназин В) макропен Г) тазоцин @	A
265.	ДЕ-8. Вопрос-265 «АМОКСИКЛАВ + КЛАВУЛАНАТ» ВЫПУСКАЮТ ПОД ТОРГОВЫМ НАЗВАНИЕМ: А) флемоклав Солготаб	A

	Б) юнидокс Солютаб В) меропенем Г) макропен @	
266.	ДЕ-8. Вопрос-266 СОЗДАЁТ КОНЦЕНТРАЦИЮ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В КРОВИ СОПОСТАВИМУЮ С ИНЪЕКЦИОННЫМИ ФОРМАМИ И ВЫПУСКАЕМЫЙ В ФОРМЕ ДИСПЕРГИРУЕМЫХ ТАБЛЕТОК, АНТИБИОТИК: А) юнидокс Солютаб Б) цефуроксим аксетил В) тобромицин Г) цефтазидим @	A
267.	ДЕ-8. Вопрос-267 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ С ПИЩЕЙ СНИЖАЕТСЯ В 2 РАЗА БИОДОСТУПНОСТЬ АНТИБИОТИКА: А) эритромицина Б) ампициллина В) доксициклина Г) циклосерина @	A
268.	ДЕ-8. Вопрос-268 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ С ПИЩЕЙ СНИЖАЕТСЯ В 2 РАЗА БИОДОСТУПНОСТЬ АНТИБИОТИКА: А) тетрациклина Б) ампициллина В) кларитромицина Г) цефалексина @	A
269.	ДЕ-8. Вопрос-269 АНТИБИОТИК, УГНЕТАЮЩИЙ РИБОСОМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ БЕЛКА МИКРООРГАНИЗМОВ: А) гентамицин Б) амоксициллин В) цефуроксим Г) имепенем @	A
	ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	
270.	ДЕ-8. Вопрос-270 К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) рифампицин Б) нифурантел В) метронидазол Г) арбидол @	A
271.	ДЕ-8. Вопрос-271 К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) изониазид Б) нифурантел В) метронидазол Г) арбидол @	A
272.	ДЕ-8. Вопрос-272 ИЗОНИАЗИД: А) нарушает синтез миколовых кислот в клеточной стенке микобактерий Б) является препаратом средней эффективности В) является препаратом низкой эффективности Г) ингибирует ДНК-зависимую РНК-полимеразу, нарушая процесс транскрипции @	A
273.	ДЕ-8. Вопрос-273 НА МИКОБАКТЕРИИ ИЗОНИАЗИД ПРОЯВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: А) высокую Б) среднюю В) низкую Г) эффективность отсутствует @	A
274.	ДЕ-8. Вопрос-274	A

	РИСК ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ С ПРЕПАРАТОМ: А) изониазид Б) стрептомицин В) этамбутол Г) арбидол @	
275.	ДЕ-8. Вопрос-275 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИМЕНЯЮТ АНТИБИОТИК: А) рифампицин Б) цефтазидим В) меропенем Г) гентамицин @	А
276.	ДЕ-8. Вопрос-276 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ: А) изониазид Б) этамбутол В) этионамид Г) циклосерин @	А
	СИНТЕТИЧЕСКИЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЛС	
277.	ДЕ-8. Вопрос-277 СУЛЬФАЦЕТАМИД (СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капли глазные 10% или 20%, флакон-капельница полимерная 10 мл Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	А
278.	ДЕ-8. Вопрос-278 КО-ТРИМОКСАЗОЛ [СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ + ТРИМЕТОПРИМ] (БАКТРИМ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) суспензии для приема внутрь 240 мг/5 мл, флакон темного стекла 100 мл Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	А
279.	ДЕ-8. Вопрос-279 КО-ТРИМОКСАЗОЛ [СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ + ТРИМЕТОПРИМ] (БИСЕПТОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 120 мг или 480 мг, №20 - 20 шт. Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	А
280.	ДЕ-8. Вопрос-280 КО-ТРИМОКСАЗОЛ [СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ + ТРИМЕТОПРИМ] (БИСЕПТОЛ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) суспензии для приема внутрь 240 мг/5 мл, флакон 80 мл Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	А
281.	ДЕ-8. Вопрос-281 ЛЕВОФЛОКСАЦИН (ТАВАНИК) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) раствора для инфузий 5 мг/мл, флакон 100 мл Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	А

282.	ДЕ-8. Вопрос-282 ЛЕВОФЛОКСАЦИН (ТАВАНИК) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток, покрытых пленочной оболочкой 250 мг и 500 мг Б) спрей ингаляционный 300 мкг/доза В) пакетики-саше 3 г Г) пластырь 500/10 мг @	A
283.	ДЕ-8. Вопрос-283 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ: А) фталилсульфатиазол Б) изониазид В) метронидазол Г) линезолид @	A
284.	ДЕ-8. Вопрос-284 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ: А) сульфадиметоксин Б) нитроксолин В) метронидазол Г) изониазид @	A
285.	ДЕ-8. Вопрос-285 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ: А) ко-тримоксазол Б) нитроксолин В) метронидазол Г) изониазид @	A
286.	ДЕ-8. Вопрос-286 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ПРОСВЕТЕ КИШЕЧНИКА: А) фталилсульфатиазол Б) салазосульфапиридазин В) сульфацетамид Г) нитроксолин @	A
287.	ДЕ-8. Вопрос-287 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ БАКТЕРИЦИДНО: А) ко-тримоксазол Б) сульфацетамид В) метронидазол Г) сульфаметоксипиразин @	A
288.	ДЕ-8. Вопрос-288 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ СВЕРХДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ($T_{1/2} > 48$ Ч) А) сульфаметоксипиразин Б) сульфацетамид В) метронидазол Г) ко-тримоксазол @	A
289.	ДЕ-8. Вопрос-289 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ И ТРИМЕТОПРИМА: А) ко-тримоксазол Б) нитроксолин В) метронидазол Г) изониазид @	A
290.	ДЕ-8. Вопрос-290 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ РЕЗОРБТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: А) сульфадиметоксин Б) фталилсульфатиазол В) фуразидин Г) нитрофурал	A

	@	
291.	ДЕ-8. Вопрос-291 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ РЕЗОРБТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: А) сульфаметоксипиразин Б) фталилсульфатиазол В) фуразидин Г) нитрофура @	А
292.	ДЕ-8. Вопрос-292 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ: А) сульфацил Б) сульфадимидин В) сульфаниламид Г) сульфасалазин @	А
293.	ДЕ-8. Вопрос-293 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В МИКРОБНОЙ КЛЕТКЕ: А) проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой Б) блокируют фермент ДНК-гиразу В) нарушают синтез клеточной стенки Г) блокируют фермент дигидрофолатредуктазу @	А
294.	ДЕ-8. Вопрос-294 НА ФОНЕ ПРИЕМА КАКОГО ПРЕПАРАТА РЕЗКО ПОВЫШАЕТСЯ ТОКСИЧНОСТЬ АЛКОГОЛЯ? А) Метронидазола Б) Преднизолона В) Ипратропия бромид Г) Ницерголина @	А
295.	ДЕ-8. Вопрос-295 К СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХОНОЛОНОВ ОТНОСЯТ: А) ципрофлоксацин Б) цефепим В) цефтазидин Г) цефтибутен @	А
296.	ДЕ-8. Вопрос-296 К СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХОНОЛОНОВ ОТНОСЯТ: А) офлоксацин Б) азтреонам В) амикацин Г) линезолид @	А
297.	ДЕ-8. Вопрос-297 К СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ ОТНОСЯТ: А) фуразолидон Б) фталилсульфатиазол 3) сульфален 4) нистатин @	А
298.	ДЕ-8. Вопрос-298 К СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ ОТНОСЯТ: А) фуразидин Б) фталазол В) фтивазид 4) нистатин @	А
299.	ДЕ-8. Вопрос-299 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ ДЛЯ РЕЗОРБТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: А) кристаллурия Б) дисфункция слухового нерва	А

	В) дисфункция зрительного нерва Г) разрыв сухожилий @	
300.	ДЕ-8. Вопрос-300 АНТИМИКРОБНЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ: А) сульфацетамид Б) сульфасалазин В) сульфален Г) сульфадиметоксин @	А
301.	ДЕ-8. Вопрос-301 АНТИМИКРОБНЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ МЕСТНО А) фталилсульфатиазол Б) фуразидин В) сульфацетамид Г) сульфадиметоксин @	А
302.	ДЕ-8. Вопрос-302 ФУРАЗИДИН (ФУРАГИН) ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: А) инфекций мочевыводящих путей Б) сифилиса В) гонореи Г) туберкулеза @	А
303.	ДЕ-8. Вопрос-303 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ: А) ингибируют преимущественно топоизомеразу II (ДНК-гиразу), нарушая процесс суперспирализации ДНК Б) являются антагонистами пара-аминобензойной кислоты и нарушают биосинтез фолиевой кислоты В) ингибируют фермент дигидрофолатредуктазу, нарушая обмен фолиевой кислоты Г) нарушают синтез белка на бактериальных рибосомах @	А
304.	ДЕ-8. Вопрос-304 ФТОРХИНОЛОНЫ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИЦИДНО, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ: А) синтез белка на рибосомах Б) процесс суперспирализации ДНК В) синтез клеточной стенки Г) проницаемость цитоплазматической мембраны @	А
305.	ДЕ-8. Вопрос-305 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ФТАЛИЛСУЛЬФАТИАЗОЛА (ФТАЛАЗОЛА) ЯВЛЯЕТСЯ: А) кишечные инфекции Б) туберкулез В) инфекционные заболевания глаз Г) инфекции верхних дыхательных путей @	А
306.	ДЕ-8. Вопрос-306 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ СУЛЬФАЦЕТАМИДА (СУЛЬФАЦИЛ- НАТРИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ: А) инфекционные заболевания глаз Б) туберкулез В) кишечные инфекции Г) инфекции верхних дыхательных путей @	А
307.	ДЕ-8. Вопрос-307 СУЛЬФАНИЛАМИД - НЕВСАСЫВАЮЩИЙСЯ В ЖКТ И ОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЕЙСТВИЕ ТОЛЬКО В ПРОСВЕТЕ КИШЕЧНИКА: А) фталилсульфатиазол Б) сульфацетамид В) сульфален	А

	Г) сульфадиметоксин @	
308.	ДЕ-8. Вопрос-308 СУЛЬФАНИЛАМИД , ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА И БОЛЕЗНИ КРОНА: А) сульфасалазин Б) сульфацетамид В) сульфален Г) сульфадиметоксин @	А
309.	ДЕ-8. Вопрос-309 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАРУШЕНИЕ СИНТЕЗА: А) фолиевой кислоты Б) топоизомеразы II-типа В) клеточной стенки Г) белка на рибосомах @	А
310.	ДЕ-8. Вопрос-310 НЕКОМБИНИРОВАННЫЕ СУЛЬФАНИЛАМИДЫ ИНГИБИРУЮТ ФЕРМЕНТ: А) дигидроптероатсинтазу Б) дигидрофолатредуктазу В) топоизомеразу II Г) транспептидазу пептидогликана @	А
311.	ДЕ-8. Вопрос-311 ТРИМЕТОПРИМ, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА «КО-ТРИМОКСАЗОЛ», ИНГИБИРУЕТ ФЕРМЕНТ: А) дигидрофолатредуктазу Б) дигидроптероатсинтазу В) Топоизомеразу II Г) ДНК- гиразу @	А
312.	ДЕ-8. Вопрос-312 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ «СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ + ТРИМЕТОПРИМ» ВЫПУСКАЕТСЯ ПОД ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ: А) ко-тримоксазол Б) тиенам В) амоксиклав Г) ампиокс @	А
313.	ДЕ-8. Вопрос-313 ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ: А) нарушение образования хрящевой ткани Б) нарушение формирования костной ткани В) повышение температуры, озноб Г) атрофия зрительного нерва @	А
314.	ДЕ-8. Вопрос-314 МЕХАНИЗМ ФТОРХИНОЛОНОВ СВЯЗАН С: А) ингибированием фермента ДНК-гиразы Б) нарушением синтеза белка рибосомами В)ингибированием фермента дигидрофолатредуктазы Г) нарушением процесса биосинтеза фолиевой кислоты @	А
315.	ДЕ-8. Вопрос-315 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА СВЯЗАН С ИНГИБИРОВАНИЕМ: А) ДНК-гиразы Б) ДНК-зависимой РНК-полимеразы В) синтаза жирных кислот Г) арабинозил-трансферазы @	А
316.	ДЕ-8. Вопрос-316	А

	МЕХАНИЗМ ФТОРХИНОЛОНОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАРУШЕНИИ: А) процесса суперспирализации ДНК Б) синтеза белка рибосомами В) активности фермента дигидрофолатредуктазы Г) процесса биосинтеза фолиевой кислоты @	
317.	ДЕ-8. Вопрос-317 ЛЕВОФЛОКСАЦИН ИНГИБИРУЕТ: А) ДНК-гиразу Б) арабинозил-трансферазу В) ДНК-зависимую РНК-полимеразу Г) бета-лактамазу @	A
318.	ДЕ-8. Вопрос-318 К ФТОРХИНОЛОНАМ ОТНОСИТСЯ: А) моксифлоксацин Б) линкомицин В) ванкомицин Г) азтреонам @	A
319.	ДЕ-8. Вопрос-319 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, КОСТЕЙ, СУСТАВОВ ПРИМЕНЯЮТ: А) Спарфлоксацин (Спарфло) Б) Дигоксин В) Мирамистин Г) Иммунал @	A
320.	ДЕ-8. Вопрос-320 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ СПАРФЛОКСАЦИН (СПАРФЛО) ЯВЛЯЕТСЯ: А) Сепсис Б) Гельминтозы В) Туберкулез Г) ВИЧ – инфекция @	A
321.	ДЕ-8. Вопрос-321 СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) ципрофлоксацин Б) азитромицин В) линезолид Г) тиенам @	A
322.	ДЕ-8. Вопрос-322 К ГРУППЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ: А) нитрофураны Б) макролиды В) полимиксины Г) амфениколы @	A
323.	ДЕ-8. Вопрос-323 ОБМЕН ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ В БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКЕ НАРУШАЮТ: А) ко-тримоксазол Б) моксифлоксацин В) фуразолидон Г) гентамицин @	A
324.	ДЕ-8. Вопрос-324 К СИНТЕТИЧЕСКИМ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТСЯ ГРУППА: А) нитрофуранов Б) полимиксинов В) гликопептидов Г) рифамицины @	A
325.	ДЕ-8. Вопрос-325 К СИНТЕТИЧЕСКИМ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ: А) ломефлоксацин	A

	Б) цефтазидин В) меропенем Г) азтреонам @	
326.	ДЕ-8. Вопрос-326 К СИНТЕТИЧЕСКИМ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ: А) нифуроксазид Б) рифампицин В) линезолид Г) ванкомицин @	А
327.	ДЕ-8. Вопрос-327 К ГРУППЕ ФТОРХИНОЛОНОВ ОТНОСЯТ ПРЕПАРАТ: А) офлоксацин Б) рифампицин В) линезолид Г) ванкомицин @	А
328.	ДЕ-8. Вопрос-328 К ГРУППЕ ХИНОЛОНОВ ОТНОСЯТ КИСЛОТУ: А) налидиксовую Б) никотиновую В) парааминосалициловую Г) парааминобензойную @	А
329.	ДЕ-8. Вопрос-329 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ХЛОРАМФЕНИКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ: А) брюшной тиф Б) туберкулез В) кандидоз Г) скарлатина @	А
330.	ДЕ-8. Вопрос-330 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ХЛОРАМФЕНИКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ: А) бактериальный менингит Б) туберкулез В) кандидоз Г) сальмонеллез @	А
331.	ДЕ-8. Вопрос-331 НАРУШАЮТ ПРОЦЕСС КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ БАКТЕРИЙ И ИНГИБИРУЮТ БИОСИНТЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗ ГРУППЫ: А) нитрофуранов Б) пенициллинов В) цефалоспоринов Г) амфениколов @	А
332.	ДЕ-8. Вопрос-332 ВОССТАНАВЛИВАЮТ НИТРОГРУППУ, НАРУШАЮТ РЕПЛИКАЦИЮ ДНК И ПРОЦЕСС КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ БАКТЕРИЙ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗ ГРУППЫ: А) нитроимидазолов Б) пенициллинов В) цефалоспоринов Г) амфениколов @	А
333.	ДЕ-8. Вопрос-333 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) нитрофурантоин Б) нитрофурал В) нифуроксазид Г) метронидазол @	А
334.	ДЕ-8. Вопрос-334	А

	ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) нитроксолин Б) нитрофурал В) нифуроксазид Г) метронидазол @	
335.	ДЕ-8. Вопрос-335 ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ПОКАЗАН ПРЕПАРАТ: А) нифуроксазид Б) нитрофурал В) нитрофурантоин Г) метронидазол @	A
336.	ДЕ-8. Вопрос-336 ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ПОКАЗАНА КИСЛОТА: А) налидиксовая Б) оксолиновая В) пипемидовая Г) аскорбиновая @	A
337.	ДЕ-8. Вопрос-337 ПРИ ОСТРОМ ЦИСТИТЕ ПОКАЗАНА К ПРИМЕНЕНИЮ КИСЛОТА: А) пипемидовая Б) оксолиновая В) налидиксовая Г) аскорбиновая @	A
338.	ДЕ-8. Вопрос-338 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ФУАЗОЛИДОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТОЗОЙНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: А) тризомониаз Б) малярия В) балантидиаз Г) амёбиаз кишечный @	A
339.	ДЕ-8. Вопрос-339 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ФУАЗОЛИДОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТОЗОЙНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: А) лямблиоз Б) малярия В) балантидиаз Г) амёбиаз кишечный @	A
340.	ДЕ-8. Вопрос-340 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТРОНИДАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТОЗОЙНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: А) трихомониаз Б) малярия В) сифилис Г) хламидиоз @	A
341.	ДЕ-8. Вопрос-341 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТРОНИДАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТОЗОЙНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: А) амёбиаз кишечный Б) малярия В) хламидиоз Г) гонорея @	A
342.	ДЕ-8. Вопрос-342 АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ: А) нитрофурал Б) нифуроксазид В) нитрофурантоин Г) метронидазол @	A
343.	ДЕ-8. Вопрос-343	A

	ПРЕПАРАТ НАНОСЯТ НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА, ЧТО СОЗДАЁТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ГИНГИВИТЕ: А) метронидазол + хлоргексидина глюконат Б) метронидазол + миконазола нитрат В) метронидазол + клотримазол Г) триметоприм + сульфаметоксазол @	
344.	ДЕ-8. Вопрос-344 ДИФТОРИРОВАННЫМ ФТОРХИНОЛОНОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) ломефлоксацин Б) левофлоксацин В) ципрофлоксацин Г) офлоксацин @	А
345.	ДЕ-8. Вопрос-345 МОНОФТОРИРОВАННЫМ ФТОРХИНОЛОНОМ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: А) гатифлоксацин Б) левофлоксацин В) ципрофлоксацин Г) офлоксацин @	А
346.	ДЕ-8. Вопрос-346 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТРОНИДАЗОЛА: А) Заболевания, вызванные простейшими (лямблиями, трихомонадами) Б) Туберкулез В) Кандидоз Г) Кишечные гельминтозы @	А
347.	ДЕ-8. Вопрос-347 О ЧЕМ ДОЛЖЕН ПРЕДУПРЕДИТЬ ПАЦИЕНТА ПРОВИЗОР ПРИ ОТПУСКЕ ПРЕПАРАТА МЕТРОНИДАЗОЛ? А) Не допускать употребление алкоголя Б) Ограничить потребление молочных продуктов В) Не употреблять в пищу листовую зелень, содержащую витамин К (капуста, шпинат) Г) Запивать щелочной водой @	А
348.	ДЕ-8. Вопрос-348 КАКОЙ ПРЕПАРАТ РЕЗКО ПОВЫШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА К АЛКОГОЛЮ? А) Метронидазол Б) Дексаметазон В) Трипсин Г) Иммунал @	А
349.	ДЕ-8. Вопрос-349 МЕТРОНИДАЗОЛ ПОВЫШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА К АЛКОГОЛЮ? А) Да Б) Нет @	А
350.	ДЕ-8. Вопрос-350 ЦИПРОФЛОКСАЦИН (ЦИПРОБАЙ) ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	А
351.	ДЕ-8. Вопрос-351 ЦИПРОФЛОКСАЦИН(ЦИПРОБАЙ) ОТНОСИТСЯ К: А) Противомикробным средствам группы фторхинолонов Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	А
352.	ДЕ-8. Вопрос-352	А

	ЦИПРОФЛОКСАЦИН(ЦИПРОБАЙ) ОТНОСИТСЯ К: А) Противомикробным средствам группы фторхинолонов Б) Аналептики В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	
353.	ДЕ-8. Вопрос-353 ЦИПРОФЛОКСАЦИН(ЦИПРОБАЙ) ОТНОСИТСЯ К: А) Противомикробным средствам группы фторхинолонов Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	А
354.	ДЕ-8. Вопрос-354 ЦИПРОФЛОКСАЦИН(ЦИПРОБАЙ) ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противорвотного средства Г) Противогрибкового средства @	А
355.	ДЕ-8. Вопрос-355 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Ципрофлоксацин (Ципробай) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Ацикловир (Зовиракс) @	А
356.	ДЕ-8. Вопрос-356 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ: А) Ципрофлоксацин(Ципробай) Б) Кетопрофен (ОКИ) В) Омепразол Г) Кетотифен @	А
357.	ДЕ-8. Вопрос-357 ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ : А) Ципрофлоксацин(Ципробай) Б) Амикацин В) Бициллин-5 Г) Феноболил @	А
358.	ДЕ-8. Вопрос-358 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, КОСТЕЙ, СУСТАВОВ ПРИМЕНЯЮТ: А) Ципрофлоксацин(Ципробай) Б) Дигоксин В) Мирамистин Г) Иммунал @	А
359.	ДЕ-8. Вопрос-359 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА(ЦИПРОБАЙ) ЯВЛЯЕТСЯ: А) Постоперационные инфекции Б) Грипп В) Туберкулез Г) ВИЧ –инфекция @	А
360.	ДЕ-8. Вопрос-360 СПАРФЛОКСАЦИН (СПАРФЛО) ОТНОСИТСЯ К: А) К противомикробным средствам Б) Анальгетикам В) Аналептикам Г) Противовирусным средствам @	А
361.	ДЕ-8. Вопрос-361 МОКСИФЛОКСАЦИН (АВЕЛОКС) ОТНОСИТСЯ К: А) Противомикробным средствам группы фторхинолонов	А

	Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	
362.	ДЕ-8. Вопрос-362 ЛЕВОФЛОКСАЦИН (ТАВАНИК) ОТНОСИТСЯ К: А) Противомикробным средствам группы фторхинолонов Б) Аналептикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	А
363.	ДЕ-8. Вопрос-363 НИТРОКСОЛИН (5-НОК) ОТНОСИТСЯ К: А) Синтетическим противомикробным средствам Б) Антибиотикам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	А
364.	ДЕ-8. Вопрос-364 НИТРОКСОЛИН (5-НОК) ОТНОСИТСЯ К: А) Антибактериальным средствам Б) Противоглистным средствам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	А
365.	ДЕ-8. Вопрос-365 НИТРОКСОЛИН (5-НОК) АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ: А) Бактерий Б) Гельминтов В) Вирусов Г) Опухолей @	А
366.	ДЕ-8. Вопрос-366 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Нитроксолин (5-НОК) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубин Г) Арбидол @	А
367.	ДЕ-8. Вопрос-367 НИТРОКСОЛИН (5-НОК) ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: А) Инфекций мочевыводящих путей Б) ВИЧ-инфекции В) Гриппе Г) Герпесной инфекции @	А
368.	ДЕ-8. Вопрос-368 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ В ОТНОШЕНИИ ГР+ И ГР- ОБЛАДАЕТ: А) Нитроксолин (5-НОК) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубин Г) Мебендазол @	А
369.	ДЕ-8. Вопрос-369 НИТРОКСОЛИН (5-НОК) ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ: А) Мочевыводящих путей Б) ЖКТ В) Дыхательных путей Г) Сепсисе @	А
370.	ДЕ-8. Вопрос-370 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) Нитроксолин (5-НОК) Б) Сульгин В) Зидовудин Г) Арбидол @	А

371.	ДЕ-8. Вопрос-371 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) Нитроксолин (5-НОК) Б) Доксирубицин В) Ларипронт Г) Мебендазол @	A
372.	ДЕ-8. Вопрос-372 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ ПРИМЕНЯЮТ: А) Нитроксолин (5-НОК) Б) Сульгин В) Зидовудин Г) Арбидол @	A
373.	ДЕ-8. Вопрос-373 ФУРАЗОЛИДОН ОТНОСИТСЯ К: А) Синтетическим противомикробным средствам Б) Антибиотикам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	A
374.	ДЕ-8. Вопрос-374 ФУРАЗОЛИДОН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибактериальным средствам Б) Противоглистным средствам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	A
375.	ДЕ-8. Вопрос-375 ФУРАЗОЛИДОН АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ: А) Бактерий и простейших Б) Гельминтов В) Вирусов Г) Только бактерий @	A
376.	ДЕ-8. Вопрос-376 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Фуразолидон Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубицин Г) Омепразол @	A
377.	ДЕ-8. Вопрос-377 ФУРАЗОЛИДОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: А) Инфекций ЖКТ Б) ВИЧ-инфекции В) Гриппа Г) Герпеса @	A
378.	ДЕ-8. Вопрос-378 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Фуразолидон Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубицин Г) Мебендазол @	A
379.	ДЕ-8. Вопрос-379 ФУРАЗОЛИДОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ: А) ЖКТ Б) Мочевыводящих путей В) Дыхательных путей Г) Инфекционных поражениях ЦНС @	A
380.	ДЕ-8. Вопрос-380 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ ЖКТ ПРИМЕНЯЮТ: А) Фуразолидон	A

	Б) Нитроксалин (5-НОК) В) Зидовудин Г) Арбидол @	
381.	ДЕ-8. Вопрос-381 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ ЖКТ ПРИМЕНЯЮТ А) Фуразолидон Б) ЖКТ применяют: В) Доксирубин Г) Нитроксалин (5-НОК) @	A
382.	ДЕ-8. Вопрос-382 ФУРАЗОЛИДОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ: А) ЖКТ Б) Слизистой оболочки полости рта В) Дыхательных путей Г) Мочевыводящих путей @	A
383.	ДЕ-8. Вопрос-383 ФУРАЦИЛИН ОТНОСИТСЯ К: А) Синтетическим противомикробным средствам Б) Антибиотикам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	A
384.	ДЕ-8. Вопрос-384 ФУРАЦИЛИН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибактериальным средствам Б) Противоглистным средствам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	A
385.	ДЕ-8. Вопрос-385 ФУРАЦИЛИН АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ: А) Бактерий Б) Гельминтов В) Вирусов Г) Опухолей @	A
386.	ДЕ-8. Вопрос-386 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Фурацилин Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубин Г) Ацикловир (Зовиракс) @	A
387.	ДЕ-8. Вопрос-387 ФУРАЦИЛИН ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ: А) Антисептического и дезинфицирующего средства Б) Обволакивающего, адсорбирующего средства В) Вяжущего средства Г) Противовирусного средства @	A
388.	ДЕ-8. Вопрос-388 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Фурацилин Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубин Г) Осельтамивир (Тамифлю) @	A
389.	ДЕ-8. Вопрос-389 ФУРАЦИЛИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: А) Гнойно-воспалительных процессов в стоматологии Б) Туберкулеза В) Кишечных гельминтозов Г) Кандидамикозах @	A

390.	ДЕ-8. Вопрос-390 ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГНОЙНЫХ РАН, ПРОЛЕЖНЕЙ, ЯЗВ ПРИМЕНЯЮТ: А) Фурацилин Б) Сульгин В) Ко-тримаксозол Г) Мебендазол @	A
391.	ДЕ-8. Вопрос-391 СУЛЬГИН ОТНОСИТСЯ К: А) Сульфаниламидам Б) Антибиотикам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	A
392.	ДЕ-8. Вопрос-392 СУЛЬГИН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибактериальным средствам Б) Противоглистным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антибиотикам @	A
393.	ДЕ-8. Вопрос-393 СУЛЬГИН АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ: А) Бактерий Б) Гельминтов В) Вирусов Г) Грибковых поражениях @	A
394.	ДЕ-8. Вопрос-394 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Ципрофлоксацин (Цифран) Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубицин Г) Празиквантел (Бильтрицид) @	A
395.	ДЕ-8. Вопрос-395 СУЛЬГИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Противовирусного средства @	A
396.	ДЕ-8. Вопрос-396 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Сульгин Б) Зидовудин (Ретровир) Г) Доксирубицин Д) Флуконазол (Дифлюкан) @	A
397.	ДЕ-8. Вопрос-397 СУЛЬГИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: А) Бактериальных инфекций ЖКТ Б) Туберкулеза В) Кишечных гельминтозов Г) Кандидамикозах @	A
398.	ДЕ-8. Вопрос-398 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЖКТ ПРИМЕНЯЮТ: А) Сульгин Б) Нитроксалин (5-НОК) В) Зидовудин Г) Арбидол @	A
399.	ДЕ-8. Вопрос-399 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ПРИМЕНЯЮТ: А) Сульгин Б) Доксирубицин В) Нитроксалин (5-НОК)	A

	Г) Мебендазол @	
400.	ДЕ-8. Вопрос-400 ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ И ТОНКОЙ КИШКЕ (ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ) ПРИМЕНЯЮТ: А) Сульгин Б) Зидовудин (Ретровир) В) Мебендазол Г) Арбидол @	А
401.	ДЕ-8. Вопрос-401 СУЛЬФАЛЕН ОТНОСИТСЯ К: А) Сульфаниламидам Б) Антибиотикам В) Противогрибковым средствам Г) Противовирусным средствам @	А
402.	ДЕ-8. Вопрос-402 СУЛЬФАЛЕН ОТНОСИТСЯ К: А) Антибактериальным средствам Б) Противоглистным средствам В) Противовирусным средствам Г) Противогрибковым средствам @	А
403.	ДЕ-8. Вопрос-403 СУЛЬФАЛЕН АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ: А) Бактерий Б) Гельминтов В) Вирусов герпеса Г) Цитомегаловирусной инфекции @	А
404.	ДЕ-8. Вопрос-404 Антибактериальным действием обладает: А) Сульфален Б) Зидовудин (Ретровир) В) Доксирубин Г) Римантадин (Ремантадин) @	А
405.	ДЕ-8. Вопрос-405 СУЛЬФАЛЕН ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противовотного средства В) Противогрибкового средства Г) Противоязвенного средства @	А
406.	ДЕ-8. Вопрос-406 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Сульфален Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Кетотифен (Задитен) @	А
407.	ДЕ-8. Вопрос-407 Сульфален применяется для лечения всех инфекций кроме: А) Вирусных инфекций Б) Бронхо-легочных инфекций В) Инфекций мочевыводящих путей Г) Инфекций желчевыводящих путей @	А
408.	ДЕ-8. Вопрос-408 СУЛЬФАЛЕН: А) Медленно выводится из организма Б) Быстро выводится из организма В) Не выводится из организма Г) Применяется только местно @	А
409.	ДЕ-8. Вопрос-409	А

	СУЛЬФАЛЕН- СУЛЬФАНИЛАМИД СВЕРХДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ПОТОМУ ЧТО ОН: А) Медленно выводится из организма Б) Не выводится из организма вообще В) Быстро выводится из организма Г) Применяется только местно @	
410.	ДЕ-8. Вопрос-410 СУЛЬФАНИЛАМИД СВЕРХДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ: А) Сульфален Б) Сульгин В) Сульфадиметоксин Г) Триметоприм @	A
411.	ДЕ-8. Вопрос-411 КО-ТРИМОКСАЗОЛ ОТНОСИТСЯ К: А) Сульфаниламидам (Комбинированный препарат) Б) Анальгетикам В) Противовирусным средствам Г) Иммуностимуляторам @	A
412.	ДЕ-8. Вопрос-412 КО-ТРИМОКСАЗОЛ ОТНОСИТСЯ К: А) Сульфаниламидам (комбинированный препарат) Б) Обволакивающим средствам В) Анксиолитикам Г) Ноотропам @	A
413.	ДЕ-8. Вопрос-413 КО- ТРИМОКСАЗОЛ ОТНОСИТСЯ К: А) Сульфаниламидам (Комбинированный препарат) Б) Аналептикам В) Противоглистным средствам Г) Иммуностимуляторам @	A
414.	ДЕ-8. Вопрос-414 КО-ТРИМОКСАЗОЛ ОТНОСИТСЯ К: А) Сульфаниламидам Б) Желчегонным средствам В) Противовирусным средствам Г) Антипсихотическим средствам @	A
415.	ДЕ-8. Вопрос-415 КО- ТРИМОКСАЗОЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ: А) Противобактериального средства Б) Противоглистного средства В) Противогрибкового средства Г) Антигельминтного средства	A
416.	ДЕ-8. Вопрос-416 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: А) Ко-тримоксазол Б) Зидовудин (Ретровир) В) Арбидол Г) Римантадин (Ремантадин) @	A
417.	ДЕ-8. Вопрос-417 КО-ТРИМОКСАЗОЛ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: А) ВИЧ- инфекции Б) Бронхо-легочных инфекций В) Инфекций мочевыводящих путей Г) Инфекций желчевыводящих путей @	A
418.	ДЕ-8. Вопрос-418 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ: А) Ко-тримоксазол Б) Этинилэстрадиол Г) Дексаметазон	A

	Д) Феноболил @	
419.	ДЕ-8. Вопрос-419 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ : А) Ко-тримоксазол Б) Этинилэстрадиол В) Дексаметазон Г) Феноболил @	А
420.	ДЕ-8. Вопрос-420 ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ЖКТ ПРИМЕНЯЮТ: А) Ко-тримоксазол Б) Триметазидин (Предуктал) В) Варфарин Г) Феноболил @	А
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА		
421.	ДЕ-8. Вопрос-421 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: А) ингибирование ферментов (нейраминидазы, обратной транскриптазы) Б) ингибирование синтеза эргостерола В) блокада кальциевых каналов Г) ингибирование 14-альфа-деметилазы @	А
422.	ДЕ-8. Вопрос-422 ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО А) ацикловир Б) дроперидол В) парацетамол Г) протамина сульфат @	А
423.	ДЕ-8. Вопрос-423 ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО: А) зидовудин Б) галоперидол В) парацетамол Г) протамина сульфат @	А
424.	ДЕ-8. Вопрос-424 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ОСЕЛЬТАМИВИР: А) тамифлю Б) зовиракс В) азидотимидин Г) ремантадин @	А
425.	ДЕ-8. Вопрос-425 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН АЦИКЛОВИР: А) зовиракс Б) азидотимидин В) тамифлю Г) ремантадин @	А
426.	ДЕ-8. Вопрос-426 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЗИДОВУДИН: А) азидотимидин Б) зовиракс В) тамифлю Г) ремантадин @	А
427.		А

	ДЕ-8. Вопрос-427 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2: А) гриппферон Б) зовиракс В) тамифлю Г) ремантадин @	
428.	ДЕ-8. Вопрос-428 ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ГРИППЕ: А) осельтамивир Б) ацикловир В) зидовудин Г) метронидазол @	А
429.	ДЕ-8. Вопрос-429 ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ГРИППЕ: А) римантадин Б) валацикловир В) ламивудин Г) ципрофлоксацин @	А
430.	ДЕ-8. Вопрос-430 ТОЛЬКО ПРОТИВ ВИРУСА ГРИППА «А» АКТИВЕН А) римантадин Б) осельтамивир В) занамивир Г) ацикловир @	А
431.	ДЕ-8. Вопрос-431 ОСЕЛЬТАМИВИР (ТАМИФЛЮ) ПРИМЕНЯЕТСЯ: А) не позднее 24-48 ч от проявления первых симптомов заболевания Б) на любой стадии ВИЧ В) на любой стадии гриппа Г) на любой стадии герпеса @	А
432.	ДЕ-8. Вопрос-432 ОСЕЛЬТАМИВИР (ТАМИФЛЮ) ПРИМЕНЯЕТСЯ: А) с целью профилактики и лечения вируса гриппа А и В Б) с целью лечения ВИЧ В) с целью лечения вируса герпеса Г) с целью профилактики вируса ВИЧ @	А
433.	ДЕ-8. Вопрос-433 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОСЕЛЬТАМИВИРА: А) является ингибитором нейраминидазы вируса гриппа Б) нарушает цепь ДНК вируса В) является ингибитором обратной транскриптазы Г) блокирует М2-канал вируса гриппа @	А
434.	ДЕ-8. Вопрос-434 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РИМАНТАДИНА: А) блокирует М2-канал вируса гриппа Б) нарушает цепь ДНК вируса В) является ингибитором обратной транскриптазы Г) является ингибитором нейраминидазы вируса гриппа @	А
435.	ДЕ-8. Вопрос-435 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСА ГРИППА ПРИМЕНЯЮТ А) осельтамивир Б) саквинавир	А

	В) телбивудин Г) ацикловир	
436.	ДЕ-8. Вопрос-436 ПРОТИВОГРИППОЗНОЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМОЕ В НАЗАЛЬНОЙ ФОРМЕ: А) Интерферон альфа-2b (гриппферон) Б) Осельтамивир В) Кагоцел Г) Арбидол @	А
437.	ДЕ-8. Вопрос-437 К ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) ацикловир Б) осельтамивир В) кагоцел Г) арбидол @	А
438.	ДЕ-8. Вопрос-438 ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА: А) ацикловир гель Б) гепариновая мазь В) метрогил Дента Гель Г) вольтарен гель @	А
439.	ДЕ-8. Вопрос-439 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ДОЛЖЕН НАЗНАЧИТ ВРАЧ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА? А) ацикловир Б) зидовудин В) доксирубицин Г) диклофенак @	А
440.	ДЕ-8. Вопрос-440 АЦИКЛОВИР АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ВИРУСА: А) герпеса Б) гриппа В) ВИЧ Г) гепатита @	А
441.	ДЕ-8. Вопрос-441 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ У ПРЕПАРАТА АЦИКЛОВИР: А) зовиракс Б) гайро В) сумамед Г) азидотимидин @	А
442.	ДЕ-8. Вопрос-442 АЦИКЛОВИР ОТНОСИТСЯ К: А) к противовирусным, противогерпетическим средствам Б) анальгетикам наркотического действия В) антибиотикам макролидной группы Г) противовирусным противогепатитным средствам @	А
443.	ДЕ-8. Вопрос-443 АЦИКЛОВИР: А) хорошо переносится в большинстве случаев Б) обладает острым ототоксическим действием В) вызывает дизбактериоз Г) разрушает костную ткань так как имеет свойство депонироваться с ионами кальция	А

	@	
444.	ДЕ-8. Вопрос-444 НАРУШЕНИЯ В ЦЕПИ ДНК ВИРУСА ВЫЗЫВАЕТ: А) ацикловир Б) амитриптилин В) бициллин-5 Г) ликопид @	A
445.	ДЕ-8. Вопрос-445 ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТОМ ИЗ ГРУППЫ НУКЛЕОТИДНЫХ ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ: А) зидовудин Б) дипиридамол В) пропופол Г) трамадол @	A
446.	ДЕ-8. Вопрос-446 К АНТИРЕТРОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ) ОТНОСИТСЯ: А) зидовудин Б) ацикловир В) кагоцел Г) арбидол @	A
447.	ДЕ-8. Вопрос-447 К АНТИРЕТРОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ) ОТНОСИТСЯ: А) маравирик Б) арбидол В) ацикловир Г) панавир @	A
448.	ДЕ-8. Вопрос-448 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЗИДОВУДИНА: А) ВИЧ-инфекция Б) туберкулез В) сифилис Г) гонорея @	A
449.	ДЕ-8. Вопрос-449 ЗИДОВУДИН (РЕТРОВИР) АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПОТОМУ ЧТО ИНГИБИРУЕТ: А) обратную транскриптазу Б) гемагглютинин В) нейраминидазу Г) M2-канал @	A
450.	ДЕ-8. Вопрос-450 АЦИКЛОВИР И РИБАВИРИН – ЭТО ПРЕПАРАТЫ: А) аналоги нуклеотидов Б) ингибиторы обратной транскриптазы В) индукторы интерферона Г) ингибиторы пептидилтрансферазы @	A
451.	ДЕ-8. Вопрос-451 СВОЙСТВА, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПРЕПАРАТУ ЗИДОВУДИН: А) все перечисленное верно Б) препятствует образованию ДНК из вирусной РНК за счет блокады обратной транскриптазы вирионов	A

	В) побочные эффекты: нарушения кроветворения, нарушения функций печени, бессонница, миалгии Г) синтетический аналог тимидина. Активен в отношении ВИЧ @	
452.	ДЕ-8. Вопрос-452 РИМАНТАДИН (РЕМАНТАДИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 50 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) инъекционного раствора 5 мг/мл 1 мл Г) суппозиторий 500 мг @	
453.	ДЕ-8. Вопрос-453 РИМАНТАДИН (РЕМАНТАДИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсул 100 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг В) инъекционного раствора 5 мг/мл 1 мл Г) суппозиторий 500 мг @	
454.	ДЕ-8. Вопрос-454 АЦИКЛОВИР (ЗОВИРАКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток 200 мг и лиофилизата для приготовления раствора для инфузий 250 мг Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг и сублингвальных таблеток 5 мг В) инъекционного раствора 5 мг/мл 1 мл Г) суппозиторий 500 мг @	А
455.	ДЕ-8. Вопрос-455 АЦИКЛОВИР (ЗОВИРАКС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) крем для наружного применения 5% (10 г) и мазь глазная 3% (4,5 г) Б) таблеток для приготовления раствора 500 мг и сублингвальных таблеток 5 мг В) инъекционного раствора 5 мг/мл 1 мл Г) суппозиторий 500 мг @	А
456.	ДЕ-8. Вопрос-456 ЗИДОВУДИН (АЗИДОТИМИДИН) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) капсул 100 мг Б) сублингвальных таблеток 5 мг В) инъекционного раствора 5 мг/мл 1 мл Г) суппозиторий 500 мг @	А
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ		
457.	ДЕ-8. Вопрос-457 К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ АНТИБИОТИКАМ (ПОЛИЕНАМ) ОТНОСИТСЯ: А) Нистатин Б) Кетоконазол В) Тербинафин Г) Флуконазол @	А
458.	ДЕ-8. Вопрос-458 К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ АНТИБИОТИКАМ (ПОЛИЕНАМ) ОТНОСИТСЯ: А) амфотерицин В Б) кетоконазол В) тербинафин Г) флуконазол @	А
459.	ДЕ-8. Вопрос-459	А

	К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ПРЕПАРАТАМ ГРУППЫ ИМИДАЗОЛА ОТНОСИТСЯ: А) кетоконазол Б) амфотерицин В В) тербинафин Г) нистатин @	
460.	ДЕ-8. Вопрос-460 К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ПРЕПАРАТАМ ГРУППЫ ИМИДАЗОЛА ОТНОСИТСЯ: А) флуконазол Б) амфотерицин В В) тербинафин Г) нистатин @	А
461.	ДЕ-8. Вопрос-461 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН КЕТОКОНАЗОЛ: А) низорал Б) ламизил В) дифлюкан Г) ремантадин @	А
462.	ДЕ-8. Вопрос-462 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ТЕРБИНАФИН: А) ламизил Б) низорал В) дифлюкан Г) ремантадин @	А
463.	ДЕ-8. Вопрос-463 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ФЛУКОНАЗОЛ: А) дифлюкан Б) низорал В) ламизил Г) ремантадин @	А
464.	ДЕ-8. Вопрос-464 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «НИЗОРАЛ»: А) кетоконазол Б) тербинафин В) флуконазол Г) метронидазол @	А
465.	ДЕ-8. Вопрос-465 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ЛАМИЗИЛЬ»: А) тербинафин Б) кетоконазол В) флуконазол Г) метронидазол @	А
466.	ДЕ-8. Вопрос-466 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ДИФЛЮКАН»: А) флуконазол Б) кетоконазол В) тербинафин Г) метронидазол @	А
467.		А

	ДЕ-8. Вопрос-467 СИНТЕЗ ЭРГОСТЕРОЛА ИНГИБИРУЮТ: А) имидазолы Б) полиеновые противогрибковые препараты В) аналоги нуклеотидов Г) линкозамиды @	
468.	ДЕ-8. Вопрос-468 ФЛУКОНАЗОЛ ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПОТОМУ ЧТО ОН: А) Ингибирует синтез эргостерола клеточной мембраны грибов Б) Нарушает обмен веществ в мицелии грибов В) Нарушает синтез белка на 30S субъединицах рибосом Г) Тормозит утилизацию глюкозы грибковыми клетками @	A
469.	ДЕ-8. Вопрос-469 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КЕТОКОНАЗОЛА: А) Ингибирует 14 α -деметилазу Б) Ингибирует сквален-эпоксидазу В) Нарушают биосинтез эргостерола на поздних стадиях Г) Нарушают целостность фосфолипидного бислоя, образуя пору @	A
470.	ДЕ-8. Вопрос-470 В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА ИМЕЕТ МЕСТО БЛОКАДА СИНТЕЗА ЭРГОСТЕРОЛА? А) Флуконазола Б) Омепразола В) Тазодина Г) Эритромицина @	A
471.	ДЕ-8. Вопрос-471 КАКОЙ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ ЭРГОСТЕРОЛА КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ ЗА СЧЕТ БЛОКАДЫ СКВАЛЕН-ЭПОКСИДАЗЫ? А) Тербинафин Б) Нистатин В) Кетоконазол Г) Флуконазол @	A
472.	ДЕ-8. Вопрос-472 ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ БАКТЕРИЙ НАРУШАЮТ: А) полиены Б) монобактамы В) полимиксины Г) азалиды @	A
473.	ДЕ-8. Вопрос-473 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТЕРБИНАФИНА А) ингибирует сквален-эпоксидазу Б) ингибирует 14 α -деметилазу В) ингибирует β -глюкансинтазу Г) нарушает целостность фосфолипидного бислоя @	A
474.	ДЕ-8. Вопрос-474 КАКИЕ ИЗ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НАРУШАЕТ СИНТЕЗ ЭРГОСТЕРОЛА КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ ЗА СЧЕТ ИНГИБИРОВАНИЯ 14 α -ДЕМЕТИЛАЗЫ? А) Кетоконазол и Флуконазол Б) Нистатин и Тербинафин В) Омепразол и Амфотерицин В Г) Амфотерицин В и нистатин	A

	@	
475.	ДЕ-8. Вопрос-475 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРИПТОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ПРИМЕНЯЕТСЯ: А. Флуконазол В. Кетоконазол С. Тербинафин D. Нистатин @	A
476.	ДЕ-8. Вопрос-476 В ТЕРАПИИ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ ЦНС ИСПОЛЬЗУЮТ: А. флуконазол В. кетоконазол С. аморолфин D. нафтифин @	A
477.	ДЕ-8. Вопрос-477 ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КЕТОКОНАЗОЛА ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) гинекомастия и нарушение менструального цикла Б) нарушение нервно-мышечной передачи В) псевдомембранозный колит Г) болезнь Крона @	A
478.	ДЕ-8. Вопрос-478 СВОЙСТВА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕПАРАТУ ТЕРБИНАФИН: А) нарушает начальный этап синтеза эргостерола в цитоплазматической мембране грибов Б) ингибирует ДНК-гиразу В) вызывает образование пор в клеточной стенке грибов Г) ингибирует транспептидазу @	A
479.	ДЕ-8. Вопрос-479 ПРЕПАРАТ ТЕРБИНАФИН: А) применяют внутрь и местно при дерматомикозах и поверхностном кандидамикозе Б) применяется при фотодерматитах В) применяют в виде инъекций Г) применяют в виде лака для ногтей @	A
480.	ДЕ-8. Вопрос-480 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТЕРБИНАФИН ЯВЛЯЕТСЯ: А) Дерматомикозы Б) Инфекции дыхательных путей В) Туберкулез Г) Кишечные гельминтозы @	A
481.	ДЕ-8. Вопрос-481 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ФЛУКОНАЗОЛ ЯВЛЯЕТСЯ: А) Кандидомикозы Б) Кишечные и внекишечные гельминтозы В) Трихомониаз Г) Профилактика ревматизма @	A
482.	ДЕ-8. Вопрос-482 ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ТЕРБИНАФИН МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ: А) тошноту, диарею, кожный зуд, головную боль Б) гинекомастию и нарушение менструального цикла В) болезнь Аддисона Г) экстрапиримидные расстройства @	A
	АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА	

483.	ДЕ-8. Вопрос-483 АНТИГЕЛЬМИНТНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) мебендазол Б) метформин В) метронидазол Г) метопролол @	A
484.	ДЕ-8. Вопрос-484 К ПРОТИВОГЛИСТНЫМ СРЕДСТВА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ: А) нистатин Б) левамизол В) мебендазол Г) празиквантель @	A
485.	ДЕ-8. Вопрос-485 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ЛЕВАМИЗОЛ: А) декарис Б) вермокс В) бильтрицид Г) спрегаль @	A
486.	ДЕ-8. Вопрос-486 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН МЕБЕНДАЗОЛ: А) вермокс Б) декарис В) бильтрицид Г) спрегаль @	A
487.	ДЕ-8. Вопрос-487 ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ У ПРЕПАРАТА С МНН ПРАЗИКВАТЕЛ: А) бильтрицид Б) вермокс В) декарис Г) спрегаль @	A
488.	ДЕ-8. Вопрос-488 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ДЕКАРИС»: А) левамизол Б) мебендазол В) празиквантел Г) метронидазол @	A
489.	ДЕ-8. Вопрос-489 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ВЕРМОКС»: А) мебендазол Б) левамизол В) празиквантел Г) метронидазол @	A
490.	ДЕ-8. Вопрос-490 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО У ПРЕПАРАТА С ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «БИЛЬТРИЦИД»: А) празиквантел Б) левамизол В) мебендазол Г) метронидазол @	A
491.		A

	ДЕ-8. Вопрос-491 МЕБЕНДАЗОЛ ПО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ - ЭТО: А) противоглистное средство Б) противогрибковое средство В) противотуберкулезное средство Г) противовирусное средство @	
492.	ДЕ-8. Вопрос-492 МЕБЕНДАЗОЛ АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ: А) кишечных гельминтов Б) вирусов В) патогенных грибов Г) микобактерий туберкулеза @	А
493.	ДЕ-8. Вопрос-493 ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ ПРИ КИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗАХ (НАПРИМЕР, НЕМАТОДОЗАХ): А) мебендазол Б) ликопид В) стрептомицин Г) мезим @	А
494.	ДЕ-8. Вопрос-494 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЛЕВАМИЗОЛ ЯВЛЯЕТСЯ: А) кишечные гельминтозы Б) инфекции дыхательных путей В) туберкулез Г) дерматомикозы @	А
495.	ДЕ-8. Вопрос-495 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ПРАЗИКВАНТЕЛ ЯВЛЯЕТСЯ: А) кишечные и внекишечные гельминтозы Б) трихомониаз В) кандидомикозы Г) профилактика ревматизма @	А
496.	ДЕ-8. Вопрос-496 ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗА, ВЫЗВАННОГО ЛЕНТОЧНЫМИ ЧЕРВЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ: А) празиквантел Б) мебендазол В) пирантел Г) зидовудин @	А
497.	ДЕ-8. Вопрос-497 СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИНВАЗИИ ПЛОСКИМИ ЧЕРВЯМИ: А) празиквантел Б) левамизол В) мебендазол Г) нистатин @	А
498.	ДЕ-8. Вопрос-498 СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИНВАЗИИ КРУГЛЫМИ ЧЕРВЯМИ: А) мебендазол Б) кетоконазол В) тетрацилин Г) празиквантель @	А
499.	ДЕ-8. Вопрос-499 СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИНВАЗИИ КРУГЛЫМИ ЧЕРВЯМИ: 	А

	А) левамизол Б) кетоконазол В) тетрацилин Г) празиквантель @	
500.	ДЕ-8. Вопрос-500 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕБЕНДАЗОЛА СВЯЗАН С: А) торможением утилизации глюкозы гельминтами Б) разрушением покровных тканей гельминтов В) размножением гельминтов Г) нарушением дыхания гельминтов @	А
501.	ДЕ-8. Вопрос-501 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА СВЯЗАН С ТОРМОЖЕНИЕМ УТИЛИЗАЦИИ ГЛЮКОЗЫ ГЕЛЬМИНТАМИ: А) мебендазола Б) бициллина-5 В) линкомицина Г) сульгина @	А
502.	ДЕ-8. Вопрос-502 ЛЕВАМИЗОЛ (ДЕКАРИС) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) таблеток Б) спиртового раствора В) инъекционного раствора Г) суппозиторий @	А
	ПРЕПАРАТЫ АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ И ПРОТИВ ПРОЧИХ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	
503.	ДЕ-8. Вопрос-503 К ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) метронидазол Б) зидовудин В) флуконазол Г) мебендазол @	А
504.	ДЕ-8. Вопрос-504 К ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) орнидазол Б) нистатин В) мебендазол Г) рибавирин @	А
505.	ДЕ-8. Вопрос-505 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА МЕТРОНИДАЗОЛ ЯВЛЯЕТСЯ: А) трихомониаз Б) кишечные и внекишечные гельминтозы В) кандидомикозы Г) профилактика ревматизма @	А
506.	ДЕ-8. Вопрос-506 ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ И ТРИХОМОНИАЗЕ: А) метронидазол Б) пириметамин В) фуразолидон Г) примахин @	А
507.	ДЕ-8. Вопрос-507	А

	ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ И ТРИХОМОНИАЗЕ: А) пириметамин Б) метронидазол В) фуразолидон Г) тинидазол @	
508.	ДЕ-8. Вопрос-508 МЕТРОНИДАЗОЛ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ АНТИПРОТОЗОЙНОГО ПРЕПАРАТА И ДЛЯ: А) эрадикации <i>H.pylori</i> Б) терапии ВИЧ-инфекции В) лечения чесотки Г) терапии инфекции кожи и слизистых оболочек (в качестве антисептика) @	A
509.	ДЕ-8. Вопрос-509 МЕТРОНИДАЗОЛ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ АНТИПРОТОЗОЙНОГО ПРЕПАРАТА И ДЛЯ: А) терапии псевдомембранозного колита (вызванного <i>Clostridium difficile</i>) Б) терапии ВИЧ-инфекции В) лечения чесотки Г) терапии инфекции кожи и слизистых оболочек (в качестве антисептика) @	A
510.	ДЕ-8. Вопрос-510 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА: А) нарушение репликации ДНК микроорганизмов Б) нарушение синтеза белка на этапе инициации В) ингибирование M2-канала Г) ингибирование ЦОГ-2 @	A
511.	ДЕ-8. Вопрос-511 ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТРОНИДАЗОЛА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТЕТУРАМОПОДОБНУЮ РЕАКЦИЮ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? А) проявление побочных эффектов после употребления алкоголя Б) проявление лекарственного паркинсонизма В) проявление симптомов болезни Иценко-Кушинга Г) увеличение эффективного рефрактерного периода @	A
512.	ДЕ-8. Вопрос-512 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МАЛЯРИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ А) пириметамин Б) ципрофлоксацин В) этамбутол Г) левамизол @	A
513.	ДЕ-8. Вопрос-513 МЕТРОНИДАЗОЛ НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: А) сифилисе Б) лямблиозе В) трихомониазе Г) амёбной дизентерии @	A
514.	ДЕ-8. Вопрос-514 МЕТРОНИДАЗОЛ НЕ ОБЛАДАЕТ АКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ: А) Бледной трепонемы Б) <i>H. pylori</i> В) Лямблий Г) Возбудителя псевдомембранозного колита (<i>Clostridium difficile</i>) @	A
515.	ДЕ-8. Вопрос-515	A

	СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ МАЛЯРИИ: А) приметами Б) Зидовудин В) Ацикловир Г) Арбидол @	
516.	ДЕ-8. Вопрос-516 БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ: А) доксицилина Б) приметамина В) осельтамивира Г) празиквантеля @	A
517.	ДЕ-8. Вопрос-517 ЭСДЕПАЛЛЕТРИН + ПИПЕРОНИЛ БУТОКСИД (СПРЕГАЛЬ) ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ: А) лечения чесотки Б) терапии ВИЧ-инфекции В) эрадикации <i>H.pylori</i> Г) терапии инфекции кожи и слизистых оболочек (в качестве антисептика) @	A
518.	ДЕ-8. Вопрос-518 ЭСДЕПАЛЛЕТРИН + ПИПЕРОНИЛ БУТОКСИД (СПРЕГАЛЬ) ВЫПУСКАЕТСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВИДЕ: А) спрея Б) таблеток для приготовления раствора В) инъекционного раствора Г) суппозиторий @	A
	ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ	
519.	ДЕ-8. Вопрос-519 ОСНОВНОЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ: А) угнетение кроветворения Б) нарушение сна В) кристаллурия Г) шум в ушах @	A
520.	ДЕ-8. Вопрос-520 ОСНОВНОЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ: А) изъязвление слизистых оболочек ЖКТ Б) нарушение сна В) кристаллурия Г) шум в ушах @	A
521.	ДЕ-8. Вопрос-521 ОСНОВНОЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ: А) тошнота и рвота Б) головная боль В) кристаллурия Г) чувство жжения в месте введения @	A
522.	ДЕ-8. Вопрос-522 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ТАМОКСИФЕНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) рак молочной железы Б) остеосаркома В) лейкозы Г) опухоль мозга @	A
523.	ДЕ-8. Вопрос-523 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ТАМОКСИФЕНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) рак яичников Б) лимфома В) лейкозы	A

	Г) опухоль мозга @	
524.	ДЕ-8. Вопрос-524 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОЗЕРЕЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) рак молочной железы Б) остеосаркома В) лейкозы Г) опухоль мозга @	А
525.	ДЕ-8. Вопрос-525 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОЗЕРЕЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) фиброма матки Б) остеосаркома В) лейкозы Г) опухоль мозга @	А
526.	ДЕ-8. Вопрос-526 К ФАЗОСПЕЦИФИЧНЫМ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ: А) паклитаксел Б) циклофосфамид В) доксорубин Г) кармустин @	А
527.	ДЕ-8. Вопрос-527 ГОРМОНАЛЬНЫМ ПРОТИОПУХОЛЕВЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) гозерелин Б) доксорубин В) паклитаксел Г) цисплатин @	А
528.	ДЕ-8. Вопрос-528 ГОРМОНАЛЬНЫМ ПРОТИОПУХОЛЕВЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: А) тамоксифен Б) доксорубин В) паклитаксел Г) цисплатин @	А
529.	ДЕ-8. Вопрос-529 К ГРУППЕ АЛКИЛИРУЮЩИХ АГЕНТОВ ОТНОСИТСЯ: А) циклофосфамид Б) метотрексат В) паклитаксел Г) доксорубин @	А
530.	ДЕ-8. Вопрос-530 МЕТОТРЕКСАТ ЯВЛЯЕТСЯ АНТАГОНИСТОМ: А) фолиевой кислоты Б) пиримидинов В) пуринов Г) бензойной кислоты @	А
531.	ДЕ-8. Вопрос-531 ФТОРУРАЦИЛ ЯВЛЯЕТСЯ АНТАГОНИСТОМ: А) пиримидина Б) фолиевой кислоты В) пурина Г) бензойной кислоты @	А
532.	ДЕ-8. Вопрос-532 МЕРКАПТОПУРИН ЯВЛЯЕТСЯ АНТАГОНИСТОМ: А) пурина Б) пиримидина В) фолиевой кислоты Г) бензойной кислоты @	А
533.	ДЕ-8. Вопрос-533 К ПРОИЗВОДНЫМ ОКСАЗАФОСФОРИНОВ ОТНОСИТСЯ: А) циклофосфамид	А

	Б) метотрексат В) тамоксифен Г) гозерелин @	
534.	ДЕ-8. Вопрос-534 ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ МЕТОТРЕКСАТОМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: А) кальция фолинат Б) налоксон В) флумазенил Г) пиридоксин @	А
535.	ДЕ-8. Вопрос-535 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТАМОКСИФЕНА: А) блокада эстрогенных рецепторов Б) ингибирование дигидрофолатредуктазы В) алкилирование азотистых оснований в молекуле ДНК Г) повреждение митотического веретена деления @	А
536.	ДЕ-8. Вопрос-536 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕТОТРЕКСАТА: А) ингибирование дигидрофолатредуктазы Б) блокада эстрогенных рецепторов В) алкилирование азотистых оснований в молекуле ДНК Г) повреждение митотического веретена деления @	А
537.	ДЕ-8. Вопрос-537 ДОКСОРУБИЦИН ЯВЛЯЕТСЯ: А) противоопухолевым антибиотиком Б) антиметаболитом В) алкилирующим агентом Г) гормональным средством @	А
538.	ДЕ-8. Вопрос-538 ДОКСОРУБИЦИН ОБЛАДАЕТ ВЫРАЖЕННЫМ КАРДИТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ: А) образования свободных радикалов в кардиомиоцитах Б) нарушения обмена фолиевой кислоты В) образования метаболита акролеина Г) угнетения продукции гонадотропинов @	А
539.	ДЕ-8. Вопрос-539 АНАЛОГОМ ГОНАДОТРОПИН-РЕЛИЗИНГ ГОРМОНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) гозерелин Б) тамоксифен В) метотрексат Г) паклитаксел @	А
540.	ДЕ-8. Вопрос-540 ИНГИБИТОРОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ГИПОФИЗОМ ФСГ И ЛГ ПО ПРИНЦИПУ ОБРАТНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ ЯВЛЯЕТСЯ: А) гозерелин Б) циклофосфамид В) паклитаксел Г) доксорубин @	А
541.	ДЕ-8. Вопрос-541 ПРЕПАРАТ ИНТЕРКАЛИРУЕТ В ДВОЙНУЮ СПИРАЛЬ ДНК МЕЖДУ ПАРАМИ АЗОТИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И ВЫЗЫВАЕТ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ: А) доксорубин Б) паклитаксел В) циклофосфамид Г) гозерелин	А

	@	
542.	ДЕ-8. Вопрос-542 СВЯЗЫВАЕТСЯ С ВНУТРИКЛЕТОЧНЫМИ МОЛЕКУЛЯРНЫМИ СТРУКТУРАМИ (ДНК, РНК), ЧТО ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ СШИВОК, РАЗРЫВОВ И К ГИБЕЛИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК: А) циклофосфамид Б) паклитаксел В) доксорубицин Г) гозерелин @	А
543.	ДЕ-8. Вопрос-543 ПРЕПАРАТ СТИМУЛИРУЕТ СБОРКУ ДЕФЕКТНЫХ МИКРОТРУБОЧЕК, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ МИТОТИЧЕСКОГО ВЕРЕТЕНА ДЕЛЕНИЯ И К НАРУШЕНИЮ ПРОЦЕССА МИТОЗА: А) паклитаксел Б) циклофосфамид В) доксорубицин Г) гозерелин @	А
544.	ДЕ-8. Вопрос-544 ЦИКЛОФОСФАМИД ЯВЛЯЕТСЯ: А) алкилирующим агентом Б) антиметаболитом В) противоопухолевым антибиотиком Г) гормональным средством @	А
545.	ДЕ-8. Вопрос-545 ЯВЛЯЕТСЯ АЛКАЛОИДОМ БАРВИНКА РОЗОВОГО (VINCA ROSEA) ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ СРЕДСТВО: А) винкристин Б) доксорубицин В) циклофосфамид Г) паклитаксел @	А
546.	ДЕ-8. Вопрос-546 АЛКАЛОИДОМ ТИСОВОГО ДЕРЕВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ СРЕДСТВО А) паклитаксел Б) доксорубицин В) циклофосфамид Г) винкристин @	А
547.	ДЕ-8. Вопрос-547 ЦИТОСТАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО АЛКИЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ: А) циклофосфамид Б) доксорубицин В) винкристин Г) паклитаксел @	А
548.	ДЕ-8. Вопрос-548 АНТИГОРМОНАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ: А) тамоксифен Б) доксорубицин В) метотрексат Г) азатиоприн @	А
549.	ДЕ-8. Вопрос-549 ИНГИБИРУЕТ ФЕРМЕНТ АРОМАТАЗУ ПРЕПАРАТ: А) летрозол Б) финастерид В) тамоксифен Г) метилтестостерон @	А
550.	ДЕ-8. Вопрос-550 СВЯЗЫВАЕТСЯ С ТУБУЛИНОМ И ИНГИБИРУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ МИТОТИЧЕСКОГО ВЕРЕТЕНА ПРЕПАРАТ: А) винкристин Б) метотрексат	А

	В) мехлорэтамин Г) фторурацил @	
551.	ДЕ-8. Вопрос-551 ВЫСОКОЕ СРОДСТВО К ДИГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЕ ПРОЯВЛЯЕТ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ: А) метотрексат Б) фторурацил В) платидиам Г) триметоприм @	А
552.	ДЕ-8. Вопрос-552 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭСТРОГЕНЗАВИСИМОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ: А) тамоксифен Б) дактиномицин В) метотрексат Г) фторурацил @	А
553.	ДЕ-8. Вопрос-553 КАРДИОТОКСИЧНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ: А) доксорубицин Б) фторурацил В) винкристин Г) цисплатин @	А
554.	ДЕ-8. Вопрос-554 ЦИКЛОФOSФАМИД ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) мелкоклеточном раке легкого Б) кахексии В) псориазе Г) раке почки @	А
555.	ДЕ-8. Вопрос-555 ЦИКЛОФOSФАМИД ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) раке яичников Б) кахексии В) псориазе Г) раке почки @	А
556.	ДЕ-8. Вопрос-556 ЦИКЛОФOSФАМИД ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) раке мочевого пузыря Б) кахексии В) туберкулезе Г) раке пищевода @	А
557.	ДЕ-8. Вопрос-557 МЕТОТРЕКСАТ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) острым лимфобластном лейкозе Б) кахексии В) гингивите Г) туберкулезе @	А
558.	ДЕ-8. Вопрос-558 МЕТОТРЕКСАТ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: А) раке молочной железы Б) кахексии В) энтерите Г) туберкулезе @	А
559.	ДЕ-8. Вопрос-559 КАРМУСТИН ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: А) опухоли головного мозга Б) кахексии В) раке яичников Г) туберкулезе @	А
560.	ДЕ-8. Вопрос-560	А

	СВЯЗЫВАЕТСЯ С ЭСТРОГЕННЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И УСТРАНЯЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ЭСТРОГЕНОВ ПРЕПАРАТ: А) тамоксифен Б) гозерелин В) паклитаксел Г) климонорм @	
561.	ДЕ-8. Вопрос-561 ДОКСИРУБИЦИН ОТНОСЯТ К ГРУППЕ: А) противоопухолевые антибиотики Б) антиметаболиты В) алкилирующие средства Г) моноклональные антитела @	A
562.	ДЕ-8. Вопрос-562 АНТАГОНИСТОМ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ: А) метотрексат Б) циклофосфамид В) паклитаксел Г) доксирубицин @	A
563.	ДЕ-8. Вопрос-563 ИЗБИРАТЕЛЬНО СОЕДИНЯЮТСЯ С ЧУЖЕРОДНЫМИ РЕЦЕПТОРАМИ КЛЕТКИ ОПУХОЛИ И ИНИЦИИРУЕТ ЛИЗИС В-КЛЕТОК ПРЕПАРАТ: А) ритуксимаб Б) митоксатрон В) кармустин Г) паклитаксел @	A
564.	ДЕ-8. Вопрос-564 ОБЩИМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ: А) выраженная лейко- и тромбоцитопения Б) лимфосаркома В) миеломная болезнь Г) псориаз, тяжёлая форма @	A
565.	ДЕ-8. Вопрос-565 АЛОПЕЦИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА: А) метотрексат Б) гозерелин В) фосфэстрол Г) празиквантель @	A
566.	ДЕ-8. Вопрос-566 АЛОПЕЦИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА: А) циклофосфамид Б) гозерелин В) фосфэстрол Г) празиквантель @	A
567.	ДЕ-8. Вопрос-567 ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЛЕКАРСТВОМ, В ОРГАНИЗМЕ БЫСТРО РАЗЛАГАЕТСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ АКТИВНОГО БИС-БЕТА-ХЛОРЕТИЛАМИНА, МЕТАБОЛИТ АЛКИЛИРУЕТ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ: А) циклофосфамид Б) метотрексат В) фторурацил Г) цитарабин @	A
568.	ДЕ-8. Вопрос-568 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА ВОЗНИКАЕТ НЕЙРОПАТИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОНЕЧНОСТЕЙ: А) цисплатин Б) фторурацил В) винкристин	A

	Г) доксорубицин @	
569.	ДЕ-8. Вопрос-569 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ СРЕДСТВОМ ИЗ ГРУППЫ АНТРАЦИКЛИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ: А) Доксирубицин Б) Фенотерол В) Леводопа Г) Пирацетам @	А
570.	ДЕ-8. Вопрос-570 ДОКСИРУБИЦИН ЯВЛЯЕТСЯ: А) Противоопухолевым средством из группы антрациклиновых антибиотиков Б) Антибиотиком из группы цефалоспоринов В) Антибиотиком из группы пенициллина Г) Антибиотиком из группы тетрациклина @	А
571.	ДЕ-8. Вопрос-571 К ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ: А) Доксирубицин Б) Нитроглицерин В) Леводопа Г) Лидокаин @	А
572.	ДЕ-8. Вопрос-572 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ: А) Доксирубицин Б) Лидокаин В) Нитроглицерин Г) Леводопа @	А
573.	ДЕ-8. Вопрос-573 ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОКСИРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Саркома мягких тканей Б) Болезнь Паркинсона В) Эпилепсия Г) Пульпит @	А
574.	ДЕ-8. Вопрос-574 ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОКСИРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Рак молочной железы Б) Болезнь Паркинсона В) Эпилепсия Г) Пульпит @	А
575.	ДЕ-8. Вопрос-575 ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОКСИРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Рак щитовидной железы Б) Болезнь Паркинсона В) Эпилепсия Г) Пульпит	А
576.	ДЕ-8. Вопрос-576 ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОКСИРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Рак мочевого пузыря Б) Болезнь Паркинсона В) Эпилепсия Г) Пульпит @	А
577.	ДЕ-8. Вопрос-577 ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОКСИРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ: А) Рак яичников Б) Болезнь Паркинсона В) Эпилепсия Г) Инфекции мягких тканей @	А
578.	ДЕ-8. Вопрос-578 ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОКСИРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ:	А

	А) Рак желудка Б) Болезнь Паркинсона В) Эпилепсия Г) Альгодисминорея @	
--	--	--

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Фармакологии ИФ

Принята на заседании кафедры Фармакологии ИФ

От 28.01.2025, протокол №6

Заведующий кафедрой
Фармакологии ИФ им. А.П
Нелюбина

(подпись)

Смолярчук Е.А.

(фамилия, инициалы)

Одобрена Центральным методическим советом
от 31.01.2025, протокол № 2