

Хирургическая стоматология

Тема №1. Принципы организации стоматологической помощи. Асептика. Антисептика. Методы обследования.

Выберите один правильный ответ

1.1. ПЛОЩАДЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ МИНИМАЛЬНО НА ОДНО КРЕСЛО

- а) 18 м²
- б) 16,5 м²
- в) 15 м²
- г) 14 м²

1.2. В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ

- а) 2 помещения
- б) 3 помещения
- в) 4 помещения
- г) 5 помещений

1.3. В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПРИ НАЛИЧИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

- а) 1 помещения
- б) 2 помещений
- в) 3 помещений
- г) 4 помещений

1.4. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- а) остеосинтез
- б) имплантация
- в) удаление зуба
- г) пластика преддверия полости рта

1.5. В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ

- а) стоматологи-ортопеды
- б) стоматологи-ортодонты
- в) стоматологи-терапевты
- г) челюстно-лицевые хирурги

1.6. В СТАЦИОНАРЕ ПО ПРАВИЛАМ АСЕПТИКИ НЕОБХОДИМА ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ПАЛАТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

- а) онкологическими
- б) неврологическими
- в) гнойно-воспалительными
- г) травматическими

1.7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ НАЗЫВАЕТСЯ

- а) септика
- б) антисептика
- в) реабилитация
- г) асептика
- д) профилактика

1.8. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННАЯ НА УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРОБОВ В РАНЕ, ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ ОРГАНИЗМЕ В ЦЕЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- а) дезинфекция
- б) стерилизация
- в) асептика
- г) антисептика

1.9. УСТАНОВЛЕНИЕ ДИАГНОЗА НА ОСНОВАНИИ ТЩАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЖАЛОБ, СБОРА АНАМНЕЗА И ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- а) лечения
- б) обследования
- в) профилактики
- г) реабилитации

1.10. ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ОПРОС БОЛЬНОГО ПОЗВОЛЯЕТ ВРАЧУ ВЫДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

- а) жалобы
- б) методы обследования
- в) не диагностируемые заболевания
- г) лабораторные исследования

1.11. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ЖАЛОБОЙ, СВЯЗАННОЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ ОСТРАЯ БОЛЬ В

- а) челюсти
- б) горле
- в) ушах
- г) глазах

1.12. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ПРИЧИНОЙ ДЕФЕКТА И ДЕФОРМАЦИИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ

- а) травма
- б) воспалительный процесс
- в) хронические заболевания
- г) нервно-психологический статус пациента

1.13. ПРИ ТРАВМЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ

- а) терял ли больной сознание, и на какое время
- б) находился ли больной на улице
- в) находился ли больной на рабочем месте
- г) кем была оказана первая помощь

1.14. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕРВОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДАННЫЕ

- а) генетического статуса
- б) кардиологического статуса
- в) терапевтического статуса
- г) неврологического статуса

1.15. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ

- а) воспалительных процессах
- б) онкологических процессах
- в) врожденных пороках
- г) специфических процессах

1.16. ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО НАЧИНАЮТ С

- а) жалоб
- б) наличия сопутствующих заболеваний
- в) анамнеза жизни
- г) общего осмотра

1.17. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРУЮ ИНФЕКЦИЮ, СИФИЛИС, РОЖУ, ОПУХОЛЬ ОСМАТРИВАЮТ КОЖУ

- а) лица
- б) лица и шеи
- в) лица, шеи и груди
- г) всего тела

1.18. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ЖАЛОБОЙ, СВЯЗАННОЙ С

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, МОЖЕТ БЫТЬ

- а) сухость полости рта
- б) заложенность уха
- в) сухость глаза
- г) несвязанная речь

1.19. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ЖАЛОБОЙ, СВЯЗАННОЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ОБЛАСТИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ, МОЖЕТ БЫТЬ

- а) затрудненное открывание рта
- б) сухость полости рта
- в) заложенность уха
- г) слезотечение

1.20. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРУЮ ИНФЕКЦИЮ, СИФИЛИС, РОЖУ, ОПУХОЛЬ ВИЧ-инфекцию ПАЛЬПИРУЮТ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

- а) затылочные
- б) затылочные, латеральные шейные
- в) затылочные, латеральные шейные, подключичные
- г) затылочные, латеральные шейные, подключичные, подмышечные

1.21. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРУЮ ИНФЕКЦИЮ, СИФИЛИС, РОЖУ, ОПУХОЛЬ ВИЧ-инфекцию ИССЛЕДУЮТ СИМПТОМ

- а) Кернинга
- б) наполнения
- в) нагрузки
- г) Дюпюитрена

1.22. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО В ХОДЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСМОТРА

- а) языка
- б) твердого и мягкого неба
- в) преддверия рта
- г) зубов, преддверия рта, подъязычной области, неба

1.23. ШПАТЕЛЬ В ХОДЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

- а) осмотра языка
- б) отведения губ, щек, языка и осмотра собственно полости рта
- в) осмотра преддверия рта
- г) осмотра полости рта

1.24. ПРИ ОСМОТРЕ ЛИЦО ЧАЩЕ ВСЕГО

- а) деформировано

- б) асимметрично
- в) симметрично
- г) конфигурация лица изменена

1.25. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ПОПРОСИТЬ ПАЦИЕНТА

- а) подвигать нижней челюстью вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз
- б) запрокинуть голову назад
- в) сделать боковые движения нижней челюсти
- г) открыть и закрыть рот

1.26. КАКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ УТОЧНИТЬ ГРАНИЦЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, КОНСИСТЕНЦИЮ ТКАНЕЙ, НАЛИЧИЕ РУБЦОВ, СПОСОБНОСТЬ КОЖИ СОБИРАТЬСЯ В СКЛАДКУ

- а) перкуссия
- б) пальпация
- в) аускультация
- г) зондирование

1.27. ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- а) пальпацию
- б) перкуссию
- в) лучевую диагностику
- г) ротоносовую пробу

1.28. ЕСЛИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ОКОЛОЧЕЛЮСТНЫЕ МЯГКИЕ ТКАНИ УПЛОТНЕННЫ, БОЛЕЗНЕННЫ, КОЖА СПЯНА С ПОДЛЕЖАЩИМИ ТКАНЯМИ, В СКЛАДКУ СОБИРАЕТСЯ С ТРУДОМ, ГИПЕРЕМИРОВАНА, ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ПОВЫШЕНА, ТО ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

- а) онкологического процесса
- б) воспалительного процесса
- в) порока развития
- г) неврологического процесса

1.29. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕТОДОМ ПАЛЬПАЦИИ В ОБЛАСТИ ВЫХОДА ПЕРЕФЕРИЧЕСКИХ ВЕТВЕЙ

- а) надглазничного, подбородочного
- б) подглазничного, лицевого
- в) подбородочного, надглазничного
- г) надглазничного, подглазничного, подбородочного

1.30. ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДОЛЖНЫ НАСТОРАЖИВАТЬ ТАКИЕ СИМПТОМЫ, КАК

- а) боль, нарушение чувствительности нижнего альвеолярного нерва
- б) сухость полости рта
- в) болевые приступы длительностью 1-2 сек от внешних раздражителей
- г) припухлость железы, связанная с приемом пищи

1.31. КОНТРАКТУРА ЧЕЛЮСТИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПРОЦЕССЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОРОСТАНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ ИЗ

- а) челюстей
- б) зубов
- в) языка
- г) подъязычной железы

1.32. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЯЗВЫ В ПОЛОСТИ РТА ПРОВОДЯТ

- а) исследование дна и плотности краев язвы
- б) обследование зубов
- в) лучевую диагностику
- г) уточнение локализации

1.33. ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРА ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЕТ

- а) цитологическое исследование
- б) лабораторная диагностика
- в) лучевая диагностика
- г) генетическое исследование

1.34. ПРИ ДЛИТЕЛЬНО НЕ ЗАЖИВАЮЩИХ ЯЗВАХ, БЕЗБОЛЕЗНЕННЫХ ИНФИЛЬТРАТАХ, ДЕФЕКТАХ НЕБА ПРОВОДЯТ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ

- а) сифилиса
- б) красного плоского лишая
- в) лейкоплакии
- г) болезни Шегрена

1.35. В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА ПРОВОДЯТ

- а) экстренную биопсию
- б) цитологию
- в) биопсию
- г) биомикроскопию

1.36. ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛЕНИЯ, ТРАВМЫ,

ОПУХОЛИ, ДЕФОРМАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА

- а) ортопантомография
- б) УЗИ-диагностика
- в) контрастная рентгенография
- г) биомикроскопия

1.37. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ КОНКРЕМЕНТА ПРОВОДЯТ

- а) цитологическое исследование
- б) УЗИ-диагностику
- в) зондирование протоков
- г) биопсию

1.38. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ ПАЛЬПАЦИЮ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТОКА ПРОВОДЯТ С

- а) вестибулярной стороны
- б) вестибулярной, язычной или небной стороны
- в) небной стороны
- г) язычной и небной стороны

Выберите несколько правильных ответов

1.39. ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ КОНТАКТНЫМ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- а) руки врача
- б) операционное поле
- в) рабочий инструмент
- г) вентиляция
- д) бестеневая лампа

1.40. ОСМОТР БОЛЬНОГО И ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧ ПРОВОДИТ

- а) в маске
- б) в резиновых перчатках
- в) в халате
- г) в защитных очках
- д) в бахилах

1.41. В ХИРУРГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

- а) стоматологическое кресло
- б) бестеневую лампу
- в) столик для инструментов
- г) бактерицидную и ультрафиолетовую лампу
- д) электрическую бормашину без наконечников

1.42. СПОСОБЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- а) физические
- б) химические
- в) воздушные
- г) холодовые
- д) газообразные

1.43. К ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- а) температура
- б) гальванизм
- в) давление
- г) облучение
- д) электролиз

1.44. АНТИСЕПТИКА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ

- а) механическая
- б) физическая
- в) химическая
- г) биологическая
- д) рентгенологическая

1.45. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ЗВЕНОМ АСЕПТИКИ И СОСТОИТ ИЗ

- а) предстерилизационной очистки
- б) упаковки
- в) дезинфекции
- г) контроля эффективности стерилизации
- д) доставки инструментов к месту операции

1.46. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЕТ

- а) осмотр больного
- б) сбор анамнеза жизни
- в) сбор анамнеза заболевания
- г) пальпаторного исследования
- д) дополнительного исследования

Установите и выберите правильную связь

1.47. ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫЕ ЖАЛУЮТСЯ НА БОЛЕЗНЕННОСТЬ И ПРИПУХЛОСТЬ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ, СУХОСТЬ ВО РТУ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует

г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

1.48. ПРИ СБОРЕ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

1.49. ОСМОТР БОЛЬНОГО ПРОВОДЯТ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КРЕСЛЕ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО ГОЛОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ФИКСИРОВАНА НА ПОДГОЛОВНИКЕ

- а) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I неверно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

1.50. В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА ИМЕЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО ПРОФЕССИЯ СТОМАТОЛОГА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ НИЗКОГО РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ

- а) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I неверно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

Тема 2. Препараты для местного обезболивания.

Выберите один правильный ответ

2.1. НАИБОЛЬШУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ АНЕСТЕЗИИ ИМЕЕТ

- а) новокаин
- б) лидокаин
- в) артикаин
- г) бупивакаин

2.2. ВАЗОКОНСТРИКТОРЫ ЗАМЕДЛЯЮТ ВСАСЫВАНИЕ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА, ВЫЗЫВАЮТ

- а) расширение сосудов
- б) сужение сосудов

- в) гиперемии кожных покровов
- г) парестезии

2.3. НАИМЕНЬШУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ АНЕСТЕЗИИ ИМЕЕТ

- а) прокаин
- б) лидокаин
- в) артикаин
- г) прилокаин

2.4. СКОС ИГЛЫ ПРИ ИНЪЕКЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ НАПРАВЛЯЕТСЯ К КОСТИ ПОД УГЛОМ

- а) 90°
- б) 60-70°
- в) 50-55°
- г) 30-45°

2.5. КАКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИГЛЫ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕ ПОГРУЖЕННОЙ В ТКАНИ ПРИ ИНЪЕКЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ

- а) 1/2
- б) 1/3
- в) 1/4
- г) 1/5

2.6. ДЛЯ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИГЛА ДЛИНОЙ

- а) 12 мм
- б) 16 мм
- в) 42 мм
- г) 8 мм

2.7. ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ИГЛЫ ДЛИНОЙ

- а) 36, 38 и 42 мм
- б) 16, 25 мм
- в) 10, 12 мм
- г) 8 мм

2.8. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОПАДАНИЯ АНЕСТЕТИКА В СОСУД ПРОВОДЯТ

- а) определяют время свертываемости крови
- б) проводят аспирационную пробу
- в) определяют время кровотечения
- г) проводят цветную пробу на новокаин

2.9. ШПРИЦ ДЛЯ ИНТРАЛИГАМЕТАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ

- а) не требует применения карпул
- б) позволяет вводить анестетик малыми дозами
- в) не требует стерилизационной обработки
- г) всегда одноразовый

2.10. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕЗЫГОЛЬНОГО ИНЪЕКТОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- а) эндодонтическое лечение зубов
- б) лечение кариеса резцов
- в) заболевания слизистой оболочки полости рта
- г) ортопедические конструкции

2.11. С ПОМОЩЬЮ БЕЗЫГОЛЬНОГО ИНЪЕКТОРА ПРОВОДЯТ АНЕСТЕЗИЮ

- а) инфильтрационную
- б) аппликационную
- в) проводниковую
- г) стволую

2.12. КАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШПРИЦА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

- а) шприц Жане
- б) двухкомпонентный шприц Мердока
- в) карпульный шприц Кука
- г) инъекционный шприц Фишера

2.13. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АМПУЛЫ (КАРПУЛЫ) С АНЕСТЕТИКОМ КОНЕЦ РЕЗИНОВОЙ ПРОБКИ ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ В ИНЪЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

- а) спиртом
- б) вазелином
- в) 3% раствором перекиси водорода
- г) раствором фурацилина

2.14. МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ ОТНОСЯТСЯ

- а) к антигистаминным фармакологическим соединениям
- б) к антагонистам ацетилхолина
- в) к антиаритмическим препаратам
- г) к аналептикам

2.15. АНЕСТЕЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ АНЕСТЕТИК ВВОДЯТ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОСТНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ МЕЖДУ

АЛЬВЕОЛАМИ РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗУБОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- а) мандибулярная
- б) интрасептальная
- в) ментальная
- г) внутрипульпарная

2.16. К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ДОБАВЛЯЮТ

- а) вазоконстриктор
- б) антикоагулянт
- в) антидепрессант
- г) гормон

2.17. ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ДОБАВЛЯЮТ

- а) антикоагулянт
- б) антидепрессант
- в) вазодилататор
- г) вазоконстриктор

2.18. ОБЩЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ АНЕСТЕТИКА

- а) двигательное возбуждение, судороги
- б) кровотечение
- в) побледнение участка кожи
- г) невралгия тройничного нерва

2.19. МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ ОТНОСЯТСЯ К

- а) антиаритмическим препаратам
- б) аналептикам
- в) нейролептикам
- г) антибиотикам

2.20. ЛИДОКАИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- а) амиду
- б) эфиру
- в) этилу
- г) производному изохинолину

2.21. КАКОЙ ИЗ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФИРОМ ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

- а) азакаин
- б) совкаин
- в) новокаинамид
- г) новокаин

2.22. ЗОНА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ АНЕСТЕЗИИ У РЕЗЦОВОГО ОТВЕРСТИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

- а) на уровне резцов с вестибулярной стороны
- б) на уровне резцов и клыков с небной стороны
- в) на уровне клыков с небной стороны
- г) всего твердого неба

2.23. ВТОРАЯ ВЕТВЬ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ВЫХОДИТ ИЗ ПОЛОСТИ ЧЕРЕПА ЧЕРЕЗ

- а) сонное отверстие
- б) овальное отверстие
- в) остистое отверстие
- г) круглое отверстие

2.24. ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- а) атаралгезия
- б) эндотрахеальный наркоз
- в) проводниковая анестезия
- г) вагосимпатическая блокада

2.25. ПРИ СТВОЛОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ЗОНА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

- а) зубы
- б) слизистую оболочку челюсти
- в) всю половину челюсти
- г) шею

2.26. К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО НАРКОЗА ОТНОСИТСЯ

- а) хлороформ
- б) фторотан
- в) циклопропан
- г) кетамин

2.27. ПЕРВЫМ АНЕСТЕТИКОМ, ОТКРЫВШИМ ЭПОХУ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ БЫЛ

- а) прокаин
- б) кокаин
- в) настойка опия
- г) лидокаин

2.28. К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ОТНОСИТСЯ

- а) 10% р-р лидокаина
- б) закись азота
- в) гексенал
- г) сомбревин

2.29. К АМИДНОЙ ГРУППЕ АНЕСТЕТИКОВ ОТНОСИТСЯ

- а) прокаин
- б) артикаин
- в) тетракаин
- г) пропоксикаин

Выберите несколько правильных ответов

2.30. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ

- а) 1% новокаин
- б) 4% артикаин
- в) 10% лидокаин
- г) 5% бензокаин

2.31. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- а) апирогенная дистиллированная вода
- б) хлорид натрия
- в) вазоконстриктор
- г) ЭДТА

2.32. В КАЧЕСТВЕ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- а) эpineфрин
- б) норадреналин
- в) гидрокортизон
- г) дексаметазон

2.33. К АМИДНОЙ ГРУППЕ АНЕСТЕТИКОВ ОТНОСЯТСЯ

- а) апрокаин
- б) артикаин
- в) впропоксикаин
- г) мепивакин

2.34. К ЭФИРНОЙ ГРУППЕ АНЕСТЕТИКОВ ОТНОСЯТСЯ

- а) новокаин
- б) дикаин
- в) лидокаин
- г) бупивикаин

2.35. ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИГЛЫ

- а) длиной 16 мм
- б) длиной 35, 38 мм
- в) длиной 10 или 12 мм
- г) длиной 25 мм

2.36. К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО НАРКОЗА ОТНОСЯТ

- а) оксибутират натрия
- б) пропофол
- в) циклопропан
- г) закись азота

2.37. ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- а) 1% прокаин
- б) 10% бензокаин
- в) 10% лидокаин
- г) 2% этидокаин

2.38. К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ОТНОСИТСЯ

- а) 10% р-р лидокаина
- б) закись азота
- в) фторотан
- г) сомбревин

2.39. К ОБЩЕМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- а) эндотрахеальный наркоз
- б) туберальная анестезия
- в) нейролептаналгезия
- г) вагосимпатическая блокада

Установите и выберите правильную связь

2.40. ПОДНАДКОСТНИЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ НА ПУЛЬПЕ ЗУБА, ПОТОМУ ЧТО ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНА.

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.41. ФТОРОТАН – БЕСЦВЕТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ СО

СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЗАПАХОМ, НА СВЕТУ РАЗЛАГАЕТСЯ ПОЭТОМУ ФТОРОТАН ХРАНЯТ В ТЕМНЫХ ФЛАКОНАХ.

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.42. ФТОРОТАН НЕ РАЗДРАЖАЕТ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ХОРОШО РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОДЕ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.43. ГЕКСОНАЛ – ПОРОШОК БЕЛОГО ЦВЕТА, ХОРОШО РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ И СПИРТЕ, ПОЭТОМУ ВЫЗЫВАЕТ ЛИТОРГИЧЕСКИЙ СОН

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.44. СОМБРЕВИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СМЕСЬ ПОРОШКА И ЖИДКОСТИ, ВЫПУСКАЕТСЯ В АМПУЛАХ, ПОТОМУ ЧТО ПРЕПАРАТ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.45. С ПОМОЩЬЮ БЕЗЫГОЛЬНОГО ИНЪЕКТОРА МОЖНО ПРОВОДИТЬ ИНФИЛЬТРАЦИОННУЮ АНЕСТЕЗИЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.46. НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛОД ОКАЗЫВАЕТ МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК БУПИВАКАИН, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ ПРОНИКАТЬ ЧЕРЕЗ ГЕМАТО-ПЛАЦЕНТАРНЫЙ БАРЬЕР

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует

г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.47. ВНУТРИВЕННЫЙ НАРКОЗ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ПОТОМУ ЧТО СУЩЕСТВУЕТ РИСК АСФИКСИИ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.48. ПРИ ИНЪЕКЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ 1/3 ИГЛЫ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕ ПОГРУЖЕННОЙ В ТКАНИ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ИЗВЛЕЧЬ ИГЛУ ПРИ ЕЕ ОТЛОМЕ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I неверно, утверждение II верно, связь отсутствует

2.49. ВНУТРИВЕННЫЙ НАРКОЗ ПРОТИВОПОКАЗАН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОТОМУ ЧТО СУЩЕСТВУЕТ РИСК АСФИКСИИ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

2.50. ЭЛЕКТРОНАРКОЗ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНОГО ТОКА, ПОТОМУ ЧТО СУЩЕСТВУЕТ РИСК ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

Тема 3. Техника местной анестезии.

Выберите один правильный ответ

3.1. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ КОТОРОЙ АНЕСТЕТИК ВВОДЯТ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПЕРИОДОНТ ЗУБА НАЗЫВАЕТСЯ

- а) интралигаментарная
- б) интрасептальная
- в) внутрикостная
- г) туберальная

3.2. РАЗНОВИДНОСТЬЮ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- а) интралигаментарная
- б) ментальная
- в) торусальная
- г) туберальная

3.3. ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНЕСТЕЗИЮ

- а) резцовую
- б) инфраорбитальную
- в) внутриканальную
- г) мандибулярную

3.4. ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНЕСТЕЗИЮ

- а) туберальную
- б) ментальную
- в) внутрипульпарную
- г) мандибулярную

3.5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КОСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ОКОЛО

- а) 2 часов
- б) 1 часа
- в) 45 минут
- г) 20 минут

3.6. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ КОТОРОЙ АНЕСТЕТИК ВВОДЯТ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ГУБЧАТУЮ КОСТЬ МЕЖДУ КОРНЯМИ ЗУБОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- а) внутрикостная
- б) интрасептальная
- в) инфраорбитальная
- г) внутрипульпарная

3.7. В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ НЕОБХОДИМО

- а) сделать аппликационную анестезию
- б) обработать мягкие ткани спиртом
- в) обработать мягкие ткани 5% раствором йода
- г) сделать разрез

3.8. НАИМЕНЕЕ ТРАВМАТИЧНЫМ СПОСОБОМ ПРИ

**ИНФИЛЬТРАЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ СЧИТАЕТСЯ
ВВЕДЕНИЕ АНЕСТЕТИКА**

- а) в область прикрепленной десны
- б) кпереди от переходной складки субпериостально
- в) кпереди от переходной складки супрапериостально
- г) в губчатое вещество кости

**3.9. АНЕСТЕЗИЯ ЯЗЫЧНОГО НЕРВА ПРОВОДИТСЯ В ЧЕЛЮСТНО-
ЯЗЫЧНОМ ЖЕЛОБКЕ НА УРОВНЕ**

- а) третьего моляра
- б) второго моляра
- в) первого моляра
- г) второго премоляра

3.10. ПРИ ТОРУСАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ БЛОКИРУЮТСЯ

- а) щечный и нижнелуночковый
- б) щечный и язычный
- в) язычный и нижнелуночковый
- г) язычный, щечный, нижнелуночковый

**3.11. АНАТОМИЧЕСКИМ ОРИЕНТИРОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ АПОДАКТИЛЬНЫМ
ВНУТРИРОТОВЫМ СПОСОБОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- а) позадимолярная ямка
- б) височный гребешок
- в) передний край ветви нижней челюсти
- г) крыловидно-челюстная складка

**3.12. ПРИ ТУБЕРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ БЛОКИРУЮТСЯ ВЕРХНИЕ
ЛУНОЧКОВЫЕ ВЕТВИ**

- а) передние
- б) средние
- в) задние
- г) передние и средние

**3.13. ПРИ ИНФРАОРБИТАЛЬНОМ МЕТОДЕ ДОСТИГАЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ**

- а) передних верхнелуночковых ветвей
- б) средних верхнелуночковых ветвей
- в) задних верхнелуночковых ветвей
- г) передних и средних верхнелуночковых ветвей

**3.14. ПРИ АНЕСТЕЗИИ У БОЛЬШОГО НЕБНОГО ОТВЕРСТИЯ
БЛОКИРУЕТСЯ**

- а) среднее верхнее альвеолярное сплетение

- б) заднее верхнее альвеолярное сплетение
- в) носонебный нерв
- г) большой небный нерв

3.15. К МЕТОДУ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ

- а) внутривульпарная
- б) интралигаментарная
- в) внутрисептальная
- г) туберальная

3.16. ЦЕЛЮЮ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ ПО БЕРШЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЛОКАДА

- а) чувствительных волокон тройничного нерва
- б) двигательных волокон тройничного нерва
- в) язычного и нижнелуночкового нервов
- г) двигательных волокон лицевого нерва

3.17. ЧТОБЫ ПРИДАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИГЛЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БЛОКАДЫ ПОБОРОДОЧНОГО НЕРВА НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ПОДБОРОДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

- а) кзади, кверху, кнаружи
- б) прямо кпереди
- в) кнаружи, кпереди, кверху
- г) кнаружи, кпереди, книзу

3.18. ПРИ ТУБЕРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОД УГЛОМ

- а) 30°
- б) 45°
- в) 60°
- г) 90°

3.19. ПРИ КАКОЙ АНЕСТЕЗИИ ВКОЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТСТУПА НА 0,5 СМ КНАРУЖИ ОТ ПЕРЕХОДНОЙ СКЛАДКИ НА УРОВНЕ ВТОРОГО ВЕРХНЕГО МОЛЯРА ИЛИ МЕЖДУ ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ ВЕРХНИМИ МОЛЯРАМИ

- а) торусальной
- б) туберальной
- в) мандибулярной
- г) палатинальной

3.20. ПРИ КАКОЙ АНЕСТЕЗИИ ВКОЛ ИГЛЫ ПРОИЗВОДЯТ ОТСТУПА ОТ ПРОЕКЦИИ ПОДГЛАЗНИЧНОГО ОТВЕРСТИЯ НА

КОЖУ ВНИЗ И КНУТРИ НА 1СМ

- а) торусальной
- б) внеротовой подглазничной
- в) внутриротовой подглазничной
- г) палатинальной

3.21. ПРИ КАКОЙ АНЕСТЕЗИИ ВКОЛ ИГЛЫ ПРОИЗВОДЯТ ПО ПЕРЕХОДНОЙ СКЛАДКЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ И БОКОВЫМ РЕЗЦОМ

- а) внеротовой подглазничной
- б) внутриротовой подглазничной
- в) мандибулярной
- г) палатинальной

3.22. ПРИ КАКОЙ АНЕСТЕЗИИ ВКОЛ ИГЛЫ ПРОИЗВОДЯТ НА 10 ММ КПЕРЕДИ И КНУТРИ ОТ ПРОЕКЦИИ БОЛЬШОГО НЕБНОГО ОТВЕРСТИЯ

- а) внутриротовой подглазничной
- б) мандибулярной
- в) блокаде большого небного нерва
- г) инфильтрационной

3.23. ПРИ КАКОЙ АНЕСТЕЗИИ ВКОЛ ИГЛЫ ПРОИЗВОДЯТ В СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ РЕЗЦОВОГО СОСОЧКА, НЕСКОЛЬКО КПЕРЕДИ ОТ УСТЬЯ РЕЗЦОВОГО ОТВЕРСТИЯ

- а) блокаде большого небного нерва
- б) внутриротовой подглазничной
- в) блокаде носонебного нерва
- г) туберальной
- д) инфильтрационной

3.24. ПРИ МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВНУТРИРОТОВЫМ АПОДАКТИЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВКОЛ ИГЛЫ ПРОИЗВОДЯТ

- а) в наружный скат крылочелюстной складки
- б) во внутренний скат крылочелюстной складки
- в) в переходную складку в области моляров
- г) в нижний край щечной области

3.25. ПРИ МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ПОМОЩЬЮ ПАЛЬПАЦИИ ВКОЛ ПРОИЗВОДЯТ

- а) кнутри от височного гребешка
- б) кнаружи от височного гребешка
- в) в нижний край щечной области
- г) в переходную складку в области моляров

3.26. ПРИ МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ВНЕРОТОВЫМ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫМ МЕТОДОМ ВКОЛ ИГЛЫ ПРОИЗВОДЯТ

- а) кнаружи от височного гребешка
- б) в нижний край щечной области
- в) в переходную складку в области моляров
- г) под базальный край нижней челюсти отступя от угла челюсти

3.27. К МЕТОДУ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ

- а) торусальная
- б) внутрикостная
- в) внутрисептальная
- г) внутривульпарная

3.28. К ОБЩЕМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСИТСЯ

- а) стволовая анестезия
- б) внутрикостная
- в) мандибулярная
- г) нейролептаналгезия

3.29. К ОБЩЕМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСИТСЯ

- а) блокады
- б) электрофорез
- в) гипноз
- г) мандибулярная

3.30. К ОБЩЕМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСИТСЯ

- а) фонофорез
- б) электронаркоз
- в) инфильтрация
- г) бальнеотерапия

Выберите несколько правильных ответов

3.31. ВИД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

- а) инфильтрационная
- б) проводниковая
- в) эпидуральная
- г) масочная

3.32. ВИД ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ПОЛОСТИ РТА

- а) подкожная
- б) интрасептальная
- в) интралигаментарная

г) эпидуральная

3.33. К ОБЩЕМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- а) атаралгезия
- б) электронаркоз
- в) инфильтрация
- г) бальнеотерапия

3.34. К ОБЩЕМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- а) наркоз
- б) иглоукальвание
- в) ингаляции
- г) бальнеотерапия

3.35. К МЕСТНОМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- а) инфильтрационная анестезия
- б) аппликационная анестезия
- в) атаралгезия
- г) нейролептаналгезия

3.36. К МЕСТНОМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- а) ментальная анестезия
- б) туберальная анестезия
- в) наркоз
- г) гипноз

3.37. К МЕСТНОМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- а) иглоукальвание
- б) центральная аналгезия
- в) резцовая анестезия
- г) внутрикостная анестезия

3.38. К МЕСТНОМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- а) комбинированный наркоз
- б) внутривенный наркоз
- в) мандибулярная анестезия
- г) внутрисвязочная анестезия

3.39. К ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСЯТСЯ

- а) внутрипульпарная анестезия
- б) внутривенный наркоз
- в) мандибулярная анестезия
- г) внутрисвязочная анестезия

3.40. К ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСЯТСЯ

- а) интрасептальная анестезия
- б) комбинированный наркоз
- в) торусальная анестезия
- г) интралигаментарная анестезия

Установите и выберите правильную связь

3.41. ДЛЯ БЛОКАДЫ НОСОНЕБНОГО НЕРВА МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕРОТОВОЙ МЕТОД, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ МЕТОД ПРИМЕНЯЮТ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ АНЕСТЕЗИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИРОТОВОГО ДОСТУПА

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.42. ПРИ ИНТРАСЕПТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРОИСХОДИТ ВЫКЛЮЧЕНИЕ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН В КОСТНЫХ И МЯГКИХ ТКАНЯХ, ПОТОМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ ДИФФУЗИЯ АНЕСТЕТИКА ЧЕРЕЗ КОСТНОМОЗГОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА И СОСУДЫ ПАРОДОНТА

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.43. ПЕРЕД ИНТРАСЕПТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЧКУ ВКОЛА, ПОТОМУ ЧТО ДАННУЮ АНЕСТЕЗИЮ ВЫПОЛНЯЮТ ДЛИННОЙ ИГЛОЙ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.44. В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНИПУЛЯЦИЙ В ПОЛОСТИ РТА ПРИМЕНЯЮТ ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫ В ВЫПОЛНЕНИИ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.45. В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ ИНФИЛЬТРАЦИОННУЮ

АНЕСТЕЗИЮ, ПОТОМУ ЧТО ОНА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.46. БЛОКАДУ НОСОНЕБНОГО НЕРВА ПРОВОДЯТ ИСПОЛЬЗУЯ ВНУТРИРОТОВОЙ МЕТОД, ПОТОМУ ЧТО ПРИ ЭТОМ «ВЫКЛЮЧАЕТСЯ» АНАСТОМОЗНАЯ ВЕТВЬ ОТ НОСОНЕБНОГО НЕРВА ИДУЩАЯ К ПЕРЕДНЕМУ ОТДЕЛУ ЗУБНОГО СПЛЕТЕНИЯ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.47. ПРИ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ БЛОКИРУЮТ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВЕТВИ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПОТОМУ ЧТО ДЕПО РАСТВОРА АНЕСТЕТИКА СОЗДАЮТ В ОБЛАСТИ ПОДГЛАЗНИЧНОГО ОТВЕРСТИЯ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.48. ПРИ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ РАСТВОР АНЕСТЕТИКА ВВОДЯТ НЕ В ТКАНИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ, А НА НЕКОТОРОМ РАССТОЯНИИ В ОБЛАСТЬ НЕРВА, ПОТОМУ ЧТО ПРИ ЭТОМ НЕ НАДО ПРОВОДИТЬ АСПИРАЦИОННУЮ ПРОБУ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.49. ПРИ ТУБЕРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ЗОНУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВХОДЯТ ВЕРХНИЕ МОЛЯРЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧАСТОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ, ПОТОМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ БЛОКАДА БОКОВЫХ ЛУНОЧКОВЫХ ВЕТВЕЙ НЕРВА

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

3.50. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПО ЕГОРОВУ – ЭТО АНЕСТЕЗИЯ В

ОБЛАСТИ БУГРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, потому что ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ ТУБЕРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

- а) утверждение I верно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- б) утверждение I неверно, утверждение II неверно, связь отсутствует
- в) утверждение I верно, утверждение II верно, связь отсутствует
- г) утверждение I верно, утверждение II верно, связь существует

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема №1. Принципы организации стоматологической помощи. Асептика, антисептика, методы обследования.

№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ
1.1	г	1.11	а	1.21	а	1.31	а	1.41	а б в г
1.2	г	1.12	а	1.22	г	1.32	а	1.42	а б
1.3	в	1.13	а	1.23	б	1.33	а	1.43	а в г
1.4	в	1.14	г	1.24	б	1.34	а	1.44	а б в г
1.5	г	1.15	в	1.25	а	1.35	а	1.45	а б г д
1.6	в	1.16	г	1.26	б	1.36	а	1.46	а б в г д
1.7	г	1.17	г	1.27	б	1.37	б	1.47	г
1.8	г	1.18	а	1.28	б	1.38	б	1.48	г
1.9	б	1.19	а	1.29	г	1.39	а б в	1.49	г
1.10	а	1.20	г	1.30	а	1.40	а б в г	1.50	б

Тема №2. Препараты для общего и местного обезболивания.

№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ
2.1	г	2.11	а	2.21	г	2.31	а б	2.41	г
2.2	б	2.12	в	2.22	б	2.32	а б	2.42	а
2.3	а	2.13	а	2.23	г	2.33	б г	2.43	а
2.4	г	2.14	в	2.24	б	2.34	а б	2.44	б
2.5	б	2.15	б	2.25	в	2.35	а г	2.45	г
2.6	в	2.16	а	2.26	г	2.36	а б	2.46	г
2.7	б	2.17	г	2.27	б	2.37	б в	2.47	г
2.8	б	2.18	а	2.28	б	2.38	б в	2.48	г
2.9	б	2.19	а	2.29	б	2.39	а в	2.49	б
2.10	в	2.20	а	2.30	в г	2.40	а	2.50	а

Тема №3. Техника местной анестезии.

№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ
3.1	а	3.11	г	3.21	б	3.31	а б	3.41	г

3.2	a	3.12	ϵ	3.22	ϵ	3.32	$\bar{b}\epsilon$	3.42	ϵ
3.3	ϵ	3.13	ϵ	3.23	ϵ	3.33	$a\bar{b}$	3.43	a
3.4	ϵ	3.14	ϵ	3.24	a	3.34	$a\bar{b}$	3.44	a
3.5	\bar{b}	3.15	ϵ	3.25	a	3.35	$a\bar{b}$	3.45	a
3.6	a	3.16	\bar{b}	3.26	ϵ	3.36	$a\bar{b}$	3.46	ϵ
3.7	a	3.17	a	3.27	a	3.37	$\epsilon\epsilon$	3.47	ϵ
3.8	ϵ	3.18	\bar{b}	3.28	ϵ	3.38	$\epsilon\epsilon$	3.48	a
3.9	a	3.19	\bar{b}	3.29	ϵ	3.39	$a\epsilon$	3.49	a
3.10	ϵ	3.20	\bar{b}	3.30	\bar{b}	3.40	$a\epsilon$	3.50	ϵ