

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Дифференциальная диагностика шизофрении
основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина
31.05.01 Лечебное дело

Рассмотрен на заседании кафедры Психиатрии и наркологии ИКМ
от «11» декабря 2024 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой
Психиатрии и наркологии
ИКМ

(подпись)

М.А.Кинкулькина

(фамилия, инициалы)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Крепелин объединил несколько типов психоза в dementia praecox на основании единства:

- A) _этиологии_
- B) _патоморфологии_
- C) _симптомов_
- D) _способов лечения_
- E) _исхода_

ANSWER: E

Ключевыми симптомами шизофрении Блейлер считал:

- A) _бред и галлюцинации_
- B) _амбивалентность и нарушения ассоциаций_
- C) _амнезию и расстройства сознания_
- D) _манию и меланхолию_

ANSWER: B

С точки зрения Ясперса, шизофрению как болезнь лучше всего характеризует понятие:

- A) _патологическая конституция_
- B) _циклические фазы_
- C) _прогредиентный процесс_

ANSWER: C

К.Шнайдер к симптомам первого ранга при шизофрении относил:

- A) _ипохондрический бред и сенестопатии_
- B) _отнятие и вкладывание мыслей_
- C) _апатию и абулию_
- D) _амбивалентность и аутизм_
- E) _бред преследования и отравления_
- F) _все перечисленное_

ANSWER: B

В дебюте шизофрении нередко наблюдается:

- A) _головная боль и головокружение_
- B) _нарастание жадности и завистливости_
- C) _эйфория и дизартрия_
- D) _деперсонализация и метафизическая интоксикация_
- E) _все перечисленное_

ANSWER: D

В исходе злокачественной шизофрении наступает:

- A) _полная обездвиженность_
- B) _потеря способности самостоятельно принимать пищу_
- C) _дезориентировка во времени и собственной личности_
- D) _лень и равнодушие к близким_
- E) _смерть_

ANSWER: D

Характерный негативный симптом шизофрении:

- A) _бред воздействия_
- B) _сенестопатии_
- C) _резонерство_
- D) _псевдогаллюцинации_
- E) _депрессия_

ANSWER: C

Своеобразие мимики и нарушение эмпатии при шизофрении включают в симптом:

- A) _Павлова_
- B) _Рюмке_
- C) _Ашаффенбурга_
- D) _Аргайла Робертсона_
- E) _Маньяна_
- F) _Фреголи_

ANSWER: B

В исходе шизофрении развивается:

- A) _абулия и разорванность_
- B) _деменция и фиксационная амнезия_

- С) _лакунарное слабоумие и слабодушие_
D) _апраксия и акалькулия_

ANSWER: A

К типичным формам шизофрении относят:

- A) _простую_
B) _пароксизмальную_
C) _дементную_
D) _делириозную_
E) _сенильную_

ANSWER: A

Злокачественным вариантам болезни считают:

- A) _шизоаффективный психоз_
B) _параноидную шизофрению_
C) _шизотипическое расстройство_
D) _гебефреническую шизофрению_

ANSWER: D

При параноидной шизофрении чаще всего возникает бред:

- A) _величия_
B) _самообвинения_
C) _ипохондрический_
D) _воздействия_
E) _отравления_

ANSWER: D

Негативизм является типичным симптомом:

- A) _параноидной шизофрении_
B) _простой шизофрении_
C) _кататонической шизофрении_
D) _шизоаффективного расстройства_
E) _шизотипического расстройства_

ANSWER: C

Неврозоподобная и психопатоподобная симптоматика чаще всего наблюдается при:

- A) _параноидной шизофрении_
B) _простой шизофрении_
C) _кататонической шизофрении_
D) _шизоаффективном расстройстве_
E) _шизотипическом расстройстве_

ANSWER: E

Признаками более благоприятного прогноза при шизофрении считают:

- A) _спутанность сознания_
B) _медленное постепенное начало_
C) _дебют в возрасте до 20 лет_
D) _астеническое телосложение_
E) _длительные периоды без приема нейролептиков_

ANSWER: A

Интермиссии характерны для шизофрении:

- A) _непрерывной_
B) _приступообразно-прогредиентной_
C) _периодической_
D) _малопрогредиентной_

ANSWER: C

Первостепенную роль в возникновении шизофрении отводят:

- A) _генетическим факторам_
B) _органическим повреждениям в раннем детстве_
C) _хроническому эмоциональному стрессу_
D) _патологическим моделям воспитания в семье_

ANSWER: A

Доказано участие в патогенезе шизофрении дисбаланса:

- A) _норадреналина и гистамина_
B) _трийодтиронина и ацетилхолина_
C) _дофамина и глутамата_
D) _ГАМК и АКТГ_

ANSWER: C

Одним из биологических механизмов патогенеза шизофрении сегодня считают:

- A) _апоптоз_
- B) _дизонтогенез_
- C) _дегенерацию_
- D) _диссоциацию_

ANSWER: B

Паранойя и инволюционный параноид отличаются от шизофрении:

- A) _отсутствием бреда и галлюцинаций_
- B) _наличием критики к болезни_
- C) _преобладанием аффективных расстройств_
- D) _отсутствием прогрессивности_

ANSWER: D

Для лечения шизофрении НЕ используют:

- A) _ЭСТ_
- B) _противосудорожные средства_
- C) _антипсихотические препараты_
- D) _инсулинокоматозную терапию_

ANSWER: B

Важнейшим в поддерживающем лечении шизофрении считают

- A) _сочетание гипноза и шоковых методик_
- B) _длительный прием транквилизаторов и антидепрессантов_
- C) _сочетание витаминов и общеукрепляющих средств_
- D) _прием нейролептиков и поддержание комплаенса_

ANSWER: D

В период стабильной ремиссии больным шизофренией следует

- A) _избегать всяческих стрессов_
- B) _употреблять более калорийную пищу_
- C) _постоянно принимать лекарства_
- D) _воздерживаться от длительной умственной работы_
- E) _делать все перечисленное_

ANSWER: C

Инвалидность больным шизофренией оформляется при наличии:

- A) _выраженной апатии и абулии_
- B) _агрессии и самоагрессии_
- C) _помрачения сознания_
- D) _псевдогаллюцинаций и бреда воздействия_

ANSWER: A

В исходе шизофрении развивается:

- A) корсаковский синдром
- B) тотальное слабоумие
- C) мусситирующий делирий
- D) энцефалопатия Гайе-Вернике
- E) апатико-абулический синдром

ANSWER: E

Характерный продуктивный симптом шизофрении:

- A) истинные галлюцинации
- B) бред воздействия
- C) паралогическое мышление
- D) апатия и абулия
- E) симптом Аргайль-Робертсона

ANSWER: B

Для параноидной шизофрении характерно: а) наличие вербальных псевдогаллюцинаций б) задержка психического развития в) отсутствие негативной симптоматики д) начало в пубертатном возрасте е) все перечисленное выше

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Для параноидной шизофрении характерно: a) наличие истинных галлюцинаций b) наличие бреда преследования и воздействия c) отсутствие негативной симптоматики d) ухудшение запоминания и понимания абстрактных понятий e) все перечисленное выше

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Для параноидной шизофрении характерно: a) наличие истинных галлюцинаций b) задержка психического развития c) медленное прогрессирование негативных расстройств d) ухудшение запоминания и понимания абстрактных понятий e) все перечисленное выше

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Для параноидной шизофрении характерно: a) наличие истинных галлюцинаций b) задержка психического развития c) отсутствие негативной симптоматики d) начало на третьем десятке жизни e) все перечисленное выше

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: D

Для параноидной шизофрении характерно: a) наличие вербальных псевдогаллюцинаций b) преобладание бреда преследования и воздействия c) медленное прогрессирование негативных расстройств d) начало на третьем десятке жизни e) все перечисленное выше

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Наиболее характерным проявлением параноидной шизофрении является: a) маниакальный синдром b) гебефренический синдром c) апатико-абулический синдром d) синдром Кандинского-Клерамбо e) синдром Корсакова

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: D

К типичным проявлениям параноидной шизофрении относят: a) паранойальный синдром b) параноидный синдром c) синдром Кандинского-Клерамбо d) парафренный синдром e) все перечисленные

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Параноидная шизофрения проявляется: a) бредом b) галлюцинациями c) изменениями личности d) идеаторным автоматизмом e) всем перечисленным

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Параноидная шизофрения проявляется: a) фиксационной амнезией b) истинными галлюцинациями c) идеаторным автоматизмом d) сумеречным помрачением сознания e) всем перечисленным

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Негативная симптоматика при параноидной шизофрении: a) отсутствует b) проявляется ухудшением памяти c) проявляется склонностью к рассуждательству d) проявляется утратой способности осмыслять абстрактные понятия e) быстро прогрессирует

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Негативная симптоматика при параноидной шизофрении проявляется: a) склонностью к рассуждательству b) утратой эмоционального резонанса c) снижением энергетического потенциала d) изменением жизненного стиля e) всем перечисленным

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Параноидная шизофрения среди всех прочих вариантов шизофрении является самым: a) злокачественным b) распространенным c) благоприятным d) ранним e) редким

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Параноидная шизофрения может протекать: a) непрерывно b) рецидивно c) пароксизмально d) циклически e) всё перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Параноидная шизофрения может протекать: a) циклически b) рецидивно c) приступообразно d) пароксизмально e) всё перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Паранойяльный синдром характерен для течения шизофрении: a) непрерывного b) периодического c) приступообразного d) малопрогрессиентного e) всех перечисленных

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Синдром острого чувственного бреда характерен для течения шизофрении: a) непрерывного b) злокачественного c) приступообразного d) малопрогрессиентного e) всех перечисленных

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Непрерывная параноидная шизофрения чаще всего начинается с этапа: a) маниакального b) паранойяльного c) парафренного d) параноидного e) кататонического

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Непрерывная параноидная шизофрения чаще всего заканчивается этапом: a) маниакальным b) паранойяльным c) парафренным d) параноидным e) дементным

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Прогрессиентность непрерывной параноидной шизофрении: a) крайне низкая b) низкая c) средняя d) высокая e) крайне высокая

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Приступообразная параноидная шизофрения: a) начинается остро резко b) быстро прогрессирует c) проявляется систематизированным бредом d) обычно приводит к выраженному слабоумию e) всё перечисленное выше верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Приступообразная параноидная шизофрения: a) начинается исподволь постепенно b) прогрессирует относительно медленно c) проявляется систематизированным бредом d) обычно приводит к выраженному слабоумию e) всё перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Приступообразная параноидная шизофрения: a) начинается исподволь по-
степенно b) быстро прогрессирует c) проявляется острым чув-
ственным бредом d) обычно приводит к выраженному слабо-
умию e) всё перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Приступообразная параноидная шизофрения: a) начинается остро
резко b) прогрессирует относительно медленно c) проявляется
острым чувственным бредом d) обычно не приводит к выраженному слабо-
умию e) всё перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Острый чувственный бред обычно: a) бывает несистематизирован-
ным b) сопровождается апатией и абулией c) бывает первичным,
интерпретативным d) проявляется идеями материального
ущерба e) всё перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Острый чувственный бред обычно: a) бывает систематизирован-
ным b) сопровождается тревогой и растерянностью c) бывает
первичным, интерпретативным d) проявляется идеями материального
ущерба e) всё перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Острый чувственный бред обычно: a) бывает систематизирован-
ным b) сопровождается апатией и абулией c) бывает первичным,
интерпретативным d) проявляется идеями отношения и инсцени-
ровки e) всё перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: D

Острый чувственный бред обычно: a) бывает систематизирован-
ным b) сопровождается апатией и абулией c) проявляется иде-
ями материального ущерба d) сочетается с дереализацией и деперсонали-
зацией e) всё перечисленное выше верно

- A) a
- B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Для органических бредовых психозов характерно: a) эпизодическое или пароксизмальное течение b) начало болезни после эмоционального стресса c) наличие признаков идеаторного автоматизма d) преобладание апатико-абулического дефекта e) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Для органических бредовых психозов характерно: a) непрерывное прогрессирование b) начало болезни после эмоционального стресса c) отсутствие признаков идеаторного автоматизма d) преобладание апатико-абулического дефекта e) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Для органических бредовых психозов характерно: a) непрерывное прогрессирование b) начало болезни после эмоционального стресса c) наличие признаков идеаторного автоматизма d) преобладание мнестико-интеллектуального дефекта e) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Для органических бредовых психозов характерно: a) непрерывное прогрессирование b) склонность к вспышкам дисфории c) наличие признаков идеаторного автоматизма d) преобладание апатико-абулического дефекта e) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Бред при эпилепсии часто характеризуется: a) преобладанием астении и слабодушия b) приступами раздражения и гнева c) идеями овладения и воздействия d) наличием признаков идеаторного автоматизма e) растерянностью и идеями материального ущерба

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Бред при церебральном атеросклерозе часто характеризуется: a) преобладанием астении и слабодушия b) приступами раздражения и гнева c) идеями овладения и воздействия d) наличием признаков идеаторного автоматизма e) растерянностью и идеями материального ущерба

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Бред при болезни Альцгеймера часто характеризуется: a) преобладанием астении и слабодушия b) приступами раздражения и гнева c) идеями овладения и воздействия d) наличием признаков идеаторного автоматизма e) растерянностью и идеями материального ущерба

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Бредовые психозы вследствие соматических заболеваний: a) возникают довольно редко b) сопровождаются идеаторным автоматизмом c) сопровождаются псевдогаллюцинациями d) обычно непрерывно прогрессируют e) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Бредовые психозы вследствие соматических заболеваний: a) возникают довольно часто b) сопровождаются идеаторным автоматизмом c) сопровождаются псевдогаллюцинациями d) могут быть следствием приема лекарственных средств e) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Бредовые психозы у пациентов с соматическими заболеваниями могут быть следствием приема: a) противопаркинсонических средств b) противотуберкулезных препаратов c) гипотензивных средств d) стероидных гормонов e) всех перечисленных лекарств

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Бредовые психозы нередко возникают на фоне длительного приема: a) барбитуратов b) кокаина c) опиатов d) бензодиазепиновых транквилизаторов e) всех перечисленных средств

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Бредовые психозы нередко возникают на фоне длительного приема: a) барбитуратов b) нейролептиков c) опиатов d) каннабиноидов e) всех перечисленных средств

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Бредовые психозы у больных алкоголизмом чаще всего возникают: а) в инициальном периоде болезни б) на фоне приема максимальных доз алкоголя в) на фоне приема суррогатов, содержащих метиловый спирт г) на фоне абстинентного синдрома е) на фоне корсаковского синдрома

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Реактивный паранойд обычно: а) является следствием невосполнимой утраты (смерти близкого) б) провоцируется ситуацией изоляции и иноязычной средой в) сопровождается суицидальным поведением г) склонен к непрерывному прогрессированию е) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Реактивный паранойд обычно: а) является следствием невосполнимой утраты (смерти близкого) б) проявляется идеями дистанционного воздействия в) сопровождается суицидальным поведением г) проходит после разрешения стресса е) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Реактивный паранойд обычно: а) является следствием ситуации неопределенности и неясной угрозы б) сопровождается идеями преследования и аффектогенными иллюзиями в) провоцируется ситуацией изоляции и иноязычной средой г) проходит после разрешения стресса е) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Реактивный паранойд обычно: а) возникает в пожилом возрасте б) проявляется идеями материального ущерба в) сопровождается нарушениями памяти и понимания г) проходит после разрешения стресса е) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Инволюционный паранойд обычно: а) развивается у людей старше 80 лет б) без лечения быстро прогрессирует в) возникает у выросших в многодетных семьях г) не сопровождается расстройствами памяти и интеллекта е) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Инволюционный параноид обычно: а) развивается у людей старше 80 лет б) без лечения быстро прогрессирует с) проявляется идеями материального ущерба д) завершается формированием тотального слабоумия е) все перечисленное верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Инволюционный параноид обычно: а) развивается у людей старше 80 лет б) плохо поддается лечению, но и не прогрессирует с) сопровождается идеями самообвинения и самоуничтожения д) завершается формированием апатико-абулического синдрома е) все перечисленное верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Инволюционный параноид обычно: а) развивается после 55 лет б) сопровождается идеями материального ущерба с) плохо поддается лечению, но не прогрессирует д) часто возникает у одиноких людей е) все перечисленное верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Паранойя обычно: а) провоцируется ситуацией невосполнимой утраты б) сопровождается истинными и псевдогаллюцинациями с) развивается у лиц с демонстративными чертами характера д) протекает хронически, но не прогрессирует е) все перечисленное верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: D

Паранойя обычно: а) провоцируется ситуацией невосполнимой утраты б) сопровождается идеями дистанционного воздействия с) никогда не сопровождается галлюцинациями д) без лечения быстро прогрессирует е) все перечисленное верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Паранойя обычно: а) возникает эндогенно, не имеет связи со стрессом б) сопровождается идеями дистанционного воздействия с) сопровождается истинными и псевдогаллюцинациями д) без лечения быстро прогрессирует е) все перечисленное верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Паранойя обычно: a) возникает эндогенно, не имеет связи со стрессом b) проявляется монотематичным стойким бредом c) никогда не сопровождается галлюцинациями d) протекает хронически, но не прогрессирует e) все перечисленное верно

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Часто высказывается точка зрения о родстве с малопрогредиентной шизофренией: a) реактивного параноида b) психастении c) дистимии d) паранойи e) всех перечисленных расстройств

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D