

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Психиатрия, медицинская психология
основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина
31.05.01 Лечебное дело

Рассмотрен на заседании кафедры Психиатрии и наркологии ИКМ
от «11» декабря 2024 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой
Психиатрии и наркологии
ИКМ

(подпись)

М.А.Кинкулькина

(фамилия, инициалы)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Синдром наилучшим образом характеризует: * причину болезни * темп ее развития * текущее состояние * прогноз

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Нозологический диагноз наилучшим образом характеризует: * степень утраты трудоспособности * общественную опасность пациента * текущее состояние * причину патологии и прогноз

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Необратимыми чаще всего бывают расстройства: * невротические * психотические * продуктивные * негативные

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Психогенные боли считают проявлением: * мании * истерии * эпилепсии * деменции

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Повышенную отвлекаемость и откликаемость считают проявлением: * мании * истерии * эпилепсии * шизофрении

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Вязкость мышления считают проявлением: * мании * истерии * эпилепсии * шизофрении

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Резонерство считают проявлением: * мании * истерии * эпилепсии * шизофрении

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Характерное свойство псевдогаллюцинаций: * экстрапроекция * телесность и весомость * усиление в вечернее время * уверенность в дистанционном воздействии

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Характерное свойство псевдогаллюцинаций: * интропоекция * телесность и весомость * усиление в вечернее время * уверенность в том, что все люди тоже видят те же объекты

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Резонерство рассматривается как утрата способности: * к абстрактному мышлению * отличать главное от второстепенного * мыслить целенаправленно * концентрировать внимание

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Обстоятельность рассматривается как утрата способности: * к абстрактному мышлению * отличать главное от второстепенного * мыслить целенаправленно * концентрировать внимание

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Больной с навязчивыми идеями: * не поддается разубеждению * настойчиво старается их реализовать * стремится от них избавиться * представляет опасность для окружающих

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Больной с бредовыми идеями: * не поддается разубеждению * всегда возбужден * не способен мыслить логически * всегда представляет опасность для окружающих

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

При типичном корсаковском синдроме больной: * полностью ориентирован * дезориентирован в месте и времени * дезориентирован в ситуации и собственной личности * дезориентирован во всех отношениях

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

При типичном корсаковском синдроме больной: * знает, как его зовут * знает текущую дату и время * не понимает, что находится в больнице * дезориентирован во всех отношениях

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Точнее всего олигофрению можно определить как * недоразвитие интеллекта * тяжелую потерю интеллекта * врожденное отсутствие интеллекта * прогрессирующее снижение интеллекта

- A) 1
- B) 2
- C) 3

D) 4

ANSWER: A

Истинные галлюцинации обычно: * усиливаются в вечернее время * характеризуются интрапроекцией * сопровождаются чувством «сделанности» * наблюдаются при параноидной шизофрении

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Истинные галлюцинации обычно: * усиливаются днём * характеризуются экстрапроекцией * сопровождаются чувством «сделанности» * наблюдаются при параноидной шизофрении

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Псевдогаллюцинации высокоспецифичны для: * генуинной эпилепсии * алкогольного делирия * истерической психопатии * параноидной шизофрении

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Утрата способности отличать главное от второстепенного наблюдается в случае: * резонерства * разорванности * патологической обстоятельности * символического и паралогического мышления

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Справедливые суждения, овладевающие больным, и нарушающие его адаптацию в обществе, называют: * бредовыми идеями * навязчивыми идеями * сверхценными идеями * паралогичными идеями

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Острый бред обычно бывает: * несистематизированным * интерпретативным * мегаломаническим * первичным

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

К проявлениям синдрома Кандинского-Клерамбо относят: * резонерство * конфабуляции * симптом открытости * парейдолические иллюзии

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

К проявлениям синдрома Кандинского-Клерамбо относят: * ангедонию * резонерство * симптом Липмана * ментизм и шперрунг

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Причиной корсаковского синдрома может быть * тяжелая эмоциональная травма
* злокачественная шизофрения * злоупотребление алкоголем * воспитание в неполной семье

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Больные с дебильностью преимущественно проживают и воспитываются: * в интернатах для психически больных * в психиатрических больницах * в специальных детских домах * в собственной семье

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Главной чертой шизофренического слабоумия является утрата: * памяти * воли и эмоций * сознания и критики * абстрактного мышления

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Типичной причиной лакунарного слабоумия считают: * локальные инсульты * опухоли лобных долей * диффузные ангиопатии * сифилитический менингоэнцефалит

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Признаком патологии в психиатрии является: * странное поведение * опасность для окружающих * нарушение адаптации * выход за рамки нормы

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Болезнью в психиатрии называется: * нарушение адаптации * выход за рамки нормы * страдание и беспомощность * патологический процесс

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Нозологический диагноз основан на: * формальных критериях * ведущем синдроме * представлениях о природе болезни * данных об эффективности лечения

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Классификация МКБ-10 основана на: * формальных критериях * ведущем синдроме * представлениях о природе болезни * данных об эффективности лечения

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Закон РФ «О психиатрической помощи...» НЕ ГАРАНТИРУЕТ: * обеспечение гражданских прав и свобод * сохранение врачебной тайны * бесплатную психиатрическую помощь * наименее ограничительные условия

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

К условиям отказа от добровольности НЕ ОТНОСЯТ: * неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности * существенный вред здоровью в случае не оказания психиатрической помощи * отсутствие критики к имеющемуся заболеванию * опасность для себя или окружающих

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Правоспособностью пользуются: * психически здоровые люди * лица, способные контролировать своё поведение * лица, способные понимать свои действия и руководить ими * все люди, находящиеся на территории Российской Федерации

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Невменяемым признается человек неспособный: * контролировать свои действия и руководить ими * осознавать опасность своих действий * ухаживать за собой и соблюдать правила общежития * понять, что он психически болен

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Невменяемость определяется: * при решении вопроса о госпитализации * при назначении пенсии по заболеванию * в уголовном судебном процессе * при оформлении завещания

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Психиатрия изучает болезни: * души * головного мозга * центральной нервной системы * центральной, периферической и вегетативной нервной системы

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Диагностикой и лечением депрессии и неврозов занимается: * психиатр * невролог * клинический психолог * психотерапевт

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Официальной классификацией психических расстройств в Российской Федерации является: * DSM-IV * МКБ-10 * Классификация НЦПЗ РАН * Шкала PANSS

- A) 1
- B) 2
- C) 3

D) 4

ANSWER: B

В МКБ-10 психические расстройства отнесены к классу: * D * F * G * L

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Разрешение на недобровольное содержание больного в психиатрическом стационаре дает: * лечащий врач * главный врач больницы * прокурор * суд

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

В Классификации НЦПЗ РАН отсутствует класс психических расстройств: * эндогенных * психогенных * неврогенных * экзогенных

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Для обозначения психических нарушений в МКБ-10 используется слово: * болезнь * расстройство * патология * аномалия

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Прогноз психического расстройства в первую очередь определяется * наличием критики * степенью выраженности расстройства * синдромальным диагнозом * нозологическим диагнозом

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Заболеванием можно назвать только такое расстройство, которое характеризуется наличием: * течения * дезадаптации * прогрессирования * патологических симптомов

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Больные с патологическим обсессивным влечением: * должны быть госпитализированы * представляют опасность для окружающих * относятся к своему расстройству без критики * могут контролировать свое поведение в соответствии с ситуацией

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Характерными признаками апатико-абулического синдрома считают: * похуждение и потерю аппетита * молчание и обездвиженность * безразличие и равнодушие * все перечисленное

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Характерными проявлениями депрессивного синдрома считают: * запоры и потерю аппетита * молчание и негативизм * безразличие и равнодушие * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Характерными проявлениями сумеречного помрачения сознания считают: * кататоническое поведение * полную амнезию психоза * псевдогаллюцинации * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Характерными проявлениями синдрома онейроида считают: * кататоническое поведение * полную амнезию психоза * истинные галлюцинации * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Характерными проявлениями синдрома делирия считают: * импульсивные поступки * полную амнезию психоза * истинные галлюцинации * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Характерными проявлениями кататонического синдрома считают: * ангедонию и потерю аппетита * молчание и обездвиженность * параличи и атаксию * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Характерными признаками депрессивного синдрома считают: * раннее утреннее пробуждение и ангедонию * брадикардию и снижение АД * безразличие и равнодушие * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Больные с манией обычно: * часто проявляют подозрительность и недоверчивость * любят помогать знакомым и незнакомым людям * представляют опасность для окружающих * характеризуются всем перечисленным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Больные с кататоническим синдромом: * не могут сохранять равновесия при ходьбе * спасаются от преследователей бегством * не отвечают на вопросы * делают все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3

D) 4

ANSWER: C

Опасность больных в кататоническом состоянии чаще всего обусловлена: * отказом от еды * помрачением сознания * стремлением к суициду * императивными галлюцинациями

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Общественная опасность больных в маниакальном состоянии: * обусловлена императивными галлюцинациями * является следствием помрачения сознания * проявляется сексуальным насилием * обычно отсутствует

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Опасное поведение у больных в депрессивном состоянии: * обусловлено настойчивым отказом от еды * определяется стремлением к суициду * проявляется бессмысленной агрессией * обычно отсутствует

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Острым обратимым психозом является: * делирий * онейроид * сумеречное состояние, * любой тип помрачения сознания

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Сочетание парейдолических иллюзий со сценopodobными истинными галлюцинациями характерно для: * делирия * онейроида * сумеречного состояния * любого типа нарушения сознания

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Дисфория чаще всего наблюдается при: * неврозах * эпилепсии * шизофрении * биполярном расстройстве

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Амбивалентность чаще всего наблюдается при: * неврозах * эпилепсии * шизофрении * биполярном расстройстве

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Сон нарушен у пациентов с: * депрессивным синдромом * кататоническим синдромом * апатико-абулическим синдромом * всеми перечисленными синдромами

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Депрессия это расстройство: * продуктивное функциональное * негативное функциональное * продуктивное органическое * негативное органическое

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Апатия это расстройство: * продуктивное * невротическое * психогенное * негативное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Типичная продолжительность депрессии — несколько: * часов * дней * недель * месяцев

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания составляет до 30: * минут * часов * дней * недель

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Для депрессии характерно: * сонливость в дневное время * яркие сновидения и кошмары * раннее утреннее пробуждение * всё перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Для мании характерно: * сокращение продолжительности ночного сна * возбуждение и бред преследования * склонность к агрессии и насилию * всё перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Возбуждение может быть проявлением синдрома: * депрессивного * маниакального * кататонического * любого из перечисленных

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Чисто моторным называют возбуждение при синдроме: * кататоническом * депрессивном * маниакальном * делириозном

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Внезапное возникновение и резкое прекращение характерны для: * делирия * онейроида * сумеречного состояния * любого типа помрачения сознания

- A) 1
- B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Сумеречные состояния могут возникать при: * истерии * шизофрении * корсаковском психозе * маниакально-депрессивном психозе

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Для эндогенных заболеваний характерно: * спонтанное начало * аутохтонное течение * связь с биологическими часами * всё перечисленное

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Для эндогенных заболеваний характерно: * спонтанное начало * помрачение сознания * отсутствие критики * всё перечисленное

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Для эндогенных заболеваний характерно: * непрерывное прогрессирование * интеллектуальное недоразвитие * аутохтонное течение * всё перечисленное

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

О высокой роли наследственности при той или иной болезни свидетельствует: * высокая частота заболевания у родителей и сибсов * низкая частота заболевания у усыновленных детей * отсутствие различий в конкордантности у идентичных и неидентичных близнецов * существенное различие в конкордантности у идентичных и неидентичных близнецов

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Ключевыми симптомами шизофрении Блейлер считал: * амбивалентность и нарушения ассоциаций * амнезию и расстройства сознания * бред и галлюцинации * манию и меланхолию

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Ключевыми симптомами шизофрении Блейлер считал: * эмоциональное оскудение * нарушение ассоциаций * аутизм * всё перечисленное

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

В исходе шизофрении развивается: * апраксия и акалькулия * абулия и разорванность * деменция и фиксационная амнезия * лакунарное слабоумие и слабодушие

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

В исходе шизофрении развивается: * разорванность * апатия * абулия * всё перечисленное

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

В исходе шизофрении развивается синдром: * концентрического слабоумия * ажитированной депрессии * апатико-абулический * обсессивно-фобический

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

При параноидной шизофрении чаще всего возникает бред: * ипохондрический * воздействия * отравления * величия

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

При параноидной шизофрении чаще всего наблюдается синдром: * онейроидной кататонии * экспансивного бреда величия * психического автоматизма * гневливой мании

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Признаками более благоприятного прогноза при шизофрении считают: * длительные периоды без приема нейролептиков * медленное постепенное начало * дебют в возрасте до 20 лет * спутанность сознания

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Важнейшим диагностическим признаком маниакально-депрессивного психоза считают наличие: * хронической депрессии * приступов депрессии * хронической мании * интермиссий

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Случаи хронической подавленности без выраженных колебаний в самочувствии называют: * дисфорией * дистимией * астенией * апатией

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Шизофрению как болезнь лучше всего характеризует понятие: * циклический психоз * генетический дефект * прогрессирующий процесс * патологическое развитие

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

В дебюте шизофрении нередко наблюдается: * деперсонализация и метафизическая интоксикация * нарастание жадности и завистливости * эйфория и дизартрия * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

В дебюте шизофрении нередко наблюдается: * кратковременное помрачение сознания * разрыв социальных связей * бред отравления * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

В дебюте шизофрении нередко наблюдается: * разрыв прежних социальных связей * снижение энергетического потенциала * обращение к религии * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

К типичным формам шизофрении относят: * простую * сенильную * делириозную * пароксизмальную

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Интермиссии характерны для течения шизофрении: * приступообразно-прогредиентного * малопрогредиентного * периодического * непрерывного

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Негативизм является типичным симптомом: * простой шизофрении * кататонической шизофрении * шизотипического расстройства * шизоаффективного расстройства

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Психический автоматизм – это характерное проявление: * простой шизофрении * параноидной шизофрении * кататонической шизофрении * любой формы шизофрении

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Дурашливость и копролалия являются типичными симптомами шизофрении: * простой * кататонической * гебефренической * параноидной

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Характерным негативным симптомом шизофрении следует считать: * бред воздействия * сенестопатии * резонерство * депрессию

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

К.Шнайдер к симптомам первого ранга при шизофрении относил: * ипохондрический бред и сенестопатии * бред преследования и отравления * отнятие и вкладывание мыслей * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Состояние полного психического здоровья в промежутках между болезненными фазами маниакально-депрессивного психоза называют: * обнубильяцией * интермиссией * компенсацией * регрессией

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Быструю смену относительно неглубоких аффективных фаз называют: * алекситимией * циклотимией * гипотимией * дистимией

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Настроение у депрессивных больных обычно: * улучшается после встречи с близкими * улучшается в солнечный день * ухудшается в утренние часы* не меняется в течение дня

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Типичные симптомы параноидной формы шизофрении:1/ мутизм2/ копролалия3/ гримасничание4/ псевдогаллюцинации

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: D

Типичные симптомы гебефренической формы шизофрении:1/ возбуждение2/ копролалия3/ гримасничание4/ псевдогаллюцинации

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: A

Типичные симптомы параноидной формы шизофрении:1/ идеаторный автоматизм2/ бред воздействия3/ псевдогаллюцинации4/ мутизм и негативизм

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: A

Типичные симптомы простой формы шизофрении:1/ идеаторный автоматизм2/ бред воздействия3/ псевдогаллюцинации4/ апатия

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: D

Типичные симптомы гебефренической формы шизофрении:1/ идеаторный автоматизм2/ бред воздействия3/ псевдогаллюцинации4/ возбуждение

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: D

Типичные симптомы кататонической формы шизофрении:1/ акатизия2/ лицевые гиперкинезы3/ дистонические кризы4/ пассивная подчиняемость

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: D

Типичные симптомы кататонической формы шизофрении:1/ пассивная подчиняемость2/ негативизм3/ мутизм и восковая гибкость4/ акатизия

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: A

Типичные симптомы кататонической формы шизофрении:1/ амнезия и апраксия2/ гипотимия и гипобулия3/ гиперестезия и астения4/ активный и пассивный негативизм

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: D

Типичные симптомы кататонической формы шизофрении:1/ импульсивные поступки2/ гипертимия и гипербулия3/ эхолоалия и эхомимия4/ амнезия и апраксия

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: B

Типичные симптомы кататонической формы шизофрении:1/ негативизм2/ ступор или субступор3/ возбуждение со стереотипиями4/ мутизм и восковая гибкость

- A) Верно 1, 2 и 3
- B) Верно 1 и 3
- C) Верно 2 и 4
- D) Верно только 4
- E) Верно всё

ANSWER: E

О благоприятном течении шизофрении свидетельствует:1/ острое начало заболевания2/ сочетание бреда с выраженными признаками мании или депрессии3/ помрачение сознания во время приступов заболевания4/ выраженная кататоническая симптоматика на фоне ясного сознания

- A) Верно 1, 2 и 3

- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: А

О злокачественном течении шизофрении свидетельствует:1/ острое начало заболевания2/ сочетание бреда с выраженными признаками мании или депрессии3/ помрачение сознания во время приступов заболевания4/ выраженная кататоническая симптоматика на фоне ясного сознания

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: D

О благоприятном течении шизофрении свидетельствует:1/ высокая эмоциональная насыщенность психотических переживаний2/ раннее начало заболевания (до 20 лет)3/ помрачение сознания во время приступов заболевания4/ преобладание апатии в картине заболевания

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: В

О злокачественном течении шизофрении свидетельствует:1/ высокая эмоциональная насыщенность психотических переживаний2/ раннее начало заболевания (до 20 лет)3/ помрачение сознания во время приступов заболевания4/ преобладание апатии в картине заболевания

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: С

Следующие расстройства могут быть проявлением шизофрении:1/ мутизм и эхолалия2/ ментизм и шперрунг3/ паранойяльный синдром4/ корсаковский синдром

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: А

Следующие расстройства могут быть проявлением шизофрении:1/ аутизм2/ амбивалентность3/ абулия4/ амнезия

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: А

Следующие расстройства могут быть проявлением шизофрении:1/ сумеречное помрачение сознания2/ фиксационная амнезия3/ делирий4/ апатия

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: D

Следующие расстройства могут быть проявлением шизофрении:1/ символическое мышление2/ разорванность мышления3/ резонерство4/ ментизм

- А) Верно 1, 2 и 3

- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: Е

Следующие расстройства могут быть проявлением шизофрении:1/ идеаторный и моторный автоматизм2/ фиксационная амнезия3/ резонерство4/ слабодушие

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: В

Следующие расстройства могут быть проявлением шизофрении:1/ дереализация и деперсонализация2/ ипохондрия и сенестопатии3/ кататония и онейроид4/ апатия и абulia

- А) Верно 1, 2 и 3
- В) Верно 1 и 3
- С) Верно 2 и 4
- Д) Верно только 4
- Е) Верно всё

ANSWER: Е

Студент 22 лет (наследственность неотягощена) около недели назад впервые без видимой причины перестал спать ночью. Был беспокоен. Утверждал, что вскоре должна начаться мировая война, так как об этом ему сказал "голос", возникший у него в голове. Хаотично метался подому, твердил, что его никто не понимает. **НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ:** А/ делирий вследствие неизвестной интоксикации В/ обсессивно-компульсивное расстройство С/ маниакально-депрессивный психоз Д/ неврастения Е/ можно с уверенностью исключить любой из перечисленных диагнозов

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: Е

Студент 22 лет (наследственность неотягощена) около недели назад впервые без видимой причины перестал спать ночью. Был беспокоен. Утверждал, что вскоре должна начаться мировая война, так как об этом ему сказал "голос", возникший у него в голове. Хаотично метался подому, твердил, что его никто не понимает. **ВЕДУЩИЙ СИНДРОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:** А/ маниакальный В/ паранойальный С/ острый чувственный бред Д/ делирий Е/ сумеречное помрачение сознания

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: С

Студент 22 лет (наследственность неотягощена) около недели назад впервые без видимой причины перестал спать ночью. Был беспокоен. Утверждал, что вскоре должна начаться мировая война, так как об этом ему сказал "голос", возникший у него в голове. Хаотично метался подому, твердил, что его никто не понимает. **НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ:** А/ алкогольный делирий В/ реактивный психоз С/ маниакально-депрессивный психоз Д/ шизофрения Е/ можно с уверенностью исключить любой из перечисленных диагнозов

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: Д

В исходе параноидной шизофрении часто наблюдается:А/ кататонический синдромВ/ обсессивно-фобический синдромС/ онейроидное помрачение сознанияD/ парафренный синдромЕ/ маниакальный синдром

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

В исходе параноидной шизофрении часто наблюдается:А/ парафренный синдромВ/ ипохондрический синдромС/ делириозное помрачение сознанияD/ психоорганический синдромЕ/ депрессивный синдром

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

В исходе параноидной шизофрении часто наблюдается:А/ тотальное слабоумиеВ/ лакунарное слабоумиеС/ сумеречное помрачение сознанияD/ корсаковский синдромЕ/ парафренный синдром

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Исходом шизофрении является синдром:А/ апатико-абулическийВ/ сенестопатически-ипохондрическийС/ психоорганическийD/ амнестическийЕ/ Кандинского-Клерамбо

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Исходом шизофрении является синдром:А/ маниакальныйВ/ апатико-абулическийС/ психоорганическийD/ концентрического слабоумияЕ/ тотального слабоумия

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Исходом шизофрении является синдром:А/ корсаковскийВ/ астеническийС/ апатико-абулическийD/ онейроидно-кататоническийЕ/ галлюцинаторно-параноидный

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Все следующее характерно для шизофрении, КРОМЕ:А/ Символическое мышлениеВ/ Психический автоматизмС/ Уплотнение эмоцийD/ СенестопатииЕ/ Абсансы

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Все следующее характерно для шизофрении, КРОМЕ: А/ Нарушение единства психических процессов В/ Обстоятельность мышления С/ Идеаторный автоматизм D/ Резонерство Е/ Аутизм

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: В

Все следующее характерно для шизофрении, КРОМЕ: А/ Амбулаторный автоматизм В/ Амбивалентность С/ Абулия D/ Апатия Е/ Аутизм

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: А

Все следующее характерно для шизофрении, КРОМЕ: А/ Псевдогаллюцинации В/ Амбивалентность С/ Слабодушие D/ Ментизм Е/ Абулия

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: С

Среди представленных вариантов шизофрении протекает наиболее злокачественной приводит к выраженным изменениям личности: А/ циркулярная форма В/ неврозоподобная форма С/ люцидная кататония D/ психопатоподобная форма Е/ параноидная форма

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: С

Среди представленных вариантов шизофрении протекает наиболее злокачественной приводит к выраженным изменениям личности: А/ простая форма В/ неврозоподобная форма С/ циркулярная форма D/ психопатоподобная форма Е/ параноидная форма

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: А

Среди представленных вариантов шизофрении протекает наиболее злокачественной приводит к выраженным изменениям личности: А/ онейроидная кататония В/ неврозоподобная форма С/ циркулярная форма D/ гебефреническая форма Е/ параноидная форма

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: D

БРЕД ВЕЛИЧИЯ В СОЧЕТАНИИ С ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИЯМИ И БРЕДОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ весьма характерен для пациентов с: А/ парафренным синдромом В/ маниакальным синдромом С/ синдромом Котара D/ синдромом Мартина-Бэлл Е/ всеми перечисленными синдромами

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

Е) Е

ANSWER: А

БРЕД ВЕЛИЧИЯ В СОЧЕТАНИИ С ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИЯМИ И БРЕДОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ весьма характерен для пациентов с: А/ психоорганическим синдромом В/ маниакальным синдромом С/ парафренным синдромом D/ кататоническим синдромом Е/ всеми перечисленными синдромами

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: С

БРЕД ВЕЛИЧИЯ В СОЧЕТАНИИ С БРЕДОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ весьма характерен для пациентов с: А/ паранойяльным синдромом В/ ипохондрическим синдромом С/ корсаковским синдромом D/ парафренным синдромом Е/ всеми перечисленными синдромами

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: D

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, РЕВНОСТИ, МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА довольно характерны для пациентов с: А/ психоорганическим синдромом В/ ипохондрическим синдромом С/ гебефреническим синдромом D/ паранойяльным синдромом Е/ всеми указанными синдромами

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: D

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, РЕВНОСТИ, МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА довольно характерны для пациентов с: А/ обсессивно-фобическим синдромом В/ синдромом психического автоматизма С/ паранойяльным синдромом D/ корсаковским синдромом Е/ всеми указанными синдромами

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: С

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, РЕВНОСТИ, МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА довольно характерны для пациентов с: А/ паранойяльным синдромом В/ парафренным синдромом С/ депрессивным синдромом D/ маниакальным синдромом Е/ всеми указанными синдромами

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: А

У больных с ипохондрическим бредом обычно: А/ имеется критика к заболеванию В/ присутствует чувство, что у них что-то не так с головой С/ имеется желание избавиться от психического расстройства D/ присутствует формальная критика Е/ критика полностью отсутствует

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: Е

У больных с ипохондрическим неврозом обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует недоверие к врачамС/ отмечается нежелание принимать лекарстваD/ имеется ощущение, что окружающие хотят причинить им вредЕ/ критика полностью отсутствует

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

У больных с паническим расстройством обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует недоверие к врачамС/ отмечается нежелание принимать лекарстваD/ имеется ощущение, что окружающие хотят причинить им вредЕ/ критика полностью отсутствует

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

У больных с обсессивно-компульсивным расстройством обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует недоверие к врачамС/ отмечается нежелание принимать лекарстваD/ имеется ощущение, что окружающие хотят причинить им вредЕ/ критика полностью отсутствует

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

У больных с неврозами обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует недоверие к врачамС/ отмечается нежелание принимать лекарстваD/ имеется ощущение, что окружающие хотят причинить им вредЕ/ критика полностью отсутствует

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

У больных с обсессиями обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует недоверие к врачамС/ отмечается нежелание принимать лекарстваD/ имеется ощущение, что окружающие хотят причинить им вредЕ/ критика полностью отсутствует

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

У больных с навязчивыми идеями обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует недоверие к врачамС/ отмечается нежелание принимать лекарстваD/ имеется ощущение, что окружающие хотят причинить им вредЕ/ критика полностью отсутствует

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

У больных в состоянии делирия обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует чувство, что с ними что-то не такС/ имеется желание избавиться от болезниD/ присутствует формальная критикаЕ/ критика полностью отсутствует

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

У больных с онейроидным синдромом обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует чувство, что с ними что-то не такС/ имеется желание избавиться от болезниD/ присутствует формальная критикаЕ/ критика полностью отсутствует

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

У больных с кататоническим синдромом обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует чувство, что с ними что-то не такС/ имеется желание избавиться от болезниD/ присутствует формальная критикаЕ/ критика полностью отсутствует

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

У больных с апатико-абулическим синдромом обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует чувство, что с ними что-то не такС/ имеется желание избавиться от болезниD/ присутствует формальная критикаЕ/ критика полностью отсутствует

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

У больных с парафренным синдромом обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует чувство, что с ними что-то не такС/ имеется желание избавиться от болезниD/ присутствует формальная критикаЕ/ критика полностью отсутствует

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

У больных с паранойяльным синдромом обычно:А/ имеется критика к заболеваниюВ/ присутствует чувство, что с ними что-то не такС/ имеется желание избавиться от болезниD/ присутствует формальная критикаЕ/ критика полностью отсутствует

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

БРЕД ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИИ нередко наблюдаются в составе:А/ корсаковского синдромаВ/ гебефренического синдромаС/ ипохондрического синдромаD/ парафренного синдромаЕ/ всех перечисленных синдромов

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

БРЕД ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИИ нередко наблюдаются в составе: A/ паранойяльного синдрома B/ парафренного синдрома C/ маниакального синдрома D/ делириозного синдрома E/ всех перечисленных синдромов

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ ВОЗДЕЙСТВИЯ считают типичным компонентом: A/ синдрома Марфана B/ синдрома Котара C/ синдрома Мартина-Бэлл D/ синдрома Кандинского-Клерамбо E/ всех перечисленных синдромов

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ ВОЗДЕЙСТВИЯ считают типичным компонентом: A/ паранойяльного синдрома B/ маниакального синдрома C/ кататонического синдрома D/ синдрома психического автоматизма E/ всех перечисленных синдромов

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ считают типичным компонентом: A/ параноидного синдрома B/ маниакального синдрома C/ кататонического синдрома D/ психоорганического синдрома E/ всех перечисленных синдромов

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

Молодой человек поступил в психиатрическую больницу в состоянии заторможенности: на вопросы отвечает односложно, не видит смысла в лечении, так как считает, что ему никто не сможет помочь. Утверждает, что проиграл всё в жизни. Отказывается от еды, но после уговоров съедает несколько ложек. ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: A/ неврастении B/ аффективного психоза C/ истерической конверсии D/ гебефренической шизофрении E/ всех перечисленных заболеваний

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Молодой человек поступил в психиатрическую больницу в состоянии заторможенности: на вопросы отвечает односложно, не видит смысла в лечении, так как считает, что ему никто не сможет помочь. Утверждает, что проиграл всё в жизни. Отказывается от еды, но после уговоров съедает несколько ложек. ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: A/ эпилепсии B/ неврастении C/ параноидной шизофрении D/ маниакально-депрессивного психоза E/ всех перечисленных заболеваний

A) A

B) B

C) C

D) D

Е) Е

ANSWER: D

Молодой человек поступил в психиатрическую больницу в состоянии заторможенности: на вопросы отвечает односложно, не видит смысла в лечении, так как считает, что ему никто не сможет помочь. Утверждает, что проиграл всё в жизни. Отказывается от еды, но после уговоров съедает несколько ложек. ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: А/ парафренного синдрома В/ корсаковского синдрома С/ депрессивного синдрома D/ кататонического синдрома Е/ всех перечисленных расстройств

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: C

Молодой человек поступил в психиатрическую больницу в состоянии заторможенности: на вопросы не отвечает, неадекватно стереотипно смеется, копирует жесты окружающих, подолгу сидит на корточках около кровати. ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: А/ парафренного синдрома В/ корсаковского синдрома С/ депрессивного синдрома D/ кататонического синдрома Е/ всех перечисленных расстройств

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: D

Молодой человек поступил в психиатрическую больницу в состоянии заторможенности: на вопросы не отвечает, неадекватно стереотипно смеется, копирует жесты окружающих, подолгу сидит на корточках около кровати. ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: А/ депрессии В/ кататонии С/ делирия D/ сумеречного помрачения сознания Е/ всех перечисленных расстройств

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: B

Молодой человек поступил в психиатрическую больницу в состоянии заторможенности: на вопросы не отвечает, неадекватно стереотипно смеется, копирует жесты окружающих, подолгу сидит на корточках около кровати. ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: А/ эпилепсии В/ неврастении С/ шизофрении D/ маниакально-депрессивного психоза Е/ всех перечисленных заболеваний

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: C

Студент оставил занятия в институте, так как решил, что эта профессия не для него. Устроился в ресторан быстрого обслуживания официантом, очень нравится эта работа. Решил переселиться от родителей со своей девушкой на съемную квартиру. Сами платят за квартиру вместе с девушкой, у родителей денег не просят. На работе его хвалят и предлагают ему повышение. Вечерами играет вне профессиональной музыкальной группы. ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ гебефреническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: E

Студент оставил занятия в институте, постоянно находится дома, лежит на кровати и смотрит в потолок. Садится за стол после уговоров, но, съев несколько ложек, уходит. Винит себя в смерти деда, который умет 2 года назад от инсульта. До этого успешно учился, был душой компании, часто знакомил родителей со своими друзьями, устраивал дома вечеринки для одноклассников. ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: D

Студент оставил занятия в институте, постоянно находится дома, на улицу вывести его не удается. Родным ничего не объясняет, на вопросы не отвечает. Первое время ел после уговоров, потом вовсе перестал есть. Ночью спит нормально, иногда встает, чтобы сходить в туалет, но тут же засыпает. ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: C

Студент оставил занятия в институте, всё свободное время проводит дома, на улицу выходит редко. Большую часть дня лежит на постели и смотрит что-то в телефоне. Постоянно подходит к холодильнику и что-то ест. Садиться со всеми за обеденный стол отказывается. Говорит "Вы мне все надоели. смотреть на вас противно" ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: A

Студент оставил занятия в институте после того, как у него без видимых причин появилось ощущение, что преподаватели мешают ему заниматься, "воруют" мысли из его головы, вкладывают в его голову какие-то другие мысли. ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: B

В межприступный период больным рекуррентной шизофренией обычно рекомендуют: А/ амбулаторное поддерживающее медикаментозное лечение и продолжение работы на прежнем рабочем месте В/ лечение в условиях обычного стационара С/ лечение в условиях дневного стационара D/ санаторно-курортное лечение на берегу моря Е/ оформление инвалидности и работу в лечебных мастерских

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: A

"СХИЗИС" - это: А/ раздвоение личности В/ нарушение логики мышления С/ склонность к подозрительности D/ отсутствие критики к болезненным переживаниям Е/ нарушение единства психических процессов больного

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

"СХИЗИС" - это: А/ раздвоение личности В/ многообразие черт характера больного С/ несоответствие поступков больного его словам D/ нарушение единства психических процессов больного Е/ прогрессирующее нарастание замкнутости и равнодушия

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Ступор нередко наблюдается у больных с: А/ концентрическим слабоумием В/ паранойальным синдромом С/ корсаковским синдромом D/ неврастенией Е/ истерией

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Ступор нередко наблюдается у больных с: А/ корсаковским синдромом В/ лакунарным слабоумием С/ люцидной кататонией D/ манией Е/ всеми перечисленными расстройствами

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Ступор нередко наблюдается у больных с: А/ концентрическим слабоумием В/ корсаковским синдромом С/ онейроидной кататонией D/ делирием Е/ всеми перечисленными расстройствами

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Ступор нередко наблюдается у больных с: А/ концентрическим слабоумием В/ кататоническим синдромом С/ параноидным синдромом D/ делирием Е/ всеми перечисленными расстройствами

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Ступор нередко наблюдается у больных с: А/ концентрическим слабоумием В/ корсаковским синдромом С/ параноидным синдромом D/ депрессией Е/ всеми перечисленными расстройствами

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

Е) Е

ANSWER: D

Ступор нередко наблюдается у больных с: А/ концентрическим слабоумием В/ депрессивным синдромом С/ параноидным синдромом D/ неврастенией Е/ делирием

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: B

Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ сумеречное помрачение сознания С/ ангедонию и диссомнию D/ прогрессирующую амнезию Е/ апатию и абулию

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: E

Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ сумеречное помрачение сознания С/ ангедонию и диссомнию D/ идеаторный автоматизм Е/ патологическую обстоятельность

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: D

Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ сумеречное помрачение сознания С/ амбивалентность и резонерство D/ прогрессирующую амнезию Е/ патологическую обстоятельность

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: C

Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ замкнутость и пассивность С/ ангедонию и диссомнию D/ прогрессирующую амнезию Е/ патологическую обстоятельность

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: B

Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную холодность В/ сумеречное помрачение сознания С/ ангедонию и диссомнию D/ прогрессирующую амнезию Е/ патологическую обстоятельность

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: A

Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную холодность В/ замкнутость (аутизм) С/ амбивалентность D/ различные расстройства ассоциативного процесса Е/ все перечисленные выше расстройства

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: Е

В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ (от 14 до 35 лет) обычно начинается:А/ Непрерывная шизофренияВ/ Шубообразная (приступообразно-прогредиентная) шизофренияС/ Рекуррентная (периодическая) шизофренияД/ Все типы течения шизофренииЕ/ Ни одна из форм шизофрении

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: D

УХУДШЕНИЕ ЗАПОМИНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ АБСТРАКТНЫХ ИДЕЙявляется типичным проявлением:А/ Малопрогредиентной шизофренииВ/ Шубообразной (приступообразно-прогредиентной) шизофренииС/ Рекуррентной (периодической) шизофренииД/ Всех типов течения шизофренииЕ/ Ни одной из указанных форм шизофрении

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: Е

Рекуррентной шизофрении (шизоаффективному психозу) свойственновсе следующее, КРОМЕ:А/ начало в зрелом возрасте (50-65 лет)В/ высокое качество ремиссийС/ аффективные приступы (депрессия или мания)Д/ онейроидно-кататонические приступыЕ/ мягкий медленно нарастающий эмоционально-волевой дефект

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: А

Параноидной форме шизофрении свойственно все следующее, КРОМЕ:А/ начало в молодом возрасте (20-35 лет)В/ наличие псевдогаллюцинацийС/ наличие бреда воздействияД/ среднепрогредиентное непрерывное течениеЕ/ выраженный мнестико-интеллектуальный дефект

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: Е

ИНТЕРМИССИИ считают характерной чертой:А/ обсессивно-фобического неврозаВ/ маниакально-депрессивного психозаС/ шизотипического расстройства (вялотекущей шизофрении)Д/ посттравматического стрессового расстройстваЕ/ энцефалопатии вследствие церебрального артериосклероза

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: В

СЛАБОДУШИЕ считают типичным проявлением:А/ обсессивно-фобического неврозаВ/ маниакально-депрессивного психозаС/ шизотипического расстройства (вялотекущей шизофрении)Д/ посттравматического стрессового расстройстваЕ/ энцефалопатии вследствие церебрального артериосклероза

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: Е

СЕНЕСТОПАТИЧЕСКИ-ИПОХОНДРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ считают типичным проявлением: А/ истерического невроза В/ маниакально-депрессивного психоза С/ шизотипического расстройства (вялотекущей шизофрении) D/ посттравматического стрессового расстройства Е/ энцефалопатии вследствие церебрального артериосклероза

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА обычно отмечается у больных с: А/ простой шизофренией В/ гебефренической шизофренией С/ кататонической шизофренией D/ параноидной шизофренией Е/ любой формой шизофрении

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

АПАТИКО-АБУЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ возникает в исходе: А/ простой шизофрении В/ гебефренической шизофрении С/ кататонической шизофрении D/ параноидной шизофрении Е/ всех перечисленных форм шизофрении

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

ПРОГРЕДИЕНТНО ПРОТЕКАЕТ: А/ простая шизофрения В/ гебефреническая шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ параноидная шизофрения Е/ любая из перечисленных форм шизофрении

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

ИСТОНЧЕНИЕ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА обычно выявляют у пациентов с: А/ непрерывной злокачественной шизофренией В/ приступообразно-прогредиентной шизофренией С/ рекуррентной (периодической) шизофренией D/ Любым типом течения шизофрении Е/ Ни при одном из вариантов шизофрении

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

ПРОДУКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА обычно не удается выявить у больных с: А/ простой шизофренией В/ гебефренической шизофренией С/ кататонической шизофренией D/ параноидной шизофренией Е/ любой формой шизофрении

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

ДЕПРЕССИВНЫЙ СИНДРОМ вероятнее всего возникает: А/ при непрерывной злокачественной шизофрении В/ при приступообразно-прогредиентной шизофрении С/ при рекуррентной (периодической) шизофрении D/ при вялотекущей (малопрогрессирующей) шизофрении Е/ Никогда не возникает у больных шизофренией

- A) A
- B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

МАНИАКАЛЬНЫЙ СИНДРОМ возникает у пациентов с: A/ непрерывной злокачественной шизофренией B/ приступообразно-прогредиентной шизофренией C/ рекуррентной (периодической) шизофренией D/ вялотекущей (малопрогрессирующей) шизофренией E/ сенестопатически-ипохондрической шизофренией

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

ГЕБЕФРЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ вероятнее всего возникает: A/ при непрерывной злокачественной шизофрении B/ при приступообразно-прогредиентной шизофрении C/ при рекуррентной (периодической) шизофрении D/ при вялотекущей (малопрогрессирующей) шизофрении E/ Никогда не возникает у больных шизофренией

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

ЛЮЦИДНАЯ КАТАТОНΙΑ – это проявление: A/ непрерывной злокачественной шизофрении B/ приступообразно-прогредиентной шизофрении C/ рекуррентной (периодической) шизофрении D/ вялотекущей (малопрогрессирующей) шизофрении E/ Ничего из перечисленного

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

Проявление РЕКУРРЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНИИ: A/ делирий B/ аменция C/ онейроид D/ сумеречное состояние E/ все перечисленные синдромы

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Типичный прогноз течения заболевания при развернутом синдроме Кандинского-Клерамбо: A/ прогрессирующее (нарастающее) течение B/ формирование лакунарного слабоумия C/ формирование тотального слабоумия D/ хроническое регрессирующее течение E/ полное выздоровление

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

Появление у больного негативной симптоматики: * подтверждает диагноз невроза * исключает диагноз шизофрении * подтверждает диагноз реактивного психоза * исключает диагноз любого психогенного заболевания

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Психогенное заболевание связано с эмоциональным стрессом * по времени возникновения * по проявлениям * по течению * по всему перечисленному

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Эмоциональный стресс играет важную роль в возникновении: * мании * дели-
рия * псевдодеменции * всего перечисленного

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Типичным исходом реактивных психозов является: * выздоровление * форми-
рование ремиссии * апатико-абулический дефект * длительное безремиссионное
непрогредиентное течение

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Нарушения плотания: * характерны для обсессивно-фобического невроза *
характерны для неврастений * характерны для истерии * при неврозах не
наблюдаются

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Самой частой причиной неврозов бывает: * окончательный разрыв с партнером
* длительная умственная нагрузка * внутриличностный конфликт * смерть
близкого человека

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Гипноз относят к группе методов психотерапии: * когнитивных * суггестивных
* бихевиоральных * психодинамических

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Лечение основанное на положительном и отрицательном подкреплении условного
рефлекса относят к психотерапии: * когнитивной * суггестивной * бихе-
виоральной * психодинамической

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Характерной чертой аффективно-шоковых реакций считают: * явление психиче-
ского автоматизма * дурашливость и кривляние * тоску и безысходность
* помрачение сознания

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Появление детского поведения на фоне тяжелого психотравмирующего события ха-
рактерно для: * неврозов * реактивной депрессии * истерических психозов
* аффективно-шоковой реакции

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Возникновению реактивного параноида способствует * воспитание в неполной семье * пребывание в иноязычной среде * работа с техническими устройствами * длительное воздержание от сексуальных контактов

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Сомато-вегетативные расстройства являются характерным проявлением: * истерии * неврастении * обсессивно-фобического невроза * любого невроза

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Закрепление в поведении больных неврозами патологических стереотипов, стремление приспособить свою жизнь к проявлениям болезни называют: * морально-этическим дефектом личности * невротическим развитием личности * внутриличностным конфликтом * личностным ростом

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

При лечении панических атак наиболее стойкий эффект наблюдают при назначении: * ноотропов * антидепрессантов * атипичных нейролептиков * сочетания всего перечисленного

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Большинству больных неврозом свойственно стремление: * избегать чрезмерных физических нагрузок * получить социальные выгоды от своей болезни * сохранить свой социальный статус и трудоспособность * делиться своими переживаниями со всеми окружающими

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Истерические расстройства обычно: * усиливаются в вечернее время * исчезают в присутствии посторонних * усиливаются на фоне изменений погоды * исчезают, если больной отвлекается или успокаивается

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Психотерапия эффективна при самых различных психических расстройствах, КРОМЕ: * реактивной депрессии * истерического невроза * гневливой мании * алкоголизма

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Для лечения расстройств личности лучше всего использовать методы психотерапии: * групповые * суггестивные * когнитивные * бихевиоральные

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Характерными проявлениями органических заболеваний считают расстройства: * восприятия и мышления * памяти и интеллекта * движений и эмоций * воли и влечений

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

К реакциям экзогенного типа относят: * депрессию * кататонию * делирий * манию

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

К типичным проявлениям болезни Альцгеймера относят * апатию и абулию * апраксию и дизартрию * моторную афазию и арефлексию * все перечисленное

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Лечение антихолинэстеразными средствами назначается при: * деменции с тельцами Леви * прогрессивном параличе * болезни Альцгеймера, * болезни Пика

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Лакунарное слабоумие характерно для пациентов с: * болезнью Пика * сосудистой деменцией * с травмами лобных долей мозга * прогрессивным параличом

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Утренние и ночные головные боли, сопровождающиеся рвотой довольно характерны для: * церебрального артериосклероза * внутричерепных опухолей * прогрессивного паралича * всех перечисленных поражений

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Характерной чертой эпилептической болезни считают: * нарастание эмоционально-волевого дефекта * быстрое прогрессирование * стереотипность приступов * стойкую утрату трудоспособности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Эпилептические припадки возникают: * при алкогольном абстинентном синдроме * на фоне интоксикации барбитуратами * при злокачественной шизофрении * только при эпилепсии

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Изменения личности при органических заболеваниях характеризуются: * замкнутостью и склонностью к рассуждательству * впечатлительностью и демонстративностью * медлительностью и взрывчатостью * страхом и подозрительностью

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Психические расстройства при различных инфекционных поражениях мозга: * зависят от особенности инфекционного агента * имеют временный обратимый характер * обычно выражаются в бреде и галлюцинациях * одинаковы при самых различных инфекциях

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Характерной чертой сосудистых заболеваний считают: * утрату критики к имеющимся расстройствам * раннее развитие апраксии * утренние головные боли * мерцание симптомов

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Характерным проявлением прогрессивного паралича считают симптом: * Павлова * Липмана * Маринеску-Радовичи * Аргайла Робертсона

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

На высокий риск внутричерепной опухоли указывает: * делирий на фоне лихорадки * отсутствие реакции зрачков на свет * апраксия в сочетании с дизартрией и гипомнезией * возникший впервые эпилептический припадок у взрослого

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Антибиотикотерапия показана при: * болезни Альцгеймера * деменции с тельцами Леви * болезни Крейтцфельда-Якоба * прогрессивном параличе

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Делирий вследствие травмы головы обычно возникает: * в остром периоде * на этапе реконвалесценции * в период отдаленных последствий * на всех этапах течения

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Хронические сердечные заболевания могут стать причиной: * депрессии * делирия * астении * всех перечисленных расстройств

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Эпилепсию следует заподозрить при возникновении у больного: * пассивности и апатии * явления психического автоматизма * периодической смены повышенного и сниженного настроения * стереотипно повторяющихся коротких периодов галлюцинирования

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Больным эпилепсией следует воздерживаться от: * приема алкоголя * сна в дневное время * жирной и жареной пищи * всего перечисленного

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Надежным признаком зависимости от ПАВ считают: * отсутствие защитных рефлексов * наличие абстинентного синдрома * возникновение эйфории на фоне приема * частое его употребление

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

На высокий риск употребления ПАВ указывает: * стремление обращаться за помощью к другим людям * самоуверенность, высокая самооценка * воспитание и проживание в многодетной семье * низкий IQ и социальная некомпетентность

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Характерным проявлением алкогольного абстинентного синдрома считают: * головокружение и гипотонию * апраксию и дизартрию * ларингоспазм и бронхоспазм * эпилептические припадки

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Характерное проявление I стадии алкоголизма: * обсессивное влечение к алкоголю * алкогольный абстинентный синдром * снижение толерантности к алкоголю * алкогольные психозы

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

К токсикомании относят зависимость от: * кодеина * циклодола * эфедрона * каннабиса

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Прием опиатов сопровождается: * галлюцинациями * мидриазом и тахикардией
* редким дыханием * слюнотечением и повышением аппетита

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Психозы вследствие употребления ПАВ чаще всего проявляются: * симптомами психического автоматизма * реакциями экзогенного типа * маниакальными и депрессивными эпизодами * нарушениями ассоциативного процесса

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Алкогольный делирий обычно возникает на фоне: * легкого опьянения * опьянения средней степени * тяжелого опьянения * абстинентного синдрома

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Алкоголизм стали рассматривать как многоуровневое заболевание, имеющее биологический субстрат: * в античное время * в эпоху ренессанса * в конце XVIII, начале XIX века * в XX веке

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Зависимость от ПАВ выражается: * повторными эпизодами асоциального поведения в состоянии опьянения * употреблением вещества, несмотря на наличие законодательного запрета на его продажу и медицинское применение * ухудшением физического здоровья после приема больших доз вещества * продолжением приема вещества, несмотря на сознание того, что это уже привело к негативным последствиям

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Гепатит С выявляют больше, чем у половины потребителей: * природных и синтетических опиатов * синтетических каннабиноидов * инъекционных наркотиков * одурманивающих газов и летучих растворителей

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Низкий риск употребления ПАВ отмечается у лиц: * неудовлетворенных своим физическим и психическим здоровьем * слабовольных с низким IQ и низким уровнем дохода * обращающихся за помощью для совместного преодоления проблем * свободных от соблюдения общественных норм, независимых от родителей

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Характерным проявлением алкогольной болезни считают: * атеросклероз венечных артерий и аорты * полинейропатию * гипотиреоз * гипогликемию

- A) 1
- B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Характерное проявление алкогольного абстинентного синдрома: * олигоурия и задержка мочеиспускания * тремор и нистагм * коллаптоидные состояния * волчий аппетит

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

К средствам аверсивной терапии относят: * тиамин * оксибутират натрия * дисульфирам * унитиол

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

К седативным наркотическим средствам относят: * фентанил * фенциклидин * бензодиазепины * каннабиноиды

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Угрожающими жизни расстройствами сопровождается: * синдром отмены опиатов * передозировка каннабиноидов * синдром отмены кокаина * синдром отмены седативных средств

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Патологическое опьянение проявляется: * эпилептиформными припадками * помрачением сознания * тремором, атаксией и нистагмом * сценopodobными галлюцинациями

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Женщина 33 лет жалуется на чувство пустоты и бессмысленности жизни. Вышла замуж в 23 года за кавказца, который ей очень понравился, хотела, чтобы он её полюбил, всячески его соблазнила. Потом одного за другим родила ему 4 детей. Муж целыми днями работает, чтобы прокормить семью. Дети здоровы, но отнимают у неё всё свободное время. Выйти на работу она не может. Мужа почти не видит, никуда не ходит развлекаться, только работает по дому. Она сокрушается "зачем мне такая жизнь?". Пациентка нуждается в:

A) приеме нейрорептиков

B) приеме антидепрессантов

C) приеме транквилизаторов

D) приеме ноотропов

E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 29 лет осмотрена врачом по инициативе родственников, потому что она отказывается ухаживать за здоровым сыном, который родился 3 недели назад. Тревожна, не может заснуть, если ей приносят ребенка, злится, говорит, что от него исходит "черная энергия", отказывается давать ему грудь, подозревает, что он является воплощением дьявола. Пациентка нуждается в:

A) приеме нейрорептиков

B) приеме антидепрессантов

C) приеме транквилизаторов

- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Женщина 29 лет осмотрена врачом по инициативе родственников, потому что она отказывается ухаживать за здоровым сыном, который родился 3 недели назад. Лежит, отвернувшись лицом к стене, ест после уговоров, говорит, что у неё нет сил, что она плохая мать, что ей не стоило заводить ребенка, что у неё в душе всё онемело, что она не может ничем помочь ребенку. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Женщина 45 лет не может заснуть, жалуется на тревогу и беспокойство. Работает заместителем главного врача поликлиники, накануне получила приказ вышестоящей организации, который она должна выполнить в трёхдневный срок, что, по её мнению, невозможно. Волнуется, боится за своё будущее, обдумывает всю ночь возможные варианты решения проблемы. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина 55 лет не может заснуть, потому что накануне молния ударила в трубу её дома. Ночью прислушивается к звукам, боится, что остаток трубы упадет. Рабочие сказали, что отремонтируют трубу через 3 дня. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина 37 лет жалуется на то, что её никто не понимает, и не поддерживает. Закончила медицинский вуз, сделала хорошую карьеру, была замужем, сейчас в разводе. Работает заместителем главного врача больницы. Два месяца назад поняла, что больница работает неэффективно, составила программу развития на следующие 35 лет, предложила построить над садом стеклянный купол, настаивает на введении в больнице "системы контроля качества". Возбуждена, много речива. Пациентка нуждается в:

- A) приеме ноотропов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 37 лет жалуется на то, что её никто не понимает, и не поддерживает. Закончила медицинский вуз, сделала хорошую карьеру, была замужем, сейчас в разводе. Работает заместителем главного врача больницы. Два месяца назад поняла, что больница работает неэффективно, составила программу развития на следующие 35 лет, предложила построить над садом стеклянный купол, настаивает на введении в больнице "системы контроля качества". Возбуждена, много речива. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Женщина 30 лет жалуется на "депрессию". Имеет высшее математическое образование, руководила фирмой по созданию компьютерных игр. Всегда нравилось разрабатывать «фантастическую реальность», однако в обычной жизни была замкнута, своей семьи нет. Фирма развивалась успешно. Два года назад потеряла интерес к работе, закрыла фирму, сидела дома, обдумывала своё будущее, строила планы, но ничего не делала. Отмечает, что в голове «слишком много мыслей», и она никак не может принять решение. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Женщина 42 года жалуется на тревогу, подавленность и нарушения сна. Невролог районной поликлиники неделю назад диагностировал у неё рассеянный склероз, была напугана, не хотелось жить. Прошла подробное обследование в университетской клинике, при котором рассеянный склероз был полностью отвергнут. Несмотря на это, часто думала об этой ситуации, не могла заснуть. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина 36 лет жалуется на страх езды в метро. Всегда была склонна к пониженной самооценке, отличалась ответственностью и неуверенностью. Месяц назад вагон метро остановился в туннеле, в этот момент «подкосились ноги», «прошиб пот», почувствовала беспомощность. С тех пор такое состояние возникает при каждом пользовании метро. По совету подруги принимала феназепам, но с этим лекарством была сонлива и не могла работать. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Девочка 12 лет жалуется на трудности обучения в школе. С 5 лет страдает эпилепсией, регулярно принимает противоэpileптические средства, последние 3 года припадков нет, но на электроэнцефалограмме остаются патологические знаки. Отмечает, что очень устает в школе, не может долго концентрировать внимание. Материал понимает только после индивидуального объяснения. Терапевт не обнаружил ничего опасного. Девочка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать девочки 4 лет просит о помощи, поскольку беспокоится по поводу её медленного развития. Начала произносить первые слова в 2 года, однако до сих пор говорит только короткими фразами. Ласкова и привязана к родителям, любит играть с другими детьми, но быстро устает, любит посидеть, часто спит днем несколько раз. Обычно засыпает, если читать ей книгу вслух. Неврологи и терапевты не обнаружили какого-либо заболевания. Девочка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать девочки 8 лет просит о помощи, поскольку девочка не справляется со школьной программой. В раннем детстве много болела, ходила в детский сад, но там не могла долго играть, иногда засыпала от усталости. Первый класс школы испытывала трудности, но учителя не ставили оценок и она не переживала. Во втором классе не может сосредоточить внимание, материал понимает только после индивидуального объяснения. Учителя жалуются, что она может заснуть на уроке. Неврологи и терапевты не обнаружили какого-либо заболевания. Девочка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать мальчика 4 лет просит о помощи, поскольку видит, что сын развивается с отставанием. Первые слова начал произносить в 2,5 года. Сейчас говорит фразами, но очень короткими и косноязычными. Ходит в туалет сам, но часто не удерживает мочу и кал. Недавно начали заниматься с логопедом, но он быстро устает, и не может долго работать над речью. У мальчика бедный словарный запас. Неврологи и терапевты не обнаружили какого-либо заболевания. Мальчик нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать мальчика 5 лет просит о помощи, поскольку после перенесенной месяц назад кори мальчик стал какой-то вялый. Прежде здоровье мальчика не вызывало никаких тревог, развивался нормально, был активным и веселым. Последнее время часто устает, бывает сонлив, не может досмотреть мультфильм до конца. Невролог при обследовании ничего особенного не выявил. Мальчик нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать мальчика 7 лет просит о помощи, поскольку мальчик испытывает трудности в учебе. С детства был болезненным и слабым. Основные функции формировались с легким отставанием. В детский сад не ходил, потому что часто простужался. Последние 4 месяца ходит в первый класс, однако не может долго концентрировать внимание. Пытается делать домашнее задание дома, но быстро устает и не может закончить. Мальчик нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Подросток 13 лет жалуется на трудности обучения в школе. Раньше учился на хорошо и отлично. Полтора месяца назад тяжело переболел корью, лечился в стационаре, 3 дня находился в интенсивной терапии. Выписан 3 недели назад, сразу пошел в школу, но на уроках часто болела голова, хотелось спать. После уроков так уставал, что совсем не мог делать домашнее задание. Не может читать и работать на компьютере. Неврологи и терапевты не обнаружили ничего серьезного. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 44 лет жалуется на утомляемость и ухудшение памяти. Месяц назад выписался из наркологического отделения, где проходил курс лечения от алкоголизма. С этого момента не пьет, физически чувствует себя достаточно крепким, аппетит не нарушен. Однако на работе быстро устает, иногда получает замечания за невнимательность и забывчивость. Сам замечает, что стало труднее понимать содержание документов. Неврологи и терапевты ничего при обследовании не обнаружили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 30 лет жалуется на утомляемость и ухудшение памяти. Месяц назад выписался из наркологического отделения, где проходил курс лечения по поводу зависимости от амфетаминов. Всё это время наркотиков не употребляет. Однако постоянно чувствует усталость, сонливость, порой голод. Пытался взбодрить себя кофе, но от него нет никакого толку. Неврологи и терапевты ничего при обследовании не обнаружили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 33 лет жалуется на утомляемость и ухудшение памяти. Месяц назад выписался из наркологического отделения, где проходил курс лечения по поводу зависимости от кокаина. Сейчас наркотиков не употребляет, но на работе не может сосредоточиться, иногда засыпает прямо на рабочем столе. Бывает забывчив и рассеян. Неврологи и терапевты ничего при обследовании не обнаружили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 42 лет жалуется на вялость и утомляемость. 3 месяца назад была проведена операция на сердечных клапанах с остановкой сердца и искусственным кровообращением. В реанимации после операции перенес кратковременный психоз, когда казалось, что попал на стройку. Психоз благополучно разрешился, полтора месяца назад выписан домой. Однако испытывает усталость, не может приступить к работе, много спит, жалуется на невозможность сконцентрировать внимание. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 55 лет жалуется на усталость и слабость. 2 месяца назад в критическом состоянии был госпитализирован по поводу ущемления пупочной грыжи. Иссечена некротизированная кишка, был помещен в реанимацию в связи с развивающимся перитонитом. Выписан 3 недели назад, не может выйти на работу, много спит, не может долго концентрировать внимание, часто требуется повторить сказанное несколько раз, чтобы он это запомнил. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 32 лет жалуется на слабость и ухудшение памяти. 3 месяца назад был госпитализирован по поводу инфекционного менингита. Несколько дней провел в реанимации. Выписан полтора месяца назад, однако не может выйти на работу, сохраняется слабость, чтение и просмотр телевизора вызывают головную боль и сонливость. Часто забывает то, о чем с ним говорили ранее. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорепарантов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 38 лет жалуется на слабость, сонливость и плохую память. 3 месяца назад попал в автомобильную катастрофу, были сломаны ребра и плечевая кость, обнаружено легкое сотрясение мозга. Наложено гипс, рекомендовано амбулаторное лечение. Дома ничем не может заниматься, устает, если пытается работать с бумагами и читать документы, много спит. Запоминает информацию только после повторения. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорепарантов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 38 лет жалуется на утомляемость и плохую память. 2 месяца назад попал в реанимацию после приема спиртосодержащего напитка. Выписан из больницы через 3 недели после госпитализации. С тех пор сохраняется утомляемость, ухудшилось запоминание, записывает необходимую информацию, испытывает трудности при чтении, поскольку не может вспомнить, что прочитал ранее. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорепарантов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 38 лет жалуется на утомляемость и плохую память. Последние 10 лет лечится от диабета, вводит регулярно инсулин, однако показатели крови не стабильны. Последние 3 месяца на фоне колебаний сахара крови, ухудшилось зрение, появилась утомляемость, ухудшилась память и работоспособность. Стал раздражителен, иногда срывается на ребенка. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорепарантов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Юноша 17 лет, жалуется на утомляемость и слабость. Всегда отлично учился, много лет занимался спортом, на занятиях по боксу 2 месяца назад получил травму головы. Диагностировано легкое сотрясение, рекомендовано амбулаторное лечение. В школу не ходит 2 месяца, при этом сохраняется головокружение, сонливость. Не может долго читать, закрывает двери, чтобы побыть в тишине. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорепарантов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 26 лет жалуется на слабость и утомляемость. 2 месяца назад в критическом состоянии была госпитализирована по поводу аппендицита, осложненного

перитонитом. Дважды проводилось оперативное лечение, находилась в интенсивной терапии. 3 недели назад выписана домой. На работу выйти не может, сохраняется сонливость, слабость, пытается делать работу по дому, но быстро устает. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 32 лет чувствует усталость и раздражительность после перенесенной травмы головы. 2 месяца назад упала, катаясь на сноуборде. При обследовании обнаружено легкое сотрясение, стационарное лечение не требуется. Всё это время сохраняется вялость и слабость, не может долго читать и смотреть телевизор, не может выйти на работу, много спит, если хочет чем-то заняться, то опять клонит в сон.. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 42 лет чувствует подавленность и раздражительность после перенесенного гриппа. В связи с осложнениями проходила стационарное лечение, выписана неделю назад. Не может выйти на работу, сохраняется вялость и слабость, не может долго читать и смотреть телевизор, много спит, громкие звуки вызывают раздражение. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 24 лет испытывает тревогу и подавленность в связи с семейными проблемами. Родилась на Кавказе, будучи студенткой медицинского вуза, по воле родителей вышла замуж за состоятельного земляка. После окончания вуза с отличием приехала в Москву учиться в ординатуре. Очень понравилось жить в столице, хочет заниматься научной работой и сделать карьеру в Москве. Муж требует, чтобы она после окончания ординатуры вернулась домой. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Девушка 26 лет испытывает тревогу и подавленность, поскольку не может выйти замуж. После окончания вуза пришла работать в офис, где было много мужчин, но они все были женаты. На неё обратил внимание полненький юноша низкого роста, но она любит только стройных и высоких. Пыталась найти жениха по интернету, но её постоянно обманывали. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 30 лет жалуется на нарушения координации движений и шаткость походки. С юности не любил работать, жил на деньги родителей. 5 лет назад женился на женщине, которая много работала, и могла содержать их обоих. Жаловался ей, что в Москве трудно найти работу. 9 месяцев назад родился ребенок,

который оказался нездоров. Жена решила оставить работу, и нашла хорошее место для мужа. Попытался выйти на работу, но на этом фоне возникли двигательные расстройства, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 35 лет испытывает подавленность, обусловленную тем, что 3 года назад после рождения ребенка его жена стала ночевать в комнате сына и их сексуальные отношения прекратились. Испытывает влечение к жене и любовь к ребенку, не хочет разводиться. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 56 лет просит назначить ему лекарственные препараты для подавления сексуального влечения, поскольку его жена постарела и больше не вызывает у него эротических чувств. Его привлекают более молодые женщины, но его моральные принципы не позволяют ему вступить с ними в отношения. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студент 22 лет просит назначить ему лекарственные препараты для подавления сексуального влечения, потому что его возлюбленная не допускает близости до брака, и всё время утверждает, что пока не готова к замужеству, просит его подождать ещё. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 46 лет испытывает подавленность после развода с мужем. Развод произошел по её инициативе, так она уличила мужа в измене. Муж просил прощения, клялся, что любит только её. Уже после развода несколько раз звонил, чтобы узнать, не передумала ли она. Пациентка испытывает одиночество, сочувствует мужу, который живет на плохо отапливаемой даче, но в душе не может простить его. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 46 лет испытывает подавленность, обусловленную семейной ситуацией. Несколько месяцев назад узнала, что у мужа есть любовница. Поняла, что если она скажет ему об этом, то придется разводиться. Решила сделать вид, что ничего не знает, так как боялась остаться одна. Но в душе очень переживает и ревнует. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения

Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 40 лет испытывает подавленность и ревность по отношению к сестре. Сестра моложе неё на 10 лет, её всегда баловали и оберегали. Последние 3 года пациентка ухаживает за больной матерью, которая вечно недовольна, и ругает пациентку за то, что она недостаточно заботлива и ласкова. Когда в гости приходит младшая сестра, мать всё время хвалит её и благодарит за ласку и заботу. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 62 лет испытывает подавленность в связи с тем, что вынуждена воспитывать своего внука, у которого есть проблемы с обучением. Дочь живет отдельно, несколько раз меняла мужей. Пациентка часто упрекала дочь в том, что она бросила на неё сына. Полгода назад у дочери появился мужчина, который предложил забрать сына у бабушки. Пациентка испугалась, что останется одна. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 33 лет никак не может забеременеть. Замужем с 23 лет, после вуза устроилась на престижную работу, зарабатывала намного больше мужа, сделала хорошую карьеру. Муж всё время пытается её управлять, но не всегда может это сделать, потому что зарабатывает меньше пациентки. Она боится, что с рождением ребенка и уходом с работы полностью попадет под давление мужа. Гинекологи не обнаруживают причин для бесплодия. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 57 лет испытывает подавленность, обусловленную тем, что 3 года назад её дочь вышла замуж за человека, который патологически требователен к чистоте. Он ругает её дочь каждый раз, когда родители навещают её, утверждает, что они приносят грязь, долго моет после этого пол. Дочь звонит матери и просит не приходить к ним домой. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 40 лет жалуется на приступы дурноты, сердцебиения и стеснения в области сердца. Замужем, не работает, так как у сына 15 лет проблемы со здоровьем и учебой. Муж любит возить семью отдыхать на море по дешевым путевкам, пациентка не любит жару и не хочет уезжать из дома. При этом не хочет отпускать мужа одного, так как боится измены. На этом фоне возникли описанные расстройства, терапевты при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студентка 25 лет жалуется на нарушения координации движений и шаткость походки. Единственная дочка в семье, мать работает медсестрой, всегда хотела, чтобы дочь стала врачом. Пациентка училась слабо, и сразу в вуз поступить не смогла. Поступила только на 4-й год по протекции. В вузе ей преподаватели указывали на слабую подготовку, говорили, что она не сможет учиться. На этом фоне возникли двигательные расстройства, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 30 лет жалуется на нарушения координации движений и шаткость походки. Пациентка замужем, но детей нет, так как считает, что у неё слабое здоровье. По этой же причине не работает. Месяц назад муж сообщил, что умерла мать его внебрачного ребенка 2 лет. Потребовал забрать ребенка к ним в семью. Пациентка, сказала, что ей нужно подготовиться к уходу за ребенком. На этом фоне возникли двигательные расстройства, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 29 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. 2 года назад развелась с мужем, потому что он был скучный и никуда не ездил, кроме дачи. Их 7-летнего сына воспитывают её родители. Познакомилась с женатым мужчиной 37 лет, пережила бурный роман. Потребовала, чтобы он бросил жену, но тот отказался, так как его жена была беременна. На этом фоне возникли приступы потери сознания, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 30 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Женат 7 лет, имеет дочь 6 лет. 3 года назад вступил в отношения с другой женщиной. Часто отсутствовал дома, говорил, что много работает, но денег домой приносил мало. В течение последнего месяца и жена, и любовница обе сообщили, что они беременны и собираются рожать. На этом фоне возникли приступы потери сознания, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студентка 20 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Родилась на Кавказе, поступила в московский вуз. Познакомилась с москвичом, по секрету от родителей вступила с ним в связь. Недавно родители позвонили и сказали, что нашли ей жениха. Потребовали, чтобы она бросила вуз и приехала на свадьбу. Не может признаться родителям в том, что потеряла девственность, не хочет уезжать из Москвы. На этом фоне возникли приступы потери сознания, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения

Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 20 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Родилась на Кавказе, в 18 лет была выдана замуж за москвича 35 лет. Вскоре забеременела, не работает, сидит дома с ребенком. У мужа в Москве много друзей, он хорошо зарабатывает, но дома бывает редко. Пациентка плохо говорит по-русски, в Москве никого не знает, целыми днями ждет возвращения мужа. Когда он приходит у неё начинается сердцебиение и темнеет в глазах. Терапевты патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студентка 17 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Воспитывалась матерью без отца, мать не отходила от дочери ни на минуту. Всю школу мать помогала дочери, делала с ней уроки. Вместе с дочерью переехала в Москву, когда та поступила в университет. Ходила с ней на экзамены, подсказывала ей через телефон. 2 недели назад дочь уехала на практику, где живет в лесу в палатке, она в ужасе от такой жизни, боится ходить в туалет. Все над ней смеются. На этом фоне стала падать в «обморок», неврологи патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 55 лет чувствует подавленность и тревогу за дочь 17 лет. С отцом дочери развелась 12 лет назад. Отказалась от алиментов, не разрешала дочери видеться с отцом. Много работала, зарабатывала на будущее дочери. Не отпускала её от себя, до последнего класса вместе с ней делала уроки. Дочь поступила в московский университет, пациентка бросила работу и живет в Москве на съемной квартире. Учеба у дочери идет с трудом, она жалуется, что к ней придираются, пациентка постоянно приходит в университет и требует «объективного» отношения к дочери. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 35 лет чувствует усталость и подавленность, не может понять причину этого. Никогда не испытывала большого удовольствия от секса с мужем. 7 лет назад родила сына и спала отдельно от мужа в комнате ребенка. 4 месяца назад муж настоял на том, что сын уже большой, и им следует спать вместе. Не может заснуть в постели с мужем, выгоняет его спать на кухню, часто жалуется на головные боли и дурноту. При обследовании у терапевта патологии не выявлено. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Девушка 25 лет испытывает подавленность, вызванную тем, что её сестра-близнец вышла замуж. С ненавистью относится к её мужу. Испытывает одиночество, считает, что сестра её предала. Злитесь на родителей, которые встали на сторону сестры. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов

- С) приеме ноотропов
- Д) приеме стабилизаторов настроения
- Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: Е

Женщина 35 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её родителями. Мать обнаружила письма, которые отцу писала любимая женщина на протяжении 30 лет, прогнала его из дома, запретила дочери произносить его имя. Отец живет на даче у друга, очень страдает от этого конфликта, винит жену в жестокости, ищет защиты у дочери. Пациентка нуждается в:

- А) приеме нейролептиков
- В) приеме антидепрессантов
- С) приеме ноотропов
- Д) приеме стабилизаторов настроения
- Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: Е

Мужчина 55 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом с родителями. 2 года назад оставил жену с 2 детьми и женился на 20-летней девушке. Родители встали на сторону бывшей жены, заботятся о внуках, а его не пускают к себе домой. К тому же общение с новой женой не всегда приносит удовольствие из-за большой разницы в возрасте. Пациент нуждается в:

- А) приеме нейролептиков
- В) приеме антидепрессантов
- С) приеме ноотропов
- Д) приеме стабилизаторов настроения
- Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: Е

Женщина 35 лет чувствует усталость и подавленность из-за отношений с матерью. Муж пациентки год назад погиб в автокатастрофе, после этого её мать переехала из далекого города жить к ней, чтобы «поддержать дочь». Очень тягостится присутствием матери в квартире, боится, что она помешает ей познакомиться с другим мужчиной. Боится, что останется незамужней. Пациентка нуждается в:

- А) приеме нейролептиков
- В) приеме антидепрессантов
- С) приеме ноотропов
- Д) приеме стабилизаторов настроения
- Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: Е

Женщина 55 лет, армянка по национальности, испытывает подавленность, вызванную тем, что её дочь вышла замуж за человека другой национальности, и поменяла веру. Не может дочери простить этого, и в то же время страдает от того, что не может с ней встречаться. Пациентка нуждается в:

- А) приеме нейролептиков
- В) приеме антидепрессантов
- С) приеме ноотропов
- Д) приеме стабилизаторов настроения
- Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: Е

Женщина 55 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её сыном и мужем. Сын 32 лет женился на чернокожей девушке из Африки, она родила ему дочь. Муж не принимает этот брак, запретил пациентке приходить на свадьбу, и не разрешает навещать внуку. Пациентка нуждается в:

- А) приеме нейролептиков
- В) приеме антидепрессантов
- С) приеме ноотропов
- Д) приеме стабилизаторов настроения
- Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: Е

Девушка 25 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её родителями и женихом. Её жених на 10 лет её старше, родители ненавидят его и не разрешают приводить его в их дом. У жениха финансовые трудности, и он пока не может снимать квартиру для них двоих. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 45 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её 20-летним сыном и новым мужем. 15 лет воспитывала сына одна. 2 года назад познакомилась с мужчиной, который на 2 года её моложе, но очень её любит. Год назад они поженились, и муж со своей собакой переехал жить к ним. Сын ненавидит этого мужчину, угрожает отравить его собаку. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 35 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между его женой и родителями. Родители требуют, чтобы он приезжал к ним на дачу, занимался огородом и ремонтом дома. Жена утверждает, что он не обязан это делать, и должен заниматься своей семьей. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 45 лет испытывает подавленность, вызванную тем, что сам он 8 месяцев не может найти работу, а его жена делает успешную карьеру, возложила на него все домашние обязанности, ругает его за плохо убранную квартиру и то, что ребенок не сделал домашнее задание. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 35 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что на его предприятии финансовые трудности, и ему 10 месяцев не платят зарплату, при этом заставляют работать больше, обещают заплатить потом. Работает на предприятии 20 лет, не хочет уходить с этой работы, так как очень к ней привык. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 39 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что между её мужем и 14-летним сыном дома развивается конфликт. Сын грубит, муж старается поставить его на место, строго наказывает, иногда бьет. Не хочет обижать ни мужа, ни сына, но не может изменить ситуацию. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 39 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что её 14-летний сын стал ей грубить, не пускает её в свою комнату. Воспитывала сына одна, души в нём не чаёт, хочет, чтобы он делился с ней своими секретами, боится его «потерять». Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 30 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что у родившегося ребенка обнаружили тяжелое неизлечимое расстройство, которое приведет к серьезной задержке его умственного развития. Отец ребенка почти не разговаривает с пациенткой, задерживается на работе, почти не подходит к ребенку. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 42 лет обратился с жалобами на подавленность, связанную с семейными обстоятельствами. Пациент женат, имеет двоих детей 16 и 20 лет, 3 месяца назад жена забеременела и сообщила, что сохранит этого ребенка. У пациента сложности на работе, и он решительно не хочет воспитывать маленького ребенка. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 40 лет обратился с жалобами на подавленность, обусловленную тем, что он, будучи женат, и имея 2 детей, вступил в связь с 20-летней сотрудницей, которая не ставила ему никаких условий. Неделью назад она сообщила, что беременна и собирается сохранить этого ребенка. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 38 лет обратилась с жалобами на подавленность после того, как она 3 месяца назад усыновила ребенка 5 лет. Своих детей нет, муж 3 года назад в возрасте 55 лет умер от рака. Привыкла жить одна, много работает в офисе. После того, как привезла ребенка домой, поняла, что она не готова быть матерью, но вернуть его в детский дом стыдно. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Пациент 35 лет обратился с жалобами на подавленность, недовольство своими отношениями с любимой женщиной. Его избранница в разводе, имеет дочь от первого брака, не готова к повторному браку. Говорит, что любит пациента, но часто встречается с бывшим мужем «по делам». Иногда делает это по секрету от пациента, потому что он сердится. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 36 лет обратился с жалобами на подавленность, возникшую после того, как ему предложили занять место руководителя. Всегда прилежно учился, был

исполнителен. Женат, во всем слушается свою жену. Всегда аккуратно выполнял распоряжения начальства, но сам принимать решения не любил. Испугался, когда ему предложили повышение по службе, сказал, что должен подумать, Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 32 лет обратился за помощью в связи с подавленностью. С детства отличался замкнутостью. После смерти мамы 8 лет назад живет один. Со школьных лет поддерживает отношения с одноклассницей, она приходила к нему 2-3 раза в неделю, но никогда не ночевала. 3 месяца назад по её настоянию они поженились. Ему сразу не понравилось присутствие в доме чужого человека, очень страдает, но не знает, как разрешить эту ситуацию. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Пациент 42 лет жалуется на тревогу и бессонницу, связанные с тем, что его жену госпитализировали по поводу патологически протекающей беременности. Они с женой ждут своего первого ребенка, плановый срок родов через 6 недель. По телефону жена сообщает, что чувствует себя плохо, врачи ничего определенного не говорят. Постоянно думает о жене, боится за неё и ребенка, не может спокойно спать, на работе чувствует тревогу и усталость. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Врач неврологического отделения переживает из-за того, что одна из пациенток постоянно предъявляет ему претензии, жалуется на него начальству, постоянно обсуждает его с другими пациентами и медперсоналом. Врач домой приходит вымотанным, долго не может уснуть по ночам, не чувствует отдыха после сна, днем не может спокойно работать из-за тревоги и усталости. Врач нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина жалуется на тревогу и бессонницу из-за того, что муж с двумя их детьми уехал отдыхать на море. Волновалась за детей, часто им звонила, ночью всё время думала о них, долго не могла заснуть, не могла дожидаться приезда. Днем чувствовала тревогу, не могла ни на чем сосредоточиться. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Выпускник вуза 24 лет, закончивший вуз с отличием, пошел на собеседование в престижную компанию. После собеседования ему сказали, что они примут решение в течение 10 дней. После этого не мог спать спокойно, очень хотел поступить на эту работу, днем чувствовал тревогу, не мог ни на чем сосредоточиться. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков

- В) приеме антидепрессантов
- С) приеме транквилизаторов
- Д) приеме антиконвульсантов
- Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: С

Ректор медицинского вуза летит в командировку на самолете. На соседнем кресле у молодого человека 28 лет внезапно возникает приступ одышки, сердцебиения, страха. Он судорожно хватается за грудь, просит о помощи. При осмотре признаков острой сердечной и легочной патологии не обнаружено. Пациент нуждается в назначении:

- А) нейролептика
- В) ноотропа
- С) транквилизатора
- Д) психостимулятора
- Е) солей лития

ANSWER: С

Бригаду скорой помощи вызвали в зал ожидания аэропорта к пациентке 36 лет, которая внезапно почувствовала дурноту, головокружение, слабость в руках и ногах, тревогу, страх смерти. Врачи кроме небольшой тахикардии не обнаружили ничего опасного. Пациентка нуждается в назначении:

- А) нейролептика
- В) ноотропа
- С) транквилизатора
- Д) психостимулятора
- Е) солей лития

ANSWER: С

Бригаду скорой помощи вызвали в торговый центр к пациентке 32 лет, которая без всякой причины внезапно почувствовала нехватку воздуха, сердцебиение, потемнение в глазах, озноб и страх смерти. "Покрылась холодным потом". Врачи кроме небольшой тахикардии не обнаружили ничего опасного. Пациентка нуждается в назначении:

- А) нейролептика
- В) ноотропа
- С) транквилизатора
- Д) психостимулятора
- Е) солей лития

ANSWER: С

Бригаду скорой помощи вызвали в метро к пациенту 24 лет, который внезапно в вагоне метро почувствовал духоту, сердцебиение, прилив жара и страх смерти. При осмотре опасного соматического заболевания не обнаружено. Пациент нуждается в:

- А) назначении нейролептика
- В) назначении ноотропа
- С) назначении транквилизатора
- Д) назначении психостимулятора
- Е) назначении солей лития

ANSWER: С

Пациент 48 лет устроился на новую работу, сотрудники отнеслись к нему с недоверием, не хотят принимать его в свой круг общения, намекают на недостаточную компетентность. Стал плохо спать по ночам. Утром, собираясь на работу испытывает тревогу, неуверенность в себе. Пациент нуждается в:

- А) приеме нейролептиков
- В) приеме антидепрессантов
- С) приеме транквилизаторов
- Д) приеме антиконвульсантов
- Е) приеме солей лития

ANSWER: С

Пациентка 40 лет 10 лет назад потеряла мужа из-за автокатастрофы. Одна воспитывает детей. После смерти мужа стала выпивать, последнее время пьет ежедневно. Поняла, что испытывает зависимость от алкоголя. Решила навсегда бросить пить, однако на этом фоне появились бессонница, тревога, сердцебиение.

На работе не может сосредоточиться, боится, что опять начнет выпивать. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 38 лет с молодости злоупотребляет алкоголем, от алкоголизма не лечился, но в семье постоянно возникают скандалы из-за его выпивок. Жена заявила, что разведется с ним, если он не бросит пить. Последние 2 дня не пьет, но чувствует себя очень плохо, не может уснуть по ночам, много курит, жалуется на приливы жара и сердцебиение. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 48 лет с молодости злоупотребляет алкоголем. Последнее время выпивает практически ежедневно. Понимает, что болен. Решил отказаться от спиртного полностью, но на этом фоне появились головные боли, бессонница, сердцебиение. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 48 лет был госпитализирован по поводу болей в животе. При обследовании был обнаружен рак желудка. Врачи сказали, что операция возможна, если нет метастазов. Больной проходит обследование. В настоящее время почти постоянно испытывает тревогу, долго не может заснуть, вспоминает всю свою жизнь, боится смерти. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 48 лет жалуется на тревогу и бессонницу, возникшую после того как его жену госпитализировали с острыми болями в спине. Врачи сказали, что нужна операция на позвоночнике, хотя случай тяжелый, и они опасаются последующего паралича. Решение об операции должно быть принято в течение следующей недели. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациентка 38 лет жалуется на тревогу и бессонницу. Проходит обследование у гинекологов, обнаружена киста яичника, врачи не могут исключить онкологическое заболевание. Операция будет проведена через 10 дней. Ходит на работу и выполняет свои обязанности, но вечером долго не может уснуть, и приходит на работу не отдохнувшей. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациентка 30 лет обратилась с жалобами на тревогу и бессонницу после того, как её мать была госпитализирована по поводу инфаркта миокарда. Врачи сказали, что инфаркт был тяжелым, и пока трудно говорить о прогнозе. Мать находится в реанимации и пациентку к ней не пускают. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациентка 30 лет обратилась с жалобами на тревогу и бессонницу после того, как у её 3-летнего сына обнаружили порок сердца и рекомендовали провести операцию. Ребенок проходит обследование в стационаре, больная дала согласие на операцию, но по ночам не может уснуть, боится за жизнь сына, представляет себе всё самое плохое. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной 55 лет перенес острый инфаркт миокарда, прошел успешное лечение, но врачи посоветовали сделать операцию на сосудах сердца. Запланировано провести операцию через 10 дней, в настоящее время стал плохо спать, лежит и обдумывает прошлую жизнь, не уверен в успехе операции. Днем чувствует себя не отдохнувшим, пытается читать, но не может сосредоточиться. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной 45 лет жалуется на бессонницу и тревогу, потому что через неделю на его предприятии запланирован аудит. Днем на работе активно готовится к аудиту, работает немного хаотично, но справляется. Вечером чувствует беспокойство и не может уснуть, обдумывает, что ему ещё нужно успеть. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной 45 лет поступил в гастроэнтерологическое отделение для лечения язвы желудка. При гастроскопии обнаружили участки подозрительные на онкологическое заболевание и взяли ткани на гистологическое обследование. Результаты будут готовы через неделю. Больной жалуется на то, что не может спать, думает о возможном раке. Днем не находит себе места. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больная 23 лет, студентка медицинского вуза, учится на отлично, имеет много друзей, занимается общественной работой, через полгода собирается выходить замуж за однокурсника. Месяц назад почувствовала усталость, через силу ходила на занятия, но ничего не усваивала, дома не могла заниматься, отказывалась от всех приглашений. Своему избраннику говорила, что он должен подумать, потому что она не такая хорошая, как казалась прежде. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 42 лет замужем, до 30 лет пыталась забеременеть, но ничего не получалось. Решили с мужем усыновить сразу двоих детей 2 и 5 лет. Сначала воспитание давалось с трудом, но потом все выправилось. Детям сейчас 14 и 17 лет, они любят родителей. Три месяца назад больная почувствовала подавленность, перестала справляться с работой по дому, плохо ела, рано просыпалась. Лежала и думала, что сделала много ошибок, что её дети будут несчастны, что она старая, и не сможет "поднять их на ноги". Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 35 лет замужем, до 30 лет пыталась забеременеть, но ничего не получалось. Решили с мужем усыновить сразу двоих детей 2 и 5 лет. Сначала воспитание давалось с трудом, но потом все выправилось. Детям сейчас 7 и 10 лет, они любят родителей. Три месяца назад больная почувствовала, что эти дети наполнены "черной энергией", что они исчадие Ада, заявила мужу, что их надо отдать назад, иначе она с ними "что-то сделает". Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больная 23 лет, студентка медицинского вуза, учится на отлично, имеет много друзей, занимается общественной работой, через полгода собиралась выходить замуж за однокурсника. Месяц назад почувствовала, что её однокурсники против неё что-то замышляют, что её любимый с ними заодно. Видела, как они переговариваются между собой, иногда хихикают. Перестала ходить в университет, не отвечала на звонки своего жениха. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больная 23 лет, выпускница медицинского вуза, училась на "хорошо" и "отлично", поступила в ординатуру, но поняла, что в отделении её не любят, потому что все сидят над историями болезни, постоянно пишут, и не обращают на неё внимание. Пряталась от всех в бельевой комнате, писала там истории болезни. Попросила перевести её в другое отделение, но там тут же почувствовала плохое отношение к себе. В кафе и на улице тоже видела неприятных людей, уходила из кафе, не съев заказанной пищи. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 35 лет, женат, имеет детей, счастлив в браке. 3 года назад в автокатастрофе погибли его родители. После этого почувствовал, что стал старше, что теперь несет ответственность за других. Два месяца назад почувствовал, что стал слабым, не может принимать решения, появились проблемы в сексе, похудел. Стал говорить, что виноват перед родителями и женой, что он не мужчина, а "тряпка". Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме бензодиазепиновых транквилизаторов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 42 лет в молодости много пил. Но его любимая сказала, что "не выйдет за алкоголика". Бросил пить 20 лет назад. Женаты около 20 лет, имеют 2 детей. Оба работают, семья обеспечена. Два месяца назад больной почувствовал упадок сил, работал через силу, похудел. Пытался снять это состояние алкоголем, но не получалось. Винил себя за то, что вернулся к выпивке, не мог признаться в этом жене. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме бензодиазепиновых транквилизаторов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 38 лет замужем, имеет четверых детей, младшему 9 лет. Последние 3 года вышла на работу "на полставки". Около полутора месяцев назад почувствовала усталость и подавленность. Уволилась с работы, не справлялась с обычной работой по дому. Муж и дети её берегли, и взяли всю работу на себя. Не чувствовала потребности в сексе, пропали месячные. Соматическое обследование не обнаружило патологии. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 55 лет успешный бизнесмен, женат, имеет двоих детей, был счастлив в браке. 2 месяца назад почувствовал, что совершил много ошибок в жизни, что его жена не была с ним счастлива. Одновременно снизилась потенция. Понял, что он постарел и теперь никуда не годен. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 29 лет имеет высшее образование и стабильную работу. Последние полтора года поддерживает отношения с девушкой, полгода назад стали жить вместе, назначили день свадьбы. Души не чаёт в своей избраннице, видит, как легко им жить вместе. Но месяц назад почувствовал, что он её недостойн, что не сможет прокормить семью, что она будет с ним несчастна. Долго терпел, но потом признался ей в этом, девушка сказала, что это всё ерунда. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 35 лет успешный бизнесмен, женат, имеет двоих детей. Три месяца назад поссорился со своими компаньонами, потому что понял, что они решили отнять у него бизнес. Выбросил из квартиры все компьютеры, телефоны и другие электронные устройства, потому что был уверен, что через них преследователи "скачивают информацию" о нем. Заставил жену собрать вещи и уехать жить на дачу. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития

- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 35 лет в молодости много пил. Его избранница заявила, что "не выйдет за алкоголика", бросил пить, женился, последние 10 лет не употребляет спиртного. Полгода назад понял, что испортил здоровье алкоголем, чувствует как у него "съежилась печень", показывает врачам, что у него "тают" руки и ноги, в области сердца испытывает непонятное чувство примагничивания. Накричал на жену, которая дала ему несколько капель спиртовой настойки валерианы. Заявил, что она хотела его отравить. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 42 лет имеет стабильную работу, жену и ребенка 5 лет. Мечтали с женой о втором ребенке, но это никак не получалось. Год назад жена забеременела, все были счастливы. За месяц до родов пациент почувствовал упадок сил, подавленность, не мог в этом признаться жене. Считал, что не сможет прокормить семью, после родов попросил друга о помощи, потому что сам не справлялся ни с чем. Похудел на 5 кг. Ночью спал очень плохо. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 28 лет последний месяц без какой-либо причины часто испытывает приступы страха. Приступы возникают обычно в утреннее время, могут продолжаться по 20-30 минут. В это время тело охватывает дрожь, начинается сердцебиение. Из-за этих приступов не может ходить в университет. Подавлен, не знает, что ему дальше делать. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 42 лет последний месяц печален. Без какой-либо причины стал задумываться о прошлой жизни. Стал вспоминать родителей, которых потерял ещё в детстве, понял, что плохо обращался с ними, был непослушным ребенком, принес им много горя. Понимал, что они уже умерли, и теперь этого никогда не исправить. Пациент нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 38 лет жалуется на тяжесть в груди и усталость. Такое состояние возникло 2 месяца назад без всякой причины. Похудел на 8 килограмм, аппетит плохой, заставляет себя есть. Телесное обследование у врачей не позволило выявить патологии. Считает, что он "уже никогда не выкарабкается". Пациент нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 30 лет после родов почувствовала упадок сил, не могла ухаживать за ребенком, винила себя в том, что решила завести второго ребенка. Ела после уговоров. Когда ребенок кричал, затыкала уши, но не подходила к нему. Просила забрать ребенка, а то "в голову лезут плохие мысли". Пациентка нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 42 лет без какой-либо причины почувствовал упадок сил. Попытался взять отпуск на работе, но дома ничего не мог делать, ночью спал плохо, на улицу почти не выходил, вспоминал свою жизнь с горечью, считал, что она не удалась. Пациент нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 32 лет, имеет финансовое образование, успешно работал в банке. Три месяца назад уволился, так как понял, что в банке замышляют козни против него, что его "хотят подвести под монастырь", видел, что на улице за ним следуют незнакомые люди, считал, что они связаны с банком. Закрывал окна шторами, видел на улице подозрительных людей. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной подозревает, что в банке, где он работает, в компьютерах завелся вирус, который "подключает людей к эфиру". Чувствует гудение и шорохи в голове, не может понять, какие движения совершает он сам, а какие наводит на него компьютер. Иногда слышит в голове какие-то разговоры незнакомых людей. Пытается понять, кто из сотрудников, находится с ним на связи. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной считает, что у его соседей есть "самогонный аппарат", который работает и днем и ночью. Постоянно слышит шум за стеной, не может спать, много раз жаловался в полицию, полицейские приходили, но ничего не слышали. Говорил, что соседи выключают аппарат на это время, но тут же включают, когда полиция уходит. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной чувствует, что у него под кожей ползают какие-то мелкие "твари", расчесывает кожу, рассматривает её под лупой. Обращается к врачам паразитологам для обследования, несмотря на отрицательные результаты уверен, что "там кто-то есть". Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов

- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной чувствует, что кто-то вмешивается в его мыслительный процесс, ворует мысли у него из головы, пытается вложить ему в голову посторонние мысли. Очень переживает в связи с этим, подавлен, временами не может заснуть, потому что мысли в голове «водят хороводы». Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 32 лет не умеет читать и писать, с детства развивался с отставанием, долго не умел ходить в туалет самостоятельно, потом научился, может есть и одеваться, из-за отставания не смог пойти в школу. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

У больного 72 лет последние 8 лет отмечаются серьезные проблемы с памятью, не может читать и смотреть кино, потому что не запоминает происходящего. Родных узнает, относится к ним дружелюбно, но тревожится, если остается один, потому что не знает, куда все ушли. Не знает текущей даты. Родственники не выпускают его на улица, так как он однажды заблудился. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: C

Больной 16 лет с младенчества развивался с отставанием, до сих пор не умеет ходить в туалет, ходит в "памперсах", глотает пищу, если его кормят, но сам держать ложку не может. Не узнает родителей. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

Больной 52 лет страдает с юности сахарным диабетом. 5 лет назад перенес гипогликемическую кому, находился в реанимации 2 недели. После этого стал беспомощным, не всегда понимает ситуацию, родных узнает, но путает их имена. Ест самостоятельно, ходит в туалет, но не может выполнять даже простой работы по дому. Ошибается в простом счете. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

Больной 42 лет многие годы злоупотреблял алкоголем. В возрасте 38 лет попал в реанимационное отделение после отравления спиртосодержащей жидкостью. После этого резко ухудшилась память и сообразительность, не смог продолжать работать. Живет с родными, выходит гулять возле дома, но дальше идти боится, так как не помнит дороги. Ошибается в простом счете. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов

- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 28 лет с детства развивался нормально, в 22 года попал в автомобильную катастрофу, после этого грубо нарушилась память, стал ошибаться в простом счете, говорит запинаясь, словарный запас бедный. Не смог учиться в университете. Любит гулять с родителями, но один выходить боится, потому что может заблудиться. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 52 лет много лет злоупотреблял алкоголем, после перенесенного 4 года назад острого психоза потерял память. Не запоминает новой информации, не помнит, что ему говорили только что. Дома ориентируется хорошо, но в незнакомом месте может заблудиться. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 47 лет находится под наблюдением психиатров с 25-летнего возраста. Университет не закончил из-за болезни, из дома почти не выходит, много курит, ест самостоятельно. Целыми днями лежит в своей комнате, ругается, когда кто-то к нему заходит. Не помогает престарелым родителям, но требует, чтобы они его кормили. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 55 лет находится под наблюдением психиатров с 22-летнего возраста. Раньше работал, но последние 20 лет сидит дома, ничего не делает, замкнут, равнодушен, ест достаточно. На вопросы отвечает односложно. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) психостимуляторов
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 42 лет находится под наблюдением психиатров с 20-летнего возраста. Говорит монотонно, неохотно отвечает на вопросы, часто говорит "не знаю", "мне всё рано". Эмоций не проявляет, равнодушен к близким, дома ничего не делает, только сидит на кухне и курит. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 35 лет находится под наблюдением психиатров с 16-летнего возраста. Пассивен и бездеятелен, не хочет выходить из дома, часто лежит в постели в одежде, к родителям обращается только если ему чего-нибудь нужно. Последнее

время растолстел, ест самостоятельно. Телевизор не смотрит. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 16 лет, с детства развивался с задержкой, с окружающими был дружелюбен. Дома одевается и ест самостоятельно. Не может запомнить, где право, и где лево. Считает на пальцах, не смог пойти в обычную школу. В специальной школе научился читать по слогам, и писать с ошибками. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 56 лет, три года назад перенес инсульт, всё забывает, родственников узнает, но не всегда может вспомнить их имя, по квартире передвигается с помощью родных, знает, где находится туалет, кухня и его комната. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Психофармакологические средства назначают в соответствии с:

- A) этиологией расстройства
- B) прогнозом заболевания
- C) ведущим синдромом
- D) типом личности больного
- E) данными лабораторного обследования

ANSWER: C

Больной постоянно слышит голос Бога, который не позволяет ему ходить на работу и в тренажерный зал. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Пациент уверен, что соседи мучают его с помощью аппарата, излучающего биологические поля, которые парализуют его волю. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает, что в его отсутствие в квартиру проникают люди, которые переставляют вещи, некоторые вещи забирают, позже возвращают их на место. Пациент нуждается в:

- A) приеме транквилизаторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме нейролептиков
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной не может выходить из дома, потому что уверен, что за ним ведется слежка "всем городом". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной молчит, не отвечает на вопросы, выплевывает пищу, подолгу сидит на корточках возле окна и прижимается к выключенной батарее отопления. В туалет ходит самостоятельно, ночью спит. Пациент нуждается в назначении:

- A) психостимуляторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной уверен, что ему подменили родителей, и вместо настоящих родителей в его квартире живут "диверсанты". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) лекарственное лечение малозффективно

ANSWER: C

Больной убежден, что врачи отделения это переодетые сотрудники спецслужб. Отказывается от общения с ними, считает, что другие пациенты отделения тоже следят за ним. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что на улице его постоянно преследуют неизвестные люди в "черных машинах". Стараются не выходить из дому. Показывает на машины, стоящие под окном, Уверен, что они ждут его. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной постоянно переговаривается с "людьми зорь", которые дают ему мысленные советы и рекомендации. Спрашивает у врачей, следует ли ему выполнять эти рекомендации Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной утверждает, что родители подсыпаю ему в пищу психотропные препараты, которые вызывают у него повышенное половое влечение. Ест только в кафе Макдональдс. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной утверждает, что к нему в голову проник сосед с верхнего этажа. Слышит его голос, который приказывает ему убить себя. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает, что в его отсутствие в квартиру проникают люди, которые переставляют вещи, некоторые вещи забирают, позже возвращают их на место. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной возбужден, убегает от воображаемых преследователей, отталкивает людей, стоящих у него на пути, не может ответить, кого именно он боится, растерян и испуган. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной обвиняет коллег по работе в том, что они специально наводят путаницу в документах, чтобы разозлить его, вывести из себя и заставить уволиться с работы. Видит, что и после работы в городе они преследуют его. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает, что в метро и на улице незнакомые люди обращают на него внимание, смотрят на него, но отводят взгляд, обсуждают его между собой, часто хихикают и подают знаки друг другу. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что в мире началась "психотронная война", что все люди зомбируются, действуют как роботы, боится, что он тоже попадет под действие оружия, спасается бегством. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной чувствует, что на землю явились "инопланетяне", пытается понять, кто из окружающих людей настоящий, а кто инопланетный. Тревожен, не может спокойно спать. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной спрашивает у врачей, правда ли то, что его отдали под суд, и приговорили к расстрелу. Лишь на короткое время успокаивается, после разговора с врачом, потом опять утверждает, что его скоро расстреляют. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной чувствует, что внутри него поселился дракон, чувствует течение крови по его венам и движение газов в его кишечнике. Очень страдает от этого. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больная считает, что её слабость связана с "выкачиванием энергии её мачехой". Грубит мачехе, требует "прекратить это безобразие". Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной считает, что ночью видит сны, которые не принадлежат ему. Сны ему "показывает", специально организованная группа экспериментаторов из США. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной выходит из электрички против своей воли не на своей станции, убежден, что его ноги переставляют с помощью гипноза. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной отказывается от еды, потому что "голоса в голове" запрещают ему есть, утверждают, что он может питаться их энергией и жить без еды. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной в автобусе против своей воли садится на свободное место, убежденный в том, что преследователи, находящиеся с ним на связи, его "посадили". Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

- С) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что за ним постоянно следят на улице, в разговорах соседей улавливает намеки на то, что его считают иностранным шпионом. В тексте афиши прочитал слова, написанные специально для него. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной не может спать на кровати, потому что неизвестные постоянно "бьют его током". Устроил себе постель в ванной, но иногда чувствует, что и там "покалывает током". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

В скором поезде по пути в другой город больной начал внезапно метаться по составу, кричать, говорить, что вокруг "все враги", пытается спрыгнуть с движущего состава. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что жена ему изменяет с внуком, запрещает дочери с зятем привозить к ним в дом своего сына. Не дает жене спать по ночам, требует признания в неверности. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что заразился СПИДом во время туристической поездки в Финляндию, где в ресторане ему официант с "хитрой улыбкой" подсунил тарелку с несвежей пищей. Не позволяет жене и детям подходить к себе, потому что по его коже "ползают вирусы". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной постоянно пишет обращения в прокуратуру и ФСБ с требованием проверить соседа по даче, потому что уверен, что тот у себя на участке строит атомную бомбу. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной постоянно обращается для обследования к паразитологам, потому что уверен, что на его коже обитают клещи разного цвета. Расчесывает кожу и показывает врачам какие-то мелкие частицы, которые считает "скопищем паразитов". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает себя великим изобретателем, показывает чертежи "вечного двигателя", самолета без крыльев, и автомобиля на древесном угле. Не обращает внимания на возражения и вопросы, уверен, что все его изобретения скоро у него купят за большие деньги. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной утверждает, что может усилием воли вызывать землетрясения, извержения вулканов и движение ледников. Винит себя в том, что в недавнем землетрясении погибло много людей.. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной чувствует, что может читать мысли окружающих, видит, как люди отвечают ему улыбкой на мысленные послания, способен лечить разные душевные и физические болезни, предлагает врачам свои услуги, отказывается возвращаться на работы, где он раньше был бухгалтером. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает себя сыном актрисы Мерил Стрип. Свою мать благодарит, что она его вырастила, но уверен, что он ей не родной. В качестве доказательства вспоминает ситуации из детства, когда его мать была строгой и наказывала его. Мечтает о встрече со "своей настоящей матерью". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной утверждает, что его врач - это Архангел Михаил, готов выполнять все его распоряжения, встает перед врачом на колени и смотрит на него с восхищением. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает себя слишком худым, требует от родителей покупать самую калорийную пищу, вычитал в книге, что после кастрации вес человека увеличивается. Просит провести ему кастрацию. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает, что его соседка колдунья, чувствует, как она напускает на него порчу, видит, что его руки и ноги высохли, пожелтели, чувствует слабость и зуд в заднем проходе. Приходил к соседке и угрожал ей сообщить в полицию, если она не прекратит этим заниматься. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной вдруг решил, что у него была много лет назад связь с его сотрудницей, и у них есть общий сын. Приходил домой к бездетной сослуживице и требовал, чтобы она показала ему их общего ребенка. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной всё время держит руку у носа, защищаясь от запаха гниения, который постоянно чувствует вокруг. Уверен, что этот запах ему передает сосед, который хочет завладеть его квартирой. Пишет на соседа жалобы. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больная скандалит с соседями и пишет на них жалобы в полицию, так как постоянно слышит из-за стены оскорбления в свой адрес: "дура, некрофилка, лощара". Пациентка нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежал из дома в одном белье и был остановлен полицией, при осмотре врачами заявил, что "что-то случилось". Не мог объяснить, что именно, не мог найти себе место, спрашивал врачей "что произошло", что будет дальше, просил защиты и спасения. С тревогой рассматривал всех окружающих. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Пациентка не спала несколько ночей, в возбуждении ходила по комнате, заявила, что 3-летний ребенок, приехавший в гости со своими родителями, это её ребенок. Пациентка нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов

- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Врач заявил начальству, что он остался единственным врачом на планете, несет ответственность за судьбы всех людей, чувствует, что может перемещаться между звездами. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной двигается медленно, временами застывает с поднятыми руками, на вопросы не отвечает, иногда повторяет сказанную врачом фразу. Не ест, при попытке накормить его зажимает рот. Пациент нуждается в назначении:

- A) солей лития
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) лекарственное лечение малозффективно

ANSWER: C

Больной жалуется, что у него тяжесть в груди, его ничего не радует, у него отсутствует аппетит, он плохо спит и жалуется на запор. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) нейролептиков
- C) психостимуляторов
- D) антидепрессантов
- E) ноотропов

ANSWER: D

Больной отмечает, что примерно раз в неделю у него бывают эпизоды, когда он «отключается» и непонятно каким образом оказывается в 10-15 минутах ходьбы от того места, где он отключился. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) ноотропов
- C) антиконвульсантов
- D) солей лития
- E) антидепрессантов

ANSWER: C

Больной отмечает, что последние 10 лет его настроение крайне нестабильно. Примерно по 2 месяца в год он испытывает то невероятный прилив энергии и болезненное возбуждение, по тоску, подавленность и нежелание жить. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) солей лития
- C) нейролептиков
- D) транквилизаторов
- E) ноотропов

ANSWER: B

Больной жалуется, что примерно 3 раза в неделю у него возникает внезапный страх смерти, сопровождающийся сердцебиением, потливостью, чувством жара. Такой приступ может продолжаться до часа. Больной боится пользоваться транспортом, так как ему может стать плохо. Пациент нуждается в длительном приеме:

- A) антидепрессантов
- B) нейролептиков
- C) солей лития
- D) транквилизаторов
- E) психостимуляторов

ANSWER: A

Больной беспокоится, что в связи с предстоящей операцией он не сможет уснуть. Думает об исходе операции, беспокоится, что не сможет сразу же вернуться к работе. Пациент нуждается в кратковременном назначении:

- A) нейролептиков
- B) транквилизаторов
- C) солей лития
- D) антидепрессантов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: B

Больной убежден, что у него имеется мыслительная связь с артистом Ширвиндтом. Он звонит и приходит в Театр Сатиры, чтобы предложить свои услуги, временами слышит голос артиста, который советует ему стать актером. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) антидепрессантов
- C) транквилизаторов
- D) ноотропов
- E) солей лития

ANSWER: A

В настоящее время в Российской Федерации запрещено применение: * депривации сна * фронтальной лоботомии * электросудорожной терапии * инсулинокоматозной терапии

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Депривация сна показана при: * панических атаках * психогенной депрессии * параноидной шизофрении * онейроидной кататонии

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Самый быстрый эффект на психопатологическую симптоматику оказывают: * антидепрессанты * транквилизаторы * ноотропы * тимостабилизаторы

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Зависимость развивается при длительном применении: * антидепрессантов * нейролептиков * транквилизаторов * солей лития

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Основной механизм действия нейролептиков: * блокада дофаминовых рецепторов * блокада ГАМК-рецепторов * потенцирование норадреналиновых рецепторов * потенцирование серотониновых рецепторов

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Галоперидол является производным: * фенотиазина * бутирофенона * тioxантена * бензамида

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Основной механизм действия антидепрессантов: * блокада NMDA-глутаматных рецепторов * блокада ГАМК-рецепторов * потенцирование рецепторов моноаминов * потенцирование ГАМК-рецепторов

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Показания к назначению транквилизаторов: * бред и галлюцинации * эндогенная депрессия * ситуационная тревога * расстройства памяти

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

В 1927 году была вручена Нобелевская премия создателю: * инсулинокоматозной терапии * электросудорожной терапии * психофармакотерапии * маляротерапии

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Инсулинокоматозная терапия эффективна в случае: * панических атак * эндогенной депрессии * острых приступов шизофрении * химических и нехимических зависимостей

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Электросудорожная терапия: * относится к методам высокого риска * высокоэффективна при тяжелой депрессии * часто вызывает необратимые изменения в мозге * применяется при злокачественных формах шизофрении

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

В скоромощной практике часто применяются: * трициклические и серотонинергические антидепрессанты * соли лития и антиконвульсанты * ноотропы и психостимуляторы * нейролептики и транквилизаторы

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Эффект антидепрессантов обычно развивается: * через 7-10 часов * через 2-3 суток * через 7-10 суток * через 2-3 недели

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Транквилизаторы (анксиолитики): * эффективны при эндогенной депрессии * рекомендуются для постоянного приема * провоцируют синдром отмены * повышают тонус мышц

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Антиконвульсанты показаны при: * кататонической шизофрении * биполярном расстройстве * задержках психического развития * истерическом неврозе

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Нейролептики обычно: * повышают артериальное давление * провоцируют рвоту и диарею * подавляют активность гипофиза * потенцируют действие анальгетиков

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

При приеме нейролептиков может развиваться угрожающая жизни: * экстрапиримидная симптоматика * обструкция дыхательных путей * гиперпродукция пролактина * гипертермия

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Угрожающие жизни осложнения при приеме в терапевтических дозах чаще всего вызывают: * атипичные нейролептики * трициклические антидепрессанты * ноотропы и ноотропоподобные средства * антиконвульсанты

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Больной чувствует прилив сил, перебивает собеседника, постоянно хвалится своими талантами, у него повышен аппетит. В разговоре с врачом делает нескромные сексуальные намеки. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) солей лития
- D) ноотропов
- E) психостимуляторов

ANSWER: C

Больной похудел за последний месяц на 7 кг, плохо спит по ночам. просыпается в 4 часа утра, до 5 часов вечера не может заставить себя поесть, на работе не может сосредоточиться, плохо справляется с работой, не получает удовольствия от общения с семьей и обычных развлечений. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) транквилизаторов
- C) антидепрессантов
- D) солей лития
- E) психостимуляторов

ANSWER: C

Больной замечает, что его кто-то преследует, видит, что люди перешептываются у него за спиной, смотрят на него косо. Пытается понять в чем он провинился, не знает, почему все обращают на него внимание, часто ходит таким маршрутом, чтобы уйти от преследования. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) солей лития
- C) нейролептиков
- D) транквилизаторов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной чувствует, что кто-то вмешивается в его мыслительный процесс, ворует мысли у него из головы, пытается вложить ему в голову посторонние мысли. Очень переживает в связи с этим, подавлен, временами не может заснуть, потому что мысли в голове «водят хороводы». Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) антидепрессантов
- C) транквилизаторов
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: A

Больной многие годы страдает сахарным диабетом, последнее время у него ухудшилась память, часто по несколько раз рассказывает родственникам одно и то же, забывает, что читал накануне, не может вспомнить номера телефонов, которые прежде знал наизусть. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) ноотропов
- C) психостимуляторов
- D) антидепрессантов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: B

Больной после перенесенной травмы головы стал жаловаться на утомляемость, ухудшение памяти, плохую способность концентрировать внимание, трудности при понимании сложных текстов. Пациент нуждается в назначении:

- A) ноотропов
- B) антидепрессантов
- C) транквилизаторов
- D) психостимуляторов
- E) солей лития

ANSWER: A

Первоклассник, всегда отличавшийся болезненностью и слабостью, испытывает большие трудности в школе, не может концентрировать внимание, быстро утомляется, позже других усваивает материал. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) психостимуляторов
- C) ноотропов
- D) транквилизаторов
- E) солей лития

ANSWER: C

Первоклассник многократно в течение дня внезапно застывает, смотрит в пустоту, не отвечает на вопросы, не реагирует на происходящее. Через несколько секунд приходит в себя, ничего не помнит о случившемся. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) ноотропов
- C) антиконвульсантов
- D) солей лития
- E) психостимуляторов

ANSWER: C

Больной прошел лечение по поводу алкоголизма, чувствует, что длительное злоупотребление алкоголем привело к ухудшению его памяти и сообразительности. Отмечает, что стал хуже справляться работой, больше устает. Хочет побыстрее восстановить силы. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) солей лития
- D) ноотропов
- E) нейролептиков

ANSWER: D

Больной переживает в связи с болезнью жены, у которой нашли рак, часто плачет, не может заснуть, после бессонной ночи чувствует себя разбитым, боится, что жена заметит его переживания. Когда приходит к ней в больницу, то старается улыбаться и подбадривать её, но дома часто бывает тревожен, невольно

возвращается к пугающим мыслям. Пациент нуждается в кратковременном назначении:

- A) ноотропов
- B) нейролептиков
- C) антидепрессантов
- D) транквилизаторов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: D

Больной постоянно винит себя в том, что бессмысленно прожил жизнь, считает, что виновен в смерти родителей, не видит перспективы в будущем, постоянно вспоминает совершенные им ошибки, ночью почти не спит, мечтает о том, чтобы заснуть и не проснуться. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) психостимуляторов
- D) ноотропов
- E) солей лития

ANSWER: B

Больной постоянно слышит голоса в голове, один из них ругает его, а другой хвалит и защищает, больной переживает в связи с этим, расстроен, печален, плохо спит. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) транквилизаторов
- C) нейролептиков
- D) солей лития
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Показания к назначению нейролептиков:

- A) возбуждение и агрессивность
- B) слуховые и зрительные галлюцинации
- C) бред преследования и воздействия
- D) мания и бред величия
- E) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению нейролептиков:

- A) тоска и подавленность
- B) бред и галлюцинации
- C) нарушения памяти и интеллекта
- D) апатия и абulia
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению антидепрессантов:

- A) панические атаки
- B) навязчивые мысли и навязчивые страхи
- C) психосоматические расстройства
- D) тоска и пониженная самооценка
- E) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению антидепрессантов:

- A) бред и галлюцинации
- B) задержка психического развития
- C) навязчивости и панические атаки
- D) приступы с помрачением сознания
- E) все перечисленное выше

ANSWER: C

Показания к назначению антидепрессантов:

- A) острый чувственный бред
- B) психосоматические расстройства
- C) нарушения памяти и интеллекта
- D) утомляемость и сонливость
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению транквилизаторов:

- A) ситуационная тревога
- B) бессонница
- C) состояние паники
- D) болезненная реакция горя
- E) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению транквилизаторов:

- A) тоска и депрессия
- B) тревога и бессонница
- C) мания и возбуждение
- D) бред и агрессия
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению транквилизаторов:

- A) сонливость и нарушение внимания
- B) ухудшение памяти и интеллекта
- C) нарушения координации движений
- D) тревога и бессонница
- E) все перечисленное выше

ANSWER: D

Показания к назначению ноотропов:

- A) астенический синдром
- B) расстройства памяти
- C) нарушения интеллекта
- D) задержка психического развития
- E) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению ноотропов:

- A) тоска и печаль
- B) навязчивые состояния
- C) панические атаки
- D) расстройства памяти
- E) все перечисленное выше

ANSWER: D

Показания к назначению ноотропов:

- A) задержка психического развития
- B) синдром психического автоматизма
- C) тревога и бессонница
- D) ангедония и идеи сморвинения
- E) все перечисленное выше

ANSWER: A

Показания к назначению солей лития:

- A) острый чувственный бред
- B) маниакальный синдром
- C) корсаковский синдром
- D) обсессивно-фобический синдром
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению солей лития:

- A) параноидная шизофрения
- B) истерическая психопатия
- C) биполярное расстройство
- D) генуинная эпилепсия
- E) все перечисленное выше

ANSWER: C

Показания к назначению солей лития:

- A) утомляемость и сонливость
- B) повышение настроения
- C) зависимость от психоактивных веществ
- D) синдром отмены алкоголя
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению антиконвульсантов:

- A) панические атаки
- B) биполярное расстройство
- C) судорожные припадки
- D) пароксизмальные психические расстройства
- E) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению антиконвульсантов:

- A) бред и галлюцинации
- B) обсессивно-фобический синдром
- C) утомляемость и сонливость
- D) биполярное расстройство
- E) все перечисленное выше

ANSWER: D

Показания к назначению антиконвульсантов:

- A) задержка психического развития
- B) пароксизмальные психические расстройства
- C) снижение аппетита и утреннее раннее пробуждение
- D) синдром психического автоматизма
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Психическая и физическая зависимость часто развивается при длительном приеме:

- A) психостимуляторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) солей лития
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: A

Психическая и физическая зависимость часто развивается при длительном приеме:

- A) антидепрессантов
- B) антиконвульсантов
- C) нейролептиков
- D) транквилизаторов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: D

Психическая и физическая зависимость часто развивается при длительном приеме:

- A) солей лития
- B) барбитуратов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: B

Врачи рекомендуют и считают безопасным длительный прием следующих средств:

- A) нейролептиков
- B) антидепрессантов
- C) антиконвульсантов
- D) солей лития
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: E

Врачи рекомендуют и считают безопасным длительный прием следующих средств:

- A) ноотропов
- B) нейролептиков
- C) антидепрессантов
- D) антиконвульсантов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: E

Врачи рекомендуют и считают безопасным длительный прием следующих средств:

- A) бензодиазепиновых транквилизаторов

- В) антидепрессантов
- С) барбитуратов
- Д) психостимуляторов
- Е) всех перечисленных средств

ANSWER: В

Мышечная скованность и тремор часто возникают при приеме:

- А) трициклических антидепрессантов
- В) бензодиазепиновых транквилизаторов
- С) типичных нейролептиков
- Д) барбитуратов и антиконвульсантов
- Е) всех перечисленных средств

ANSWER: С

Мышечная скованность и тремор часто возникают при приеме:

- А) нейролептиков
- В) солей лития
- С) ноотропов
- Д) транквилизаторов
- Е) всех перечисленных средств

ANSWER: А

Повышение аппетита и прибавка в весе часто возникают при приеме:

- А) солей лития
- В) психостимуляторов
- С) серотонинэргических антидепрессантов
- Д) атипичных нейролептиков
- Е) всех перечисленных средств

ANSWER: D

Повышение аппетита и прибавка в весе часто возникают при приеме:

- А) ноотропов
- В) транквилизаторов
- С) нейролептиков
- Д) солей лития
- Е) всех перечисленных средств

ANSWER: С

Мышечная слабость и нарушения координации движений часто возникают при приеме:

- А) трициклических антидепрессантов
- В) типичных нейролептиков
- С) солей лития
- Д) бензодиазепиновых транквилизаторов
- Е) всех перечисленных средств

ANSWER: D

Мышечная слабость и нарушения координации движений часто возникают при приеме:

- А) серотонинэргических антидепрессантов
- В) барбитуратов и транквилизаторов
- С) типичных и атипичных нейролептиков
- Д) ноотропов и психостимуляторов
- Е) всех перечисленных средств

ANSWER: В

Нейролептики: а) повышают настроение б) вызывают зависимость
с) блокируют рецепторы дофамина д) необратимо меняют личность пациента
е) все перечисленное выше верно

- А) а
- В) б
- С) с
- Д) д
- Е) е

ANSWER: С

Нейролептики: а) вызывают зависимость б) снижают выраженность эмоций
с) блокируют рецепторы глутамата д) оказывают на психоз симптоматическое действие
е) все перечисленное выше верно

- А) а

- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Нейролептики: a) повышают настроение b) провоцируют синдром отмены c) блокируют рецепторы глутамата d) оказывают на психоз патогенетическое действие e) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: D

Нейролептики: a) при длительном приеме не провоцируют толерантность b) необратимо меняют личность пациента c) активизируют систему ГАМК d) вызывают зависимость e) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Нейролептики: a) не вызывают зависимость b) снижают выраженность эмоций c) блокируют рецепторы дофамина d) оказывают на психоз патогенетическое действие e) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Показания для назначения нейролептиков включают: a) суицидальное поведение b) психомоторное возбуждение c) бред, галлюцинации и кататонию d) расстройства мышления и поведения при неврозах e) всё перечисленное

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Показания для назначения нейролептиков включают: a) задержки психического развития b) суицидальное поведение c) корсаковский синдром d) астенический синдром e) всё перечисленное

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Показания для назначения нейролептиков включают: a) суицидальное поведение b) психомоторное возбуждение c) пассивность вследствие шизофрении d) психосоматические и неврологические расстройства e) всё перечисленное

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Нейролептики НЕ СПОСОБНЫ: a) улучшать настроение депрессивных больных b) активизировать больных с мягким дефектом c) контролировать бред и галлюцинации d) купировать психомоторное возбуждение e) предотвращать новые приступы болезни

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Нейролептики НЕ СПОСОБНЫ: a) лечить соматические и неврологические расстройства b) активизировать больных с мягким дефектом c) контролировать бред и галлюцинации d) купировать психомоторное возбуждение e) снижать частоту судорожных припадков

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Нейролептики НЕ СПОСОБНЫ: a) лечить соматические и неврологические расстройства b) подавлять тревогу и суицидальное поведение c) улучшать когнитивные функции при деменции d) купировать психомоторное возбуждение e) контролировать бред и галлюцинации

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Нейролептики могут: a) лечить соматические и неврологические расстройства b) подавлять тревогу и суицидальное поведение c) купировать психомоторное возбуждение d) контролировать бред и галлюцинации e) делать всё перечисленное

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Нейролептики могут: a) снижать частоту судорожных припадков b) улучшать когнитивные функции при деменции c) активизировать больных с мягким дефектом d) улучшать настроение депрессивных больных e) делать всё перечисленное

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Нейролептики могут: a) купировать алкогольный абстинентный синдром b) корректировать поведение при психопатиях c) улучшать настроение депрессивных больных d) улучшать когнитивные функции при деменции e) делать всё перечисленное

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Структура личности, которая в наибольшей степени определяется биологическими факторами: * роль * характер * темперамент * направленность

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Гармоничная личность характеризуется: * высокой стеничностью * экстравертированной позицией * хорошей адаптацией в обществе * низкой вероятностью ошибок в принятии решений

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Психопатия это личность: * с чрезмерной выраженностью некоторых черт * патологически сформировавшаяся в детстве * преобразованная прогрессирующим заболеванием * видоизменившаяся вследствие исключительных обстоятельств

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Важным диагностическим признаком психопатии является: * прогредиентность * пассивная подчиняемость * амбивалентность * тотальность

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Слабость воли и безответственность – это характерная черта психопатии: * параноидной * шизоидной * неустойчивой * ананкастной

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Психологическая защита в форме регрессии и конверсии характерна для психопатов: * возбудимых * истерических * параноидных * шизоидных

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Изменения личности вследствие органических заболеваний характеризуются: * замкнутостью и пассивностью * сужением круга интересов * ухудшением памяти и понимания * эмоциональной холодностью и равнодушием

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Вязкость в сочетании со взрывчатостью – это характерная черта изменений личности вследствие: * шизофрении * эпилепсии * алкоголизма * церебрального атеросклероза

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Скорость, сила и подвижность психических процессов определяется понятием: * характер * направленность * самооценка * темперамент

- A) 1
- B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

И.П.Павлов разделял личности на: * стеничные и астеничные * экстраверти-
рованные и интровертированные * художественные и рационально-логические
* конформные и неконформные

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Клинический метод диагностики личности предполагает в первую очередь анализ:
* планов и чаяний пациента * мимики и пантомимики * суждений больного
о самом себе * поступков пациента

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Акцентуированная личность: * не делает выводов из совершенных ошибок *
отличается низкой адаптацией * является вариантом здоровой личности *
склонна к частым конфликтам и декомпенсациям

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Психопатии, в происхождении которых значительную роль играют биологические и
наследственные факторы называются: * возбудимыми * крайними * ядер-
ными * тормозимыми

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

К группе тормозимых психопатов относятся личности: * дистимичные * пара-
ноидные * неустойчивые * эксплозивные

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Подозрительность, злопамятность и ревность характерны для психопатов: *
шизоидных * параноидных * неустойчивых * истерических

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Для неустойчивых психопатов характерны: * колебания настроения * низкая само-
оценка и самообвинение * замкнутость и боязнь посторонних * слабость
воли и безответственность

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Изменения личности вследствие шизофрении предполагают: * злобность и агрес-
сивность * пассивность и эмоциональную холодность * чувствительность и
сентиментальность * ухудшение памяти и понимания

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Следствием долго существующего биполярного расстройства может стать: *
патологическое развитие личности * психопатия (расстройство личности) *
изменение личности * личностная деградация

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Частота психических расстройств у детей составляет человек на 1000: * - 1 * -
5 * - 10 * - 20

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Частота психических расстройств в детском возрасте: * выше у младенцев
* выше у мальчиков * выше у девочек * не зависит от возраста и пола

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Умственная отсталость регистрируется у детей с аутизмом с частотой: * 20 %
* 40 % * 60 % * 80 %

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью в большинстве случаев является
следствием: * генетической предрасположенности * несбалансированного пи-
тания * неправильного воспитания в семье * острых стрессов в дошкольном
возрасте

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Наследуемым генным дефектом, сцепленным с полом является синдром: * Дауна
* Мартина-Белл * Клайнфельтера * Шерешевского-Тернера

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Половая функция грубо нарушена при: * наличии лишней X хромосомы *
наличии лишней Y хромосомы * синдроме Мартина-Бэлл * фенилкетонурии

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

В психотерапии детей чаще всего используются методики: * психодинамические
* когнитивные * бихевиоральные * групповые

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

В 6 лет при весе около 25 кг ребенку обычно назначают по сравнению со взрослым: * десятую часть дозы * пятую часть дозы * треть дозы * половину дозы

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Среди детей, которые страдают заиканием до 5 лет, после первого года учебы в школе прекращают заикаться около: * 20 % * 40 % * 60 % * 80 %

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

В большинстве случаев первичный энурез бывает обусловлен: * инфекциями, перенесенными в дошкольном возрасте * семейными конфликтами и дисгармониями * наследственной предрасположенностью * несбалансированной диетой

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Синдром Жилья де ля Туретта проявляется: * умственной отсталостью в степени дебильности * умственной отсталостью в степени имбецильности * множественными тиками в сочетании с копролалией * низкой способностью к невербальной коммуникации

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Есть все основания считать, что детский аутизм обусловлен: * инфекциями, перенесенными в дошкольном возрасте * семейными конфликтами и дисгармониями * наследственной предрасположенностью * несбалансированной диетой

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

В первую очередь для коррекции поведения при детском аутизме используются: * ноотропы * антидепрессанты * психостимуляторы * педагогические методики

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Детская шизофрения отличается от аутизма наличием: * расстройств речи * когнитивных нарушений * двигательных стереотипий * прогрессирования и периодов ремиссий

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью часто связывают с наличием: * лишней X хромосомы * минимальной мозговой дисфункции * дефицита антидиуретического гормона * пониженного порога судорожной готовности

- A) 1
- B) 2
- C) 3

D) 4

ANSWER: B

Если оба родителя имеют признаки олигофрении, риск повторного возникновения умственной отсталости в семье составляет около: * 20 % * 40 % * 60 % * 80 %

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

У подавляющего большинства лиц с синдромом Дауна регистрируется: * идиотия * имбецильность * дебильность * пограничная задержка умственного развития

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

В лечении детских расстройств хорошую эффективность в сочетании с безопасностью продемонстрировали небольшие дозы: * ноотропов * нейролептиков * антидепрессантов * бензодиазепиновых транквилизаторов

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Уолтер Б. Кэннон связывал реакцию на стресс в первую очередь с работой: * лобных долей мозга * сердечной мышцы * надпочечников * щитовидной железы

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

По шкале Холмса и Рейха наиболее стрессовым событием является: * смена должности * женитьба * смерть друга * уход на пенсию

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Наибольшим успехом в жизни характеризуются люди, которые рассматривают препятствия как: * постоянные внешние * внешние неконтролируемые * внутренние контролируемые * временные неконтролируемые

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Для разрешения межличностного конфликта рекомендуют: * обсуждать проблемы в коллективе * жестко придерживаться своей позиции * соблюдать дистанцию между конфликтующими * не афишировать детали обсуждения, которые вызывают раздражение

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Саул Розенцвейг считал, что полезнее всего: * добиваться желаемого результата всё равно какой ценой * взять на себя вину за то, что потребность не удовлетворена * сохранять самообладание и освободиться от чувства вины * наказать виновного в том, что потребность не удовлетворена

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

К активным стратегиям преодоления относят: * дистанцирование * планирование * самоконтроль * избегание

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Психологическая защита: * является активной стратегией преодоления * направлена на достижение поставленной цели * проявляется психологической слепотой и бездействием * рассматривается, как сознательный отказ от удовлетворения потребности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

К зрелым механизмам психологической защиты относят: * регрессию * вытеснение * сублимацию * расщепление

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Ганс Селье подробно описал: * типы внутриличностного конфликта * общий адаптационный синдром * синдром эмоционального выгорания * стратегии преодоления фрустрации

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Эмоциональное выгорание чаще всего развивается у: * членов многодетных семей * работающих в финансовом секторе * работников помогающих профессий * лиц, склонных к внутреннему локусу контроля

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Интерналы обычно: * винят во всем окружающих * проявляют терпение и самообладание * уверены, что могут добиться желаемого * в трудных ситуациях впадают в оцепенение

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Курт Левин называл конфликт «желаемое-желаемое»: * витальным * эквивалентным * амбивалентным * интерперсональным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Наибольшей адаптации способствуют стратегии преодоления направленные на: * наказание виновных * сохранение самообладания * инструментальное решение * эмоциональное отреагирование

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

К пассивным коупинг-стратегиям относят: * планирование * конфронтацию * дистанцирование * принятие ответственности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Диссоциацию и обесценивание относят к механизмам психологической защиты: * примитивным * невротическим * зрелым * постоянным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Лица, склонные к сублимации обычно: * демонстрируют признаки депрессии и дистимии * подвержены психосоматическим заболеваниям * провоцируют межличностные конфликты * здоровы и хорошо адаптированы

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Для преодоления межличностного конфликта следует: * скрывать свои истинные чувства * отстаивать интересы, а не позицию * давать свободу своим чувствам и порывам * договариваться с противником «с глазу на глаз»

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Крайне неприятное эмоциональное состояние, обусловленное блокадой чрезвычайно актуальной или доминирующей потребности человека, называют: * сублимацией * фрустрацией * аффилиацией * конфронтацией

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Зигмунд Фрейд рассматривал психосоматическую болезнь как: * психологическую защиту * разновидность невроза * разновидность психоза * результат фиксации

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Концепция «locus minoris resistentiae» была предложена: * Гансом Селье * Романом Лурия * Альфредом Адлером * Францем Александером

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Концепция «общего адаптационного синдрома» была предложена: * Гансом Селье * Романом Лурия * Альфредом Адлером * Францем Александером

- A) 1
- B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Концепция «внутренней картины болезни» была предложена: * Гансом Селье * Романом Лурия * Альфредом Адлером * Францем Александером

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

К психосоматозам относят: * маскированную депрессию * гипертоническую болезнь * истерическую конверсию * импотенцию

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

К психосоматозам относят: * маскированную депрессию * ипохондрическую шизофрению * диссоциативное расстройство * неспецифический язвенный колит

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

К психосоматозам относят: * язвенную болезнь * соматогенный делирий * диссоциативное расстройство * синдром приобретенного иммунодефицита

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Опрятность и пунктуальность весьма характерны для лиц с: * неспецифическим язвенным колитом * атопической бронхиальной астмой * ревматоидным артритом * мигренью

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

К типичным органическим соматопсихическим расстройствам относят: * апатию * делирий * сенестопатии * деперсонализацию

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

К типичным органическим соматопсихическим расстройствам относят: * апатию * амбивалентность * деперсонализацию * астенический синдром

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

К типичным органическим соматопсихическим расстройствам относят: * астению * делирий * галлюциноз * все перечисленное

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

К типичным органическим соматопсихическим расстройствам относят: * синдромы помрачения сознания * нарушения целенаправленности мышления * усиление и извращение влечений * суточные колебания настроения

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Злокачественные опухоли и хронические деструктивные заболевания внутренних органов нередко приводят к: * конверсии * депрессии * Obsessions * апатии

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Характерным проявлением маскированной депрессии является: * дневная сонливость * артериальная гипотония * неспособность получать удовольствие * эмоциональная холодность и отгороженность

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Характерным проявлением маскированной депрессии является: * мышечная гипотония * тошнота и рвота * повышение аппетита * тахикардия и запоры

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Характерным проявлением маскированной депрессии является: * головокружение и обмороки * дуоденальные эрозии * артериальная гипертензия * сенситивная атаксия

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Истерические соматические и неврологические расстройства обычно: * усиливаются к вечеру * исчезают, если пациент отвлекается * возникают и исчезают по воле пациента * сопровождаются появлением патологических рефлексов

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Истерические соматические и неврологические расстройства обычно: * усиливаются утром * исчезают по воле пациента * развиваются у тревожно-мнительных личностей * усиливаются, если на них обращают внимание

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Психосоматические расстройства, с точки зрения психоаналитиков, часто являются следствием: * амбивалентности * алекситимии * антедонии * астении

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Роман Альбертович Лурия подробно описал понятие: * алекситимии * locus minoris resistentiae * маскированной депрессии * внутренней картины болезни

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Сексуальные расстройства обычно являются проявлением: * психосоматоза * эндокринного психосиндрома * психоорганического синдрома * психосоматической дисфункции

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Маскированная депрессия часто проявляется: * пассивностью и безразличием * внутренним локусом контроля * аменореей и импотенцией * перееданием и рвотой

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Высокой выносливостью отличаются люди: * работающие, аккуратные и пунктуальные * с внешним локусом контроля * готовые к переменам и состязанию * хладнокровные и независимые

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Элизабет Кюблер-Росс считала, что одной из стадий принятия смерти является: * гнев * апатия * регрессия * альтруизм

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Чрезвычайно странное и трудноописуемое ощущение внутри тела, иногда сопровождающееся чувством сделанности, называется: * конверсией * сенестопатией * ангедонией * неврастением

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Астенический синдром является примером типичного: * психосоматоза по М.Блейлеру * соматопсихического расстройства * этапа принятия смерти по Э. Кюблер-Росс * проявления депрессии по В.П.Протопопову

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Чрезмерное внимание к своему здоровью, стремление рассматривать малозначимые явления, как признаки опасных болезней, называют: * ангедонией * ипохондрией * алекситимией * сенестопатией

- A) 1
- B) 2
- C) 3

D) 4

ANSWER: B

Неспособность выразить словами свои внутренние переживания называют: *

ангедонией * ипохондрией * алекситимией * сенестопатией

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Необычные трудноописуемые ощущения внутри тела, напоминающие соматические расстройства, называют: *

ангедонией * ипохондрией * алекситимией

* сенестопатией

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Неоправданную озабоченность своим соматическим здоровьем и стремление получить помощь врача-интерниста называют: *

ангедонией * ипохондрией *

алекситимией * сенестопатией

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Характерную для депрессивных больных, утрату способности получать удовольствие от чего-либо называют: *

ангедонией * ипохондрией *

алекситимией * сенестопатией

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Характерным симптомом неврастения является: *

ангедония * конверсия * подозрительность

* раздражительность

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕК УНАСЛЕДОВАЛ ОТ ЖИВОТНЫХ, ОНИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАНЫ -считают сторонники концепции:

A) бихевиоральной

B) психодинамической

C) гуманистической

D) социобиологической

E) когнитивной

ANSWER: D

В СВОЕМ ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕК, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, РУКОВОДСТВУЕТСЯ РАЗУМОМ И ТЕОРИЯМИ -считают сторонники концепции:

A) бихевиоральной

B) психодинамической

C) гуманистической

D) социобиологической

E) когнитивной

ANSWER: E

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДЕТЕРМИНИРОВАНО ЕГО ОПЫТОМ, ПОЛУЧЕННЫМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ -считают сторонники концепции:

A) бихевиоральной

B) психодинамической

C) гуманистической

D) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: В

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТСЯ ПУТЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ –считают сторонники концепции:

А) бихевиоральной

В) психодинамической

С) гуманистической

Д) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: А

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ СТРЕМЛЕНИЯ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ –считают сторонники концепции:

А) бихевиоральной

В) психодинамической

С) гуманистической

Д) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: С

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТСЯ ПУТЕМ НАУЧЕНИЯ И КОПИРОВАНИЯ ПОСТУПКОВ РОДИТЕЛЕЙ –считают сторонники концепции:

А) бихевиоральной

В) психодинамической

С) гуманистической

Д) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: А

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ ЭВОЛЮЦИИ, ЕГО ПОВЕДЕНИЕ НЕСЕТ НА СЕБЕ ЧЕРТЫ ЕГО ПРЕДКОВ –считают сторонники концепции:

А) бихевиоральной

В) психодинамической

С) гуманистической

Д) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: D

ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВУЕТ СОЗНАТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ СВОИХ ТЕОРИЙ И ПРОГНОЗОВ –считают сторонники концепции:

А) бихевиоральной

В) психодинамической

С) гуманистической

Д) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: E

ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, ЧЕЛОВЕК НЕ ОСОЗНАЕТ МОТИВЫ СВОИХ ПОСТУПКОВ, ИМ УПРАВЛЯЮТ СИЛЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО –считают сторонники концепции:

А) бихевиоральной

В) психодинамической

С) гуманистической

Д) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: В

ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЕТ СВОБОДНОЙ ВОЛЕЙ, ОН САМ ТВОРИТ СВОЕ СЧАСТЬЕ И СВОЁ НЕСЧАСТЬЕ –считают сторонники концепции:

А) бихевиоральной

В) психодинамической

С) гуманистической

Д) социобиологической

Е) когнитивной

ANSWER: С

По мнению З.Фрейда, за моральный контроль поведения отвечает:

А) ИД

В) ЭГО

С) СУПЕР-ЭГО

ANSWER: C

По мнению З.Фрейда, принципом удовольствия руководствуется:

- A) ИД
- B) ЭГО
- C) СУПЕР-ЭГО

ANSWER: A

По мнению З.Фрейда, принципом реальности руководствуется:

- A) ИД
- B) ЭГО
- C) СУПЕР-ЭГО

ANSWER: B

По мнению З.Фрейда, полностью погружено в подсознание и не представлено в сознании:

- A) ИД
- B) ЭГО
- C) СУПЕР-ЭГО

ANSWER: A

По мнению З.Фрейда, подстраивание поведения под меняющиеся условия и возникающие новые возможности осуществляет:

- A) ИД
- B) ЭГО
- C) СУПЕР-ЭГО

ANSWER: B

По мнению З.Фрейда, испытывать муки совести человека заставляет:

- A) ИД
- B) ЭГО
- C) СУПЕР-ЭГО

ANSWER: C

По мнению З.Фрейда, стремление к кокетству, украшению себя, привлечению внимания окружающих является результатом фиксации:

- A) на оральной стадии
- B) на анальной стадии
- C) на фаллической стадии
- D) на латентной стадии
- E) на генитальной стадии

ANSWER: C

По мнению З.Фрейда, стремление к порядку и аккуратности является результатом фиксации:

- A) на оральной стадии
- B) на анальной стадии
- C) на фаллической стадии
- D) на латентной стадии
- E) на генитальной стадии

ANSWER: B

По мнению З.Фрейда, стремление к накопительству и жадность являются результатом фиксации:

- A) на оральной стадии
- B) на анальной стадии
- C) на фаллической стадии
- D) на латентной стадии
- E) на генитальной стадии

ANSWER: B

По мнению З.Фрейда, стремление сосать, грызть и кусать является результатом фиксации:

- A) на оральной стадии
- B) на анальной стадии
- C) на фаллической стадии
- D) на латентной стадии
- E) на генитальной стадии

ANSWER: A

По мнению З.Фрейда, стремление болтать, кричать и сквернословить является результатом фиксации:

- A) на оральной стадии
- B) на анальной стадии
- C) на фаллической стадии
- D) на латентной стадии
- E) на генитальной стадии

ANSWER: A

По мнению З.Фрейда, сильный Эдипов комплекс человек переживает:

- A) на оральной стадии
- B) на анальной стадии
- C) на фаллической стадии
- D) на латентной стадии
- E) на генитальной стадии

ANSWER: C

По мнению З.Фрейда, пубертатный возраст знаменует вступление человека в:

- A) оральную стадию
- B) анальную стадию
- C) фаллическую стадию
- D) латентную стадию
- E) генитальную стадию

ANSWER: E

По мнению З.Фрейда, возраст 2 года приходится на:

- A) оральную стадию
- B) анальную стадию
- C) фаллическую стадию
- D) латентную стадию
- E) генитальную стадию

ANSWER: B

По мнению З.Фрейда, возраст 5 лет приходится на:

- A) оральную стадию
- B) анальную стадию
- C) фаллическую стадию
- D) латентную стадию
- E) генитальную стадию

ANSWER: C

По мнению З.Фрейда, возраст 8 лет приходится на:

- A) оральную стадию
- B) анальную стадию
- C) фаллическую стадию
- D) латентную стадию
- E) генитальную стадию

ANSWER: D

По мнению А.Адлера, хранителем традиций в семье является:

- A) первенец
- B) средний ребенок
- C) младший ребенок

ANSWER: A

По мнению А.Адлера, самый сильный комплекс неполноценности переживает:

- A) первенец
- B) средний ребенок
- C) младший ребенок

ANSWER: C

По мнению А.Адлера, самыми сильными лидерскими качествами обладает:

- A) первенец
- B) средний ребенок
- C) младший ребенок

ANSWER: A

По мнению А.Адлера, зависть и соперничество больше всего свойственны:

- A) первенцу
- B) среднему ребенку
- C) младшему ребенку

ANSWER: B

Радость человека вследствие выигрыша в соревновании - это проявление его:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: D

Желание взрослой женщины, чтобы её пожалела мама после тяжелого рабочего дня – это проявление её:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: E

Желание преподавателя выглядеть солидно перед своими учениками – это проявление его:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: E

Умение человека сохранять спокойствие в любой ситуации – это проявление его:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: A

Стремление человека всё делать четко и аккуратно – это проявление его:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: B

Леность и безалаберность человека – это проявление его:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: B

Запасливость и бережливость человека – это проявление его:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: B

Любовь к философии – это проявление:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния
- E) роли

ANSWER: C

Доброта и заботливость человека – это проявление его:

- A) темперамента
- B) характера
- C) направленности
- D) состояния

Е) роли

ANSWER: В

Религиозность человека - это проявление его:

А) темперамента

В) характера

С) направленности

Д) состояния

Е) роли

ANSWER: С

В структуру ЛИЧНОСТИ входит все следующее, КРОМЕ: А/ нарушение гормонального баланса В/ отношение к самому себе С/ отношение к деньгам и работе Д/ увлечения, интересы и склонности человека Е/ убеждения и мировоззрение

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: А

По мнению сторонников БИХЕВИОРИЗМА: А/ каждый человек должен преодолеть в себе комплекс неполноценности В/ личность формируется в соответствии с системой наказаний и наград С/ личность формируется в противоборстве сексуальности и совести Д/ высшей целью человека является стремление к идеалу и самореализации Е/ черты характера во многом определяются положением индивида в семье (например, тем, каким по счету ребенком он является)

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: В

З.Фрейд (1856-1939) считал, что: А/ каждый человек должен преодолеть в себе комплекс неполноценности В/ личность формируется в соответствии с системой наказаний и наград С/ личность формируется в противоборстве сексуальности и совести Д/ высшей целью человека является стремление к идеалу и самореализации Е/ черты характера во многом определяются положением индивида в семье (например, тем, каким по счету ребенком он является)

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: С

В соответствии с ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ З.Фрейда личность формируется в результате: А/ научения, положительного и отрицательного подкрепления В/ прямого запечатления (импринтинга) С/ генетического наследования Д/ поэтапного удовлетворения сексуального влечения (либидо) Е/ реализации стремления человека к внутреннему идеалу и удовлетворения потребности в самоуважении

А) А

В) В

С) С

Д) Д

Е) Е

ANSWER: D

Альфред Адлер (1870-1937) считал, что: А/ человеком движет конфликт комплекса неполноценности и жажды власти В/ у каждого человека есть определяющая личность "стержневая черта" С/ многие психические качества человека унаследованы им от животных Д/ высшей целью человека является самопознание и самосовершенствование Е/ личность человека определяется соотношением процессов возбуждения и торможения в его мозге

А) А

В) В

С) С

D) D

E) E

ANSWER: A

Альфред Адлер (1870–1937) считал, что: A/ личность формируется путем научения, поощрения и наказания B/ у каждого человека есть определяющая личность "стержневая черта" C/ многие психические качества человека унаследованы им от животных D/ высшей целью человека является самопознание и самосовершенствование E/ черты характера во многом определяются положением индивида в семье (например, тем, каким по счету ребенком он является)

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Точнее всего использовать для описания понятия ПИКНИК – ЦИКЛОТИМИК следующие слова: A/ вертлявый, угловатый, независимый, натянутый, жесткий, серьезный B/ душевный, приятный, широкий, открытый, полный жизни, материальный C/ восторженный, впечатлительный, наивный, ищущий признания, инфантильный D/ стеснительный, ищущий одобрения, ответственный, аккуратный E/ решительный, порывистый, мужественный, агрессивный, властный

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Точнее всего использовать для описания понятия ИСТЕРОТИМИК ГРАЦИЛЬНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ следующие слова: A/ вертлявый, угловатый, независимый, натянутый, жесткий, серьезный B/ душевный, приятный, широкий, открытый, полный жизни, материальный C/ восторженный, впечатлительный, наивный, ищущий признания, инфантильный D/ стеснительный, ищущий одобрения, ответственный, аккуратный E/ решительный, порывистый, мужественный, агрессивный, властный

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Точнее всего использовать для описания понятия АТЛЕТ – ЭПИЛЕПТОИД следующие слова: A/ вертлявый, угловатый, независимый, натянутый, жесткий, серьезный B/ душевный, приятный, широкий, открытый, полный жизни, материальный C/ восторженный, впечатлительный, наивный, ищущий признания, инфантильный D/ стеснительный, ищущий одобрения, ответственный, аккуратный E/ решительный, порывистый, мужественный, агрессивный, властный

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Точнее всего использовать для описания понятия АСТЕНИК – ШИЗОИД следующие слова: A/ вертлявый, угловатый, независимый, натянутый, жесткий, серьезный B/ душевный, приятный, широкий, открытый, полный жизни, материальный C/ восторженный, впечатлительный, наивный, ищущий признания, инфантильный D/ стеснительный, ищущий одобрения, ответственный, аккуратный E/ решительный, порывистый, мужественный, агрессивный, властный

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

Термины ВИСЦЕРОТОНИЯ – СОМАТОТОНИЯ – ЦЕРЕБРОТОНИЯ предложил использовать:А/ В.ШелдонВ/ З.ФрейдС/ К.Г.ЮнгD/ А.АдлерЕ/ И.П.Павлов

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Термин МЕЛАНХОЛИК предложил использовать:А/ ГиппократВ/ Р.ДекартС/ К.Г.ЮнгD/ Р.КеттелЕ/ А.Адлер

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Термин ИНТРОВЕРСИЯ предложил использовать:А/ ГиппократВ/ З.ФрейдС/ К.Г.ЮнгD/ Г.Ю.АйзенкеЕ/ А.Адлер

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Термин ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА предложил использовать:А/ ГиппократВ/ З.ФрейдС/ И.П.ПавловD/ Э.КречмерЕ/ В.Шелдон

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Сангвинический темперамент характеризуется:А/ смелостью и злопамятностьюВ/ чувствительностью и пессимизмомС/ оптимизмом и неутомимостьюD/ инфантильностью и впечатлительностьюЕ/ задумчивостью и замкнутостью

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Понятие ЭКСТРАВЕРСИЯ означает:А/ внимание к чужому мнению, стремление к общению, открытостьВ/ опору на впечатление и интуицию при принятии решения, яркое выражение своих эмоцийС/ неуверенность, склонность к сомнениям, боязнь неудачиD/ склонность к логическому анализу и рассудочной деятельностиЕ/ замкнутость, самостоятельность во взглядах, опору на собственное мнение

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Понятие ПРЕОБЛАДАНИЕ ПЕРВОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ означает:А/ внимание к чужому мнению, стремление к общению, открытостьВ/ опору на впечатление и интуицию при принятии решения, яркое выражение своих эмоцийС/ неуверенность, склонность к сомнениям, боязнь неудачиD/ склонность к логическому анализу и рассудочной деятельностиЕ/ замкнутость, самостоятельность во взглядах, опору на собственное мнение

- A) A
- B) B
- C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Понятие ПРЕОБЛАДАНИЕ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ означает: A/ внимание к чужому мнению, стремление к общению, открытость B/ опору на впечатление и интуицию при принятии решения, яркое выражение своих эмоций C/ неуверенность, склонность к сомнениям, боязнь неудачи D/ склонность к логическому анализу и рассудочной деятельности E/ замкнутость, самостоятельность во взглядах, опору на собственное мнение

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

Понятие ИНТРОВЕРСИЯ означает: A/ внимание к чужому мнению, стремление к общению, открытость B/ опору на впечатление и интуицию при принятии решения, яркое выражение своих эмоций C/ неуверенность, склонность к сомнениям, боязнь неудачи D/ склонность к логическому анализу и рассудочной деятельности E/ замкнутость, самостоятельность во взглядах, опору на собственное мнение

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Под ПИКНИЧЕСКИМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕМ понимают: A/ округлые пропорции, большой живот, теплую мягкую ладонь B/ вытянутые пропорции, длинный нос, заостренный подбородок C/ маленький рост, хрупкое сложение, детское выражение лица D/ крепкий костяк, зрелый "мужиковатый" вид, мощный торс E/ лоб выступающий вперед, чрезмерно длинные руки, неправильный прикус, отвисший живот

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

Под ЛЕПТОСОМНЫМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕМ понимают: A/ округлые пропорции, большой живот, теплую мягкую ладонь B/ вытянутые пропорции, длинный нос, заостренный подбородок C/ маленький рост, хрупкое сложение, детское выражение лица D/ крепкий костяк, зрелый "мужиковатый" вид, мощный торс E/ лоб выступающий вперед, чрезмерно длинные руки, неправильный прикус, отвисший живот

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Под ГРАЦИЛЬНЫМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕМ понимают: A/ округлые пропорции, большой живот, теплую мягкую ладонь B/ вытянутые пропорции, длинный нос, заостренный подбородок C/ маленький рост, хрупкое сложение, детское выражение лица D/ крепкий костяк, зрелый "мужиковатый" вид, мощный торс E/ лоб выступающий вперед, чрезмерно длинные руки, неправильный прикус, отвисший живот

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Определите автора, предложившего следующий термин: АСТЕНИЧНЫЙ A/ Гиппократ B/ Дж.Браунс C/ К.Г.Юнг D/ И.П.Павлов E/ А.Адлер

A) A

- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Меланхолический темперамент характеризуется: A/ смелостью и злопамятностью B/ чувствительностью и пессимизмом C/ щедростью и гедонизмом D/ инфантильностью и впечатлительностью E/ спокойствием и замкнутостью

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

ЛЮБОВЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОМИНИРОВАНИЕ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ характерны для: A/ атлета - эпилептоида B/ пикника - циклотимика C/ астеника - шизотимика D/ истеротимика грацильного телосложения E/ Всех перечисленных выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

КОЛЕБАНИЯ НАСТРОЕНИЯ ОТ ДРУЖЕЛЮБИЯ ДО ГНЕВА характерны для: A/ атлета - эпилептоида B/ пикника - циклотимика C/ астеника - шизотимика D/ истеротимика грацильного телосложения E/ Всех перечисленных выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

ИНТРОВЕРСИЯ (замкнутость) характерна для: A/ атлета - эпилептоида B/ пикника - циклотимика C/ астеника - шизотимика D/ истеротимика грацильного телосложения E/ Всех перечисленных выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Заболевания, которые весьма характерны для ЭПИЛЕПТОИДА - АТЛЕТА: A/ гипертоническая болезнь, подагра, холецистит, атеросклероз B/ травмы, инфекции, протекающие с гиперреакцией C/ язвенная болезнь, чувствительность к боли, ипохондрия D/ соматические и неврологические функциональные расстройства E/ простудные заболевания, риниты и отиты

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Заболевания, которые весьма характерны для ШИЗОТИМИКА - АСТЕНИКА: A/ гипертоническая болезнь, подагра, холецистит, атеросклероз B/ травмы, инфекции, протекающие с гиперреакцией C/ язвенная болезнь, чувствительность к боли, ипохондрия D/ соматические и неврологические функциональные расстройства E/ злокачественные опухоли и гематобластозы

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

Е) Е

ANSWER: С

Заболевания, которые весьма характерны для ПИКНИКА - ЦИКЛОТИМИКА:А/ гипертоническая болезнь, подагра, холецистит, атеросклерозВ/ травмы, инфекции, протекающие с гиперреакциейС/ язвенная болезнь, чувствительность к боли, ипохондрияD/ соматические и неврологические функциональные расстройстваЕ/ злокачественные опухоли и гематобластозы

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: А

Заболевания, которые весьма характерны для ИСТЕРОТИМИКА ГРАЦИЛЬНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ:А/ гипертоническая болезнь, подагра, холецистит, атеросклерозВ/ травмы, инфекции, протекающие с гиперреакциейС/ язвенная болезнь, чувствительность к боли, ипохондрияD/ соматические и неврологические функциональные расстройстваЕ/ злокачественные опухоли и гематобластозы

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: D

ЕДА И ОБЩЕНИЕ ДОСТАВЛЯЮТ НАИБОЛЬШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ, ГЛУБОКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ для:А/ атлета - эпилептоидаВ/ пикника - циклотимикаС/ астеника - шизотимикаD/ истеротимика грацильного телосложенияЕ/ Всех перечисленных выше

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: В

ДЕТСКОСТЬ и ИНФАНТИЛИЗМ весьма характерны для: А/ атлета - эпилептоидаВ/ пикника - циклотимикаС/ астеника - шизотимикаD/ истеротимика грацильного телосложенияЕ/ Всех перечисленных выше

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: D

ДЕМОНСТРАТИВНОСТЬ весьма характерна для:А/ атлета - эпилептоидаВ/ пикника - циклотимикаС/ астеника - шизотимикаD/ истеротимика грацильного телосложенияЕ/ Всех перечисленных выше

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: D

В психологии КОНСТИТУЦИЕЙ называется:А/ характерное для индивидуума соотношение биологических и физиологических особенностей, влияющих также на его психологические чертыВ/ система социальных отношений (к другим, к труду, к себе, к вещам)С/ тип телосложения, определяемый соотношением роста и массы телаD/ комплекс важнейших интересов, склонностей, убеждений человекаЕ/ лишенная логики неосознаваемая готовность воспринимать, эмоционально оценивать окружающих и ситуацию и действовать определенным образом

А) А

В) В

С) С

D) D

E) E

ANSWER: A

Юноша 26 лет с детства любил компании, иногда выпивал с друзьями. Последние три года ни с кем не общается, бросил институт, холоден с родителями, редко выходит из дома. У ДАННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: А/ расстройства личности (психопатии) В/ изменений личности вследствие эпилепсии С/ изменений личности вследствие шизофрении D/ изменений личности вследствие алкоголизма Е/ патологического развития личности у взрослого

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Типичные проявления изменений личности вследствие ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЗГА: А/ бессмысленный смех, завышенная самооценка, расточительность В/ пассивность, равнодушие, лень, замкнутость, интерес к философии С/ быстрая утомляемость, медлительность, эгоцентризм, вспыльчивость мелочность, внимание к бытовым вопросам D/ безответственность, утрата стыдливости, неразборчивость в контактах Е/ тревожность, исполнительность, склонность к самообвинению

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Странности и чудачества, которые наблюдаются у человека с детства, но не приводят к нарушению его адаптации, НАЗЫВАЮТ: А/ акцентуацией личности В/ развитием личности С/ изменением личности D/ расстройством личности (психопатией) Е/ патологической реакцией здоровой личности

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

Стойкое усиление тревожности и осторожности у человека, длительно страдающего заболеванием сердца, НАЗЫВАЮТ: А/ акцентуацией личности В/ развитием личности у взрослого С/ изменением личности D/ расстройством личности (психопатией) Е/ острой реакцией на стресс

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Стойкие нарушения поведения, наблюдавшиеся у больного с детства, оставшиеся причиной правонарушений и алкоголизма, НАЗЫВАЮТ: А/ акцентуацией личности В/ развитием личности у взрослого С/ изменением личности D/ расстройством личности (психопатией) Е/ острой реакцией на стресс

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

Резкое заострение прежних черт личности, повышение утомляемости, появление сентиментальности и слезливости ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ: А/ изменений личности вследствие шизофрении В/ изменений личности вследствие эпилепсии С/ изменений личности вследствие алкоголизма D/ изменений личности вследствие поражения сосудов мозга Е/ К изменениям личности не относят

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Патологическое развитие личности – это: A/ прогрессирующая утрата прежних интересов и склонностей B/ коренная ломка прежних личностных черт C/ изменение поведения вследствие ухудшения памяти и понимания D/ закрепление в поведении имевшихся прежде стереотипов E/ направление усилий в сторону бесполезных для общества действий

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Нарастающие утомляемость, медлительность, взрывчатость, несдержанность, склонность к повторениям в речи, эгоцентризм ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ: A/ шизоидной психопатии B/ изменений личности вследствие шизофрении C/ изменений личности вследствие алкоголизма D/ изменений личности вследствие органического поражения мозга E/ Не рассматривают как патологию

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Нарастающее безразличие, утрата взаимопонимания с близкими родственниками, неожиданное увлечение религией и философией ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ: A/ изменений личности вследствие шизофрении B/ изменений личности вследствие эпилепсии C/ изменений личности вследствие алкоголизма D/ изменений личности вследствие поражения сосудов мозга E/ К изменениям личности не относят

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Нарастающая педантичность, требовательность, чрезмерное внимание к деталям, увлеченность бытовыми вопросами, стремление к порядку ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ: A/ изменений личности вследствие шизофрении B/ изменений личности вследствие эпилепсии C/ изменений личности вследствие алкоголизма D/ изменений личности вследствие поражения сосудов мозга E/ шизоидной психопатии

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Нарастающая лень, замкнутость, стойкая утрата интереса к занятиям, которые прежде вызывали интерес, полное безделье ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ: A/ изменений личности вследствие шизофрении B/ изменений личности вследствие эпилепсии C/ изменений личности вследствие алкоголизма D/ изменений личности вследствие поражения сосудов мозга E/ К изменениям личности не относят

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Нарастающая злопамятность, эгоцентризм, лживость, подчеркнутое заискивание перед начальством, нетерпимость и вспыльчивость ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ: А/ изменений личности вследствие шизофрении В/ изменений личности вследствие эпилепсии С/ изменений личности вследствие алкоголизма Д/ изменений личности вследствие поражения сосудов мозга Е/ К изменениям личности не относят

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: В

Мужчина 45 лет с детства отличался активностью, искренностью, альтруизмом. Много обещал, но не все делал. Из-за неорганизованности не смог закончить университет. Очень влюбчив, поэтому не женился. В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОПИСАНА: А/ здоровая истероидная личность В/ истерическая психопатия С/ здоровая циклоидная личность Д/ гипертимическая психопатия Е/ дистимическая психопатия

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: Д

Мужчина 45 лет с детства отличался аккуратностью и ответственностью, не любил выступать на публике, никогда не спорил с начальством, всегда следовал мнению жены. У ДАННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: А/ акцентуации личности В/ изменений личности вследствие эпилепсии С/ изменений личности вследствие шизофрении Д/ изменений личности вследствие алкоголизма Е/ патологического развития личности у взрослого

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: А

Мужчина 45 лет с детства наблюдается у неврологов. В школе учился на "хорошо", в армии не служил, женат, работает бухгалтером. С юности нарастает медлительность, вязкость, временами наблюдается вспыльчивость. В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОПИСАНА: А/ здоровая шизоидная личность В/ шизоидная психопатия С/ изменения личности вследствие шизофрении Д/ другой тип психопатии Е/ другой тип изменений личности

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: Е

Мужчина 45 лет работал инженером, женился, имеет 2 детей. В 30 лет заявил жене, что устал, уволился с работы, сидел дома, вел подробный дневник. Живет на средства жены, по принуждению делает что-то по дому. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ: А/ здоровой шизоидной личности В/ шизоидной психопатии С/ изменений личности вследствие шизофрении Д/ другого типа психопатии Е/ другого типа изменений личности

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: С

Мужчина 45 лет не имеет профессии и семьи, так как в 10 классе школы заявил родителям, что больше не хочет учиться. Твердил им, что они обязаны его кормить и содержать, поскольку он не просил его рожать. В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОПИ-

САНА:А/ здоровая эпилептоидная личностьВ/ взрывчатая (эпилептоидная) психопатияС/ изменения личности вследствие эпилепсииD/ изменения личности вследствие алкоголизмаЕ/ изменения личности вследствие шизофрении

A) А

B) В

C) С

D) D

E) Е

ANSWER: E

Мужчина 45 лет наблюдается с детства у неврологов, в армии не служил. Женат, работает на почте. С юности нарастает медлительность и мелочность. Несколько раз поднимал руку на жену, так как она его не слушала. В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОПИСАНА:А/ здоровая эпилептоидная личностьВ/ паранойальная психопатияС/ изменения личности вследствие эпилепсииD/ другой тип психопатииЕ/ другой тип изменений личности

A) А

B) В

C) С

D) D

E) Е

ANSWER: C

Мужчина 45 лет закончил среднюю школу с хорошими оценками, поступил в университет. Однако на 3 курсе заявил, что не нуждается в образовании. С этого времени сидит дома, не работает, живет на средства матери.В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОПИСАНА:А/ здоровая шизоидная личностьВ/ шизоидная психопатияС/ изменения личности вследствие шизофренииD/ другой тип психопатииЕ/ другой тип изменений личности

A) А

B) В

C) С

D) D

E) Е

ANSWER: C

Мужчина 45 лет всегда отличался замкнутостью, друзей почти не было, женился в 30 лет, в браке имеет двух сыновей, их воспитанием не интересуется, работает в научной лаборатории, дома много читает. В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОПИСАНА:А/ здоровая шизоидная личностьВ/ шизоидная психопатияС/ изменения личности вследствие шизофренииD/ другой тип психопатииЕ/ другой тип изменений личности

A) А

B) В

C) С

D) D

E) Е

ANSWER: A

Мужчина 45 лет всегда был общительным, любил заводить знакомства с знаменитостями. В школе учился средне, но выступал в самодеятельности. Женат. Работает в торговле, играет в самодеятельном театре.В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОПИСАНА:А/ здоровая истероидная личностьВ/ истерическая психопатияС/ паранойальная психопатияD/ гипертимическая психопатияЕ/ дистимическая психопатия

A) А

B) В

C) С

D) D

E) Е

ANSWER: A

Мужчина 30 лет с детства отличался непослушанием, плохо учился в школе, рано начал злоупотреблять алкоголем, не имеет постоянной работы, не смог создать семью. У ДАННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ:А/ расстройства личности (психопатии)В/ изменений личности вследствие эпилепсииС/ изменений личности вследствие шизофренииD/ изменений личности вследствие алкоголизмаЕ/ патологического развития личности у взрослого

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Коренное преобразование ключевых черт характера под воздействием прогрессирующего психического заболевания НАЗЫВАЮТ: A/ акцентуацией личности B/ патологическим развитием личности C/ изменением личности D/ расстройством личности (психопатией) E/ острой реакцией на стресс

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Женщина 66 лет в последние годы жалуется на утомляемость, забывчивость и невнимательность. Стала сентиментальной, часто плачет, все перепроверяет, усилилась тревожность. У ДАННОЙ ПАЦИЕНТКИ ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: A/ акцентуации личности B/ изменений личности вследствие эпилепсии C/ изменений личности вследствие шизофрении D/ изменений личности вследствие поражения сосудов мозга E/ патологического развития личности у взрослого

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Болезненное выпячивание и закрепление в условиях длительного стресса здоровых стереотипов, присутствовавших с детства, НАЗЫВАЮТ: A/ акцентуацией личности B/ патологическим развитием личности C/ изменением личности D/ расстройством личности (психопатией) E/ острой реакцией на стресс

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Артист цирка всегда боялся потерять работу. После травмы долго пользовался костылями, боялся ходить без палочки, чувствовал боль, не смог вернуться к работе. У ДАННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЮТСЯ ПРИЗНАКИ: A/ расстройства личности (психопатии) B/ изменений личности вследствие эпилепсии C/ изменений личности вследствие шизофрении D/ изменений личности вследствие органического поражения мозга E/ патологического развития личности у взрослого

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Исследование структуры личности на основании факторного анализа провел: A/ Гордон Олпорт B/ Зигмунд Фрейд C/ Рэймонд Кэттел D/ Альфред Адлер E/ Густав Юнг

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Для ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ бережливость и скупость B/ верность в дружбе C/ склонность к ипохондрии D/ перфекционизм и упрямство E/ все перечисленное

- A) A

- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ бережливость и скупость B/ осторожность и мнительность C/ склонность к ипохондрии D/ упорство в достижении поставленной цели E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ склонность к лидерству B/ преобладание первой сигнальной системы C/ верность и преданность в дружбе D/ оптимизм и вера "в светлое будущее" E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Для ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ эгоизм B/ злопамятность и мстительность C/ склонность к самоанализу D/ стремление к лидерству E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Для ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ обязательность и ответственность B/ осторожность и мнительность C/ склонность к подчинению D/ преобладание второй сигнальной системы E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ низкая самооценка B/ осторожность в контактах с окружающими C/ упрямство и принципиальность D/ боязнь совершить ошибку E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ альтруизм B/ осторожность и мнительность C/ склонность к самоанализу D/ стремление действовать по плану E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ИНТРОВЕРТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ заботливость и альтруизм B/ злопамятность и эгоизм C/ склонность к пессимизму и тоске D/ интерес к точным наукам и философии E/ все перечисленное выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Для ИНТРОВЕРТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ подозрительность и осторожность B/ жадность и скупость C/ спокойствие и невозмутимость D/ преобладание первой сигнальной системы E/ все перечисленное выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Для ИНТРОВЕРТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ склонность к логическому мышлению B/ самостоятельность независимость взглядов C/ стремление к научному поиску и исследованию D/ аскетизм, равнодушие к комфорту и удобству E/ все перечисленное выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ИНТРОВЕРТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ склонность к самоанализу B/ интерес к абстрактным дисциплинам C/ равнодушие к мнению окружающих D/ преобладание второй сигнальной системы E/ все перечисленное выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ИНТРОВЕРТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ замкнутость B/ интерес к точным наукам C/ спокойствие и невозмутимость D/ преобладание второй сигнальной системы E/ все перечисленное выше

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ЗАСТРЕВАЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ высокая самооценка B/ щедрость и оптимизм C/ искренность и правдивость D/ преобладание первой сигнальной системы E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Для ЗАСТРЕВАЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ мнительность и тревожность B/ пониженная самооценка C/ доброта и альтруизм D/ упорство и стеничность E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Для ЗАСТРЕВАЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ стремление действовать обдуманноВ/ интерес к карьере и служебному ростуС/ упорное отстаивание интересов своей семьиD/ преобладание второй сигнальной системыЕ/ все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Для ЗАСТРЕВАЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ подозрительность и недоверчивостьВ/ нетерпимость к поражению и проигрышуС/ бережливость, осторожность в тратах денегD/ склонность видеть в случайных событиях чей-то умыселЕ/ все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Для ЗАСТРЕВАЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ мстительность и злопамятностьВ/ склонность к лидерствуС/ эгоизмD/ упорство и стеничностьЕ/ все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Для ДИСТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ низкая самооценкаВ/ завистливость и мстительностьС/ стремление манипулировать окружающимиD/ хитрость и склонность к интригамЕ/ все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

Для ДИСТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ альтруизмВ/ щедрость и бескорыстностьС/ искренность и честностьD/ пессимизм и пассивностьЕ/ все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Для ДИСТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ лень и безволиеВ/ стремление обращаться за помощьюС/ мнительность и подозрительностьD/ низкая самооценкаЕ/ все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

Для ДИСТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ низкая самооценкаВ/ отсутствие лидерских качествС/ щедрость и стремление помогатьD/ альтруизмЕ/ все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Для ДИСТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ низкая самооценка B/ честность и искренность C/ верность и преданность в дружбе D/ замкнутость E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ДЕМОНСТРАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ эмоциональная ранимость B/ стремление к подчинению C/ злопамятность и мстительность D/ преобладание второй сигнальной системы E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Для ДЕМОНСТРАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ низкая самооценка B/ подозрительность и недоверчивость C/ упорство в достижении поставленной цели D/ преобладание первой сигнальной системы E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Для ДЕМОНСТРАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ эгоцентризм B/ интерес к собственной внешности C/ нежность, ранимость, инфантилизм D/ умение забывать о неприятностях E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ДЕМОНСТРАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ общительность B/ интерес к литературе и искусству C/ интерес к собственной внешности D/ склонность к физическому недомоганию E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ДЕМОНСТРАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ высокая самооценка B/ стремление к лидерству C/ нежность, ранимость, инфантилизм D/ преобладание первой сигнальной системы E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Для ГИПЕРТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно: A/ склонность к лидерству B/ вспыльчивость и гневливость C/ склонность к самоанализу D/ мстительность и злопамятность E/ все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

Е) Е

ANSWER: А

Для ГИПЕРТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ склонность к фантазированиюВ/ эгоцентризм и скупостьС/ склонность к полигамииD/ стремление соблюдать "здоровый образ жизни"Е/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: С

Для ГИПЕРТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ щедростьВ/ искренностьС/ неутомимостьD/ экстраверсияЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: Е

Для ГИПЕРТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ склонность к оптимизмуВ/ склонность к рискуС/ высокая способность к сопереживаниюD/ желание помочь слабомуЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: Е

Для ГИПЕРТИМИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ склонность к лидерствуВ/ альтруизмС/ верность и преданность в дружбеD/ пренебрежение к препятствиямЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: Е

Для ВОЗБУДИМОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ высокая самооценкаВ/ недоверие к людямС/ последовательное движение к поставленной целиD/ осторожность и забота о здоровьеЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: А

Для ВОЗБУДИМОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ альтруизмВ/ отсутствие самостоятельностиС/ последовательное движение к поставленной целиD/ преобладание первой сигнальной системыЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: D

Для ВОЗБУДИМОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ высокая самооценкаВ/ стремление к лидерствуС/ бесстрашие и мужественностьD/ умение прощать и забывать обидуЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

D) D

Е) Е

ANSWER: Е

Для ВОЗБУДИМОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ эгоизмВ/ любовь к физическому совершенствуС/ нетерпимость к критике и порицаниямD/ преобладание первой сигнальной системыЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: Е

Для ВОЗБУДИМОЙ ЛИЧНОСТИ характерно:А/ высокая самооценкаВ/ стремление к лидерствуС/ вспыльчивость и отходчивостьD/ преобладание первой сигнальной системыЕ/ все перечисленное

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: Е

Вид врачебной деятельности наиболее подходящий ПЕДАНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ:А/ терапевт, врач функциональной диагностики, врач-лаборантВ/ хирург, врач скорой помощи, специалист по интенсивной терапииС/ психотерапевт, врач-педагог в детском учрежденииD/ исследователь в области фундаментальных медицинских знанийЕ/ руководитель крупного медицинского учреждения, организатор здравоохранения жесткого авторитарного типа

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) Е

ANSWER: А

АЛЬТРУИЗМ является характерной чертой личностей:1/ гипотимных2/ возбудимых3/ педантичных4/ застревающих

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: В

АЛЬТРУИЗМ довольно характерен для личностей:1/ возбудимых2/ застревающих3/ демонстративных4/ гипертимичных

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: D

АЛЬТРУИЗМ довольно характерен для личностей:1/ педантичных2/ дистимичных3/ гипертимичных4/ демонстративных

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: А

АЛЬТРУИЗМ довольно характерен для личностей:1/ педантичных2/ застревающих3/ гипертимичных4/ интровертированных

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: В

2я сигнальная система по И.П.Павлову (рациональный тип мышления) отчетливо преобладает у личностей:1/ демонстративных2/ интровертированных3/ гипертимических4/ педантичных

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: С

2я сигнальная система по И.П.Павлову (рациональный тип мышления) отчетливо преобладает у личностей:1/ педантичных2/ интровертированных3/ застревающих4/ демонстративных

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: А

1я сигнальная система по И.П.Павлову (эмоциональный тип мышления) отчетливо преобладает у личностей:1/ педантичных2/ демонстративных3/ застревающих4/ возбудимых

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: С

1я сигнальная система по И.П.Павлову (эмоциональный тип мышления) отчетливо преобладает у личностей:1/ педантичных2/ интровертированных3/ застревающих4/ демонстративных

А) верно 1, 2 и 3

В) верно 1 и 3

С) верно 2 и 4

Д) верно только 4

Е) верно всё

ANSWER: D

С точки зрения С.Розенцвейга, наибольшей адаптации достигают люди, которые в ситуации фрустрации:А/ обвиняют во всем другихВ/ добиваются желаемого результата любой ценойС/ обвиняют во всем себяД/ считают, что все разрешится само по себеЕ/ делают вид, что ничего не случилось

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) E

ANSWER: В

По шкале Холмса-Рэйха наивысший уровень стресса связан с:А/ смертью другаВ/ женитьбой С/ кредитом на покупку домаД/ проблемами в сексеЕ/ сменой должности

А) А

В) В

С) С

Д) D

Е) E

ANSWER: В

По шкале Холмса-Рэйха наивысший уровень стресса связан с:А/ смертью другаВ/ кредитом на покупку домаС/ уходом на пенсиюД/ проблемами в сексеЕ/ сменой должности

А) А

В) В

- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

По шкале Холмса-Рэйха наивысший уровень стресса связан с: A/ беременностью B/ кредитом на покупку дома C/ смертью друга D/ проблемами в сексе E/ сменой должности

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

По шкале Холмса-Рэйха наивысший уровень стресса связан с: A/ сменой должности B/ кредитом на покупку дома C/ смертью друга D/ проблемами в сексе E/ разводом

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

По мнению А.Адлера, одной из ведущих потребностей человека является стремление к: A/ смерти B/ власти C/ покою D/ удовольствию E/ самореализации

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

По мнению А. Маслоу, одной из ведущих потребностей человека является стремление к: A/ смерти B/ власти C/ покою D/ удовольствию E/ самореализации

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

По мнению З.Фрейда, одной из ведущих потребностей человека является стремление к: A/ успеху B/ власти C/ покою D/ удовольствию E/ самореализации

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

По мнению З.Фрейда, одной из ведущих потребностей человека является стремление к: A/ смерти B/ власти C/ покою D/ безопасности E/ самореализации

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Преходящие соматические и неврологические расстройства, обусловленные стрессом служат примером: A/ расщепления B/ конверсии C/ регрессии D/ сублимации E/ диссоциации

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Перенаправление неудовлетворенных желаний в творчество и профессиональное мастерство служит примером: A/ расщепления B/ конверсии C/ регрессии D/ сублимации E/ диссоциации

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Низкой степенью адаптации отличаются люди, которые в стрессовой ситуации чаще всего используют: A/ социальную поддержку B/ планирование C/ позитивное переосмысление D/ принятие ответственности E/ избегание

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Механизмы психологической защиты, которые подчеркивают высокие моральные качества человека и его общественную значимость, называются: A/ примитивными B/ невротическими C/ постоянными D/ высокоразвитыми E/ коупинг-стратегиями

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Механизм психологической защиты наиболее типичный для ЗАСТРЕВАЮЩЕГО типа личности: A/ проекция B/ вытеснение C/ обесценивание D/ рационализация E/ гиперкомпенсация

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

К примитивным механизмам психологической защиты относят: A/ расщепление B/ альтруизм C/ юмор D/ сублимацию E/ подавление

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

К примитивным механизмам психологической защиты относят: A/ юмор B/ подавление C/ регрессию D/ сублимацию E/ альтруизм

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

К зрелым механизмам психологической защиты относят: A/ подавление B/ конверсию C/ регрессию D/ идеализацию E/ диссоциацию

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

К зрелым механизмам психологической защиты относят:А/ расщеплениеВ/ конверсиюС/ регрессиюD/ сублимациюЕ/ диссоциацию

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Высокой степени адаптации достигают люди, которые в стрессовой ситуации чаще всего используют:А/ эмоциональную разрядкуВ/ дистанцированиеС/ психологическую защитуD/ избеганиеЕ/ активные формы коупинга

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Врач, решивший приблизить смерть тяжелобольному пациенту,вероятнее всего:А/ лишен страха смерти, презирает ееВ/ отличается альтруистическими чертами характераС/ удовлетворяет свои собственные неосознаваемые потребностиD/ хочет продемонстрировать свое несогласие с мнением обществаЕ/ не привержен ни одной из религиозных конфессий

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Врач, решивший приблизить смерть тяжелобольному пациенту,вероятнее всего:А/ обладает сильной волейВ/ руководствуется только гуманными принципамиС/ удовлетворяет свои собственные неосознаваемые потребностиD/ хочет продемонстрировать свое несогласие с мнением обществаЕ/ является патологической личностью

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Утверждение больного с инфарктом миокарда о том, что врачи "явнопреувеличивают" опасность его состояния, отказ от постельного режима ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАЩИТНОГО МЕХАНИЗМА:А/ соматизацииВ/ конверсииС/ отрицанияD/ сублимацииЕ/ проекции

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Проявлениями защитного механизма ФИКСАЦИИ ТРЕВОГИ являются:А/ неуместное упрямство, принципиальность, вспышки щедростиВ/ внезапная забывчивость, поведение "как-будто ничего не случилось"С/ капризность, хныканье, детское лепетание, надутые губыD/ построение ритуалов, избегание "опасных" ситуаций, навязчивостиЕ/ невольное копирование поведения более авторитетного лица

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Проявлениями защитного механизма РЕГРЕССИИ являются:А/ неуместное упрямство, принципиальность, вспышки щедростиВ/ внезапная забывчивость, поведение "как-

будто ничего не случилось"С/ капризность, хныканье, детское лепетание, надутые губыD/ построение ритуалов, избегание "опасных" ситуаций, навязчивостиЕ/ невольное копирование поведения более авторитетного лица

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Проявлениями защитного механизма ИДЕНТИФИКАЦИИ являются:А/ неуместное упрямство, принципиальность, вспышки щедростиВ/ внезапная забывчивость, поведение "как-будто ничего не случилось"С/ капризность, хныканье, детское лепетание, надутые губыD/ построение ритуалов, избегание "опасных" ситуаций, навязчивостиЕ/ невольное копирование поведения более авторитетного лица

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Проявлениями защитного механизма ГИПЕРКОМПЕНСАЦИИ являются:А/ неуместное упрямство, принципиальность, вспышки щедростиВ/ внезапная забывчивость, поведение "как-будто ничего не случилось"С/ капризность, хныканье, детское лепетание, надутые губыD/ построение ритуалов, избегание "опасных" ситуаций, навязчивостиЕ/ невольное копирование поведения более авторитетного лица

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Проявлениями защитного механизма ВЫТЕСНЕНИЯ являются:А/ неуместное упрямство, принципиальность, вспышки щедростиВ/ внезапная забывчивость, поведение "как-будто ничего не случилось"С/ капризность, хныканье, детское лепетание, надутые губыD/ построение ритуалов, избегание "опасных" ситуаций, навязчивостиЕ/ невольное копирование поведения более авторитетного лица

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

С точки зрения С.Розенцвейга, наибольшей адаптации достигают люди, которые в ситуации фрустрации:А/ обвиняют во всем другихВ/ добиваются желаемого результата любой ценойС/ обвиняют во всем себяD/ считают, что все разрешится само по себеЕ/ делают вид, что ничего не случилось

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

ПОСЕЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ ЖАРКОЙ БАНИ точнее всего будет назвать:А/ стрессомВ/ фрустрациейС/ межличностным конфликтомD/ внутриличностным конфликтомЕ/ пассивной коупинг-стратегией

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

ОФОРМЛЕНИЕ БРАКА С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ точнее всего будет называть:А/ стрессомВ/ фрустрациейС/ межличностным конфликтомD/ внутриличностным конфликтомЕ/ пассивной коупинг-стратегией

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

НЕВОЗМОЖНОСТЬ СДАТЬ ЭКЗАМЕН, ПОСКОЛЬКУ ЗНАНИЯ НЕДОСТАТОЧНЫЕ является препятствием:А/ внешним переменным контролируемымВ/ внутренним переменным неконтролируемымС/ внутренним постоянным контролируемымD/ внешним постоянным неконтролируемымЕ/ может быть любым из предложенных в зависимости от позиции субъекта

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПИТЬ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВУЗ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ИМЕЕТСЯ ДЕФЕКТ ДИКЦИИ является препятствием:А/ внешним переменным контролируемымВ/ внутренним переменным неконтролируемымС/ внутренним постоянным контролируемымD/ внешним постоянным неконтролируемымЕ/ может быть любым из предложенных в зависимости от позиции субъекта

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАСТЬ ДОМОЙ, ПОСКОЛЬКУ РОДИТЕЛИ УШЛИ, А СОБСТВЕННЫЙ КЛЮЧ ПОТЕРЯН является препятствием:А/ внешним переменным контролируемымВ/ внутренним переменным неконтролируемымС/ внутренним постоянным контролируемымD/ внешним постоянным неконтролируемымЕ/ может быть любым из предложенных в зависимости от позиции субъекта

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Наиболее точное определение понятия СТРЕСС:А/ чувство необъяснимой неопределенной надвигающейся угрозыВ/ состояние, возникшее вследствие блокады актуальной потребностиС/ напряжение всех регуляторных систем, обусловленное возникновением нагрузки, существенно превышающей обычнуюD/ эмоционально неприятные психологические переживания, ухудшающие адаптацию и здоровье человекаЕ/ состояние, возникающее в ситуации принятия ответственного решения

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

ИНТЕРНАЛЬНОСТЬ (внутренний локус контроля) нередко:А/ свидетельствует о низкой психологической устойчивости личностиВ/ определяет менее благоприятный прогноз при соматических и психосоматических заболеванияхС/ сопровождается чувством беспомощности и поиском защиты у более сильного или более авторитетного лицаD/ выражается в стремлении преодолеть судьбу и низвергнуть авторитетыЕ/ сопровождается страхом окружающих и нежеланием сотрудничать с ними

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

ИНТЕРНАЛЬНОСТЬ (внутренний локус контроля) нередко:А/ свидетельствует о низкой психологической устойчивости личностиВ/ определяет менее благоприятный прогноз при соматических и психосоматических заболеванияхС/ подталкивает человека к более детальному изучению ситуации и поиску выхода из нееD/ выражается в слепой вере в могущество судьбы, бога или авторитетаЕ/ сопровождается боязнью окружающих и нежеланием сотрудничать с ними

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

ИНТЕРНАЛЬНОСТЬ (внутренний локус контроля) нередко:А/ свидетельствует о низкой психологической устойчивости личностиВ/ определяет более благоприятный прогноз при соматических и психосоматических заболеванияхС/ сопровождается чувством беспомощности и поиском защиты у более сильного или более авторитетного лицаD/ выражается в слепой вере в могущество судьбы и богаЕ/ сопровождается отказом от предлагаемой помощи и поддержки

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Для преодоления МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ в коллективе следует:А/ упорно отстаивать свою правоту, противостоять любой критикеВ/ четко определить свою позицию и не отступать от нее ни на шагС/ обсудить суть конфликта на общем собрании коллективаD/ поощрять самостоятельность и инициативу, избегать формализмаЕ/ делать все перечисленное

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

Внутренний локус контроля означает:А/ потребность в опеке и защитеВ/ склонность к формированию сверхценных идейС/ неспособность преодолеть комплекс превосходстваD/ недостаточную силу психологической защитыЕ/ уверенность в своих способностях управлять ситуацией

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Внутренний локус контроля означает:А/ потребность в безусловной позитивной оценкеВ/ склонность к формированию иррациональных конструктовС/ неспособность преодолеть комплекс неполноценностиD/ чрезмерную силу психологической защитыЕ/ уверенность в своих способностях управлять ситуацией

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Внешний локус контроля означает: А/ потребность в новизне и изменениях В/ склонность к формированию иррациональных конструктов С/ неспособность преодолеть комплекс неполноценности D/ уверенность в неспособности влиять на ситуацию Е/ стремление к удовольствию и наслаждению

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Внешний локус контроля означает: А/ потребность в безусловной позитивной оценке В/ уверенность в неспособности влиять на ситуацию С/ неспособность преодолеть комплекс неполноценности D/ чрезмерную силу психологической защиты Е/ склонность к формированию иррациональных конструктов

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

В психологии ФРУСТРАЦИЕЙ называется: А/ чувство необъяснимой неопределенной надвигающейся угрозы В/ состояние, возникшее вследствие блокады актуальной потребности С/ выработанная личностью система оценки значимости той или иной потребности, необходимая для формирования плана поведения D/ система неосознаваемых мыслительных операций нацеленных на уменьшение переживаний в связи с блокадой актуальной потребности Е/ стремление наказать виновных в том, что задуманное не выполнено

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

В психологии МЕЖЛИЧНОСТНЫМ КОНФЛИКТОМ называется: А/ беспричинное чувство неприязни и отвержения к какому-либо лицу В/ обида на того, кто проявил равнодушие и бессердечность С/ противоборство нескольких одинаково значимых, но исключающих друг друга, потребностей индивида D/ столкновение потребностей нескольких людей, влекущее за собой взаимную негативную оценку и отказ от сотрудничества Е/ бессмысленные агрессивные действия в отношении постороннего лица

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

В психологии ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ называют: А/ стойкое субъективное представление человека о том, какими силами управляется большая часть событий и ситуаций В/ стремление планировать и обдумывать каждый свой шаг С/ шаблон поведения в специфической ситуации общения или деятельности D/ комплекс важнейших интересов, склонностей, убеждений человека Е/ лишенная логики неосознаваемая готовность воспринимать, эмоционально оценивать окружающих и ситуацию вне зависимости от реальности

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

В психологии ВНУТРИЛИЧНОСТНЫМ КОНФЛИКТОМ называется: А/ чувство необъяснимой неопределенной надвигающейся угрозы В/ состояние, возникшее вследствие блокады актуальной потребности С/ противоборство нескольких одинаково значимых,

но исключаящих друг друга, потребностей индивидаD/ переживание утраты (смерти близкого, крушения надежд, разрыва с партнером, потери имущества, расставания с родиной)E/ чувство растерянности, обусловленное недостатком информации

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Чувство ЖАЛОСТИ К ПАЦИЕНТУ обычно:A/ испытывают врачи с застревающим характеромB/ отражает потребность в покровительстве (родительский инстинкт)C/ способствует выздоровлению пациента и успешной реабилитацииD/ способствует удовлетворенности пациента проведенным лечениемE/ верно все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

Чувство ЖАЛОСТИ К ПАЦИЕНТУ нередко:A/ испытывают врачи с интроветированным характеромB/ возникает при неудовлетворенной потребности в переживанияхC/ способствует выздоровлению пациента и успешной реабилитацииD/ усиливает комплекс неполноценности и раздражает пациентаE/ верно все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Чувство ЖАЛОСТИ К ПАЦИЕНТУ нередко:A/ испытывают врачи застревающего характераB/ возникает при неудовлетворенной потребности в пониманииC/ мешает выздоровлению пациента и успешной реабилитацииD/ способствует удовлетворенности пациента проведенным лечениемE/ верно все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Чувство ЖАЛОСТИ К ПАЦИЕНТУ нередко:A/ испытывают врачи с циклоидным характеромB/ возникает при неудовлетворенной потребности в пониманииC/ способствует выздоровлению пациента и успешной реабилитацииD/ способствует удовлетворенности пациента проведенным лечениемE/ верно все перечисленное

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Врач в роли больного:A/ хочет, чтобы к нему относились не так, как к другим больнымB/ выполняет рекомендации врачей более аккуратно, чем другиеC/ более оптимистичен, чем непрофессионалD/ более пессимистичен, чем непрофессионалE/ ничем не отличается от других пациентов

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Врач в роли больного:A/ безошибочно ставит диагноз сам себеB/ отказывается от участия в диагностикеC/ более оптимистичен, чем непрофессионалD/ более

пессимистичен, чем непрофессионалЕ/ редко бывает объективен в оценке своего здоровья

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

В основе симуляции всегда лежит:А/ депрессияВ/ агрессияС/ психологическая защитаD/ эмоциональное выгораниеЕ/ стремление к выгоде

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

В основе невольного искажения внутренней картины болезни обычно лежит:А/ стремление к выгодеВ/ низкий интеллектС/ психологическая защитаD/ склонность к экстраверсииЕ/ сильное "Ид"

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

В основе невольного искажения внутренней картины болезни обычно лежит:А/ стремление к выгодеВ/ психологическая защитаС/ астеническая конституцияD/ склонность к экстраверсииЕ/ сильное "супер-Эго"

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

В основе невольного искажения внутренней картины болезни обычно лежит:А/ психологическая защитаВ/ низкий интеллектС/ астеническая конституцияD/ склонность к экстраверсииЕ/ сильное "Эго"

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

В основе диссимуляции всегда лежит:А/ страхВ/ агрессияС/ равнодушиеD/ оптимизмЕ/ смелость

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Наиболее точное определение понятия СИМУЛЯЦИЯ:А/ намеренная демонстрация признаков несуществующей болезниВ/ обнаружение у себя признаков несуществующей соматической болезниС/ подсознательное использование имеющейся болезни для изменения поведения окружающих в желаемом направленииD/ пренебрежение тяжестью заболевания, отказ от лечения и обследованияЕ/ намеренное сокрытие имеющихся признаков заболевания

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Наиболее точное определение понятия ИПОХОНДРИЯ: А/ намеренная демонстрация признаков несуществующей болезни В/ обнаружение у себя признаков несуществующей соматической болезни С/ подсознательное использование имеющейся болезни для изменения поведения окружающих в желаемом направлении D/ пренебрежение тяжестью заболевания, отказ от лечения и обследования Е/ намеренное сокрытие имеющихся признаков заболевания

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Наиболее точное определение понятия ДИССИМУЛЯЦИЯ: А/ намеренная демонстрация признаков несуществующей болезни В/ обнаружение у себя признаков несуществующей соматической болезни С/ подсознательное использование имеющейся болезни для изменения поведения окружающих в желаемом направлении D/ пренебрежение тяжестью заболевания, отказ от лечения и обследования Е/ намеренное сокрытие имеющихся признаков заболевания

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Наиболее точное определение понятия ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ: А/ комплекс симптомов, характерный для определенного заболевания В/ обнаружение у себя признаков несуществующей соматической болезни С/ подсознательное использование имеющейся болезни для изменения поведения окружающих в желаемом направлении D/ сокрытие признаков внутренней болезни, отказ от предлагаемой помощи Е/ сумма субъективных ощущений больного и представлений, основанных на личном опыте, касающихся сути его заболевания и его прогноза

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Наиболее точное определение понятия АНОЗОГНОЗИЯ: А/ намеренная демонстрация признаков несуществующей болезни В/ обнаружение у себя признаков несуществующей соматической болезни С/ подсознательное использование имеющейся болезни для изменения поведения окружающих в желаемом направлении D/ пренебрежение тяжестью заболевания, отказ от лечения и обследования Е/ намеренное сокрытие имеющихся признаков заболевания

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

Наиболее точное определение понятия АГГРАВАЦИЯ: А/ намеренная демонстрация признаков несуществующей болезни В/ обнаружение у себя признаков несуществующей соматической болезни С/ подсознательное использование имеющейся болезни для изменения поведения окружающих в желаемом направлении D/ намеренное увеличение тяжести имеющейся соматической болезни Е/ намеренное сокрытие имеющихся признаков заболевания

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

Наиболее точное определение понятия МАНИПУЛЯТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: А/ намеренная демонстрация признаков несуществующей болезни В/ обнаружение у себя признаков несуществующей соматической болезни С/ подсознательное использование имеющейся болезни для изменения поведения окружающих в желаемом направлении D/ пренебрежение тяжестью заболевания, отказ от лечения и обследования Е/ намеренное сокрытие имеющихся признаков заболевания

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D
- E) Е

ANSWER: C

К причинам отказа от лечения относят: 1/ страх 2/ инверсию 3/ психологическую защиту 4/ внутренний локус контроля

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: B

К причинам отказа от лечения относят: 1/ бесстрашие 2/ депрессию 3/ экстраверсию 4/ психологическую защиту

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: C

ГИПОНОЗОГНОЗИЯ характерна для больных с: 1/ психическими заболеваниями 2/ бронхиальной астмой 3/ инфарктом миокарда 4/ язвенной болезнью

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: B

ГИПЕРНОЗОГНОЗИЯ характерна для: 1/ застревающих личностей 2/ педантичных личностей 3/ демонстративных личностей 4/ дистимических личностей

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: E

ГИПЕРНОЗОГНОЗИЯ характерна для: 1/ застревающих личностей 2/ педантичных личностей 3/ демонстративных личностей 4/ гипертимических личностей

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: A

ГИПЕРНОЗОГНОЗИЯ характерна для больных с: 1/ язвенной болезнью 2/ инфарктом миокарда 3/ бронхиальной астмой 4/ психическими заболеваниями

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: B

Вариантом ГИПОНОЗОГНОЗИИ может быть реакция на болезнь по типу: 1/ ипохондрии 2/ апатии 3/ манипулятивного поведения 4/ ухода в работу

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: C

Вариантом ГИПЕРНОЗОГНОЗИИ может быть реакция на болезнь по типу: 1/ ипохондрии 2/ боязни огласки 3/ манипулятивного поведения 4/ стремления наказать виновных в болезни

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: E

Вариантом ГИПЕРНОЗОГНОЗИИ может быть реакция на болезнь по типу: 1/ ипохондрии 2/ апатии 3/ манипулятивного поведения 4/ ухода в работу

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: B

АНОЗОГНОЗИЯ характерна для: 1/ застревающих личностей 2/ педантичных личностей 3/ демонстративных личностей 4/ гипертимических личностей

- A) верно 1, 2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: D

В психотерапии ИНСАЙТОМ называют: A/ чувство доверия к психотерапевту, готовность к сотрудничеству на основе взаимной ответственности B/ иррациональные чувства любви и ненависти по отношению к врачу C/ иррациональные чувства любви и ненависти по отношению к пациенту D/ резкое улучшение состояния с чувством эмоционального очищения E/ внезапное осознание проблемы во всей ее полноте с чувством обретения спокойствия и ясности

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Иррациональные чувства привязанности или ненависти пациента по отношению к психотерапевту называются: A/ переносом (трансфером) B/ контрпереносом (контр-трансфером) C/ инсайтом D/ катарсисом E/ раппортом

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Наличие СОПРОТИВЛЕНИЯ в процессе психотерапии свидетельствует о: A/ отсутствии доверия между врачом и пациентом B/ патологическом профиле личности пациента C/ наличии у врача неразрешенных детских подсознательных комплексов D/ наличии у пациента хронического душевного заболевания E/ повышении активности психологической защиты на фоне обсуждения важной для пациента проблемы

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Наличие СОПРОТИВЛЕНИЯ в процессе психотерапии свидетельствует о: А/ важности и серьезности обсуждаемых проблем В/ патологическом профиле личности пациента С/ низком авторитете и профессионализме врача D/ наличии у пациента хронического душевного заболевания Е/ поверхностности и неискренности в процессе психотерапии

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

НЕДИРЕКТИВНОЙ называется психотерапия, которая: А/ помогает пациенту с помощью вопросов врача найти собственное решение имеющейся проблемы В/ ломает психологическую защиту и избавляет пациента от психологической "слепоты" С/ тормозит патологические рефлексy, и меняет стиль поведения D/ предполагает эмоциональное внушение без логического переосмысления Е/ направлена на поиск логических ошибок и избавление от заблуждений

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Отсутствие СОПРОТИВЛЕНИЯ в процессе психотерапии свидетельствует о: А/ высочайшем уровне доверия между врачом и пациентом В/ гармоничном профиле личности пациента С/ неискренности пациента, нежелании лечиться D/ благоприятном прогнозе заболевания Е/ наличии у пациента хронического психического заболевания

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Отсутствие СОПРОТИВЛЕНИЯ в процессе психотерапии свидетельствует о: А/ высочайшем уровне доверия между врачом и пациентом В/ гармоничном профиле личности пациента С/ высоком авторитете и профессионализме врача D/ наличии у пациента хронического душевного заболевания Е/ наличии поверхностности и неискренности в процессе психотерапии

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Поиск детских неразрешенных комплексов и их осознание считается основной целью психотерапии согласно: А/ психодинамической концепции В/ бихевиоральной концепции С/ когнитивной концепции D/ гуманистической концепции Е/ социобиологической концепции

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Помощь в осознании ценности своей личности для принятия ответственности на себя считается основной целью психотерапии согласно: А/ психодинамической концепции В/ бихевиоральной концепции С/ когнитивной концепции D/ гуманистической концепции Е/ социобиологической концепции

- A) A
- B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

При сообщении негативной информации важнее всего использовать принципы: A/ логичности и обоснованности B/ спокойствия и непоколебимости C/ искренности и ступенчатости D/ сомнительности и неопределенности E/ оптимизма и веры в лучший исход

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

При сообщении негативной информации важнее всего использовать принципы: A/ искренности и ступенчатости B/ спокойствия и непоколебимости C/ определенности и прямоты D/ сомнительности и неопределенности E/ оптимизма и веры в лучший исход

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

В психотерапии КОНТРПЕРЕНОСОМ (контртрансфером) называют: A/ чувство доверия к психотерапевту, готовность к сотрудничеству на основе взаимной ответственности B/ иррациональные чувства любви и ненависти по отношению к врачу C/ иррациональные чувства любви и ненависти по отношению к пациенту D/ резкое улучшение состояния с чувством эмоционального очищения E/ внезапное осознание проблемы во всей ее полноте с чувством обретения спокойствия и ясности

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Психотерапия, в которой врач навязывает пациенту поведение, от которого тот стремится избавиться, называется: A/ недирективной B/ суппортивной C/ экспрессивной D/ бихевиоральной E/ парадоксальной

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Психотерапия, которая направлена на торможение патологического условного рефлекса и выработку защитных условных рефлексов, называется: A/ недирективной B/ бихевиоральной C/ экспрессивной D/ когнитивной E/ суггестивной

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

Психотерапия, которая настраивает пациента на действия, нацеленные на решение проблем, называется: A/ суггестивной B/ когнитивной C/ активизирующей D/ бихевиоральной E/ релаксирующей

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Психотерапия, которая нацелена на слом существующей психологической защиты, называется: А/ директивной В/ суппортивной С/ экспрессивной D/ когнитивной Е/ бихевиоральной

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: C

Психотерапия, которая нацелена на снятие напряжения и избавление от страха, называется: А/ недирективной В/ когнитивной С/ экспрессивной D/ аналитической Е/ релаксирующей

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Психотерапия, которая проводится путем эмоционального внушения, называется: А/ недирективной В/ бихевиоральной С/ экспрессивной D/ когнитивной Е/ суггестивной

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

Психотерапия, при которой врач дает пациенту четкие инструкции и наставления, называется: А/ директивной В/ суппортивной С/ экспрессивной D/ когнитивной Е/ рациональной

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

СУППОРТИВНОЙ называется психотерапия, которая: А/ помогает пациенту с помощью вопросов врача найти собственное решение, имеющейся проблемы В/ ломает психологическую защиту и избавляет пациента от психологической "слепоты" С/ тормозит патологические рефлексy, и меняет стиль поведения D/ уменьшает тревогу за счет укрепления психологической защиты Е/ предполагает дачу пациенту четких инструкций и указаний

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

У пациента с неизлечимым заболеванием в терминальной стадии правильное всего использовать психотерапию: А/ бихевиоральную В/ когнитивную С/ экспрессивную D/ суппортивную Е/ парадоксальную

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: D

Целью психотерапии в БИХЕВИОРАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ является: А/ слом психологической защиты для осознания проблемы и ее решения В/ торможение патологических условных рефлексов и выработка адаптивных моделей поведения С/ выявление ало-

гичных конструктов и нереальных целей для переосмысления и установления реальных целей
D/ повышение самооценки и принятие ответственности на себя
E/ уменьшение внутреннего напряжения, снятие усталости и тревоги

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: B

В психотерапии РАППОРТОМ называют: A/ чувство доверия к психотерапевту, готовность к сотрудничеству на основе взаимной ответственности
B/ иррациональные чувства любви и ненависти по отношению к врачу
C/ иррациональные чувства любви и ненависти по отношению к пациенту
D/ резкое улучшение состояния с чувством эмоционального очищения
E/ внезапное осознание проблемы во всей ее полноте с чувством обретения спокойствия и ясности

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Целью психотерапии в ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ является: A/ слом психологической защиты для осознания проблемы и ее решения
B/ торможение патологических условных рефлексов и выработка адаптивных моделей поведения
C/ выявление алогичных конструктов и нереальных целей для переосмысления и установления реальных целей
D/ повышение самооценки и принятие ответственности на себя
E/ уменьшение внутреннего напряжения, снятие усталости и тревоги

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Целью психотерапии в КОГНИТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ является: A/ слом психологической защиты и преодоление детских комплексов
B/ торможение патологических условных рефлексов и выработка адаптивных моделей поведения
C/ выявление алогичных конструктов и нереальных целей для переосмысления и установления реальных целей
D/ повышение самооценки и принятие ответственности на себя
E/ уменьшение внутреннего напряжения, снятие усталости и тревоги

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

Целью психотерапии в ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ является: A/ слом психологической защиты для осознания проблемы и ее решения
B/ торможение патологических условных рефлексов и выработка адаптивных моделей поведения
C/ выявление алогичных конструктов и нереальных целей для переосмысления и установления реальных целей
D/ повышение самооценки и принятие ответственности на себя
E/ уменьшение внутреннего напряжения, снятие усталости и тревоги

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: A

Вопрос с наибольшей степенью суггестивности: A/ Живот болит?
B/ Что вас беспокоит?
C/ У вас часто болит живот, не правда ли?
D/ У вас бывают боли, недомогание, неудобство или что-то еще?

- A) A
- B) B

C) C

D) D

ANSWER: C

Вопрос с наименьшей степенью суггестивности: A/ Живот болит? B/ Что вас беспокоит? C/ У вас часто болит живот, не правда ли? D/ У вас бывают боли, недомогание, неудобство или что-то еще?

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: B

По мнению Дейла Карнеги, уменьшить чувство обиды от сделанного замечания или неприятного поручения можно: A/ избегая прямого упрека в ошибке, высказываясь в косвенной форме B/ четко формулируя свои претензии к собеседнику C/ демократично обсудив совершенный проступок в коллективе сотрудников D/ сохраняя хладнокровие и демонстрируя свое безразличие к теме беседы E/ воспитывая в людях устойчивость к стрессу, путем строгого контроля за их поступками и своевременного выявления ошибок в поведении

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

По мнению Дейла Карнеги, уменьшить чувство обиды от сделанного замечания или неприятного поручения можно: A/ высказав свое замечание или требование в письменной форме B/ высказывая замечание или задание в форме вопроса или предположения C/ демократично обсудив совершенный проступок в коллективе сотрудников D/ сохраняя хладнокровие и демонстрируя свое безразличие к теме беседы E/ воспитывая в людях устойчивость к стрессу, путем строгого контроля за их поступками и своевременного выявления ошибок в поведении

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: B

По мнению Дейла Карнеги, чтобы склонить собеседника к своей точке зрения, следует: A/ никогда прямо не заявлять человеку, что он не прав B/ пытаться взять инициативу в разговоре, говорить много и убедительно C/ четко определить предмет спора, разницу в ваших позициях D/ проявлять непреклонность, даже если вы не уверены в правильности своей позиции E/ продемонстрировать Ваше равнодушие к результату спора

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: A

По мнению Дейла Карнеги, чтобы склонить собеседника к своей точке зрения, следует: A/ искренне заявлять человеку о своей несогласии с ним B/ пытаться взять инициативу в разговоре, говорить много и убедительно C/ четко определить предмет спора, разницу в ваших позициях D/ проявлять непреклонность, даже если вы не уверены в правильности своей позиции E/ проявлять искренний интерес к мнению оппонента, пытаться понять его

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

ANSWER: E

По мнению Э.Берна, наибольшее удовольствие в жизни людям приносит:А/ процедураВ/ ритуалС/ времяпрепровождениеD/ играЕ/ близость

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

В случае отказа от лечения важнее всего:А/ напугать больного последствиямиВ/ предоставить больному побольше информацииС/ показать пациенту хорошую перспективу леченияD/ обратиться за помощью к родственникам и друзьямЕ/ предоставить больному свободу выбора

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: C

По мнению Э.Берна, семейные скандалы почти всегда представляют собой:А/ процедуруВ/ ритуалС/ времяпрепровождениеD/ игруЕ/ близость

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: D

Род социальных действий, который, согласно Эрику Берну, предполагает отсутствие искренности и стремление к верховенству:А/ ритуалВ/ процедураС/ времяпрепровождениеD/ операцияЕ/ игра

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

ANSWER: E

Эрик Берн описывает следующие виды социальных действий (последовательностей транзакций):1/ процедуры2/ времяпрепровождения3/ ритуалы4/ игры

- A) верно 1,2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: E

Эрик Берн описывает следующие виды социальных действий (последовательностей транзакций):1/ процедуры2/ конфликты3/ ритуалы4/ защиты

- A) верно 1,2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: B

Эрик Берн описывает следующие виды социальных действий (последовательностей транзакций):1/ процедуры2/ близость3/ ритуалы4/ агрессия

- A) верно 1,2 и 3
- B) верно 1 и 3
- C) верно 2 и 4
- D) верно только 4
- E) верно всё

ANSWER: A

Эрик Берн описывает следующие виды социальных действий (последовательностей транзакций):1/ интеллектуализация2/ процедуры3/ фантазии4/ игры

- A) верно 1,2 и 3

- В) верно 1 и 3
- С) верно 2 и 4
- Д) верно только 4
- Е) верно всё

ANSWER: С

В случае отказа от лечения важнее всего: А/ напугать больного последствиями В/ предоставить больному побольше информации С/ предоставить больному свободу выбора Д/ обратиться за помощью к родственникам Е/ успокоить и обнадежить больного

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: Е

Выявление алогичных установок, мешающих адаптации, и их опровержение считается основной целью психотерапии согласно: А/ психодинамической концепции В/ бихевиоральной концепции С/ когнитивной концепции Д/ гуманистической концепции Е/ социобиологической концепции

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: С

Гипноз является вариантом психотерапии: А/ недирективной В/ экспрессивной С/ суггестивной Д/ когнитивной Е/ бихевиоральной

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: С

Если сообщение врача привело больного в шок и выразилось бурными чувствами, правильнее всего: А/ предложить больному стакан воды В/ пожуричь его за несдержанность С/ назвать переживаемые больным чувства словами Д/ показать собственной мимикой те же самые чувства Е/ продемонстрировать спокойствие и безучастность

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: С

Если сообщение врача привело больного в шок и выразилось бурными чувствами, правильнее всего: А/ попросить больного успокоиться В/ указать ему, как следует вести себя в таких случаях С/ не обращать внимание на поведение пациента Д/ предложить ему отложить этот разговор Е/ назвать переживаемые больным чувства словами

- А) А
- В) В
- С) С
- Д) Д
- Е) Е

ANSWER: Е