

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных
заболеваний им.Е.И.Марциновского

Кафедра медицинской паразитологии и вирусологии

Методические материалы по дисциплине:

Клиническая паразитология

основная профессиональная образовательная программа высшего
профессионального образования - программа специалитета

31.05.02 Педиатрия ОП

Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

1. В каком органе наиболее часто локализуются абсцессы при внекишечном амебиазе:
А. Печени +
В. Почках
С. Легких
D. Головном мозге
2. Широкий лентец паразитирует в:
А. тонком кишечнике +
В. желчных путях
С. мочеполовой
D. головном мозге
3. На территории Российской Федерации из трансмиссивных гельминтозов передаются возбудители:
А. дирофиляриоза +
В. мансонеллеза
С. лоаоза
D. бругиоза
4. Окончательный хозяин – это организм, в котором
А. происходит половое размножение паразита +
В. локализуется неполовозрелая особь
С. присутствует вегетативная стадия паразита
D. происходит партеногенетическое размножение паразита
5. Возможное осложнение при дифиллоботриозе:
А. В12-дефицитная анемия +
В. отек головного мозга
С. пневмония
D. миокардит
6. Препаратом выбор для лечения токсокароза является:
А. альбендазол +
В. пирантел
С. делагил
D. метронидазол
7. Эндопаразиты
А. паразитируют внутри организма хозяина +
В. паразитируют на наружной поверхности тела
С. паразитируют внутри другого паразита
D. свободно живут в почве
8. Возбудитель дифиллоботриоза:
А. *D. latum* +
В. *T. saginata*
С. *D. medinensis*

D. *T. trichiurus*

9. Отметьте эндопаразитов

A. описторхис +

B. вши

C. комар

D. клещ

10. Для лечения дифиллоботриоза используется противопаразитарный препарат Празиквантел в дозе:

A. 25 мг/кг внутрь однократно +

B. по 25 мг внутрь 5 дней

C. 25 млн. ЕД в/м

D. 10 мг/кг внутрь однократно

11. Отметьте эктопаразитов

A. блоха +

B. боррелии

C. фасциола

D. лейшмании

12. К возбудителям тениозов не относится:

A. *T. gondii* +

B. *T. solium*

C. *T. saginata*

D. *T. asiatica*

13. Цистицеркоз – это:

A. биогельминтоз, вызываемый паразитированием в тканях и органах человека личиночной стадии *T. solium* +

B. геогельминтоз, вызываемый паразитированием в кишечнике человека взрослых особей *T. saginata*

C. биогельминтоз, вызываемый паразитированием в тканях и органах человека личиночной стадии *T. saginata*

D. биогельминтоз, вызываемый паразитированием в тканях и органах человека взрослых особей *T. solium*

14. Все перечисленное справедливо в отношении цистицеркоза, кроме:

A. передается при употреблении загрязненных овощей и зелени +

B. возможный способ заражения - аутосуперинвазия

C. часто локализуются в подкожной клетчатке, головном мозге, глазах

D. при поражении глаз показано хирургическое лечение

15. Отметьте паразита, входящего в двухчленную паразитарную систему

A. лямблия +

B. описторхис

C. малярийный плазмодий

D. тениаринхус

16. Препарат выбора для лечения тениозов:

- A. празиквантел +
- B. ципрофлоксацин
- C. альбендазол
- D. ивермектин

17. Отметьте паразита, входящего в двухчленную паразитарную систему

- A. власоглав +
- B. клонорхис
- C. тениа
- D. лейшмания

18. Отметьте паразита, входящего в трехчленную паразитарную систему

- A. малярийный плазмодий +
- B. аскарида
- C. лямблия
- D. описторхис

19. Отметьте паразита, входящего в трехчленную паразитарную систему

- A. тениаринхус +
- B. власоглав
- C. клонорхис
- D. балантидий

20. Отметьте паразита, входящего в трехчленную паразитарную систему

- A. лейшмания +
- B. стронгилоидес
- C. дифиллоботриум
- D. лямблия

21. Противорецидивная терапия после хирургического лечения эхинококкоза печени, вызванного *Echinococcus granulosus*, назначается на:

- A. 90 дней +
- B. 7 дней
- C. пожизненно
- D. 365 дней

22. В отношении альвеолярного эхинококкоза верно все, кроме:

- A. наблюдение за больным проводится 3-5 лет +
- B. заболевание часто заканчивается летально
- C. ларвоциста многокамерная
- D. наиболее характерно развитие первичных ларвоцист в печени

23. Паразитарные болезни, резервуаром возбудителей которых являются животные, и к которым, восприимчив человек, называются

- A. зоонозы +
- B. антропонозы
- C. сапронозы
- D. антропозоонозы

24. Паразитарные болезни, возбудители которых вне человеческих

коллективов существовать не могут

- A. антропонозы +
- B. зоонозы
- C. сапронозы
- D. антропозоонозы

25. Паразитарная болезнь, наносящая наибольший социальный и экономический ущерб в мире

- A. тропическая малярия +
- B. энтеробиоз
- C. тениаринхоз
- D. аскаридоз

26. Назовите наиболее распространенный гельминтоз, из регистрируемых на территории Российской Федерации

- A. энтеробиоз +
- B. аскаридоз
- C. трихинеллез
- D. трихоцефалез

27. Возбудитель альвеолярного эхинококкоза:

- A. E. multilocularis +
- B. E. histolytica
- C. E. granulosus
- D. E. polecki

28. К трансмиссивным паразитарным болезням не относят

- A. описторхоз +
- B. лейшманиоз
- C. дирофиляриозы
- D. малярия

29. Золотым стандартом верификации эхинококкоза служит:

- A. гистологическое исследование операционного материала +
- B. внутрикожная проба с антигеном
- C. жалобы
- D. серологическая диагностика

30. Возможность реализации водного пути передачи определяется

- A. наличием возбудителя в воде +
- B. устойчивостью возбудителя в почве
- C. числом инвазионных стадий паразита, выделяемых источником инвазии
- D. широким использованием воды в жизнедеятельности человека

31. Возможность реализации пищевого пути передачи гельминтозов определяется

- A. наличием инвазионных стадий паразита в пищевых продуктах +
- B. числом инвазионных стадий паразита, выделяемых источником инвазии
- C. способностью паразита размножаться в пищевых продуктах

D. широким использованием воды в жизнедеятельности человека

32. Заражение человека эхинококком происходит при

A. попадании в организм онкосфер +

B. употреблении в пищу свинины

C. контакте с больным человеком

D. употреблении в пищу мяса овец

33. Заражение паразитами через укусы кровососущих членистоногих может происходить при

A. дирофиляриозах +

B. дикроцелиозах

C. эхинококкозах

D. дипилидиозах

34. За полярным кругом не происходит заражение человека

A. анкилостоматидами +

B. аскаридами

C. дифиллоботридами

D. острицами

35. К возбудителям трематодозов не относится:

A. бычий цепень+

B. кошачья двуустка

C. китайская двуустка

D. легочный сосальщик

36. Биогельминтозы – это

A. гельминтозы, возбудители которых, покинув организм человека должны пройти определённую часть цикла в ином хозяине, прежде чем они смогут инвазировать другого человека +

B. гельминтозы, возбудители которых весь цикл своего развития проходят в одном хозяине

C. гельминтозы, возбудители которых, покинув организм человека должны пройти часть цикла в неживом субстрате (обычно в почве)

D. гельминтозы, возбудители которых нуждаются в развитии в растениях

37. В питьевой воде с наибольшей вероятностью можно обнаружить возбудителей

A. лямблиоза +

B. лейшманиоза

C. аскаридоза

D. энтеробиоза

38. Люди, зараженные описторхозом, подвержены риску развития:

A. холангиокарциномы +

B. псевдомембранозного колита

C. инфаркта сердца

D. выкидыша

39. Простейшие, паразитирующие в крови человека, могут передаваться

- A. трансмиссивным путем +
- B. пищевым путем
- C. контактным путем
- D. водным путем

40. К паразитарным болезням, передаваемым через мясо и мясную продукцию, относятся

- A. трихинеллез +
- B. аскаридоз
- C. амёбиаз
- D. фасциоз

41. К паразитарным болезням, передаваемым через мясо и мясную продукцию, относятся

- A. тениаринхоз +
- B. трихоцефалез
- C. гименолепидоз
- D. фасциоз

42. К паразитарным болезням, передаваемым через рыбу и рыбную продукцию, относятся

- A. описторхоз +
- B. дикроцелиоз
- C. трихоцефалез
- D. фасциоз

43. К паразитарным болезням, передаваемым через почву и огородные культуры, относятся

- A. аскаридоз +
- B. дикроцелиоз
- C. трихинеллез
- D. дифилляриоз

44. При подозрении на описторхоз, важным в эпидемиологическом анамнезе является факт употребления в пищу:

- A. недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых +
- B. непросоленной щукой икрой
- C. недостаточно термически обработанного мяса медведя
- D. сырых устриц

45. К паразитарным болезням, передаваемым непосредственно от человека к человеку, относятся

- A. энтеробиоз +
- B. дифиллоботриоз
- C. дикроцелиоз
- D. аскаридоз

46. К СПИД-ассоциируемым (оппортунистическим) паразитарным болезням, относят

- A. токсоплазмоз +
- B. гемеинолепидоз
- C. дикроцелиоз
- D. лямблиоз

47. В отношении описторхоза верно все, кроме:

- A. окончательный диагноз можно установить при обнаружении АТ IgG +
- B. окончательный диагноз можно установить при обнаружении яиц в дуоденальном содержимом
- C. функции печени при неосложненном описторхозе остаются в норме или незначительно нарушены
- D. окончательный диагноз можно установить при обнаружении яиц в кале

48. Тремато́ды наиболее часто поражают:

- A. гепатобилиарную систему +
- B. сердечно-сосудистую систему
- C. нервную систему
- D. мочеполовую систему

49. Какими кишечными гельминтами можно заразиться непосредственно от больного человека

- A. ги́менолеписа́ми +
- B. описторхисами
- C. аскаридами
- D. тениями

50. К какой группе по эпидемиологической классификации гельминтозов относятся аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз?

- A. геогельминтозы +
- B. биогельминтозы
- C. контактные гельминтозы
- D. перкутаные гельминтозы

51. К какой группе инфекций по механизму передачи возбудителя относится амебиаз

- A. с фекально-оральным механизмом передачи +
- B. с аэрозольным механизмом передачи
- C. с трансмиссивным механизмом передачи
- D. с контактным механизмом передачи

52. К какому классу гельминтов относится возбудитель аскаридоза

- A. нематоды +
- B. цестоды
- C. трематоды
- D. скребни

53. Формирование личинки в яйце аскариды происходит

- A. в почве +
- B. на теле окончательного хозяина

- С. в природных водоемах
- Д. в организме окончательного хозяина

54. Яйца каких видов гельминтов наиболее устойчивы к воздействию физических факторов окружающей среды

- А. аскарид +
- В. дифиллоботриид
- С. описторхисов
- Д. остриц

55. Местом локализации половозрелой *Ascaris lumbricoides* в организме человека является

- А. тонкий кишечник +
- В. двенадцатиперстная кишка
- С. желчевыделительная система
- Д. лёгкие

56. Продолжительность жизни половозрелой аскариды составляет

- А. около года +
- В. три месяца
- С. до 5 лет
- Д. до 20 лет

57. Паразитологический диагноз устанавливается при обнаружении яиц шистосом в моче через:

- А. 30 – 45 дней после заражения +
- В. 7 – 15 дней после заражения
- С. 3 – 6 дней после заражения
- Д. 16 – 28 дней после заражения

58. Диагноз гименолепидоз крысиный (диминутный) устанавливается при обнаружении яиц *H. diminuta* в:

- А. испражнениях больного +
- В. крови больного методом ИФА
- С. ликворе больного
- Д. моче больного

59. Для *Hymenolepis diminuta* человек выступает в роли

- А. случайного хозяина +
- В. промежуточного хозяина
- С. дополнительного хозяина
- Д. резервуарного хозяина

60. Эпидемиологическая группа гельминтозов, к которой может быть отнесен гименолепидоз, вызываемый *Hymenolepis nana*

- А. контактные гельминтозы +
- В. биогельминтозы
- С. геогельминтозы
- Д. перкутанные гельминтозы

61. Диагноз лямблиоза устанавливается на основании результатов паразитологического исследования:
- A. испражнений или дуоденального содержимого методом микроскопии +
 - B. крови методом ИФА
 - C. мочи или дуоденального содержимого методом микроскопии
 - D. испражнений или крови методом ИФА
62. Гельминтоз, при котором яйца паразита выделяются из организма окончательного хозяина в зрелом инвазионном для человека состоянии
- A. гименолепидоз, вызываемый карликовым цепнем +
 - B. гименолепидоз, вызываемый крысиным цепнем
 - C. аскаридоз
 - D. фасциолез
63. Цикл эритроцитарной шизогония *P. vivax* и *P. ovale* протекает в течение:
- A. 48 часов +
 - B. 24 часов
 - C. 72 часов
 - D. 12 часов
64. Основным источником заражения при гименолепидозе является:
- A. больной человек +
 - B. больной попугай
 - C. больная собака
 - D. больная кошка
65. Эпидемиологическая группа гельминтозов, к которой может быть отнесен дифиллоботриоз
- A. биогельминтозы +
 - B. геогельминтозы
 - C. контактные гельминтозы
 - D. перкутанные гельминтозы
66. Заражение широким лентецом происходит при употреблении в пищу не обеззараженной
- A. щуки +
 - B. кеты
 - C. муксуна
 - D. язя
67. Для лечения больных дифиллоботриозом используется:
- A. празиквантел в суточной дозе 25 мг/кг внутрь в один прием +
 - B. альбендазол в суточной дозе 25 мг/кг внутрь в один прием
 - C. празиквантел в суточной дозе 50 мг/кг внутрь в один прием
 - D. альбендазол в суточной дозе 50 мг/кг внутрь в один прием
68. Какая личиночная стадия лентеца является инвазионной для человека
- A. плероцеркоид +
 - B. корацидий

- С. процеркоид
- Д. онкосфера

69. Какова продолжительность жизни *Diphyllbothrium latum* в организме человека

- А. более 20 лет +
- В. 6 месяцев
- С. до 5 лет
- Д. 1 месяц

70. Цикл развития эхинококкового цепня *E. granulosus* протекает со сменой:

- А. двух хозяев +
- В. одного хозяина
- С. трех хозяев
- Д. четырех хозяев

71. К какому классу гельминтов относится возбудитель клонорхоза

- А. трематоды +
- В. цестоды
- С. нематоды
- Д. скребни

72. Возбудителем клонорхоза является:

- А. двуустка китайская – *C. sinensis* +
- В. двуустка кошачья – *O. felineus*
- С. двуустка ланцетовидная – *D. lanceatum*
- Д. двуустка кошачья – *O. viverrini*

73. Серологические методы диагностики эхинококкоза используют при:

- А. скрининге и оценке результатов операционного лечения +
- В. установке клинического диагноза и оценке результатов операционного лечения
- С. скрининге и установке клинического диагноза
- Д. возвращении из Африканских стран

74. При альвеококкозе первично всегда поражается:

- А. печень +
- В. легкие
- С. почки
- Д. головной мозг

75. Местом локализации *Clonorchis sinensis* в организме человека является

- А. желчевыделительная система +
- В. верхний отдел тонкого кишечника
- С. двенадцатиперстная кишка
- Д. лёгкие

76. Иммунологические методы диагностики гельминтозов и протозоозов относятся к методам:

- А. косвенным +

- В. основным
- С. прямым
- Д. непрямым

77. Какими гельминтами происходит заражение человека при употреблении в пищу рыб семейства карповых

- А. описторхисами +
- В. японским или восточным легочной двуусткой
- С. дифиллоботриумами
- Д. тениаринхусами

78. Эпидемиологическая группа гельминтов, к которой может быть отнесен описторхоз

- А. биогельминтозы +
- В. геогельминтозы
- С. контактные гельминтозы
- Д. перкутанные гельминтозы

79. К какому классу гельминтов относятся возбудители описторхоза

- А. трематоды +
- В. цестоды
- С. нематоды
- Д. скребни

80. С помощью каких приспособлений описторхис закрепляется в организме окончательного хозяина

- А. присосок +
- В. крючьев
- С. присосок и крючьев
- Д. ботрий

81. Наиболее типичным изменением лабораторных показателей при токсокарозе является повышенное содержание:

- А. эозинофилов в периферической крови +
- В. лейкоцитов в моче
- С. эритроцитов в периферической крови
- Д. эритроцитов в моче

82. При подозрении на токсокароз материалом для исследования является:

- А. сыворотка крови +
- В. кал
- С. моча
- Д. дуоденальное содержимое

83. Местом локализации *Opisthorchis felinus* в организме человека является

- А. желчевыделительная система +
- В. верхний отдел тонкого кишечника
- С. двенадцатиперстная кишка
- Д. лёгкие

84. Какова продолжительность жизни *Opisthorchis felinus* в организме человека

- A. более 20 лет +
- B. 6 месяцев
- C. до 5 лет
- D. 1 месяц

85. Можно ли выявить у больного токсокароз при исследовании кала:

- A. нет +
- B. да
- C. не всегда
- D. при окрашивании препарата кала

86. При выявлении какого высоко контагиозного гельминтоза, лечение проводится всем членам детского коллектива или всем членам семьи больного одновременно:

- A. энтеробиоз +
- B. аскаридоз
- C. вухерериоз
- D. дирофиляриоз

87. Эпидемиологическая группа гельминтозов, к которой может быть отнесен стронгилоидоз

- A. геогельминтозы +
- B. биогельминтозы
- C. контактные гельминтозы
- D. трансмиссивные гельминтозы

88. Какая стадия развития стронгилоида является инвазионной для человека

- A. филяриевидная личинка +
- B. яйцо
- C. рабдитовидная личинка
- D. половозрелый стронгилоид

89. К какому классу гельминтов относится возбудитель стронгилоидоза

- A. нематоды +
- B. цестоды
- C. трематоды
- D. скребни

90. Гельминтоз, при котором число особей паразита в организме человека может нарастать без дополнительного заражения

- A. стронгилоидоз +
- B. аскаридоз
- C. трихоцефалез
- D. энтеробиоз

91. Механизм заражения при стронгилоидозе преимущественно:

- A. перкутанный +

- В. трансмиссивный
- С. воздушно-капельный
- Д. парентеральный

92. Гельминтоз, возбудитель которого может находиться в окружающей среде в виде свободноживущих особей

- А. стронгилоидоз +
- В. анкилостомоз
- С. некатороз
- Д. дикроцелиоз

93. Эпидемиологическая группа гельминтозов, к которой может быть отнесен тениаринхоз

- А. биогельминтозы +
- В. геогельминтозы
- С. контактные гельминтозы
- Д. перкутанные гельминтозы

94. Возбудитель тениаринхоза относится к классу гельминтов

- А. цестоды +
- В. трематоды
- С. нематоды
- Д. скребни

95. Какая стадия развития бычьего цепня инвазионна для человека

- А. цистицеркоид +
- В. онкосфера
- С. яйцо
- Д. плероцеркоид

96. Препаратом выбора в лечении парагонимоза является

- А. празиквантел в суточной дозе 55 мг/кг в 3 приема в течение двух дней +
- В. альбендазол в суточной дозе 55 мг/кг в 3 приема в течение двух дней
- С. макмирор в суточной дозе 55 мг/кг в 3 приема в течение двух дней
- Д. тинидазол в суточной дозе 55 мг/кг в 3 приема в течение двух дней

97. Промежуточный хозяин *Taeniarrhynchus saginatus*

- А. бык +
- В. рыба семейства лососевых
- С. свинья
- Д. человек

98. Продолжительность жизни половозрелого бычьего цепня в организме человека

- А. 20 лет +
- В. около года
- С. до 5 лет
- Д. три месяца

99. Какой гельминтоз можно выявить методом опроса

- A. тениаринхоз +
- B. аскаридоз
- C. дифиллоботриоз
- D. тениоз

100. Эпидемиологическая группа гельминтозов, к которой может быть отнесен трихоцефалёз:

- A. геогельминтозы +
- B. биогельминтозы
- C. контактные гельминтозы
- D. перкутанные гельминтозы

101. Формирование личинки в яйце власоглава происходит

- A. в почве +
- B. на теле окончательного хозяина
- C. в природных водоемах
- D. в организме окончательного хозяина

102. Продолжительность жизни половозрелого власоглава в организме человека составляет:

- A. до 5 лет +
- B. около года
- C. три месяца
- D. до 20 лет

103. Эпидемиологическая группа гельминтозов, к которой может быть отнесен фасциолез

- A. биогельминтозы +
- B. геогельминтозы
- C. контактные гельминтозы
- D. перкутанные гельминтозы

104. Бычий цепень, как правило, паразитирует у человека в:

- A. единственном числе +
- B. порядковом числе
- C. множественном числе
- D. иррациональном числе

105. Контроль эффективности лечения аскаридоза через 2 недели после окончания терапии проводят:

- A. 3 исследования кала с интервалом в 2 недели +
- B. 2 исследования кала с интервалом в 2 недели
- C. 3 исследования кала с интервалом в 3 недели
- D. 2 исследования кала с интервалом в 3 недели

106. Лечение висцерального лейшманиоза проводят препаратом:

- A. амфотерицин В +
- B. далагил
- C. метронидазол

D. бильтрицид

107. Взрослые свиные цепни паразитируют в:

- A. тонкой кишке человека +
- B. печени человека
- C. легких человека
- D. головном мозге человека

108. Во избежание риска заражения больного и окружающих цистицеркозом необходимо испражнения больного:

- A. залить двойным объемом крутого кипятка и выдержать в течение 30 минут +
- B. закопать в землю
- C. залить охлажденной кипяченной водой и выдержать в течение часа
- D. высушить

109. При исследовании желчи невозможно обнаружить яйца:

- A. остриц +
- B. клонорха
- C. фасциол
- D. описторха

110. Возбудитель фасциолеза относится к классу гельминтов

- A. трематод +
- B. цестод
- C. нематод
- D. скребней

111. Возбудители филяриозов, приводящие к поражениям кожи и зрения:

- A. *Onchocerca volvulus* +
- B. *Wuchereria bancrofti*
- C. *Brugia malayi*
- D. *Mansonella ozzardi*

112. Какая личиночная стадия фасциол является инвазионной для человека

- A. адолескария +
- B. редия
- C. церкария
- D. метацеркария

113. Пути заражения фасциолами:

- A. питье необеззараженной воды, из водоемов, посещаемых жвачными +
- B. контактный
- C. прикладывание мяса зараженных вторых промежуточных хозяев возбудителя к ранам и слизистым
- D. трансмиссивным путем, через переносчика

114. Местом локализации *Fasciola hepatica* в организме человека является

- A. желчевыделительная система +
- B. верхний отдел тонкого кишечника

- С. двенадцатиперстная кишка
- Д. лёгкие

115. Формирование личинки-мирацидия в яйце фасциолы происходит

- А. в природных водоемах +
- В. в организме промежуточного хозяина
- С. в организме окончательного хозяина
- Д. в почве

116. Какова продолжительность жизни *Fasciola hepatica* в организме человека

- А. до 5 лет +
- В. 6 месяцев
- С. 1 месяц
- Д. более 20 лет

117. Эпидемиологическая группа гельминтозов, к которой может быть отнесен энтеробиоз

- А. контактные гельминтозы +
- В. геогельминтозы
- С. биогельминтозы
- Д. перкутанные гельминтозы

118. К какому классу гельминтов относится возбудитель энтеробиоза

- А. цестоды +
- С. нематоды
- В. трематоды
- Д. скребни

119. Формирование личинки в яйце острицы происходит

- А. на теле окончательного хозяина +
- В. в организме окончательного хозяина
- С. в природных водоемах
- Д. в почве

120. Местом локализации *Enterobius vermicularis* в организме человека является

- А. толстый кишечник +
- В. тонкий кишечник
- С. желчевыделительная система
- Д. двенадцатиперстная кишка

121. Жители городов чаще всего заражаются

- А. острицами +
- В. аскаридами
- С. власоглавами
- Д. трихинеллами

122. Выползание остриц и откладка яиц начинаются:

- А. через 10–12 дней после заражения +
- В. через 20–22 дня после заражения
- С. через 25 – 30 дней после заражения

D. через 3-7 дней после заражения

123. У человека при приобретенном токсоплазмозе наиболее часто поражается:

A. лимфатическая система +

B. кровеносная система

C. ЖКТ

D. мочевыделительная система

124. К патогенным амёбам, обитающим в кишечнике человека, относятся

A. *Entamoeba histolytica* +

B. *Entamoeba coli*

C. *Entamoeba hartmanni*

D. *Endolimax nana*

125. Какой симптомокомплекс характерен для трихинеллеза:

A. лихорадка+отечный синдром+миалгии +

B. озноб-жар-пот

C. зуд в заднем проходе+лихорадка

D. боль в животе+диарея+пот

126. Путь проникновения дизентерийной амебы в организм человека

A. пероральный +

B. перкутанный

C. трансмиссивный

D. вертикальный

127. Какой стадией жизненного цикла дизентерийной амебы происходит заражение человека

A. цистой +

B. просветной формой вегетативной стадии

C. тканевой формой вегетативной стадии

D. ооцистой

128. Возбудитель амёбиаза относится к

A. простейшим +

B. бактериям

C. вирусам

D. грибам

129. Какой стадией жизненного цикла лямблий происходит заражение человека

A. цистой +

B. вегетативной стадией

C. цистой или ооцистой

D. ооцистой

130. Путь проникновения лямблий в организм человека

A. пероральный +

B. перкутанный

C. трансмиссивный

D. вертикальный

131. Основное место локализации лямблий в организме человека

A. верхний отдел тонкого кишечника +

B. двенадцатиперстная кишка

C. толстая кишка

D. печень и желчный пузырь

132. К группам риска в отношении криптоспоридиоза относятся дети в возрасте:

A. от 1 до 5 лет +

B. от 9 до 14 лет

C. до 6 мес

D. от 14 до 18 лет

133. Дефинитивным хозяином токсоплазм являются

A. животные семейства кошачьих +

B. люди

C. грызуны

D. птицы

134. Дети и взрослые с приобретенным токсоплазмозом в острой стадии без поражения органа зрения подлежат диспансерному наблюдению в течение

A. 12 мес. +

B. 24 мес.

C. 36 мес.

D. 48 мес.

135. Анизакидоз распространен в странах, где практикуется употребление:

A. свежей морской рыбы +

B. свежей речной рыбы

C. бастурмы

D. суджука

136. Среди видовых форм малярии наибольший ареал имеет

A. трехдневная +

B. тропическая

C. овале-малярия

D. четырехдневная

137. Малярийный плазмодий способный вызвать местную передачу на территории России

A. *Plasmodium vivax* +

B. *Plasmodium falciparum*

C. *Plasmodium ovale*

D. *Plasmodium malariae*

138. Возбудитель малярии, который может привести к летальному исходу

A. *Plasmodium falciparum* +

B. *Plasmodium vivax*

- C. *Plasmodium ovale*
- D. *Plasmodium malariae*

139. В жизненном цикле малярийных плазмодиев человек является

- A. промежуточным хозяином +
- B. окончательным хозяином
- C. факультативным хозяином
- D. резервуарным хозяином

140. Покоящиеся экзоэритроцитарные стадии встречаются у малярии вызванные:

- A. *Plasmodium vivax* и *Plasmodium ovale* +
- B. *Plasmodium vivax* и *Plasmodium falciparum*
- C. *Plasmodium falciparum* и *Plasmodium ovale*
- D. *Plasmodium malariae* и *Plasmodium knowlesi*

141. Пути передачи малярии:

- A. трансмиссивный +
- B. пищевой
- C. контактный
- D. пероральный

142. В отношении трихенеллеза верно все, кроме:

- A. заболевание может протекать в хронической форме +
- B. гиперэозинофилия крови – наиболее ранний симптом заболевания
- C. при несвоевременном начале противопаразитарной терапии, высока вероятность развития осложнений
- D. для постановки диагноза иногда прибегают к биопсии дельтовидной или икроножных мышц

143. Переносчиком лейшманиоза является

- A. москит +
- B. муха цеце
- C. комар *Aedes*
- D. мошка *Simulium*

144. Постоянный эктопаразит человека:

- A. головная вошь +
- B. москит
- C. комнатная муха
- D. таёжный клещ

145. Переносчики малярии:

- A. комары *Anopheles* +
- B. комары *Aedeomyia*
- C. комары *Aedes*
- D. комары *Culex*

146. Изучением распространения и распределения цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов в среде обитания человека и разработкой

мероприятий по оздоровлению и охране окружающей среды от попадания инвазионного материала занимается

- A. санитарная паразитология +
- B. санитарная эпидемиология
- C. санитарная гигиена
- D. санитарная экология

147. Специфическими переносчиками возбудителей болезней являются

- A. клещи, вши, блохи +
- B. мухи
- C. постельные клопы
- D. тараканы

148. Членистоногие могут участвовать в реализации следующих механизмов передачи

- A. трансмиссивного +
- B. аэрозольного
- C. контактного
- D. фекально-орального

149. Механическими переносчиками возбудителей паразитарных болезней являются

- A. мухи +
- B. комары
- C. клещи
- D. слепни

150. Основной метод лечения эхинококкозов:

- A. хирургический +
- B. антибактериальная терапия
- C. народная медицина
- D. физиотерапия