

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М.**

**Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

**Институт Фармации им.
А.П. Нелюбина**

Кафедра фармакологии

Методические материалы по дисциплине:

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Фармакология

основная профессиональная Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата

34.00.00 Сестринское дело

34.03.01 Сестринское дело

Дидактическая единица №1. Общая фармакология. (2)-20

1

ДЕ-1. Вопрос-1

Вопрос:

Понятие "фармакодинамика" включает:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Локализацию действия ЛВ
- 2) Связывание ЛВ с "мишенями" и механизмы действия
- 3) Фармакологические эффекты
- 4) Биотрансформацию (метаболизм)

Верные ответы: 1; 2; 3;

2

ДЕ-1. Вопрос-2

Вопрос:

Понятие "фармакокинетика" включает:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Всасывание
- 2) Связывание ЛВ с "мишенями" и механизмы действия
- 3) Транспорт и распределение
- 4) Биотрансформацию (метаболизм)

Верные ответы: 1; 3; 4;

3

ДЕ-1. Вопрос-3

Вопрос:

Энтеральные пути введения ЛВ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Пероральный (внутрь)
- 2) Сублингвальный
- 3) Внутримышечный
- 4) Ректальный

Верные ответы: 1; 2; 4;

4

ДЕ-1. Вопрос-4

Вопрос:

Парентеральные пути введения ЛВ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Внутривенный
- 2) Сублингвальный
- 3) Внутримышечный
- 4) Ректальный

Верные ответы: 1; 3;

5

ДЕ-1. Вопрос-5

Вопрос:

Энтеральные пути введения ЛВ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Трансдермальный
- 2) Сублингвальный
- 3) Трансбуккальный
- 4) Ректальный

Верные ответы: 2; 3; 4;

6

ДЕ-1. Вопрос-6

Вопрос:

ЛВ попадают в системный кровоток, минуя печень при введении

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Перорально (внутрь)
- 2) Сублингвально
- 3) Трансбуккально
- 4) Трансдермально

Верные ответы: 2; 3;

7

ДЕ-1. Вопрос-7

Вопрос:

Явления, возникающие при повторном введении ЛВ:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Кумуляция
- 2) Сенсибилизация
- 3) Привыкание
- 4) Синергизм

Верные ответы: 1; 2; 3;

8

ДЕ-1. Вопрос-8

Вопрос:

Виды синергизма

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Привыкание
- 2) Потенцирование
- 3) Лекарственная зависимость
- 4) Суммирование

Верные ответы: 2; 4;

9

ДЕ-1. Вопрос-9

Вопрос:

Виды отрицательного действия ЛВ на разные стадии развития плода

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Идиосинкразия
- 2) Эмбриотоксичность
- 3) Тератогенное действие
- 4) Фетотоксическое действие

Верные ответы: 2; 3; 4;

10

ДЕ-1. Вопрос-10

Вопрос:

Явления, возникающие при комбинированном применении ЛВ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Синергизм
- 2) Лекарственная зависимость
- 3) Антагонизм
- 4) Привыкание

Верные ответы: 1; 3;

11

ДЕ-1. Вопрос-11

Вопрос:

Механизмы всасывания ЛВ, не сопровождающиеся затратой метаболической энергии

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Ультрафильтрация
- 2) Активный транспорт
- 3) Пассивная диффузия
- 4) Облегченная диффузия

Верные ответы: 1; 3; 4;

12

ДЕ-1. Вопрос-12

Вопрос:

Укажите термины, обозначающие отрицательные реакции на введении ЛВ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Идиосинкразия
- 2) Тахифилаксия
- 3) Ульцерогенное действие
- 4) Синергизм

Верные ответы: 1; 3;

13

ДЕ-1. Вопрос-13

Вопрос:

Несинтетические реакции метаболизма

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Окисление
- 2) Конъюгация
- 3) Восстановление
- 4) Гидролиз

Верные ответы: 1; 3; 4;

14

ДЕ-1. Вопрос-14

Вопрос:

Основной механизм всасывания большинства ЛВ в ЖКТ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Пиноцитоз
- 2) Ультрафильтрация
- 3) Пассивная диффузия

4) Активный транспорт

Верные ответы: 3;

15

ДЕ-1. Вопрос-15

Вопрос:

ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень при введении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Перорально (внутрь)
- 2) Сублингвально
- 3) Трансбуккально
- 4) Внутримышечно

Верные ответы: 1;

16

ДЕ-1. Вопрос-16

Вопрос:

Синтетические реакции метаболизма

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Окисление
- 2) Конъюгация
- 3) Восстановление
- 4) Гидролиз

Верные ответы: 2;

17

ДЕ-1. Вопрос-17

Вопрос:

Соотнесите название термина с его определением

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Гипотетический объем жидкости организма, в котором ЛВ распределено равномерно в концентрации равной концентрации данного ЛВ в плазме крови
- 2) Часть дозы введенного вещества, которая в неизменном виде достигла системного кровотока
- 3) Время, за которое концентрация в плазме крови снижается на 50%
- 4) Объем плазмы крови, очищающийся от ЛВ после прохождения через почки в единицу времени

- ☐ Период полуэлиминации ($T_{1/2}$)
- ☐ Почечный клиренс ($Cl_{\text{поч.}}$)
- ☐ Кажущийся объем распределения (V_d)
- ☐ Биодоступность (F)

Верные ответы:

- 3;
- 4;
- 1;
- 2;

18

ДЕ-1. Вопрос-18

Вопрос:

Соотнесите название термина с его определением

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Возникает после всасывания ЛВ в кровь
- 2) Обусловлено влиянием ЛВ на органы и ткани
- 3) Возникает при контакте с тканями в месте нанесения ЛВ
- 4) Возникает в результате прямого влияния ЛВ на головной и спинной мозг

- ☐ Местное действие
- ☐ Резорбтивное действие
- ☐ Периферическое действие
- ☐ Центральное действие

18) Верные ответы:

- 3;
- 1;
- 2;
- 4;

19

ДЕ-1. Вопрос-19

Вопрос:

Соотнесите название термина с его определением

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Дозы на курс лечения
- 2) Предельные дозы, вызывающие максимальный терапевтический эффект
- 3) Оказывают у большинства больных необходимое терапевтическое действие
- 4) Дозы, вызывающие минимальный терапевтический эффект

- ___ Минимальные действующие дозы
- ___ Средние терапевтические дозы
- ___ Высшие терапевтические дозы
- ___ Курсовые дозы

19) Верные ответы:

- 4;
- 3;
- 2;
- 1;

Дидактическая единица №2. Средства, регулирующие функции периферической нервной системы. (3)-25

1

ДЕ-2. Вопрос-20

Вопрос:

Соотнесите название термина с его определением

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) Направлена на восполнение недостатка эндогенных веществ в организме	___ Этиотропная фармакотерапия
2) Направлена на устранение или ограничение причины заболевания	___ Патогенетическая фармакотерапия
3) Направлена на ограничение или устранение отдельных нежелательных проявлений заболевания	___ Заместительная фармакотерапия
4) Направлена на ограничение или устранение механизмов развития заболевания	___ Симптоматическая фармакотерапия

20) Верные ответы:

2;

4;

1;

3;

2

ДЕ-2. Вопрос-21

Вопрос:

К М-холиноблокаторам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Атропин

2) Тропикамид

3) Эфедрин

4) Адреналин

21) Верные ответы: 1; 2;

3

ДЕ-2. Вопрос-22

Вопрос:

К местным анестетикам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Лидокаин
- 2) Доксазозин
- 3) Азаметония бромид
- 4) Бупивакаин

22) Верные ответы: 1; 4;

4

ДЕ-2. Вопрос-23

Вопрос:

Фармакологические эффекты атропина:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Расслабление скелетных мышц
- 2) Устранение спазмов гладкомышечных органов
- 3) Расширение зрачков (мидриаз)
- 4) Снижение секреции экзокринных желез

23) Верные ответы: 2; 3; 4;

5

ДЕ-2. Вопрос-24

Вопрос:

Отрицательные эффекты атропина:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Нарушение зрения
- 2) Сухость во рту
- 3) Сужение зрачков (миоз)
- 4) Брадикардия

24) Верные ответы: 1; 2;

6

ДЕ-2. Вопрос-25

Вопрос:

При бронхиальной астме применяют:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Сальбутамол
- 2) Пропранолол (анаприлин)
- 3) Фенотерол

4) Эфедрин

25) Верные ответы: 1; 3; 4;

7

ДЕ-2. Вопрос-26

Вопрос:

Показания к применению неселективных β - адреноблокаторов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Гипертоническая болезнь
- 2) Тахиформы аритмий
- 3) Бронхиальная астма
- 4) Ишемическая болезнь сердца

26) Верные ответы: 1; 2; 4;

8

ДЕ-2. Вопрос-27

Вопрос:

Основные показания к применению Фенотерола (Беротек, Партусистен):

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Спазмы периферических сосудов
- 2) Гипертонус матки, угрожающий выкидыш
- 3) Бронхиальная астма
- 4) Гипертоническая болезнь

27) Верные ответы: 2; 3;

9

ДЕ-2. Вопрос-28

Вопрос:

Форма выпуска Карведилола

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Мазь
- 2) Гель
- 3) Таблетки
- 4) Пластыри

28) Верные ответы: 3;

10

ДЕ-2. Вопрос-29

Вопрос:

Фармакологические эффекты Лидокаина:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Местноанестезирующий
- 2) Гипертензивный
- 3) Бронхолитический
- 4) Антиаритмический

29) Верные ответы: 1; 4;

11

ДЕ-2. Вопрос-30

Вопрос:

Показания к применению пилокарпина:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Острая сердечная недостаточность
- 2) Ишемическая болезнь сердца
- 3) Глаукома
- 4) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

30) Верные ответы: 3;

12

ДЕ-2. Вопрос-31

Вопрос:

Какое ЛС рефлекторно восстанавливает функцию дыхательного центра:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Никетамид (кордиамин)
- 2) Морфин
- 3) Налоксон
- 4) Раствор аммиака

31) Верные ответы: 4;

13

ДЕ-2. Вопрос-32

Вопрос:

Какое ЛС при повторном применении вызывает тахифилаксию?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Тамсулозин
- 2) Суксаметоний
- 3) Лидокаин

4) Эфедрин

32) Верные ответы: 4;

14

ДЕ-2. Вопрос-33

Вопрос:

При язвенной болезни желудка и 12-п. кишки применяют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Эфедрин
- 2) Нафазолин
- 3) Пирензепин (гастроцепин)
- 4) Адреналин

33) Верные ответы: 3;

15

ДЕ-2. Вопрос-34

Вопрос:

При бронхиальной астме противопоказан:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Сальбутамол
- 2) Пропранолол (анаприлин)
- 3) Фенотерол
- 4) Эфедрин

34) Верные ответы: 2;

16

ДЕ-2. Вопрос-35

Вопрос:

При простатите и аденоме предстательной железы применяют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Пилокарпин
- 2) Фенотерол
- 3) Клонидин
- 4) Тамсулозин (Омник)

35) Верные ответы: 4;

17

ДЕ-2. Вопрос-36

Вопрос:

Выберите препарат для повышения АД:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Азаметония бромид
- 2) Тамсулозин
- 3) Лидокаин
- 4) Фенилэфрин (мезатон)

36) Верные ответы: 4;

18

ДЕ-2. Вопрос-37

Вопрос:

Какой препарат вызывает ортостатическую гипотензию:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Лидокаин
- 2) Тамсулозин
- 3) Азаметония бромид
- 4) Фенилэфрин (мезатон)

37) Верные ответы: 3;

19

ДЕ-2. Вопрос-38

Вопрос:

Средние терапевтические дозы Клонидина (Клофелина):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 0.1 - 0.2
- 2) 0.01 - 0.02
- 3) 0.001 - 0.002
- 4) 0.000075 - 0.00015

38) Верные ответы: 4;

20

ДЕ-2. Вопрос-39

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Нафтизин
- 2) Анаприлин
- 3) Клофелин
- 4) Дилатренд

- ☐ Клонидин
- ☐ Нафазолин
- ☐ Пропранолол
- ☐ Карведилол

39) Верные ответы:

- 3;
- 1;
- 2;
- 4;

21

ДЕ-2. Вопрос-40

Вопрос:

Соотнесите название препарата с фармакологической группой

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) β - адреномиметики
- 2) α -адреномиметики
- 3) M_1 -холиноблокатор
- 4) Курареподобное средство (антидеполяризующий миорелаксант)

- ☐ Пирензепин (гастроцепин)
- ☐ Пипекурония бромид
- ☐ Сальбуматол
- ☐ Фенилэфрин

40) Верные ответы:

- 3;
- 4;
- 1;
- 2;

22

ДЕ-2. Вопрос-41

Вопрос:

Соотнесите фармакологический эффект с препаратом

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ипратропия бромид
- 2) Гиосцина бутилбромид (Бускопан)
- 3) Доксазозин
- 4) Ксилометазолин

- ☐ Сосудосуживающий
- ☐ Сосудорасширяющий
- ☐ Бронхолитический
- ☐ Спазмолитический

41) Верные ответы:

- 4;
- 3;
- 1;
- 2;

23

ДЕ-2. Вопрос-42

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Острая сердечная недостаточность
- 2) Ринит
- 3) Недержание мочи
- 4) ИБС

- ☐ Толтеродин (Детрузитол)
- ☐ Нафазолин
- ☐ Добутамин
- ☐ Метопролол

42) Верные ответы:

- 3;
- 2;
- 1;
- 4;

24

ДЕ-2. Вопрос-43

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Миастения
- 2) Для расширения зрачков при исследовании глазного дна
- 3) купирование гипертонического криза
- 4) ИБС, гипертоническая болезнь

- ☐ Тропикамид

- ☐ Бисопролол
- ☐ Неостигмина метилсульфат
- ☐ Азаметония бромид

43) Верные ответы:

- 2;
- 4;
- 1;
- 3;

25

ДЕ-2. Вопрос-44

Вопрос:

Соотнесите название препарата с механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Стимулирует М-холинорецепторы
- 2) Блокирует М-холинорецепторы
- 3) Блокирует N-холинорецепторы вегетативных ганглиев
- 4) Блокирует N-холинорецепторы скелетных мышц

- ☐ Азаметония бромид
- ☐ Атропин
- ☐ Пипекурония бромид
- ☐ Пилокарпин

44) Верные ответы:

- 3;
- 2;
- 4;
- 1;

26

ДЕ-2. Вопрос-45

Вопрос:

Соотнесите название препарата с фармакологической группой

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Неселективный β - адреноблокатор
- 2) Селективный β - адреноблокатор
- 3) Стимулятор α - адренорецепторов
- 4) Стимулятор α и β - адренорецепторов

- ☐ Бисопролол
- ☐ Пропранолол

___ Ксилометазолин
___ Эпинефрин (Адреналин)

45) Верные ответы:

2;

1;

3;

4;

Дидактическая единица №3. Средства, регулирующие функции центральной нервной системы. (4)-30

1

ДЕ-3. Вопрос- 46

Вопрос:

Фармакологические эффекты ненаркотических анальгетиков:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Анальгетический
- 2) Жаропонижающий
- 3) Противовоспалительный
- 4) Противокашлевой

46) Верные ответы: 1; 2; 3;

2

ДЕ-3. Вопрос- 47

Вопрос:

Показания к применению ненаркотических анальгетиков:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Болевой синдром на фоне инфаркта миокарда
- 2) Зубная боль
- 3) Головная боль
- 4) Ревматические боли

47) Верные ответы: 2; 3; 4;

3

ДЕ-3. Вопрос- 48

Вопрос:

Наркотические анальгетики по сравнению с ненаркотическими:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Угнетают дыхание
- 2) Обладают противовоспалительным действием
- 3) Вызывают миоз
- 4) Имеют фармакологических антагонистов

48) Верные ответы: 1; 3; 4;

4

ДЕ-3. Вопрос- 49

Вопрос:

При отравлении наркотическими анальгетиками применяют:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Налоксон
- 2) Налтрексон
- 3) Феназепам
- 4) Афобазол

49) Верные ответы: 1; 2;

5

ДЕ-3. Вопрос- 50

Вопрос:

К противокашлевым ненаркотическим средствам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Преноксидиазин
- 2) Бутамират
- 3) Кодеин
- 4) Кофеин

50) Верные ответы: 1; 2;

6

ДЕ-3. Вопрос- 51

Вопрос:

Препаратами безрецептурного отпуска являются:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Метамизол натрия (Анальгин)
- 2) Парацетамол
- 3) Галоперидол
- 4) Хлорпромазин (Аминазин)

51) Верные ответы: 1; 2;

7

ДЕ-3. Вопрос- 52

Вопрос:

Показания к применению морфина:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Онкологические боли
- 2) Постоперационные боли
- 3) Головная и зубная боль

4) Боли при травмах, ранах, ожогах

52) Верные ответы: 1; 2; 4;

8

ДЕ-3. Вопрос- 53

Вопрос:

Укажите, в каких лекарственных формах выпускается диклофенак

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Мазь и гель
- 2) Растворы для инъекций в ампулах
- 3) Свечи ректальные
- 4) Спрей

53) Верные ответы: 1; 2; 3;

9

ДЕ-3. Вопрос- 54

Вопрос:

Укажите средства для наркоза:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Ксенон
- 2) Парацетамол
- 3) Кофеин
- 4) Кетамин

54) Верные ответы: 1; 4;

10

ДЕ-3. Вопрос- 55

Вопрос:

Противопаркинсонические средства, стимулирующие дофаминергическую передачу:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Леводопа
- 2) Селегилин
- 3) Леводопа + Карбидопа (Наком)
- 4) Тригексифенидил

55) Верные ответы: 1; 2; 3;

11

ДЕ-3. Вопрос- 56

Вопрос:

Ненаркотические анальгетики по сравнению с наркотическими:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Не угнетают дыхание
- 2) Оказывают противокашлевой эффект
- 3) Не вызывают миоз
- 4) Не имеют фармакологических антагонистов

56) Верные ответы: 1; 3; 4;

12

ДЕ-3. Вопрос- 57

Вопрос:

Показания к применению ацетилсалициловой кислоты:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Зубная и головная боль
- 2) Жар
- 3) Для снижения свертывающей активности крови при сердечно-сосудистых заболеваниях.
- 4) Постоперационная боль

57) Верные ответы: 1; 2; 3;

13

ДЕ-3. Вопрос- 58

Вопрос:

Эффекты хлорпромазина (аминазина):

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Антипсихотический
- 2) Центральный миорелаксирующий
- 3) Гипотермический
- 4) Противопаркинсонический

58) Верные ответы: 1; 2; 3;

14

ДЕ-3. Вопрос- 59

Вопрос:

Препараты, применяемые при малых и больших эпилептических припадках:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фенобарбитал
- 2) Вальпроевая кислота
- 3) Этосуксимид
- 4) Ламотриджин

59) Верные ответы: 1; 2; 4;

15

ДЕ-3. Вопрос- 60

Вопрос:

Фармакологические эффекты диазепама:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Антипсихотический
- 2) Анксиолитический
- 3) Противосудорожный
- 4) Миорелаксирующий

60) Верные ответы: 2; 3; 4;

16

ДЕ-3. Вопрос- 61

Вопрос:

Какой побочный эффект является характерным для типичных нейролептиков (антипсихотиков):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Экстрапирамидные расстройства (лекарственный паркинсонизм)
- 2) Гипертонический криз
- 3) Спазм бронхов
- 4) Судороги

61) Верные ответы: 1;

17

ДЕ-3. Вопрос- 62

Вопрос:

Противокашлевое наркотическое средство:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Преноксидиазин
- 2) Ацетилцистеин
- 3) Кодеин
- 4) Кофеин

62) Верные ответы: 3;

18

ДЕ-3. Вопрос- 63

Вопрос:

Для нейрореплетаналгезии используют преимущественно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фентанил
- 2) Трамадол
- 3) Тримеперидин
- 4) Морфин

63) Верные ответы: 1;

19

ДЕ-3. Вопрос- 64

Вопрос:

Противопаркинсонические средства, угнетающие холинергическую передачу:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Леводопа
- 2) Селегилин
- 3) Леводопа + карбидопа
- 4) Тригексифенидил

64) Верные ответы: 4;

20

ДЕ-3. Вопрос- 65

Вопрос:

Карбидопу комбинируют с леводопой, потому что карбидопа:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Усиливает всасывание леводопы
- 2) Предотвращает декарбоксилирование леводопы в периферических тканях, блокируя ДОФА-декарбоксилазу.
- 3) Усиливает действие леводопы по механизму угнетения холинергической передачи.
- 4) Способствует быстрому выведению леводопы.

65) Верные ответы: 2;

21

ДЕ-3. Вопрос- 66

Вопрос:

Снотворное средство:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Мелоксикам
- 2) Нитразепам
- 3) Пирацетам
- 4) Налоксон

66) Верные ответы: 2;

22

ДЕ-3. Вопрос- 67

Вопрос:

Препарат, применяемый только при малых эпилептических припадках:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фенобарбитал
- 2) Вальпроевая кислота
- 3) Этосуксимид
- 4) Ламотриджин

67) Верные ответы: 3;

23

ДЕ-3. Вопрос- 68

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Кордиамин
- 2) Вольтарен, Ортофен
- 3) Седуксен
- 4) Аспирин

- ___ Диазепам
- ___ Диклофенак
- ___ Никетамид
- ___ Ацетилсалициловая к-та

68) Верные ответы:

- 3;
- 2;
- 1;
- 4;

24

ДЕ-3. Вопрос- 69

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ноотропил
- 2) Вольтарен, Ортофен
- 3) Промедол
- 4) Аминазин

- ☐ Тримеперидин
- ☐ Диклофенак
- ☐ Пирацетам
- ☐ Хлорпромазин

69) Верные ответы:

- 3;
- 2;
- 1;
- 4;

25

ДЕ-3. Вопрос- 70

Вопрос:

Соотнесите препарат с характерным фармакологическим эффектом

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Анальгетический
- 2) Ноотропный
- 3) Противопаркинсонический
- 4) Противосудорожный

- ☐ Вальпроевая кислота
- ☐ Морфин
- ☐ Пирацетам
- ☐ Тригексифенидил (Циклодол)

70) Верные ответы:

- 4;
- 1;
- 2;
- 3;

26

ДЕ-3. Вопрос- 71

Вопрос:

Соотнесите название препарата с фармакологической группой

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Психомоторные стимуляторы
- 2) Антидепрессанты
- 3) Аналептики
- 4) Ноотропы

___ Моклобемид
___ Кофеин
___ Пирацетам
___ Никетамид

71) Верные ответы:

- 2;
1;
4;
3;

27

ДЕ-3. Вопрос- 72

Вопрос:

Соотнесите препарат с механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Блокирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2
- 2) Связывается с опиоидными рецепторами по типу агониста
- 3) Связывается с опиоидными рецепторами по типу антагониста
- 4) Блокирует преимущественно ЦОГ-2

___ Морфин
___ Диклофенак
___ Мелоксикам
___ Налоксон

72) Верные ответы:

- 2;
1;
4;
3;

28

ДЕ-3. Вопрос- 73

Вопрос:

Соотнесите препарат с механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ингибитор МАО-А
- 2) Избирательно угнетает нейрональный захват норадреналина
- 3) Неизбирательно угнетает нейрональный захват серотонина и норадреналина
- 4) Избирательно угнетает нейрональный захват серотонина

___ Моклобемид (Аурорикс)

___ Мапротилин

___ Флуоксетин

___ Амитриптилин

73) Верные ответы:

1;

2;

4;

3;

29

ДЕ-3. Вопрос- 74

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Болезнь Паркинсона
- 2) Заболевания опорно-двигательной системы, сопровождающиеся воспалением
- 3) Нарушение сна
- 4) Угнетение жизненно - важных центров продолговатого мозга (дыхательного и сосудодвигательного)

___ Нитразепам

___ Леводопа+Карбидопа (Наком)

___ Мелоксикам

___ Никетамид

74) Верные ответы:

3;

1;

2;
4;

30

ДЕ-3. Вопрос- 75

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Депрессия
- 2) Шизофрения
- 3) Атеросклероз головного мозга и другие заболевания с явлениями нарушения памяти, внимания, головокружения.
- 4) Эпилепсия, нарушение сна

___ Пирацетам

___ Амитриптилин

___ Хлорпромазин

___ Фенобарбитал

75) Верные ответы:

3;
1;
2;
4;

Дидактическая единица №4. Средства, регулирующие функции сердечно-сосудистой системы.(4)-44

1

ДЕ-4. Вопрос-76

Вопрос:

Показания к применению блокаторов β -адренорецепторов

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) ИБС
- 2) Бронхиальная астма
- 3) Гипертоническая болезнь
- 4) Глаукома

76) Верные ответы: 1; 3; 4;

2

ДЕ-4. Вопрос- 77

Вопрос:

Как влияет дигоксин на работу сердца у больных сердечной недостаточностью:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Увеличивает силу сердечных сокращений
- 2) Уменьшает ЧСС
- 3) Уменьшает одышку
- 4) Снижает диурез

77) Верные ответы: 1; 2; 3;

3

ДЕ-4. Вопрос-78

Вопрос:

В каких лекарственных формах выпускается нитроглицерин:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Суппозитории ректальные
- 2) Таблетки пролонгированные
- 3) Спрей сублингвальный
- 4) Капсулы в масле

78) Верные ответы: 2; 3; 4;

4

ДЕ-4. Вопрос-79

Вопрос:

Для снижения уровня холестерина при атеросклерозе применяют:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Симвастатин
- 2) Валидол
- 3) Фенофибрат
- 4) Аллопуринол

79) Верные ответы: 1; 3;

5

ДЕ-4. Вопрос-80

Вопрос:

Блокаторы Са-каналов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Верапамил
- 2) Прокаинамид
- 3) Нифедипин
- 4) Амлодипин

80) Верные ответы: 1; 3; 4;

6

ДЕ-4. Вопрос-81

Вопрос:

Основные фармакологические эффекты блокаторов Са-каналов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Антиагрегантный
- 2) Гипотензивный
- 3) Антиангинальный
- 4) Антиаритмический

81) Верные ответы: 2; 3; 4;

7

ДЕ-4. Вопрос-82

Вопрос:

Формы выпуска гепарина:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Мазь

- 2) Раствор для инъекций во флаконах
 - 3) Таблетки для приема внутрь
 - 4) Гель
- 82) Верные ответы: 1; 2; 4;

8

ДЕ-4. Вопрос-83

Вопрос:

К группе нитратов, применяемых при ИБС относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Нитроглицерин
- 2) Ивабрадин
- 3) Изосорбида динитрат
- 4) Триметазидин

83) Верные ответы: 1; 3;

9

ДЕ-4. Вопрос-84

Вопрос:

При нарушениях мозгового кровообращения применяют:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Коргликон
- 2) Винпоцетин
- 3) Пентоксифиллин
- 4) Ницерголин

84) Верные ответы: 2; 3; 4;

10

ДЕ-4. Вопрос-85

Вопрос:

Калий выводящие диуретики:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуросемид
- 2) Гидрохлортиазид
- 3) Спиронолактон
- 4) Ацетазоламид

85) Верные ответы: 1; 2;

11

ДЕ-4. Вопрос-86

Вопрос:

Гипотензивные средства из группы ингибиторов АПФ:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Эналаприл
- 2) Каптоприл
- 3) Периндоприл
- 4) Лозартан

86) Верные ответы: 1; 2; 3;

12

ДЕ-4. Вопрос-87

Вопрос:

Стимуляторы эритропоэза:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Железа закисного сульфат
- 2) Этамзилат
- 3) Эритропоэтин бета
- 4) Детралекс

87) Верные ответы: 1; 3;

13

ДЕ-4. Вопрос-88

Вопрос:

Стимуляторы эритропоэза:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Железа закисного сульфат
- 2) Мексидол
- 3) Эритропоэтин бета
- 4) Молграмостим

88) Верные ответы: 1; 3;

14

ДЕ-4. Вопрос-89

Вопрос:

Детралекс:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Повышает венозный тонус
- 2) Снижает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию и уменьшает венозный застой.
- 3) Комбинированный препарат, содержащий биофлавоноиды (диосмин и гесперидин)
- 4) Стимулирует эритропоэз

89) Верные ответы: 1; 2; 3;

15

ДЕ-4. Вопрос-90

Вопрос:

Этамзилат:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Ангиопротектор
- 2) Антиаритмическое средство
- 3) Оказывает гемостатическое действие.
- 4) Применяется для профилактики и остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений

90) Верные ответы: 1; 3; 4;

16

ДЕ-4. Вопрос-91

Вопрос:

Антикоагулянты прямого действия:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Протамина сульфат
- 2) Гепарин
- 3) Эноксапарин
- 4) Алтеплаза

91) Верные ответы: 2; 3;

17

ДЕ-4. Вопрос-92

Вопрос:

Антиагреганты:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Клопидогрел
- 2) Абциксимаб
- 3) Протамина сульфат

4) Транексамовая кислота

92) Верные ответы: 1; 2;

18

ДЕ-4. Вопрос-93

Вопрос:

Гемостатическими средствами являются:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Клопидогрел
- 2) Абциксимаб
- 3) Протамина сульфат
- 4) Транексамовая кислота

93) Верные ответы: 3; 4;

19

ДЕ-4. Вопрос-94

Вопрос:

Механизм кардиотонического действия сердечных гликозидов:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Стимуляция β_1 - адренорецепторов сердца
- 2) Блокада ангиотензин - превращающего фермента
- 3) Ингибирование Na^+/K^+ - АТФ-азы мембран кардиомиоцитов
- 4) Стимуляция М-холинорецепторов сердца

94) Верные ответы: 3;

20

ДЕ-4. Вопрос-95

Вопрос:

Препарат низкомолекулярного гепарина:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Протамина сульфат
- 2) Клопидогрел
- 3) Эноксапарин
- 4) Алтеплаза

95) Верные ответы: 3;

21

ДЕ-4. Вопрос-96

Вопрос:

Ингибитор фибринолиза:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Клопидогрел
- 2) Абциксимаб
- 3) Протамина сульфат
- 4) Транексамовая кислота

96) Верные ответы: 4;

22

ДЕ-4. Вопрос-97

Вопрос:

Антикоагулянт непрямого действия:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Протамина сульфат
- 2) Гепарин
- 3) Варфарин
- 4) Эноксапарин

97) Верные ответы: 3;

23

ДЕ-4. Вопрос-98

Вопрос:

Ингибирует 3-гидрокси-3 метил-глутарил коэнзим А - редуктазу (ГМГ - Ко-А- редуктазу) :

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Симвастатин
- 2) Валидол
- 3) Мексидол
- 4) Аллопуринол

98) Верные ответы: 1;

24

ДЕ-4. Вопрос-99

Вопрос:

Антагонистом гепарина является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Протамина сульфат
- 2) Варфарин
- 3) Эноксапарин
- 4) Алтеплаза

99) Верные ответы: 1;

25

ДЕ-4. Вопрос-100

Вопрос:

Фибринолитическое средство:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Протамина сульфат
- 2) Варфарин
- 3) Эноксапарин
- 4) Алтеплаза

100) Верные ответы: 4;

26

ДЕ-4. Вопрос-101

Вопрос:

Антагонистом витамина К является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Протамина сульфат
- 2) Варфарин
- 3) Эноксапарин
- 4) Алтеплаза

101) Верные ответы: 2;

27

ДЕ-4. Вопрос-102

Вопрос:

Венотропное (флеботропное) средство:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Железа закисного сульфат
- 2) Мексидол
- 3) Эритропоэтин бета
- 4) Детралекс

102) Верные ответы: 4;

28

ДЕ-4. Вопрос-103

Вопрос:

Блокатор ангиотензиновых рецепторов:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Эналаприл
- 2) Каптоприл
- 3) Периндоприл
- 4) Лозартан

103) Верные ответы: 4;

29

ДЕ-4. Вопрос-104

Вопрос:

Стимулятор лейкопоэза:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Железа закисного сульфат
- 2) Этамзилат
- 3) Эритропоэтин бета
- 4) Молграмостим (Лейкомакс)

104) Верные ответы: 4;

30

ДЕ-4. Вопрос-105

Вопрос:

Диуретик - антагонист альдостерона:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуросемид
- 2) Спиронолактон
- 3) Маннитол
- 4) Ацетазоламид

105) Верные ответы: 2;

31

ДЕ-4. Вопрос-106

Вопрос:

Калийсберегающий диуретик:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуросемид
- 2) Гидрохлортиазид
- 3) Спиронолактон
- 4) Ацетазоламид

106) Верные ответы: 3;

32

ДЕ-4. Вопрос-107

Вопрос:

Осмотический диуретик:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуросемид
- 2) Гидрохлортиазид
- 3) Маннитол
- 4) Ацетазоламид

107) Верные ответы: 3;

33

ДЕ-4. Вопрос-108

Вопрос:

У какого препарата диуретический эффект развивается на 2-3 сутки:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуросемид
- 2) Спиронолактон
- 3) Маннитол
- 4) Гидрохлортиазид

108) Верные ответы: 2;

34

ДЕ-4. Вопрос-109

Вопрос:

Блокатор ренина почек:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Каптоприл
- 2) Алискирен

- 3) Лозартан
- 4) Периндоприл

109) Верные ответы: 2;

35

ДЕ-4. Вопрос-110

Вопрос:

При эректильной дисфункции применяют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Сивастатин
- 2) Валидол
- 3) Силденафила цитрат (Виагра)
- 4) Аллопуринол

110) Верные ответы: 3;

36

ДЕ-4. Вопрос-111

Вопрос:

Какое ЛС, блокирует К-каналы и увеличивает эффективный рефрактерный период:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Триметазидин
- 2) Дипиридамол
- 3) Прокаинамид
- 4) Амиодарон

111) Верные ответы: 4;

37

ДЕ-4. Вопрос-112

Вопрос:

Кардиопротектор, нормализующий обменные процессы в миокарде при ИБС:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Триметазидин
- 2) Дипиридамол
- 3) Прокаинамид
- 4) Амиодарон

112) Верные ответы: 1;

38

ДЕ-4. Вопрос-113

Вопрос:

В качестве антиоксиданта при нарушениях мозгового и коронарного кровообращения применяют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Дипиридамол
- 2) Прокаионамид
- 3) Амиодарон
- 4) Мексидол

113) Верные ответы: 4;

39

ДЕ-4. Вопрос-114

Вопрос:

Какой препарат применяют для лечения подагры:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Симвастатин
- 2) Коргликон
- 3) Мексидол
- 4) Аллопуринол

114) Верные ответы: 4;

40

ДЕ-4. Вопрос-115

Вопрос:

Показания к применению коргликона:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Хроническая сердечная недостаточность
- 2) Острая сердечная недостаточность
- 3) Гипертензия
- 4) Тромбоз вен нижних конечностей

115) Верные ответы: 2;

41

ДЕ-4. Вопрос-116

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Престариум
- 2) Энап
- 3) Изоптин
- 4) Кавинтон

- ___ Верапамил
- ___ Эналаприл
- ___ Периндоприл
- ___ Винпоцетин

116) Верные ответы:

- 3;
- 2;
- 1;
- 4;

42

ДЕ-4. Вопрос-117

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Зокор
- 2) Гипотиазид
- 3) Эуфиллин
- 4) Лазикс

- ___ Фуросемид
- ___ Гидрохлортиазид
- ___ Симвастатин
- ___ Аминофиллин

117) Верные ответы:

- 4;
- 2;
- 1;
- 3;

43

ДЕ-4. Вопрос-118

Вопрос:

Соотнесите препарат с механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ингибитор ангиотензиновых рецепторов
- 2) Ингибитор АПФ
- 3) Блокатор медленных Са-каналов
- 4) Блокатор α - адренорецепторов сосудов

- ☐ Нифедипин
- ☐ Эналаприл
- ☐ Ницерголин
- ☐ Лозартан

118) Верные ответы:

- 3;
- 2;
- 4;
- 1;

44

ДЕ-4. Вопрос-119

Вопрос:

Соотнесите препарат с механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ингибитор ангиотензиновых рецепторов
- 2) Ингибитор АПФ
- 3) Блокатор медленных Са-каналов
- 4) Блокатор α - адренорецепторов сосудов

- ☐ Амлодипин
- ☐ Каптоприл
- ☐ Ницерголин
- ☐ Лозартан

119) Верные ответы:

- 3;
- 2;
- 4;
- 1;

Дидактическая единица №5. Средства, регулирующие обмен веществ.(3)-25

1

ДЕ-5. Вопрос-120

Вопрос:

Препараты гормонов белкового, пептидного строения и производные аминокислот:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Прогестерон
- 2) Соматотропин
- 3) Инсулин
- 4) Окситоцин

Ответ: 234

2

ДЕ-5. Вопрос-121

Вопрос:

Препараты гормонов стероидного строения:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Прогестерон
- 2) Дексаметазон
- 3) Инсулин
- 4) Эстрадиол

Ответ:124

3

ДЕ-5. Вопрос-122

Вопрос:

Препараты гормонов, применяемые в качестве средств заместительной терапии:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Инсулин
- 2) Тестостерон
- 3) Этинилэстрадиол
- 4) Тиамазол

Ответ:123

4

ДЕ-5. Вопрос-123

Вопрос:

К группе витаминных препаратов относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Рибофлавин
- 2) Пиридоксин
- 3) Нандролон
- 4) Аскорбиновая кислота

Ответ:124

5

ДЕ-5. Вопрос-124

Вопрос:

Препараты, применяемые при сахарном диабете 2 типа:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Натеглинид
- 2) Метформин
- 3) Росиглитазон
- 4) Инсулин

Ответ:123

6

ДЕ-5. Вопрос-125

Вопрос:

Препараты глюкокортикостероидов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Гидрокортизон
- 2) Преднизолон
- 3) Тиболон
- 4) Бетаметазон

Ответ:124

7

ДЕ-5. Вопрос-126

Вопрос:

Основные эффекты глюкокортикостероидов, используемые в медицинской практике:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Противовоспалительный
- 2) Гиперурикемия
- 3) Противоаллергический
- 4) Противошоковый

Ответ:134

8

ДЕ-5. Вопрос-127

Вопрос:

Отрицательные эффекты глюкокортикостероидов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Синдром Иценко-Кушинга
- 2) Гипергликемия
- 3) Ульцерогенное действие (изъязвление слизистой желудка и 12-перстной кишки)
- 4) Кристаллурия

Ответ:123

9

ДЕ-5. Вопрос-128

Вопрос:

Отрицательные эффекты глюкокортикостероидов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Остеопороз
- 2) Гипергликемия
- 3) Ульцерогенное действие (изъязвление слизистой желудка и 12-перстной кишки)
- 4) Кристаллурия

Ответ:123

10

ДЕ-5. Вопрос-129

Вопрос:

Тестостерон:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Стимулирует развитие половых органов и вторичных половых признаков у мужчин
- 2) Оказывает анаболическое действие (стимулирует синтез белка)
- 3) Оказывает катаболическое действие (угнетает синтез белка)
- 4) У женщин вызывает явления вирилизма (появление мужских половых признаков)

Ответ:124

11

ДЕ-5. Вопрос-130

Вопрос:

Нандролон:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Обладает анаболической активностью
- 2) Оказывает катаболическое действие
- 3) Увеличивает мышечную массу
- 4) Показан при различных патологических состояниях, сопровождающихся усиленным распадом белков

Ответ:134

12

ДЕ-5. Вопрос-131

Вопрос:

Комбинированные эстраген-гестагенные контрацептивные средства:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Стимулируют овуляцию
- 2) Угнетают продукцию гонадотропных гормонов
- 3) Препятствуют имплантации яйцеклетки
- 4) Отличаются относительно высокой безопасностью

Ответ:234

13

ДЕ-5. Вопрос-132

Вопрос:

Показания к применению Левоноргестрел + Эстрадиол (Климонорм):

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Климактерический синдром
- 2) Профилактика постменопаузного остеопороза
- 3) Заместительная гормональная терапия в пре- и постменопаузе
- 4) Гормонозависимые опухоли матки, яичников и молочных желез

Ответ:123

14

ДЕ-5. Вопрос-133

Вопрос:

Норгестимат + Этинилэстрадиол (Силест):

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Монофазный пероральный контрацептив
- 2) Трехфазный пероральный контрацептив

- 3) Препятствует созреванию яйцеклеток в яичниках и овуляции
- 4) Повышает вязкость шеечной слизи, что затрудняет проникновение сперматозоидов в матку

Ответ:134

15

ДЕ-5. Вопрос-134

Вопрос:

Основные эффекты глюкокортикостероидов, используемые в медицинской практике:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Противовоспалительный
- 2) Иммуносупрессорный
- 3) Гиперурикемия
- 4) Противоаллергический

Ответ:124

16

ДЕ-5. Вопрос-135

Вопрос:

Препарат гормона эпифиза, регулирующий биоритмы и применяемый в качестве снотворного средства:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Тиамазол
- 2) Мелатонин
- 3) Тестостерон
- 4) Мифепристон

Ответ:2

17

ДЕ-5. Вопрос-136

Вопрос:

Препарат женских половых гормонов-гестаген:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Мифепристон
- 2) Этинилэстрадиол
- 3) Прогестерон
- 4) Кломифена цитрат

Ответ:3

18

ДЕ-5. Вопрос-137

Вопрос:

Синтетическое гипогликемическое средство-производное сульфонилмочевины:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Натеглинид
- 2) Глибенкламид
- 3) Росиглитазон
- 4) Метформин

Ответ:2

19

ДЕ-5. Вопрос-138

Вопрос:

Синтетическое гипогликемическое средство-производное бигуанида:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Натеглинид
- 2) Глибенкламид
- 3) Росиглитазон
- 4) Метформин

Ответ:4

20

ДЕ-5. Вопрос-139

Вопрос:

Препарат глюкокортикостероидов, используемый для местного применения в виде мази в дерматологии:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Натеглинид
- 2) Глибенкламид
- 3) Бетаметазон (Целестодерм В)
- 4) Метформин

Ответ:3

21

ДЕ-5. Вопрос-140

Вопрос:

Препарат, применяемый при сахарном диабете 1 типа:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Натеглинид
- 2) Метформин
- 3) Росиглитазон

4) Инсулин

Ответ:4

22

ДЕ-5. Вопрос-141

Вопрос:

Антагонист гормонов щитовидной железы (анти тиреоидное средство):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Тиамазол
- 2) Мелатонин
- 3) Тестостерон
- 4) Мифепристон

Ответ:1

23

ДЕ-5. Вопрос-142

Вопрос:

Антагонист эстрогенов (антиэстрогенный препарат):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Кокарбоксилаза
- 2) Мелатонин
- 3) Кломифена цитрат
- 4) Гидрокортизон

Ответ:3

24

ДЕ-5. Вопрос-143

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Эутирокс
- 2) Лантус
- 3) Глюкофаж
- 4) Миакальчик

- ___ Кальцитонин
- ___ Левотироксин натрия
- ___ Инсулин Гларгин
- ___ Метформин

Ответ:

1-4

2-1
3-2
4-3

25

ДЕ-5. Вопрос-144

Вопрос:

Соотнесите препарат с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Гипофизарный нанизм (нарушение роста)
- 2) Сахарный диабет 1 типа
- 3) Сахарный диабет 2 типа
- 4) Зоб диффузный токсический

___ Инсулин
___ Глибенкламид
___ Соматотропин
___ Тиамазол

Ответ:

1-2
2-3
3- 1
4-4

1

ДЕ-6. Вопрос-145

Вопрос:

ЛС, применяемые в качестве противорвотных средств:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Домперидон
- 2) Метоклопрамид
- 3) Однансетрон
- 4) Сибутрамин

Ответ:123

2

ДЕ-6. Вопрос-146

Вопрос:

Препараты, снижающие кислотность желудочного сока по механизму блокады гистаминовых H₂ рецепторов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фамотидин
- 2) Ранитидин
- 3) Омепразол
- 4) Рабепразол

Ответ:12

3

ДЕ-6. Вопрос-147

Вопрос:

Препараты, снижающие кислотность желудочного сока по механизму блокады «протонной помпы» - H⁺,K⁺-АТФ-азы:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фамотидин
- 2) Ранитидин
- 3) Омепразол
- 4) Рабепразол

Ответ:34

4

ДЕ-6. Вопрос-148

Вопрос:

Средство заместительной терапии, содержащее пищеварительные ферменты

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Панкреатин
- 2) Висмута субцитрат коллоидный (Де-нол)
- 3) Алюминия гидроокись + магния гидроокись
- 4) Мизопростол

Ответ:1

5

ДЕ-6. Вопрос-149

Вопрос:

Средства, устраняющие спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Панкреатин (Фестал)
- 2) Мебеверин (Дюспаталин)
- 3) Дротаверин (Но-шпа)
- 4) Гиосцина бутилбромид (Бускопан)

Ответ:234

6

ДЕ-6. Вопрос-150

Вопрос:

Гепатопротекторы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Эссенциальные фосфолипиды (Эссенциале Н)
- 2) Мебеверин (Дюспаталин)
- 3) Адеметионин (Гептрал)
- 4) Панкреатин (Фестал)

Ответ:13

7

ДЕ-6. Вопрос-151

Вопрос:

Лоперамид:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Связывается с опиоидными рецепторами ЖКТ
- 2) Оказывает анальгезирующий эффект
- 3) Повышает тонус сфинктеров ЖКТ
- 4) Применяется в качестве противодиарейного препарата

Ответ:134

8

ДЕ-6. Вопрос-152

Вопрос:

Лекарственные средства, восстанавливающие микрофлору кишечника:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Линекс
- 2) Аллохол
- 3) Хилак форте
- 4) Магния сульфат

Ответ:13

9

ДЕ-6. Вопрос-153

Вопрос:

Какие препараты применяются совместно с противомикробными средствами, для предупреждения нарушения микрофлоры кишечника:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Линекс
- 2) Аллохол
- 3) Хилак форте
- 4) Магния сульфат

Ответ:13

10

ДЕ-6. Вопрос-154

Вопрос:

Какие препараты применяются совместно с противомикробными средствами, для предупреждения нарушения микрофлоры кишечника:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Линекс
- 2) Аллохол
- 3) Магния сульфат
- 4) Хилак форте

Ответ:14

11

ДЕ-6. Вопрос-155

Вопрос:

Аллохол:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Желчегонное средство комбинированного состава
- 2) Усиливает секреторную функцию печени и двигательную активность ЖКТ
- 3) Восстанавливает микрофлору кишечника
- 4) Применяется при хронических гепатитах, холангитах, холециститах

Ответ:124

12

ДЕ-6. Вопрос-156

Вопрос:

Препараты, снижающие кислотность желудочного сока по механизму блокады гистаминовых H₂-рецепторов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Омепразол
- 2) Алюминия гидроокись + магния гидроокись (Альмагель)
- 3) Фамотидин
- 4) Ранитидин

Ответ:34

13

ДЕ-6. Вопрос-157

Вопрос:

Препараты, снижающие кислотность желудочного сока по механизму блокады «протонной помпы»:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Омепразол
- 2) Рабепразол
- 3) Мизопростол
- 4) Пирензепин

Ответ:12

14

ДЕ-6. Вопрос-158

Вопрос:

Препарат, применяемый при алиментарном ожирении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Омепразол
- 2) Рабепразол
- 3) Сибутрамин
- 4) Ондансетрон

Ответ:3

15

ДЕ-6. Вопрос-159

Вопрос:

Препарат, снижающий кислотность желудочного сока за счет нейтрализации HCl (антацидное средство):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Омепразол
- 2) Алюминия гидроокись + магния гидроокись (Альмагель)
- 3) Фамотидин
- 4) Ранитидин

Ответ:2

16

ДЕ-6. Вопрос-160

Вопрос:

Укажите механизм антисекреторного эффекта пирензепина (гастроцепина):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Блокада M₃-холинорецепторов париетальных клеток желудка
- 2) Блокада M₁-холинорецепторов энтерохромафиноподобных клеток желудка
- 3) Блокада гистаминовых H₂-рецепторов париетальных клеток желудка
- 4) Ингибирование протонной помпы

Ответ:2

17

ДЕ-6. Вопрос-161

Вопрос:

Укажите механизм антисекреторного эффекта рабепразола (париета):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Блокада М₃-холинорецепторов париетальных клеток желудка
- 2) Блокада М₁-холинорецепторов энтерохромафиноподобных клеток желудка
- 3) Блокада гистаминовых H₂-рецепторов париетальных клеток желудка
- 4) Ингибирование протонной помпы

Ответ:4

18

ДЕ-6. Вопрос-162

Вопрос:

Холелитолитическое средство:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Урсодезоксихолевая кислота
- 2) Макрогол - 4000
- 3) Лактулоза
- 4) Симетикон

Ответ:1

19

ДЕ-6. Вопрос-163

Вопрос:

Какой препарат применяют для эрадикации H.pylori:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фамотидин
- 2) Висмута субцитрат коллоидный (Де-нол)
- 3) Омепразол
- 4) Рабепразол

Ответ:2

20

ДЕ-6. Вопрос-164

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Зантак
- 2) Омез

- 3) Редуксин
- 4) Мотилиум

- ☐ Сибутрамин
- ☐ Домперидон
- ☐ Ранитидин
- ☐ Омепразол

Ответ:

- 1-3
- 2-4
- 3-1
- 4-2

21

ДЕ-6. Вопрос-165

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Гиперацидный гастрит, изжога
- 2) Спазмы ЖКТ
- 3) Метеоризм, повышенное газообразование в кишечнике
- 4) Запор

- ☐ Симетикон
- ☐ Макрогол - 4000
- ☐ Алмагель
- ☐ Мебеверин

Ответ:

- 1-3
- 2-4
- 3-1
- 4-2

22

ДЕ-6. Вопрос-166

Вопрос:

Соотнесите показание к применению с названием препарата

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ондансетрон
- 2) Урсодезоксихолевая кислота
- 3) Сибутрамин

4) Линекс

- ☐ Профилактика и лечение дисбактериоза
- ☐ Желчнокаменная болезнь
- ☐ Рвота и икота, после проведения химио- и лучевой терапии
- ☐ Алиментарное ожирение, булимия

Ответ:

- 1-4
- 2-2
- 3-1
- 4-3

23

ДЕ-6. Вопрос-167

Вопрос:

Соотнесите показание к применению с названием препарата

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Фосфолипиды эссенциальные
- 2) Сеннозиды А и В
- 3) Фамотидин
- 4) Дротаверина гидрохлорид (Но-Шпа)

- ☐ Хронический запор
- ☐ Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся спазмами
- ☐ Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- ☐ Гепатит (в составе комплексной терапии)

Ответ:

- 1-2
- 2-4
- 3-3
- 4-1

24

ДЕ-6. Вопрос-168

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- 2) Острая и хроническая диарея
- 3) Алкогольные поражения печени (гепатит, цирроз)

- 4) Хронический запор
___ Смектит диоктоэдрический (Смекта)
___ Омепразол
___ Натрия пикосульфат
___ Адеметионин (Гептрал)

Ответ:

- 1-2
2-1
3-4
4-3

25

ДЕ-6. Вопрос-169

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Но-шпа
2) Омез
3) Гутталакс
4) Имодиум
___ Дротаверина гидрохлорид
___ Натрия пикосульфат
___ Лоперамид
___ Омепразол

Ответ:

- 1-1
2-3
3-4
4-2

Дидактическая единица №7. Иммуотропные и антиаллергические средства.(3)-15

1

ДЕ-7. Вопрос-170

Вопрос:

Препараты, препятствующие высвобождению из тучных клеток медиаторов аллергии и воспаления:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид)
- 2) Кетотифен
- 3) Тимуса экстракт (Тималин)
- 4) Кромоглициевая кислота

Ответ:24

2

ДЕ-7. Вопрос-171

Вопрос:

Препараты, предупреждающие или снижающие аллергические реакции по механизму блокады Н₁-гистаминовых рецепторов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Хлоропирамин (Супрастин)
- 2) Дезлоратадин (Эриус)
- 3) Дифенгидрамин (Димедрол)
- 4) Кромоглициевая кислота (Интал)

Ответ:123

3

ДЕ-7. Вопрос-172

Вопрос:

Иммуномодуляторы:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид)
- 2) Экстракт тимуса (Тималин)
- 3) Циклоспорин А
- 4) Эхинацеи пурпурной сок (Иммунал)

Ответ:124

4

ДЕ-7. Вопрос-173

Вопрос:

Показания к применению блокаторов гистаминовых H₁-рецепторов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Бронхиальная астма (в составе комплексной терапии)
- 2) Подавление реакции отторжения трансплантата
- 3) Аллергический ринит, конъюнктивит
- 4) Профилактика аллергических реакций при применении лекарственных средств

Ответ:134

5

ДЕ-7. Вопрос-174

Вопрос:

Какие препараты не следует назначать лицам, чья работа требует напряженной психической и физической деятельности (например: водителям транспортных средств):

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Хлоропирамин (Супрастин)
- 2) Дифенгидрамин (Димедрол)
- 3) Кетотифен
- 4) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал)

Ответ:123

6

ДЕ-7. Вопрос-175

Вопрос:

Препарат, препятствующий высвобождению из тучных клеток медиаторов аллергии и воспаления и одновременно блокирующий гистаминовые H₁-рецепторы:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал)
- 2) Дезлоратадин (Эриус)
- 3) Кетотифен
- 4) Дифенгидрамин (Димедрол)

Ответ:3

7

ДЕ-7. Вопрос-176

Вопрос:

Иммуностимулятор, содержащий комплекс полипептидных фракций, выделенных из вилочковой железы крупного рогатого скота:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид)
- 2) Экстракт тимуса (Тималин)
- 3) Циклоспорин А
- 4) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал)

Ответ:2

8

ДЕ-7. Вопрос-177

Вопрос:

Под каким коммерческим названием выпускается препарат Хлоропирамин?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Эриус
- 2) Супрастин
- 3) Задитен
- 4) Димедрол

Ответ:2

9

ДЕ-7. Вопрос-178

Вопрос:

Блокатор гистаминовых Н₁-рецепторов, с наиболее выраженным седативным и снотворным эффектом:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Дезлоратадин (Эриус)
- 2) Дифенгидрамин (Димедрол)
- 3) Хлоропирамин (Супрастин)
- 4) Кетотифен

Ответ:2

10

ДЕ-7. Вопрос-179

Вопрос:

Иммуносупрессор:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид)
- 2) Экстракт тимуса (Тималин)
- 3) Циклоспорин А
- 4) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал)

Ответ:3

11

ДЕ-7. Вопрос-180

Вопрос:

Иммуномодулятор - синтетический аналог фрагментов клеточной стенки бактерий:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид)
- 2) Экстракт тимуса (Тималин)
- 3) Циклоспорин А
- 4) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал)

Ответ:1

12

ДЕ-7. Вопрос-181

Вопрос:

Экзогенный иммуномодулятор растительного происхождения:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид)
- 2) Экстракт тимуса (Тималин)
- 3) Циклоспорин А
- 4) Сок эхинацеи пурпурной (Иммунал)

Ответ:4

13

ДЕ-7. Вопрос-182

Вопрос:

Противогистаминный препарат, обладающий наименьшей седативной активностью:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Дезлоратадин (Эриус)
- 2) Кетотифен
- 3) Хлоропирамин (Супрастин)
- 4) Дифенгидрамин (Димедрол)

Ответ:1

14

ДЕ-7. Вопрос-183

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Профилактика отторжения трансплантата при пересадке почки, легких, сердца и других органов
- 2) Только профилактика приступов бронхиальной астмы
- 3) Иммунодефицитное состояние при хронических и вялотекущих инфекционно воспалительных заболеваниях различной локализации (органы дыхания, кожи и мягких тканей, псориазе и др.)
- 4) Аллергический ринит и конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, зудящие дерматозы и др.

- ☐ Глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид)
- ☐ Дезлоратадин (Эриус)
- ☐ Циклоспорин А
- ☐ Кромоглициевая кислота (Интал)

Ответ:

- 1-3
- 2-4
- 3-1
- 4-2

15

ДЕ-7. Вопрос-184

Вопрос:

Соотнесите название препарата с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Профилактика отторжения трансплантата при пересадке почки, легких, сердца и других органов
- 2) Только профилактика приступов бронхиальной астмы
- 3) Комплексная терапия заболеваний, сопровождающаяся понижением клеточного иммунитета (острые и хронические гнойные процессы, ожоговая болезнь, трофические язвы, лучевая и химиотерапия у онкологических больных)
- 4) Аллергический ринит и конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, зудящие дерматозы и др.

- ___ Экстракт тимуса (Тималин)
- ___ Хлоропирамин (Супрастин)
- ___ Циклоспорин А
- ___ Кромоглициевая кислота (Интал)

Ответ:

1-3

2-4

3-1

4-2

Дидактическая единица №8. Средства, регулирующие деятельность матки.(1)-5

1

ДЕ-8. Вопрос-185

Вопрос:

Что характерно для окситоцина?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Является препаратом гормона задней доли гипофиза
- 2) Является препаратом простагландинов
- 3) Вызывает периодические сокращения миометрия
- 4) Снижает тонус и ритмические сокращения миометрия

Ответ: 13

2

ДЕ-8. Вопрос-186

Вопрос:

Что характерно для динопростона?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Является препаратом гормона задней доли гипофиза
- 2) Является препаратом простагландинов
- 3) Повышает тонус миометрия и расслабляет шейку матки
- 4) Показан для стимуляции родовой деятельности

Ответ:234

3

ДЕ-8. Вопрос-187

Вопрос:

Что характерно для фенотерола (Партусистена)?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Стимулирует β_2 -адренорецепторы миометрия
- 2) Стимулирует родовую деятельность
- 3) Расслабляет мускулатуру матки
- 4) Применяется при гипертонусе матки

Ответ:134

4

ДЕ-8. Вопрос-188

Вопрос:

В какие сроки беременности матка чувствительна к динопростону?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) В ранние сроки беременности
- 2) Непосредственно перед родами

- 3) Во время родов
- 4) Во все сроки беременности

Ответ: 4

5

ДЕ-8. Вопрос-189

Вопрос:

Показания к применению динопростона:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Усиления родовой деятельности
- 2) Прерывания беременности (медицинский аборт)
- 3) Остановка послеродовых маточных кровотечений
- 4) Гипертонус матки, угрожающий выкидыш, не вынашиваемая беременность

Ответ: 1,2

Дидактическая единица №9. Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства.(4)-80

ДЕ-9. Вопрос-190

Вопрос:

Сульфаниламидные препараты:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фталилсульфатиазол (Фталазол)
- 2) Сульфадиметоксин
- 3) Метронидазол
- 4) Ко-тримоксазол

Ответ:124

ДЕ-9. Вопрос-191

Вопрос:

β - лактамные антибиотики:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Тетрациклины
- 2) Пенициллины
- 3) Цефалоспорины
- 4) Карбапенемы

Ответ:234

ДЕ-9. Вопрос-192

Вопрос:

β - лактамные антибиотики:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Тетрациклины
- 2) Монобактамы
- 3) Цефалоспорины
- 4) Карбапенемы

Ответ:234

ДЕ-9. Вопрос-193

Вопрос:

β - лактамные антибиотики:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Бензилпенициллин
- 2) Цефалексин
- 3) Имипенем + циластатин (Тиенам)
- 4) Эритромицин

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-194

Вопрос:

β - лактамные антибиотики:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Азитромицин (Сумамед)
- 2) Ампициллин + Оксациллин (Ампиокс)
- 3) Цефуроксим
- 4) Имипенем + циластатин (Тиенам)

Ответ:234

ДЕ-9. Вопрос-195

Вопрос:

Сульфаниламидные препараты для резорбтивного применения:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фталилсульфатиазол (Фталазол)
- 2) Сульфадиметоксин
- 3) Сульфацетамид (Сульфацил-натрия)
- 4) Ко-тримоксазол

Ответ:24

ДЕ-9. Вопрос-196

Вопрос:

Сульфаниламидные препараты (включая комбинированные) в микробной клетке:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой
- 2) Блокируют дигидроптероатсинтетазу
- 3) Нарушают синтез клеточной стенки
- 4) Блокируют дигидрофолатредуктазу

Ответ:124

ДЕ-9. Вопрос-197

Вопрос:

Цефалоспорины:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Оказывают бактериостатическое действие
- 2) Нарушают синтез белка на рибосомах
- 3) Нарушают синтез клеточной стенки
- 4) Оказывают бактерицидное действие

Ответ:34

ДЕ-9. Вопрос-198

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-199

Вопрос:

Показания к применению бензатина бензилпенициллина + бензилпенициллина прокаина (Бициллин-5)

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Сифилис
- 2) Кандидомикозы
- 3) Туберкулез
- 4) Профилактика рецидивов ревматизма

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-200

Вопрос:

Что характерно для препаратов бензилпенициллина?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Бактериостатическое действие
- 2) Бактерицидное действие
- 3) Разрушение в кислой среде желудка
- 4) Парентеральный путь введения

Ответ:234

ДЕ-9. Вопрос-201

Вопрос:

Что характерно для аминопенициллинов?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Расширенный спектр антимикробной активности в отношении кишечных бактерий и гемофильной палочки
- 2) Устойчивость к соляной кислоте желудка
- 3) Возможность перорального введения
- 4) Активность в отношении синегнойной палочки

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-202

Вопрос:

Побочные эффекты пенициллинов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Дисбактериоз
- 2) Дисфункция слухового нерва
- 3) Дисфункция зрительного нерва
- 4) Аллергические реакции

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-203

Вопрос:

Побочные эффекты цефалоспоринов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Дисбактериоз
- 2) Дисфункция слухового нерва
- 3) Дисфункция зрительного нерва
- 4) Аллергические реакции

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-204

Вопрос:

Показания к применению пенициллинов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Инфекции верхних дыхательных путей
- 2) Гонорея, газовая гангрена, сибирская язва
- 3) Сифилис
- 4) Туберкулез

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-205

Вопрос:

К антибиотикам цефалоспоринового ряда относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Цефепим
- 2) Цефтазидин
- 3) Цефалексин
- 4) Ципрофлоксацин

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-206

Вопрос:

К антибиотикам тетрациклинового ряда относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Тетрациклин

- 2) Доксициклин
 - 3) Ципрофлоксацин
 - 4) Тербинафин
- Ответ:12

ДЕ-9. Вопрос-207

Вопрос:

К макролидным антибиотикам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Азитромицин (Сумамед)
- 2) Гентамицин
- 3) Ципрофлоксацин
- 4) Кларитромицин

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-208

Вопрос:

Эритромицин:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Действует бактериостатически
- 2) Обладает широким спектром антимикробной активности
- 3) Применяется перорально
- 4) Применяется только парентерально

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-209

Вопрос:

Линезолид:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Относится к группе оксазолидинонов
- 2) Обладает бактериостатическим действием
- 3) Является препаратом выбора для лечения внутрибольничных инфекций
- 4) Относится к группе фторхинолонов

Ответ: 123

ДЕ-9. Вопрос-210

Вопрос:

К антисептикам относится:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Мирамистин
- 2) Хлоргексидин

3) Азитромицин (Сумамед)

4) Фуразолидон

Ответ:12

ДЕ-9. Вопрос-211

Вопрос:

Линкомицин:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Относится к группе линкозамидов
- 2) Относится к группе аминогликозидов
- 3) Обладает бактериостатическим действием
- 4) Накапливается в костной ткани и является наиболее эффективным препаратом при инфекционных поражениях костей и суставов.

Ответ:134

ДЕ-9. Вопрос-212

Вопрос:

Антибиотики из группы аминогликозидов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Обладают широким спектром антимикробной активности
- 2) Хорошо всасываются из пищеварительного тракта
- 3) Плохо всасываются из пищеварительного тракта
- 4) Обладают активностью в отношении микобактерий туберкулеза

Ответ:134

ДЕ-9. Вопрос-213

Вопрос:

К противотуберкулезным средствам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Рифампицин
- 2) Изониазид
- 3) Метронидазол
- 4) Арбидол

Ответ:12

ДЕ-9. Вопрос-214

Вопрос:

К противовирусным средствам, применяемым при гриппе относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Осельтамивир
- 2) Римантадин

- 3) Ацикловир
 - 4) Зидовудин
- Ответ:12

ДЕ-9. Вопрос-215

Вопрос:

Осельтамивир (Тамифлю) применяется:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Не позднее 24-48 ч от проявления первых симптомов заболевания
- 2) На любой стадии заболевания
- 3) С целью профилактики вируса гриппа А и В
- 4) С целью лечения вируса гриппа А и В

Ответ:134

ДЕ-9. Вопрос-216

Вопрос:

К синтетическим антибактериальным средствам из группы фторхинолонов относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Ципрофлоксацин
- 2) Цефепим
- 3) Левофлоксацин
- 4) Моксифлоксацин

Ответ:134

ДЕ-9. Вопрос-217

Вопрос:

К синтетическим антибактериальным средствам из группы нитрофуранов относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуразолидон
- 2) Фталилсульфатиазол (Фталазол)
- 3) Нистатин
- 4) Фуразидин (Фурагин)

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-218

Вопрос:

Изониазид:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Нарушает синтез миколовых кислот в клеточной стенке микобактерий

- 2) Является препаратом I ряда
 - 3) Является препаратом II ряда
 - 4) Ингибирует ДНК-зависимую РНК-полимеразу, нарушая процесс транскрипции
- Ответ:12

ДЕ-9. Вопрос-219

Вопрос:

Перечислите побочные эффекты аминогликозидов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Ототоксическое действие (нарушение слуха)
- 2) Нефротоксическое действие
- 3) Нарушение нервно-мышечной передачи
- 4) Кристаллурия

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-220

Вопрос:

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-221

Вопрос:

- 4) Орнидазол

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-222

Вопрос:

Метронидазол применяют при:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Амебной дизентерии
- 2) Трихомониазе
- 3) Лямблиозе
- 4) Сифилисе

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-223

Вопрос:

К противоглистным средства относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Левамизол
- 2) Мебендазол

- 3) Нистатин
 - 4) Празиквантель
- Ответ:124

ДЕ-9. Вопрос-224

Вопрос:

Метронидазол обладает активностью в отношении:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) *H. pylori*
- 2) Лямблий
- 3) Возбудителя псевдомембранозного колита (*Clostridium difficile*)
- 4) Бледной трепонемы

Ответ:123

ДЕ-9. Вопрос-225

Вопрос:

Средства, применяемые при кишечных и внекишечных гельминтозах:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Левамизол
- 2) Мебендазол
- 3) Нистатин
- 4) Празиквантель

Ответ:24

ДЕ-9. Вопрос-226

Вопрос:

Рациональные комбинации антибиотиков:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Ампициллин + оксациллин
- 2) Имипенем + циластатин
- 3) Бензилпенициллина натриевая соль + тетрациклин
- 4) Амоксициллин + клавулановая кислота

Ответ:124

ДЕ-9. Вопрос-227

Вопрос:

Побочные эффекты сульфаниламидов для резорбтивного применения:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Нарушение кроветворения (лейкопения)
- 2) Дисфункция слухового нерва
- 3) Дисфункция зрительного нерва
- 4) Кристаллурия

Ответ:14

ДЕ-9. Вопрос-228

Вопрос:

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-229

Вопрос:

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-230

Вопрос:

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-231

Вопрос:

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-232

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-233

Вопрос:

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-234

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-235

Вопрос:

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-236

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-237

Вопрос:

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-238

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-239

Вопрос:

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-240

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-241

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-242

Вопрос:

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-243

Вопрос:

ДЕ-9. Вопрос-244

Вопрос:

β - лактамные антибиотики действуют бактерицидно, потому что нарушают:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Синтез белка на уровне рибосом
- 2) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой
- 3) Синтез клеточной стенки
- 4) Синтез РНК

Ответ:3

ДЕ-9. Вопрос-245

Вопрос:

Макролидные антибиотики действуют бактериостатически, потому что нарушают:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Синтез белка на уровне рибосом

- 2) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой
- 3) Синтез клеточной стенки
- 4) Синтез РНК

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-246

Вопрос:

Тетрациклиновые антибиотики действуют бактериостатически, потому что нарушают:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Синтез белка на уровне рибосом
- 2) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой
- 3) Синтез клеточной стенки
- 4) Синтез РНК

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-247

Вопрос:

Цефалоспориновые антибиотики действуют бактерицидно, потому что нарушают:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Синтез белка на уровне рибосом
- 2) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой
- 3) Синтез клеточной стенки
- 4) Синтез РНК

Ответ:3

ДЕ-9. Вопрос-248

Вопрос:

Фторхинолоны действуют бактерицидно, потому что:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Нарушают синтез белка на рибосомах
- 2) Нарушают процесс суперспирализации ДНК
- 3) Нарушают синтез клеточной стенки
- 4) Нарушают проницаемость цитоплазматической мембраны

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-249

Вопрос:

Препарат из группы пенициллинов, обладающий длительным действием

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Бензатина бензилпенициллин + Бензилпенициллин прокаина (Бициллин-5)
- 2) Ампициллин + Оксациллин (Ампиокс)
- 3) Бензилпенициллина натриевая соль
- 4) Амоксициллин + клавулановая кислота (Амоксиклав)

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-250

Вопрос:

К группе карбапенемов относится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Моксифлоксацин
- 2) Линезолид
- 3) Имипенем
- 4) Линкомицин

Ответ:3

ДЕ-9. Вопрос-251

Вопрос:

Показание к применению фталилсульфатиазола (Фталазола)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Кишечные инфекции
- 2) Туберкулез
- 3) Инфекционные заболевания глаз
- 4) Инфекции верхних дыхательных путей

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-252

Вопрос:

Показание к применению сульфациетамида (Сульфацил-натрия)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Кишечные инфекции
- 2) Туберкулез
- 3) Инфекционные заболевания глаз
- 4) Инфекции верхних дыхательных путей

Ответ:3

ДЕ-9. Вопрос-253

Вопрос:

Сульфаниламид, действующий только в просвете кишечника:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фталилсульфатиазол (Фталазол)
- 2) Сульфацетамид (Сульфацил-натрия)
- 3) Сульфасалазин
- 4) Сульфадиметоксин

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-254

Вопрос:

Сульфаниламид, применяемый для лечения неспецифического язвенного колита и болезни Крона:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Фталилсульфатиазол (Фталазол)
- 2) Сульфацетамид (Сульфацил-натрия)
- 3) Сульфасалазин
- 4) Сульфадиметоксин

Ответ:3

ДЕ-9. Вопрос-255

Вопрос:

Механизм действия сульфаниламидов включает:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны
- 2) Нарушение синтеза фолиевой кислоты
- 3) Нарушение синтеза клеточной стенки
- 4) Нарушение синтеза белка на рибосомах

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-256

Вопрос:

Сульфаниламиды (не включая комбинированные) ингибируют фермент:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Дигидроптероатсинтетазу
- 2) Дигидрофолатредуктазу
- 3) Топоизомеразу II
- 4) Транспептидазу пептидогликана

Ответ:1

ДЕ-9. Вопрос-257

Вопрос:

К противогрибковым антибиотикам (полиенам) относится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Кетоконазол
- 2) Нистатин
- 3) Тербинафин
- 4) Флуконазол

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-258

Вопрос:

Какой противогрибковый препарат нарушает синтез эргостерола клеточной мембраны за счет блокады сквален-эпоксидазы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Кетоконазол
- 2) Нистатин
- 3) Тербинафин
- 4) Флуконазол

Ответ:3

ДЕ-9. Вопрос-259

Вопрос:

Триметоприм, входящий в состав ко-тримоксазола, ингибирует фермент:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Дигидроптероатсинтетазу
- 2) Дигидрофолатредуктазу
- 3) Топоизомеразу II
- 4) Транспептидазу пептидогликана

Ответ:2

ДЕ-9. Вопрос-260

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Низорал
- 2) Фортум
- 3) Ремантадин
- 4) Таваник

- ☐ Цефтазидим
- ☐ Левофлоксацин
- ☐ Кетоконазол
- ☐ Римантадин

Ответ:

- 1-2
- 2-4
- 3-1
- 4-3

ДЕ-9. Вопрос-261

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Гайро
- 2) Зовиракс
- 3) Сумамед
- 4) Азидотимидин

- ☐ Азитромицин
- ☐ Ацикловир
- ☐ Орнидазол
- ☐ Зидовудин

Ответ:

- 1-3
- 2-2
- 3-1
- 4-4

ДЕ-9. Вопрос-262

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Амоксиклав
- 2) Тиенам
- 3) Ко-тримоксазол
- 4) Ампиокс

- ☐ Имипенем + Циластатин
- ☐ Амоксициллин + Клавулановая кислота
- ☐ Сульфаметоксазол + Триметоприм
- ☐ Ампициллин + Оксациллин

Ответ:

- 1-2
- 2-1
- 3-3
- 4-4

ДЕ-9. Вопрос-263

Вопрос:

Соотнесите препарат с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Дерматомикозы
- 2) Инфекции дыхательных путей
- 3) Туберкулез
- 4) Кишечные гельминтозы

- ☐ Рифампицин
- ☐ Тербинафин
- ☐ Амоксициллин + клавулановая кислота (Амоксиклав)
- ☐ Левамизол

Ответ:

- 1-3
- 2-1
- 3-2
- 4-4

ДЕ-9. Вопрос-264

Вопрос:

Соотнесите препарат с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Инфекционные заболевания глаз
- 2) Грипп
- 3) Инфекции мочевыводящих путей
- 4) Кишечные инфекции

- ☐ Сульфацетамид (Сульфацил- натрия)
- ☐ Фталилсульфатиазол (Фталазол)
- ☐ Фуразидин (Фурагин)
- ☐ Кагоцел

Ответ:

- 1-1
- 2-4
- 3-3
- 4-2

ДЕ-9. Вопрос-265

Вопрос:

Соотнесите препарат с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Эрадикация *H. pylori*
- 2) ВИЧ-инфекция
- 3) Чесотка
- 4) Инфекции кожи и слизистых оболочек (в качестве антисептика)

- ☐ Эсдепаллетрин + Пиперонил бутоксид (Спрегаль)
- ☐ Зидовудин
- ☐ Метронидазол
- ☐ Мирамистин

Ответ:

- 1-3
- 2-2
- 3-1
- 4-4

ДЕ-9. Вопрос-266

Вопрос:

Соотнесите препарат с механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ингибирование 14 α -деметилазы
- 2) Нарушение синтеза миколовых кислот
- 3) Ингибирование ДНК-гиразы
- 4) Нарушение синтеза клеточной стенки

- ☐ Цефтазидим
- ☐ Моксифлоксацин
- ☐ Изониазид
- ☐ Флуконазол

Ответ:

- 1-4
- 2-3
- 3-2
- 4-1

ДЕ-9. Вопрос-267

Вопрос:

Соотнесите препарат с показанием к применению

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Профилактика ревматизма
- 2) Кандидомикозы
- 3) Кишечные и внекишечные гельминтозы
- 4) Трихомониаз

☐ Бензатина бензилпенициллин + Бензилпенициллин прокаина (Бициллин-5)

☐ Флуконазол

☐ Метронидазол

☐ Празиквантель

Ответ:

1-1

2-2

3-4

4-3

ДЕ-9. Вопрос-268

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Амоксиклав
- 2) Тиенам
- 3) Ко-тримоксазол
- 4) Ампиокс

☐ Имипенем + Циластатин

☐ Амоксициллин + Клавулановая кислота

☐ Сульфаметоксазол + Триметоприм

☐ Ампициллин + Оксациллин

Ответ:

1-2

2-1

3-3

4-4

ДЕ-9. Вопрос-269

Вопрос:

Соотнесите МНН с торговым наименованием

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Гайро
- 2) Зовиракс
- 3) Сумамед
- 4) Азидотимидин

___ Азитромицин

___ Ацикловир

___ Орнидазол

___ Зидовудин

Ответ:

1-3

2-2

3-1

4-4

1

ДЕ-10. Вопрос-270

Вопрос:

Основные побочные эффекты алкилирующих соединений:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Угнетение кроветворения
- 2) Изъязвление слизистых оболочек ЖКТ
- 3) Кристаллурия
- 4) Тошнота и рвота

Ответ:124

2

ДЕ-10. Вопрос-271

Вопрос:

Перечислите показания к применению тамоксифена:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Рак молочной железы
- 2) Рак почки
- 3) Лейкозы
- 4) Рак яичника

Ответ:14

3

ДЕ-10. Вопрос-272

Вопрос:

Перечислите показания к применению гозерелина:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Терапия бесплодия
- 2) Рак молочной железы
- 3) Рак предстательной железы
- 4) Рак прямой кишки

Ответ:123

4

ДЕ-10. Вопрос-273

Вопрос:

К фазоспецифичным противоопухолевым препаратам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Циклофосфамид
 - 2) Метотрексат
 - 3) Паклитаксел
 - 4) Доксорубицин
- Ответ:23

5

ДЕ-10. Вопрос-274

Вопрос:

К фазонеспецифичным противоопухолевым препаратам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Циклофосфамид
- 2) Метотрексат
- 3) Паклитаксел
- 4) Доксорубицин

Ответ:14

6

ДЕ-10. Вопрос-275

Вопрос:

К гормональным противоопухолевым препаратам относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Доксорубицин
- 2) Гозерелин
- 3) Паклитаксел
- 4) Тамоксифен

Ответ:24

7

ДЕ-10. Вопрос-276

Вопрос:

К группе алкилирующих агентов относится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Метотрексат
- 2) Циклофосфамид
- 3) Паклитаксел
- 4) Доксорубицин

Ответ:2

8

ДЕ-10. Вопрос-277

Вопрос:

Метотрексат является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Антагонистом пуринов
- 2) Антагонистом пиримидинов
- 3) Антагонистом фолиевой кислоты
- 4) Антиэстрогенным средством

Ответ:3

9

ДЕ-10. Вопрос-278

Вопрос:

К производным хлорэтиламина относится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Метотрексат
- 2) Циклофосфамид
- 3) Тамоксифен
- 4) Гозерелин

Ответ:2

10

ДЕ-10. Вопрос-279

Вопрос:

При передозировке метотрексатом следует использовать:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Пиридоксин
- 2) Налоксон
- 3) Флумазенил
- 4) Кальция фолиат

Ответ:4

11

ДЕ-10. Вопрос-280

Вопрос:

Укажите механизм действия тамоксифена:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Блокада эстрогенных рецепторов
- 2) Ингибирование дигидрофолатредуктазы
- 3) Алкилирование азотистых оснований в молекуле ДНК
- 4) Повреждение митотического веретена деления

Ответ:1

12

ДЕ-10. Вопрос-281

Вопрос:

Укажите механизм действия метотрексата:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Блокада эстрогенных рецепторов
- 2) Ингибирование дигидрофолатредуктазы
- 3) Алкилирование азотистых оснований в молекуле ДНК
- 4) Повреждение митотического веретена деления

Ответ:2

13

ДЕ-10. Вопрос-282

Вопрос:

Доксорубицин обладает выраженным кардиотоксическим эффектом вследствие:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Образования метаболита акролеина
- 2) Нарушения обмена фолиевой кислоты
- 3) Образования свободных радикалов в кардиомиоцитах
- 4) Угнетения продукции гонадотропинов

Ответ:3

14

ДЕ-10. Вопрос-283

Вопрос:

Доксорубицин является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Алкилирующим агентом
- 2) Антиметаболитом
- 3) Противоопухолевым антибиотиком
- 4) Гормональным средством

Ответ:3

15

ДЕ-10. Вопрос-284

Вопрос:

Циклофосфамид является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Алкилирующим агентом
- 2) Антиметаболитом
- 3) Противоопухолевым антибиотиком
- 4) Гормональным средством

Ответ:1

16

ДЕ-10. Вопрос-285

Вопрос:

Аналогом гонадотропин-рилизинг гормона является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Тамоксифен
- 2) Гозерелин
- 3) Метотрексат
- 4) Паклитаксел

Ответ:2

17

ДЕ-10. Вопрос-286

Вопрос:

Соотнесите препарат с характерным механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Ингибирует выделение гипофизом ФСГ и ЛГ по принципу отрицательной обратной связи при длительном введении
- 2) Интеркалирует в двойную спираль ДНК между парами азотистых оснований и вызывает свободнорадикальной окисление последних
- 3) Является алкилирующим агентом, образует ковалентные связи с нуклеиновыми основаниями ДНК, что ведет к образованию внутри- и межмолекулярных мостиков и, как следствие, к изгибу двойной спирали
- 4) Стимулирует сборку дефектных микротрубочек, что ведет к повреждению митотического веретена деления и, как следствие, к нарушению процесса митоза

___ Циклофосфамид

___ Паклитаксел

___ Доксорубицин

___ Гозерелин

Ответ:

1-3

2-4

3-2

4-1

18

ДЕ-10. Вопрос-287

Вопрос:

Соотнесите препарат с характерным механизмом действия

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Блокирует эстрогенные рецепторы преимущественно в молочной железе и эндометрии
- 2) Интеркалирует в двойную спираль ДНК между парами азотистых оснований и вызывает свободнорадикальное окисление последних
- 3) Является антагонистом фолиевой кислоты и нарушает ее обмен в опухолевых клетках путем ингибирования дигидрофолатредуктазы
- 4) Стимулирует сборку дефектных микротрубочек, что ведет к повреждению митотического веретена деления и, как следствие, к нарушению процесса митоза

___ Метотрексат

___ Паклитаксел

___ Доксорубин

___ Тамоксифен

Ответ:

1-3

2-4

3-2

4-1

Дидактическая единица №11. Средства, применяемые при лечении отравлений.(1)-13

1

ДЕ-11. Вопрос-288

Вопрос:

Меры, направленные на уменьшение всасывания ядов из ЖКТ:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Промывание желудка
- 2) Форсированный диурез
- 3) Введение внутрь сорбентов
- 4) Назначение солевых слабительных

Ответ:134

2

ДЕ-11. Вопрос-289

Вопрос:

Меры, направленные на уменьшение концентрации ядов в организме:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Переливание крови
- 2) Назначение функциональных антагонистов
- 3) Форсированный диурез
- 4) Гемодиализ

Ответ:

289) Верные ответы: 1; 3; 4;

3

ДЕ-11. Вопрос-290

Вопрос:

Какие мочегонные средства назначают для форсированного диуреза:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуросемид
- 2) Маннитол
- 3) Гидрохлортиазид
- 4) Спиронолактон

Ответ: 290) Верные ответы: 1; 2;

4

ДЕ-11. Вопрос-291

Вопрос:

Для форсированного диуреза нерационально применять:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Фуросемид
- 2) Маннитол
- 3) Гидрохлортиазид
- 4) Спиронолактон

Ответ: 291) Верные ответы: 3; 4;

5

ДЕ-11. Вопрос-292

Вопрос:

При отравлении антихолинэстеразными средствами необратимого действия (ФОС) применяют:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) М-холиноблокаторы
- 2) М-холиномиметики
- 3) Реактиваторы ацетилхолинэстеразы
- 4) Ганглиоблокаторы

Ответ: 292) Верные ответы: 1; 3;

6

ДЕ-11. Вопрос-293

Вопрос:

Димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат (унитиол)

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Образует нетоксичные комплексы с мышьяком
- 2) Образует нетоксичные комплексы с ртутью
- 3) Образует комплексы с сердечными гликозидами
- 4) Является антагонистом барбитуратов

Ответ: 293) Верные ответы: 1; 2; 3;

7

ДЕ-11. Вопрос-294

Вопрос:

При передозировке суксаметонием (дитилин, листенон) необходимо обеспечить:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Искусственную вентиляцию легких
- 2) Введение раствора неостигмина метилсульфата (прозерин)
- 3) Введение раствора тримедоксима
- 4) Переливание крови

Ответ: 294) Верные ответы: 1; 4;

8

ДЕ-11. Вопрос-295

Вопрос:

Поливидон (Гемодез Н):

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Является полимерным соединением
- 2) Связывает циркулирующие в крови токсины и ускоряет их выведение из организма
- 3) Является антагонистом наркотических анальгетиков
- 4) Является антагонистом барбитуратов

Ответ: 295) Верные ответы: 1; 2;

9

ДЕ-11. Вопрос-296

Вопрос:

Налоксон применяют для восстановления дыхания при:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Передозировке производными барбитуровой кислоты
- 2) Передозировке соединениями бензодиазепинового ряда
- 3) Передозировке опиоидными анальгетиками
- 4) Передозировке М-холиноблокаторами

Ответ: 296) Верные ответы: 3;

10

ДЕ-11. Вопрос-297

Вопрос:

Флумазенил применяют при:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) Передозировке производными барбитуровой кислоты
- 2) Передозировке соединениями бензодиазепинового ряда
- 3) Передозировке опиоидными анальгетиками
- 4) Передозировке М-холиноблокаторами

Ответ: 297) Верные ответы: 2;

11

ДЕ-11. Вопрос-298

Вопрос:

При отравлении антихолинэстеразными средствами обратимого действия (не являющимися ФОС) применяют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) М-холиноблокаторы
- 2) М-холиномиметики
- 3) Ганглиоблокаторы
- 4) Реактиваторы ацетилхолинэстеразы

Ответ: 298) Верные ответы: 1;

12

ДЕ-11. Вопрос-299

Вопрос:

Соотнесите препарат с его фармакологическим антагонистом

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Флумазенил
- 2) Налоксон
- 3) Неостигмина метилсульфат (Прозерин)
- 4) Протамина сульфат

___ Морфин

___ Диазепам

___ Пипекурония бромид

___ Гепарин

Ответ: 299) Верные ответы:

2;

1;

3;

4;

13

ДЕ-11. Вопрос-300

Вопрос:

Соотнесите препарат с его фармакологическим антагонистом

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

- 1) Атропин
- 2) Кальция фолинат
- 3) Неостигмина метилсульфат (Прозерин)
- 4) Протамина сульфат

- ___ Метотрексат
- ___ Пилокарпин
- ___ Пипекурония бромид
- ___ Гепарин

Ответ: 300) Верные ответы:

- 1-2;
- 2-1;
- 3-3;
- 4-4;

Дополнительные вопросы.

201. Тетракаин (Дикаин)

1. нейролептик
2. анальгетик
3. местный анестетик*
4. анксиолитик

202. Бензокаин (Анестезин)

1. нейролептик
2. анальгетик
3. местный анестетик*
4. анксиолитик

203. Прокаин (Новокаин)

1. нейролептик
2. анальгетик
3. местный анестетик*
4. Гемостатик

204. Артикаин (Ультракаин)

1. нейролептик
2. анальгетик
3. местный анестетик*
4. анксиолитик

205. Лидокаин

1. нейролептик
2. анальгетик
3. местный анестетик*
4. анксиолитик

206. Аммиака раствор

1. нейролептик
2. анальгетик
3. Аналептик*
4. анксиолитик

207. Пилокарпин

1. М-холиномиметик*
2. Н-холиномиметик
3. М-холиноблокатор
4. Альфа-адреномиметик

208. Неостигминаметилсульфат

1. Ганглиоблокатор
2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы*
3. М-холиноблокатор
4. Альфа-адреномиметик

209. Атропин

1. Ганглиоблокатор
2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы
3. М-холиноблокатор*
4. Альфа-адреномиметик

210. Пирензепин (Гастроцепин)

1. Ганглиоблокатор
2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. М₁-холиноблокатор*

4. Альфа-адреномиметик

211. Ипратропия бромид

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. М₃-холиноблокатор*

4. Альфа-адреномиметик

212. Азаметония бромид

1. Ганглиоблокатор*

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. М₃-холиноблокатор

4. Альфа-адреномиметик

213. Пипекурония бромид

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)*

4. Альфа-адреномиметик

214. Суксаметоний

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)*

4. Альфа-адреномиметик

215. Эпинефрин

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)

4. Адреномиметик*

216. Фенилэфрин

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)

4. Адреномиметик*

217. Оксиметазолин (Називин)

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)

4. Альфа-адреномиметик*

218. Добутамин

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)

4. Бета₁-адреномиметик*

219. Фенотерол

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)

4. Бета₂-адреномиметик*

220. Эфедрин

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Миорелаксант (Курареподобное средство)

4. Симпатомиметик*

221. Ницерголин

1. Ганглиоблокатор

2. Ингибитор ацетилхолинэстеразы

3. Альфа-адреноблокатор*

4. Симпатолитик

222. Пропранолол

1. Селективный бета-адреноблокатор

2. Неселективный бета-адреноблокатор*

3. Ганглиоблокатор

4. Симпатолитик

223. Метопролол

1. Селективный бета-адреноблокатор*

2. Неселективный бета-адреноблокатор

3. Ганглиоблокатор

4. Симпатолитик

224. Карведилол

1. Альфа,бета-адреноблокатор*

2. Миорелаксант

3. Ганглиоблокатор

4. Симпатолитик

225. Резерпин

1. Альфа,бета-адреноблокатор

2. Миорелаксант

3. Ганглиоблокатор

4. Симпатолитик*

226. Галотан

1. Местный анестетик

2. Общий анестетик*

3. Аналептик

4. Симпатолитик

227. Азота закись

1. Местный анестетик

2. Общий анестетик*

3. Аналептик

4. Симпатолитик

228. Пропофол

1. Местный анестетик

2. Общий анестетик*

3. Аналептик

4. Симпатолитик

229. Тиопентал натрия

1. Местный анестетик

2. Средство для наркоза*

3. Аналептик

4. Симпатолитик

230. Натрия оксибутират

1. Местный анестетик

2. Средство для наркоза*

3. Аналептик

4. Симпатолитик

231. Тиопентал натрия

1. Местный анестетик

2. Средство для неингаляционного наркоза*

3. Аналептик

4. Средство для ингаляционного наркоза

232. Пропофол

1. Местный анестетик

2. Средство для неингаляционного наркоза*

3. Аналептик

4. Средство для ингаляционного наркоза

233. Галотан

1. Местный анестетик

2. Средство для неингаляционного наркоза

3. Аналептик

4. Средство для ингаляционного наркоза*

234. Азота закись

1. Местный анестетик

2. Средство для неингаляционного наркоза

3. Аналептик

4. Средство для ингаляционного наркоза*

235. Натрия оксибутират

1. Местный анестетик

2. Средство для неингаляционного наркоза*

3. Аналептик

4. Средство для ингаляционного наркоза

236. Никетамид (Кордиамин)

1. Местный анестетик

2. Средство для неингаляционного наркоза

3. Аналептик*

4. Средство для ингаляционного наркоза

237. Нитразепам

1. Местный анестетик

2. Антибиотик

3. Снотворное средство*

4. Гемостатик

238. Вальпроевая кислота

1. Местный анестетик

2. Антибиотик

3. Снотворное средство

4. Противосудорожное средство*

239. Леводопа

1. Местный анестетик

2. Антибиотик

3. Снотворное средство

4. Противопаркинсоническое средство*

240. Хлорпромазин (Аминазин)

1. Местный анестетик

2. Антибиотик

- 3. Антипсихотик (Нейролептик)*
- 4. Противопаркинсонические средство
- 241. Дроперидол**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Антибиотик
 - 3. Антипсихотик (Нейролептик)*
 - 4. Противопаркинсонические средство
- 242. Клозапин**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Антибиотик
 - 3. Антипсихотик (Нейролептик)*
 - 4. Противопаркинсонические средство
- 243. Диазепам (Седуксен)**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Анксиолитик*
 - 3. Антипсихотик (Нейролептик)
 - 4. Противопаркинсонические средство
- 244. Валокордин**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Седотивное средство*
 - 3. Антибиотик
 - 4. Антисептик
- 245. Амитриптилин**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Антидепрессант*
 - 3. Антибиотик
 - 4. Антисептик
- 246. Флуоксетин**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Антидепрессант*
 - 3. Антибиотик
 - 4. Антисептик
- 247. Лития карбонат**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Нормотимическое средство*
 - 3. Антибиотик
 - 4. Антисептик
- 248. Пирацетам**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Ноотроп*
 - 3. Антибиотик
 - 4. Антисептик
- 249. Кофеин**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Психостимулятор*
 - 3. Антибиотик
 - 4. Антисептик
- 250. Кофеин**
 - 1. Местный анестетик
 - 2. Аналептик*

3. Антибиотик

4. Антисептик

251. Морфин

1. Психостимулятор

2. Аналептик

3. Ненаркотический анальгетик

4. Наркотический анальгетик*

252. Кодеин

1. Психостимулятор

2. Аналептик

3. Ненаркотический анальгетик

4. Наркотический анальгетик*

253. Кодеин

1. Ноотроп

2. Местный анестетик

3. Ненаркотический анальгетик

4. Противокашлевое средство*

254. Тримеперидин (Промедол)

1. Психостимулятор

2. Аналептик

3. Ненаркотический анальгетик

4. Наркотический анальгетик*

255. Фентанил

1. Психостимулятор

2. Аналептик

3. Ненаркотический анальгетик

4. Наркотический анальгетик*

256. Трамадол

1. Гармональный препарат

2. Гипотензивное средство

3. Анальгетик*

4. Противоглистное средство

257. Налоксон

1. Гармональный препарат

2. Гипотензивное средство

3. Антагонист наркотических анальгетиков*

4. Противоглистное средство

258. Ацетилсалициловая кислота

1. Гармональный препарат

2. Гипотензивное средство

3. Ненаркотических анальгетик, НПВС*

4. Противоглистное средство

259. Метамизол натрия (Анальгин)

1. Гармональный препарат

2. Гипотензивное средство

3. Ненаркотических анальгетик *

4. Противоглистное средство

260. Парацетамол

1. Гармональный препарат

2. Гипотензивное средство

3. Ненаркотических анальгетик *

4. Противоглистное средство

261. Кеторолак

1. Гармональный препарат

2. Гипотензивное средство

3. Ненаркотических анальгетик*

4. Противоглистное средство

262. Дигоксин

1. Желчегонное средство

2. Бронхолитическое средство

3. Кардиотоническое средство*

4. Противоглистное средство

263. Дигоксин

1. Желчегонное средство

2. Кардиотоническое средство негликозидной структуры

3. Кардиотоническое средство гликозидной структуры*

4. Противоглистное средство

264. Верапамил

1. Желчегонное средство

2. Кардиотоническое средство негликозидной структуры

3. Кардиотоническое средство гликозидной структуры

4. Антиаритмическое средство*

265. Верапамил

1. Желчегонное средство

2. Кардиотоническое средство негликозидной структуры

3. Кардиотоническое средство гликозидной структуры

4. Гипотензивное средство*

266. Верапамил

1. Желчегонное средство

2. Кардиотоническое средство негликозидной структуры

3. Кардиотоническое средство гликозидной структуры

4. Антиангинальное средство*

267. Амиодарон

1. Антиаритмическое средство*

2. Кардиотоническое средство негликозидной структуры

3. Кардиотоническое средство гликозидной структуры

4. Анальгетик

268. Фуросемид

1. Психостимулятор

2. Диуретик*

3. Аналептик

4. Анальгетик

269. Фуросемид

1. Калийсберегающий диуретик

2. Калийвыводящий диуретик*

3. Аналептик

4. Анальгетик

270. Спиронолактон

1. Калийсберегающий диуретик*

2. Калийвыводящий диуретик

3. Аналептик
4. Анальгетик
- 271. Спиронолактон**
 1. Ноотроп
 2. Диуретик*
 3. Слабительное средство
 4. Бронхолитическое средство
- 272. Маннитол**
 1. Ноотроп
 2. Диуретик*
 3. Слабительное средство
 4. Бронхолитическое средство
- 273. Маннитол**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик*
 3. Слабительное средство
 4. Бронхолитическое средство
- 274. Нитроглицерин**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик
 3. Антиангинальное средство*
 4. Бронхолитическое средство
- 275. Ивабрадин**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик
 3. Антиангинальное, брадикардическое средство*
 4. Бронхолитическое средство
- 276. Дипиридамол**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик
 3. Антиангинальное, антиагрегантное средство*
 4. Бронхолитическое средство
- 277. Триметазидин (Предуктал)**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик
 3. Кардиопротектор*
 4. Бронхолитическое средство
- 278. Алискирен**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик
 3. Кардиопротектор
 4. Гипотензивное средство*
- 279. Эналаприл**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик
 3. Кардиопротектор
 4. Гипотензивное средство*
- 280. Лозартан**
 1. Ноотроп
 2. Осмотический диуретик

3. Кардиопротектор
4. Гипотензивное средство*

281. Гепарин

1. Антикоагулянт*
2. Осмотический диуретик
3. Кардиопротектор
4. Гипотензивное средство

282. Варфарин

1. Антикоагулянт*
2. Осмотический диуретик
3. Кардиопротектор
4. Гипотензивное средство

283. Стрептокиназа

1. Фибринолитическое средство*
2. Осмотический диуретик
3. Кардиопротектор
4. Гипотензивное средство

284. Тромбин

1. Фибринолитическое средство
2. Осмотический диуретик
3. Гемостатическое средство*
4. Гипотензивное средство

285. Витамин К

1. Фибринолитическое средство
2. Осмотический диуретик
3. Гемостатическое средство*
4. Гипотензивное средство

286. Протамина сульфат

1. Фибринолитическое средство
2. Осмотический диуретик
3. Гемостатическое средство резорбтивного действия*
4. Гипотензивное средство

287. Аминокапроновая кислота

1. Ингибитор фибринолиза*
2. Осмотический диуретик
3. Антисептик
4. Гипотензивное средство

288. АКГГ

1. Гормональное средство*
2. Осмотический диуретик
3. Антисептик
4. Гипотензивное средство

289. Окситоцин

1. Гормональное средство*
2. Осмотический диуретик
3. Антисептик
4. Гипотензивное средство

290. Тиреоидин

1. Гормональное средство*
2. Осмотический диуретик

3. Антисептик
4. Гипотензивное средство
- 291. Тиамазол**
 1. Антигормональное средство*
 2. Осмотический диуретик
 3. Антисептик
 4. Гипотензивное средство
- 292. Глибенкламид**
 1. Противовирусное средство
 2. Осмотический диуретик
 3. Синтетическое гипогликемическое средство*
 4. Гипотензивное средство
- 293. Метформин**
 1. Противовирусное средство
 2. Осмотический диуретик
 3. Синтетическое гипогликемическое средство*
 4. Гипотензивное средство
- 294. Преднизолон**
 1. Противовирусное средство
 2. Осмотический диуретик
 3. Синтетическое гипогликемическое средство
 4. Глюкокортикостероид*
- 295. Дексаметазон**
 1. Противовирусное средство
 2. Осмотический диуретик
 3. Синтетическое гипогликемическое средство
 4. Глюкокортикостероид*
- 296. Этинилэстрадиол**
 1. Противовирусное средство
 2. Препарат женских половых гормонов*
 3. Синтетическое гипогликемическое средство
 4. Глюкокортикостероид
- 297. Прогестерон**
 1. Противовирусное средство
 2. Препарат женских половых гормонов*
 3. Синтетическое гипогликемическое средство
 4. Глюкокортикостероид
- 298. Кломифена цитрат**
 1. Противовирусное средство
 2. Антагонист эстрогенов*
 3. Синтетическое гипогликемическое средство
 4. Глюкокортикостероид
- 299. Тестостерона пропионат**
 1. Противовирусное средство
 2. Препарат мужских половых гормонов*
 3. Синтетическое гипогликемическое средство
 4. Глюкокортикостероид
- 300. Ципротерона ацетат**
 1. Противовирусное средство
 2. Антагонист мужских половых гормонов (тестостерона)*

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Глюкокортикостероид

301. Феноболил

1. Противовирусное средство

2. Анаболическое средство*

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Глюкокортикостероид

302. Продигозан

1. Иммуностимулятор*

2. Анаболическое средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Ферментный препарат

303. Имудон

1. Иммуностимулятор*

2. Анаболическое средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Ферментный препарат

304. Ликопид

1. Иммуностимулятор*

2. Анаболическое средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Ферментный препарат

305. Тималин

1. Иммуностимулятор*

2. Анаболическое средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Ферментный препарат

306. Иммунал

1. Иммуностимулятор*

2. Анаболическое средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Ферментный препарат

307. Циклоспорин А

1. Иммуностимулятор

2. Иммуносупрессор*

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Ферментный препарат

308. Хлоропирамин (Супрастин)

1. Антибиотик

2. Гипертензивное средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Антиаллергическое средство*

309. Лоратадин (Кларитин)

1. Антибиотик

2. Гипертензивное средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Антиаллергическое средство*

310. Левоцитиризин (Ксизал)

1. Антибиотик

2. Гипертензивное средство

3. Синтетическое гипогликемическое средство

4. Антиаллергическое средство*

311. Трипсин

1. Антибиотик

2. Гипертензивное средство

3. Ферментный препарат*

4. Антиаллергическое средство

312. Гиалуронидаза

1. Антибиотик

2. Гипертензивное средство

3. Ферментный препарат*

4. Антиаллергическое средство

313. Альмагель

1. Антибиотик

2. Гипертензивное средство

3. Антацидное средство*

4. Антиаллергическое средство

314. Омепразол

1. Ингибитор H^+ , K^+ - АТФазы (протонного насоса)*

2. Блокатор гистаминовых рецепторов

3. Стимулятор холинорецепторов

4. Ингибитор АПФ

315. Эссенциале

1. Гипотензивное средство

2. Психостимулятор

3. Гепатопротектор*

4. Слабительное средство

316. Аллохол

1. Желчегонное средство*

2. Психостимулятор

3. Анорексиген

4. Слабительное средство

317. Сенаде

1. Желчегонное средство

2. Психостимулятор

3. Анорексиген

4. Слабительное средство*

318. Хлоропирамин Б

1. Фторхинолон

2. Сульфаниламид

3. Дезинфицирующее средство*

4. Антибиотик

319. Повидон-йод

1. Фторхинолон

2. Сульфаниламид

3. Дезинфицирующее средство*

4. Антибиотик

320. Водорода пероксид

1. Фторхинолон

2. Сульфаниламид

3. Дезинфицирующее средство*

4. Антибиотик

321. Мирамистин

1. Фторхинолон

2. Сульфаниламид

3. Дезинфицирующее средство*

4. Антибиотик

322. Гексетидин (Гексорал)

1. Фторхинолон

2. Сульфаниламид

3. Дезинфицирующее средство*

4. Антибиотик

323. Хлоргесидин

1. Фторхинолон

2. Сульфаниламид

3. Дезинфицирующее средство*

4. Антибиотик

324. Местный анестетик

1. Налоксон

2. Тетракаин (Дикаин)*

3. Кофеин

4. Флуоксетин

325. Местный анестетик

1. Налоксон

2. Бензокаин (Анестезин)*

3. Кофеин

4. Флуоксетин

326. Местный анестетик

1. Налоксон

2. Прокаин (Новокаин)*

3. Кофеин

4. Флуоксетин

327. Местный анестетик

1. Налоксон

2. Артикаин*

3. Кофеин

4. Флуоксетин

328. Местный анестетик

1. Налоксон

2. Лидокаин*

3. Кофеин

4. Флуоксетин

329. Вяжущее средство

1. Налоксон

2. Лидокаин

3. Кофеин

4. Флуоксетин

5. Дуба коры отвар*

330. Вяжущее средство

1. Налоксон

2. Лидокаин
3. Кофеин
4. Флуоксетин
5. Ромашки цветков настой*

331. Вяжущее средство

1. Налоксон
2. Лидокаин
3. Кофеин
4. Флуоксетин
5. Шалфея листьев настой*

332. Аналептик

1. Атропин
2. Аммиака раствор*
3. Кеторолак
4. Азота закись

333. Наркозное средство

1. Резерпин
2. Галотан*
3. Амiodарон
4. Дигоксин

334. Наркозное средство

1. Резерпин
2. Пропофол*
3. Амiodарон
4. Дигоксин

335. Наркозное средство

1. Резерпин
2. Тиопентал натрия*
3. Амiodарон
4. Дигоксин

336. Наркозное средство

1. Резерпин
2. Натрия оксибутират*
3. Амiodарон
4. Дигоксин

337. Аналептик

1. Атропин
2. Некетамид*
3. Кеторолак
4. Азота закись

338. Аналептик

1. Атропин
2. Кофеин*
3. Кеторолак
4. Азота закись

339. Снотворное средство

1. Атропин
2. Кофеин
3. Кеторолак
4. Нитразепам*

340. Противозепептическое средство

1. Атропин
2. Кофеин
3. Кеторолак
4. Вальпроевая кислота*

341. Противопаркинсоническое средство

1. Леводопа*
2. Кофеин
3. Кеторолак
4. Вальпроевая кислота

342. Антипсихотик (Нейролептик)

1. Хлорпромазин (Аминазин)*
2. Кофеин
3. Кеторолак
4. Вальпроевая кислота

343. Антипсихотик (Нейролептик)

1. Дроперидол*
2. Кофеин
3. Кеторолак
4. Вальпроевая кислота

344. Антипсихотик (Нейролептик)

1. Клозапин*
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Сульгин

345. Анксиолитик

1. Диазепам (Седуксен)*
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Сульгин

346. Седативное средство

1. Валокордин*
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Сульгин

347. Антидепрессант

1. Амитриптилин*
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Сульгин

348. Антидепрессант

1. Флуоксетин*
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Сульгин

349. Нормотимическое средство

1. Налоксон
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Лития карбонат*

350. Ноотропное средство

1. Налоксон
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Пирацетам*

351. Противопаркинсоническое средство

1. Налоксон
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Тригексифенидил*

352. НПВС

1. Налоксон
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Диклофенак натрия (Вольтарен)*

353. НПВС

1. Налоксон
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Кетопрофен (ОКИ)*

354. НПВС

1. Налоксон
2. Кофеин
3. Кларитромицин
4. Ибупрофен (Нурофен)*

355. НПВС

1. Линезолид
2. Линекс
3. Кларитромицин
4. Мелоксикам (Мовалис)*

356. НПВС

1. Линезолид
2. Линекс
3. Кларитромицин
4. Целекоксиб*

357. Тригексифенидил

1. Аналептик
2. Анксиолитик
3. Противопаркинсоническое средство*
4. Анальгетик

358. Диклофенак натрия (Вольтарен)

1. Аналептик
2. Анксиолитик
3. НПВС*
4. Гепатопротектор

359. Кетопрофен (ОКИ)

1. Аналептик
2. Анксиолитик
3. НПВС*
4. Гепатопротектор

360. Ибупрофен (Нурофен)

1. Аналептик
2. Анксиолитик
3. НПВС*
4. Гепатопротектор

361. Мелоксикам (Мовалис)

1. Слабительно средство
2. Анксиолитик
3. НПВС*
4. Гепатопротектор

362. Целекоксиб

1. Слабительно средство
2. Анксиолитик
3. НПВС*
4. Гепатопротектор

363. Антибиотик

1. Метформин
2. Тазоцин*
3. Натрия фторид
4. Кальция карбонат

364. Антибиотик

1. Метформин
2. Стрептомицин*
3. Натрия фторид
4. Кальция карбонат

365. Антибиотик

1. Метформин
2. Гентамицин*
3. Натрия фторид
4. Кальция карбонат

366. Антибиотик

1. Метформин
2. Амикацин*
3. Натрия фторид
4. Кальция карбонат

367. Антибиотик

1. Метформин
2. Доксициклин (Юнидокс)*
3. Натрия фторид
4. Кальция карбонат

368. Антибиотик

1. Феноболил
2. Эритромицин*
3. Натрия фторид
4. Лоратадин (Кларитин)

369. Антибиотик

1. Феноболил
2. Кларитромицин*
3. Натрия фторид
4. Лоратадин (Кларитин)

370. Антибиотик

1. Феноболил
2. Джозамицин (Вильпрофен)*
3. Натрия фторид
4. Лоратадин (Кларитин)

371. Антибиотик

1. Феноболил
2. Линкомицин*
3. Натрия фторид
4. Лоратадин (Кларитин)

372. Антибиотик

1. Феноболил
2. Хлорамфеникол (Левомецитин)*
3. Резерпин
4. Леводопа

373. Противовирусное средство

1. Дроперидол
2. Парацетамол
3. Протамин сульфат
4. Ацикловир*

374. Противовирусное средство

1. Дроперидол
2. Парацетамол
3. Протамин сульфат
4. Арбидол*

375. Противовирусное средство

1. Дроперидол
2. Парацетамол
3. Протамин сульфат
4. Зидовудин (Ретровир)*

376. Показание к применению Дроперидола

1. Гепатит
2. Шизофрения*
3. Стенокардия
4. Глаукома

377. Показание к применению Хлорпромазина (Аминазина)

1. Гепатит
2. Шизофрения*
3. Стенокардия
4. Глаукома

378. Показание к применению Варфарина

1. Гепатит
2. Профилактика тромбообразования*
3. Болезнь Паркинсона
4. Эпилепсия

379. Показание к применению Протамин сульфата

1. Гепатит
2. Прекращение действия Гепарина*
3. Болезнь Паркинсона
4. Эпилепсия

380. Показание к применению Витамина К

1. Гепатит
2. Остановка кровотечений*
3. Болезнь Паркинсона
4. Эпилепсия

381. Показание к применению Аминокапроновой кислоты

1. Гепатит
2. Остановка кровотечений*
3. Болезнь Паркинсона
4. Эпилепсия

382. Показание к применению Парацетамола

1. Гепатит
2. Остановка кровотечений
3. Зубная боль*
4. Эпилепсия

383. Показание к применению Метамизола натрия (Анальгина)

1. Гепатит
2. Остановка кровотечений
3. Головная боль*
4. Эпилепсия

384. Показание к применению Валокордина

1. Гепатит
2. Остановка кровотечений
3. Зубная боль
4. Создание психоэмоционального покоя*

385. Показание к применению Кодеина

1. Предупреждение сухого кашля у больных*
2. Остановка кровотечений в стоматологии
3. Зубная боль
4. Создание психоэмоционального покоя перед стоматологическими манипуляциями

386. При воспалительных процессах слизистой оболочки показан:

1. Ромашки цветков настой*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

387. При воспалительных процессах слизистой оболочки показан:

1. Дуба коры отвар*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

388. При воспалительных процессах слизистой оболочки показан:

1. Шалфея листьев настой*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

389. При воспалительных процессах слизистой оболочки показан:

1. Мирамистин*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

390. При воспалительных процессах слизистой оболочки ротовой полости показан:

1. Гексетидин (Гексорал)*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

391. При воспалительных процессах слизистой оболочки показан:

1. Хлоргексидин*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

392. При ЛОР-заболеваниях показан:

1. Септолете*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

393. При нарушениях микрофлоры показан:

1. Линекс*
2. Карведилол
3. Протамина сульфат
4. Аминокапроновая кислота

394. При обмороке во время приема применяют:

1. Пирацетам
2. Ивабрадин
3. Аммиака раствор*
4. Фенотерол

395. Для лечения и предупреждения гнойно-воспалительных процессов, при стоматитах, открытых язвах, отитах применяют:

1. Фурацилин*
2. Омепразол
3. Триметазидин (Предуктал)
4. Тиреоидин

396. Какой препарат может использовать медицинская сестра, если во время приема у пациента случился обморок?:

1. Пирацетам
2. Имудон
3. Аммиака раствор*
4. Перекись водорода

397. Показания к применению для препарата Линекс:

1. Инфаркт миокарда
2. Дисбактериоз*
3. Грипп
4. Аллергические реакции

398. К какой фармакологической группе относится Гепарин?:

1. Антикоагулянты*
2. Гемостатики
3. Ноотропы
4. Кардиотонические

399. К какой фармакологической группе относится Витамин К?:

1. Антикоагулянты*
2. Гемостатики

3. Кардиопротекторы

4. Антиангинальные

400. К какой фармакологической группе относится Витамин К?:

1. Антикоагулянты

2. Гемостатики*

3. Ноотропы

4. Кардиотонические

401. К какой фармакологической группе относится цефалоспорин?:

1. Антикоагулянт

2. Антибиотики *

3. Кардиопротектор

4. Ингибиторы фибринолиза

402. К какой фармакологической группе относится инсулин?:

1. Антисептики

2. Гипогликемические средства *

3. Кардиопротекторы

4. Ферментные препараты

403. Для профилактики аллергической реакции на введение местных анестетиков вводят Кетотифен?:

1. Да*

2. Нет

404. Аллергический ринит, крапивница и аллергический дерматит - это показания для применения препарата Кетотифен?:

1. Да*

2. Нет

405. Неионизированные молекулы всасываются преимущественно по механизму:

1. Активного транспорта

2. Пассивной диффузии*

3. Пиноцитоза

4. Фильтрации

406. Неионизированные молекулы всасываются преимущественно по механизму:

1. Пассивной диффузии*

2. Пиноцитоза

407. Неионизированные молекулы всасываются преимущественно по механизму:

1. Пассивной диффузии*

2. Фильтрация

408. Липофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:

1. Активного транспорта

2. Пассивной диффузии*

3. Пиноцитоза

4. Фильтрации

409. Липофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:

1. Активного транспорта

2. Пассивной диффузии*

410. Липофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:

1. Пассивной диффузии*

2. Пиноцитоза

411. **Липофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:**

1. Пассивной диффузии*

2. Фильтрация

412. **Гидрофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:**

1. Активного транспорта*

2. Пассивной диффузии

3. Пиноцитоза

4. Фильтрации

413. **Гидрофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:**

1. Активного транспорта*

2. Пассивной диффузии

414. **Гидрофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:**

1. Активного транспорта*

2. Пиноцитоза

415. **Гидрофильные молекулы всасываются преимущественно по механизму:**

1. Активного транспорта*

2. Фильтрации

416. **Сублингвальное введение относится:**

1. К энтеральному пути введения*

2. К парентеральному пути введения

417. **Буккальное введение относится:**

1. К энтеральному пути введения*

2. К парентеральному пути введения

418. **Пероральное введение относится:**

1. К энтеральному пути введения*

2. К парентеральному пути введения

419. **Ректальное введение относится:**

1. К энтеральному пути введения*

2. К парентеральному пути введения

420. **Внутримышечное введение относится:**

1. К энтеральному пути введения

2. К парентеральному пути введения*

421. **Подкожное введение относится:**

1. К энтеральному пути введения

2. К парентеральному пути введения*

422. **Внутривенное введение относится:**

1. К энтеральному пути введения

2. К парентеральному пути введения*

423. **Местные анестетики действуют:**

1. Местно*
2. Рефлекторно
3. Резорбтивно

424. Местные анестетики действуют:

1. Местно*
2. Рефлекторно

425. Местные анестетики действуют:

1. Местно*
3. Резорбтивно

426. При пероральном пути введения ЛВ:

1. Сразу попадают в системное кровообращение
2. Попадают в системное кровообращение после прохождения через печень*

427. При сублингвальном пути введения ЛВ:

1. Сразу попадают в системное кровообращение*
2. Попадают в системное кровообращение после прохождения через печень

428. При буккальном пути введения ЛВ:

1. Сразу попадают в системное кровообращение*
2. Попадают в системное кровообращение после прохождения через печень

429. При ректальном пути введения ЛВ:

1. Сразу попадают в системное кровообращение*
2. Попадают в системное кровообращение после прохождения через печень

430. При внутримышечном пути введения ЛВ:

1. Сразу попадают в системное кровообращение*
2. Попадают в системное кровообращение после прохождения через печень

431. При подкожном пути введения ЛВ:

1. Сразу попадают в системное кровообращение*
2. Попадают в системное кровообращение после прохождения через печень

432. При трансдермальном пути введения ЛВ:

1. Сразу попадают в системное кровообращение*
2. Попадают в системное кровообращение после прохождения через печень

433. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Ректальном
2. Буккальном
3. Пероральном*

434. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Ректальном
2. Пероральном*
3. Сублингвальном

435. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Пероральном*
2. Сублингвальном
3. Подкожном
4. Внутримышечном

436. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Буккальном
2. Пероральном*

3. Внутримышечном

437. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Пероральном*

2. Подкожном

3. Внутримышечном

438. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Ректальном

2. Пероральном*

4. Сублингвальном

5. Подкожном

439. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Ректальном

2. Буккальном

3. Пероральном*

4. Внутримышечном

440. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Ректальном

2. Буккальном

3. Пероральном*

4. Сублингвальном

5. Подкожном

6. Внутримышечном

441. При каком пути введения ЛВ попадают в системное кровообращение после прохождения через печень?:

1. Ректальном

2. Внутримышечном

3. Пероральном*

4. Сублингвальном

5. Подкожном

442. Активный транспорт ЛВ через мембраны:

1. Требуется метаболической энергии *

2. Не требует метаболической энергии

443. Активный транспорт ЛВ через мембраны:

1. Осуществляется по градиенту концентрации

3. Осуществляется против градиента концентрации*

444. Пассивная диффузия ЛВ через мембраны:

1. Требуется метаболической энергии

2. Не требует метаболической энергии*

445. Пассивная диффузия ЛВ через мембраны:

1. Осуществляется по градиенту концентрации*

3. Осуществляется против градиента концентрации

446. Липофильные соединения:

1. Хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер *

2. Плохо проникают через гематоэнцефалический барьер

447. Гидрофильные соединения:

1. Хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер

2. Плохо проникают через гематоэнцефалический барьер*

448. Неполарные соединения:

1. Хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер *

2. Плохо проникают через гематоэнцефалический барьер

449. Полярные соединения:

1. Хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер

2. Плохо проникают через гематоэнцефалический барьер*

450. Полярные гидрофильные соединения выводятся преимущественно:

1. С мочой*

2. С желчью

451. Неполарные липофильные соединения выводятся преимущественно:

1. С мочой

2. С желчью*

452. Вяжущие средства оказывают главным образом:

1. Рефлекторное действие

2. Резорбтивное действие

3. Местное действие*

453. Обволакивающие средства оказывают главным образом:

1. Рефлекторное действие

2. Резорбтивное действие

3. Местное действие*

454. Адсорбирующие средства действуют главным образом:

1. Рефлекторно

2. Резорбтивно

3. Местно*

455. Раздражающие средства оказывают главным образом:

1. Рефлекторное действие*

2. Резорбтивное действие

3. Местное действие

456. Прижигающие средства оказывают главным образом:

1. Рефлекторное действие

2. Резорбтивное действие

3. Местное действие*

457. Антисептические средства оказывают главным образом:

1. Рефлекторное действие

2. Резорбтивное действие

3. Местное действие*

458. Варфарин оказывает:

1. Рефлекторное действие

2. Резорбтивное действие*

3. Местное действие

459. Тромбин оказывает:

1. Рефлекторное действие

2. Резорбтивное действие

3. Местное действие*

460. Витамин К оказывает:

1. Рефлекторное действие

2. Резорбтивное действие*

3. Местное действие

461. Фуросемид оказывает:

1. Рефлекторное действие
2. Резорбтивное действие*
3. Местное действие

462. Причину болезни устраняют:

1. Этиотропные средства*
2. Патогенетические средства
3. Симптоматические средства

463. Снижают или устраняют механизмы развития болезни:

1. Этиотропные средства
2. Патогенетические средства*
3. Симптоматические средства

464. Недостаток эндогенных веществ в организме восполняют:

1. Этиотропные средства
2. Патогенетические средства
3. Симптоматические средства
4. Средства заместительной терапии*

465. Проявления болезни снижают или устраняют:

1. Этиотропные средства
2. Патогенетические средства
3. Симптоматические средства*
4. Средства заместительной терапии

466. Кумуляция возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств*
2. Комбинированном введении лекарственных средств

467. Сенсибилизация возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств*
2. Комбинированном введении лекарственных средств

468. Лекарственная зависимость возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств*
2. Комбинированном введении лекарственных средств

469. Привыкание возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств*
2. Комбинированном введении лекарственных средств

470. Синергизм возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств
2. Комбинированном введении лекарственных средств*

471. Потенцирование эффекта возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств
2. Комбинированном введении лекарственных средств*

472. Суммирование эффекта возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств
2. Комбинированном введении лекарственных средств*

473. Суммирование эффекта возникает при повторном введении лекарственных средств?:

1. Да
2. Нет*

474. Кумуляция возникает при повторном введении лекарственных средств?:

1. Да*
2. Нет

475. Сенсибилизация возникает при повторном введении лекарственных средств?:

1. Да*

2. Нет

476. Лекарственная зависимость возникает при повторном введении лекарственных средств?:

1. Да*

2. Нет

477. Привыкание возникает при повторном введении лекарственных средств?:

1. Да*

2. Нет

478. Синергизм возникает при комбинированном введении лекарственных средств?:

1. Да*

2. Нет

479. Потенцирование эффекта возникает при комбинированном введении лекарственных средств?:

1. Да*

2. Нет

480. Суммирование эффекта возникает при комбинированном введении лекарственных средств?:

1. Да*

2. Нет

481. Кумуляция возникает при комбинированном введении лекарственных средств?:

1. Да

2. Нет*

482. Тахифилаксия возникает при:

1. Повторном введении лекарственных средств*

2. Комбинированном введении лекарственных средств

483 Тахифилаксия возникает при комбинированном введении лекарственных средств?:

1. Да

2. Нет*

484. Материальная кумуляция это:

1. Накопление в организме эффекта лекарственного вещества при повторных введениях

2. Накопление в организме лекарственного вещества при повторных введениях*

485. Функциональная кумуляция это:

1. Накопление в организме эффекта лекарственного вещества при повторных введениях*

2. Накопление в организме лекарственного вещества при повторных введениях

486. Привыкание – это:

1. Накопление в организме лекарственного вещества при повторных введениях

2. Снижение эффекта лекарственного вещества на введение одной и той же дозы*

487. Тахифилаксия возникает при повторном введении лекарственных средств?:

1. Да*

2. Нет

488. Ульцерогенное действие – это способность вызывать:

1. Злокачественные новообразования

2. Изъязвление слизистой ЖКТ*

3. Нарушение развития скелета у плода

4. Изменение генетического аппарата соматических клеток

489. Канцерогенное действие – это способность вызывать:

1. Злокачественные новообразования*

2. Изъязвление слизистой ЖКТ

3. Нарушение развития скелета у плода

4. Изменение генетического аппарата соматических клеток

490. Тератогенное действие – это способность вызывать:

1. Злокачественные новообразования
2. Изъязвление слизистой ЖКТ
3. Нарушение развития скелета у плода*
4. Изменение генетического аппарата соматических клеток

491. Мутагенное действие – это способность вызывать:

1. Злокачественные новообразования
2. Изъязвление слизистой ЖКТ
3. Нарушение развития скелета у плода
4. Изменение генетического аппарата соматических клеток*

492. Эмбриотоксическое действие – это способность вызывать:

1. Злокачественные новообразования
2. Изъязвление слизистой ЖКТ
3. Нарушение развития скелета у плода
4. Нарушение развития зародыша на ранних стадиях беременности*

493. Ульцерогенное действие характерно для:

1. Пирацетама
2. Ацетилсалициловой кислоты*
3. Кодеина
4. Морфина

494. Ацетилсалициловая кислота может вызвать изъязвление слизистой ЖКТ?:

1. Нет
2. Да*

485. Кортикостероиды могут вызвать изъязвление слизистой ЖКТ?:

1. Нет
2. Да*

496. Преднизолон может вызвать изъязвление слизистой ЖКТ?:

1. Нет
2. Да*

497. Дексаметазон может вызвать изъязвление слизистой ЖКТ?:

1. Нет
2. Да*

498. Дипиридамол может вызвать «синдром обкрадывания»?:

1. Нет
2. Да*

499. Антибиотики могут вызвать дисбактериоз?

1. Нет
2. Да*

500. Какой термин означает нарушение полезной микрофлоры слизистой оболочки ротовой полости?:

1. Мутагенность
2. Нейротоксичность
3. Дисбактериоз*
4. Тератогенность

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Фармакологии ИФ

Принята на заседании кафедры Фармакологии ИФ

От 28.01.2025, протокол №6

Заведующий кафедрой

Фармакологии ИФ им. А.П

Нелюбина

(подпись)

Смолярчук Е.А.

(фамилия, инициалы)

Одобрена Центральным методическим советом

от 31.01.2025, протокол № 2