

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

**Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Кафедра Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии им. М.И. Перельмана**

Методические материалы по дисциплине:

Внелегочный туберкулез

**основная профессиональная образовательная программа высшего
профессионального образования - программа специалитета
31.05.01 Лечебное дело**

1. Заболеваемость внелегочным туберкулезом в РФ на 100 тыс. населения:

- А) более 5 человек
- В) менее 5 человек
- С) менее 2 человек
- Д) более 10 человек
- Е) более 20 человек

ОТВЕТ: В

2. Локализация первоначальных очагов при развитии туберкулеза женских половых органов:

- А) матка
- В) яичники
- С) проксимальные отделы маточных труб
- Д) дистальные отделы маточных труб
- Е) эндометрий

ОТВЕТ: Д

3. При туберкулезе женских половых органов всегда поражаются:

- А) матка и маточные трубы
- В) маточные трубы
- С) яичники и маточные трубы
- Д) яичники
- Е) матка и яичники

ОТВЕТ: В

4. Основным исследованием, позволяющим определить объем поражения при туберкулезе женских половых органов является:

- А) гистеросальпингография
- В) КТ малого таза
- С) МРТ
- Д) лапароскопия
- Е) УЗИ органов малого таза

ОТВЕТ: А

5. Наиболее часто при туберкулезе костей и суставов поражаются:

- А) кости кисти
- В) позвонки поясничного отдела
- С) тазобедренные суставы
- Д) кости плечевого пояса
- Е) кости голени

ОТВЕТ: В

6. Основной путь попадания МБТ в ткани при развитии туберкулеза костей и суставов:

- А) контактный
- В) лимфогенный
- С) гематогенный

- D) аэрогенный
- E) алиментарный

ОТВЕТ: С

7. Локализация первоначальных очагов при развитии туберкулеза позвоночника:

- A) остистый отросток позвонка
- B) межпозвонковый диск
- C) губчатое вещество тел позвонков
- D) межреберные мышцы
- E) паравертебрально

ОТВЕТ: С

8. Степень выраженности клинических признаков при туберкулезе костей и суставов определяется:

- A) возрастом больного
- B) размерами поражения в губчатом веществе тел позвонков
- C) наличием сопутствующих заболеваний
- D) фазой течения процесса
- E) социальным статусом пациента

ОТВЕТ: D

9. При туберкулезе позвоночника рентгенологическая картина нарушения размера и формы позвонков и межпозвонковой щели с наличием паравертебрального образования соответствует:

- A) преспондилитической фазе
- B) постспондилитической фазе
- C) преартритической фазе
- D) постартритической фазе
- E) спондилитической фазе

ОТВЕТ: E

10. При туберкулезе позвоночника МРТ-картина затемнения неправильной формы, располагающегося внутри тела позвонка, соответствует:

- A) преартритической фазе
- B) артритической фазе
- C) постартритической фазе
- D) преспондилитической фазе
- E) спондилитической фазе

ОТВЕТ: D

11. В России соотношение находящихся на диспансерном учете больных легочным и внелегочным туберкулезом составляет:

- A) 5:1
- B) 7:1
- C) 10:1
- D) 12:1
- E) 20:1

ОТВЕТ: D

12. Туберкулез центральной нервной системы чаще начинается с развития:

- А) менингомиелита
- В) базиллярного менингита
- С) миелита
- Д) энцефалита
- Е) менингоэнцефалита

ОТВЕТ: В

13. Для туберкулезного менингита характерно:

- А) наличие продромального периода
- В) хаотичность клинической картины
- С) отсутствие лихорадки
- Д) молниеносность течения
- Е) доброкачественное течение

ОТВЕТ: А

14. Туберкулезный менингит характеризуется:

- А) возможностью самоизлечения
- В) стадийностью развития клинической картины
- С) отсутствием менингеального синдрома
- Д) молниеносностью течения
- Е) отсутствием продромального периода

ОТВЕТ: В

15. Мутный ликвор, нейтрофильный клеточный состав характерны для менингита:

- А) герпетического
- В) менингококкового
- С) вирусного
- Д) туберкулезного
- Е) опухолевой природы

ОТВЕТ: В

16. Локализация первоначальных очагов при развитии туберкулеза глаз:

- А) сетчатка
- В) стекловидное тело
- С) конъюнктивы
- Д) склера
- Е) хориоидея

ОТВЕТ: Е

17. Наличие двух желтоватых очаговых теней на глазном дне, проминирующих в стекловидное тело, у больного с туберкулезом легких соответствует диагнозу:

- А) туберкулезного ирита
- В) туберкулезного иридоциклита
- С) туберкулезного заднего циклита
- Д) туберкулезного хориоретинита
- Е) туберкулезного генерализованного увеита

ОТВЕТ: D

18. Основным диагностическим критерием туберкулеза глаз является:

- A) наличие болевого синдрома
- B) положительная проба Манту
- C) положительная очаговая реакция при проведении пробы Коха
- D) помутнение стекловидного тела
- E) характерная локализация поражения

ОТВЕТ: C

19. Туберкулезом периферических лимфатических узлов чаще заболевают:

- A) взрослые
- B) дети
- C) мужчины
- D) женщины
- E) люди пожилого возраста

ОТВЕТ: B

20. Из всех групп периферических лимфатических узлов туберкулезом чаще поражаются:

- A) паховые
- B) подмышечные
- C) шейные
- D) надключичные
- E) локтевые

ОТВЕТ: C

21. Наиболее частая форма абдоминального туберкулеза:

- A) туберкулезный перитонит
- B) туберкулез кишечника
- C) туберкулез печени
- D) туберкулез поджелудочной железы
- E) туберкулез брыжеечных лимфатических узлов

ОТВЕТ: E

22. Самой частой локализацией внелегочного туберкулеза в настоящее время является:

- A) абдоминальная
- B) кожная
- C) мочеполовая
- D) костно-суставная
- E) глазная

ОТВЕТ: C

23. Наиболее частая форма туберкулеза кожи:

- A) индуративная эритема Базена
- B) язвенный туберкулез
- C) папуло-некротический
- D) бородавчатый
- E) туберкулезная волчанка

ОТВЕТ: Е

24. Основным путем распространения туберкулезной инфекции на мочеполовую систему является

- А) контактный
- В) гематогенный
- С) лимфогенный
- Д) интраканаликулярный
- Е) все перечисленное верно

ОТВЕТ: В

25. Туберкулезные изменения в почке локализуются преимущественно

- А) в мозговом слое
- В) в корковом слое
- С) в чашечно-лоханочной системе
- Д) все перечисленное верно
- Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: В

26. Частота поражения мочеполовой системы туберкулезом составляет

- А) около 10%
- В) около 5%
- С) около 2.5%
- Д) около 1.5-2.0%
- Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: С

27. Заболевшие мочеполовым туберкулезом наблюдаются по группе учета

- А) V группе
- В) I группе
- С) II группе
- Д) IVаб группе учета
- Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: С

28. Наиболее частой формой туберкулеза мочевой системы является

- А) туберкулезный папиллит
- В) фиброзно-кавернозная
- С) кавернозная
- Д) паренхиматозная (туберкулез почечной паренхимы)
- Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: Д

29. Наиболее характерными для туберкулеза мочевой системы клиническими признаками являются

- А) ноющие боли в области поясницы
- В) изменения в моче в виде гематурии
- С) острая боль в животе
- Д) субфебрилитет
- Е) изменения в моче в виде лейкоцитурии

ОТВЕТ: D

30. Основными методами выявления туберкулеза мочевой системы являются

- A) рентгенологический
- B) микробиологический
- C) туберкулиновых проб
- D) клинический
- E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: B

31. Среди инструментальных методов исследования наибольшее значение для распознавания туберкулеза мочевого пузыря имеет

- A) ретроградная пиелография
- B) цистоскопия
- C) внутривенная урография
- D) инфузионная урография
- E) хромоцистография

ОТВЕТ: B

32. О функциональном состоянии почек наиболее полное суждение может быть получено с помощью

- A) анализа мочи
- B) анализа мочи по Нечипоренко
- C) пробы Зимницкого
- D) пробы Реберга - Тареева
- E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: D

33. Локализация первоначальных очагов при развитии туберкулеза почек:

- A) кортикальный слой паренхимы почки
- B) медуллярное вещество
- C) капсула почки
- D) окружающая клетчатка
- E) мозговой слой

ОТВЕТ: A

34. Для диагностики туберкулеза мочевой системы особенно у детей и подростков следует учитывать

- A) наличие контакта с больными туберкулезом
- B) ранее перенесенный внелегочный туберкулез
- C) текущий туберкулез других локализаций
- D) все вышеперечисленные факторы
- E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: D

35. Основным путем выявления туберкулеза мочеполовой системы является

- A) обследование контактов
- B) обращение к врачу
- C) систематическая постановка туберкулиновых проб
- D) исследование анализа мочи

Е) проведение обзорной рентгенографии органов брюшной полости

ОТВЕТ: В

36. Для выявления больных туберкулезом мочевой системы особое внимание следует обращать на лиц

А) с опухолью почек

В) с аномалией развития мочевой системы и с хроническими воспалительными заболеваниями почек

С) с мочекаменной болезнью

Д) с нефрозом

Е) с заболеваниями туберкулезом других органов

ОТВЕТ: Е

37. При обследовании больных с подозрением на туберкулез мочевой системы вспомогательное значение имеет

А) рентгенологический метод

В) микробиологический метод

С) серологический метод

Д) провокационная туберкулиновая проба

Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: D

38. Оптимальные сочетания препаратов при лечении нефротуберкулеза - это лечение

А) изониазидом + тизамидом и этамбутолом

В) изониазидом + стрептомицином и протионамидом

С) изониазидом + рифампицином и этамбутолом

Д) все перечисленное верно

Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: С

39. Основная цель патогенетической терапии при мочеполовом туберкулезе - это

А) уменьшить интенсивность воспаления

В) препятствовать возникновению стеноза мочевых путей

С) уменьшить аллергическое действие противотуберкулезных препаратов

Д) все перечисленное верно

Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: В

40. Применение антибиотиков широкого спектра действия при туберкулезе мочеполовой системы обусловлено

А) сочетанием специфической и неспецифической патологии мочевой системы

В) наличием клиники пиелонефрита

С) наличием признаков мочекаменной болезни

Д) все перечисленное верно

Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: А

41. Основными хирургическими методами, применяющимися при лечении туберкулеза мочевых органов, являются

- А) органосохраняющие операции
- В) нефрэктомия
- С) наложение уретерцистонастомоза
- Д) все перечисленное верно
- Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: А

42. Показаниями к проведению операций при туберкулезе мочевой системы являются

- А) наличие кисты или деструкции в пораженной почке
- В) появление микобактерий туберкулеза в моче
- С) обнаружение малого мочевого пузыря
- Д) отсутствие или резкое снижение функции органа
- Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: А

43. Основными противопоказаниями к проведению операций при туберкулезе мочевой системы являются

- А) большая распространенность специфического процесса, в том числе и в других органах
- В) хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- С) активный туберкулез почек
- Д) все перечисленное верно
- Е) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: В

44. К формам туберкулеза почки относится:

- А) округлый инфильтрат
- В) облаковидный инфильтрат
- С) очаговый туберкулез
- Д) туберкулема
- Е) кавернозный туберкулез

ОТВЕТ: Е

45. Исходы туберкулеза мочевой системы - это

- А) нефролитиаз
- В) рубцовое изменение мочеточника с нарушением оттока мочи
- С) гидронефроз
- Д) переход в неспецифический нефрит
- Е) все ответы правильные

ОТВЕТ: Е

46. Основными критериями излечения туберкулеза мочевой системы являются все перечисленные, кроме

- А) прекращения бактериовыделения
- В) прекращения лейкоцитурии
- С) нормализации функциональных показателей почек

- D) стеноза мочеточника
- E) кальцинатов в паренхиме почек

ОТВЕТ: D

47. Длительность лечения туберкулеза мочевой системы должна быть не менее

- A) 6 месяцев
- B) 9 месяцев
- C) 12 месяцев
- D) 18-24 месяцев
- E) более 2 лет

ОТВЕТ: B

48. Основной путь проникновения микобактерий туберкулеза в кости и суставы - это

- A) лимфогенный путь из внутригрудных лимфатических узлов
- B) лимфогенный путь из очага в легочной ткани
- C) гематогенный путь
- D) контактный путь при переходе инфекции с мягких тканей на костную
- E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: C

49. Самая частая форма костно-суставного туберкулеза - это

- A) туберкулезный спондилит
- B) туберкулез тазобедренного сустава
- C) туберкулез коленного сустава
- D) туберкулезный синовит
- E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: A

50. Ранний клинический признак туберкулезного спондилита - это

- A) боль в области позвоночника при ходьбе
- B) ограничение подвижности в области позвоночника
- C) боль в области позвоночника в покое
- D) нарушение функции тазовых органов
- E) все перечисленное

ОТВЕТ: C

51. Самое частое осложнение при туберкулезном спондилите - это

- A) параплегия нижних конечностей
- B) кровотечение
- C) туберкулезный менингит
- D) натечный абсцесс
- E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: A

52. Ранний и характерный клинический признак туберкулеза тазобедренного сустава - это

- A) ограничение подвижности в суставе
- B) боль в суставе при нагрузке
- C) боль в суставе в покое

D) гиперемия кожи над суставом

E) отечность в области сустава

ОТВЕТ: А

53. Ранний и характерный клинический признак туберкулеза коленного сустава - это

A) повышение температуры тела

B) боль в суставе в покое

C) появление болей при физической нагрузке

D) отечность кожи в области сустава

E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: С

54. Наиболее частым осложнением при туберкулезе суставов является

A) деформация сустава

B) ограничение подвижности сустава

C) образование свища

D) все перечисленное верно

E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: А

55. К неструктурным формам туберкулеза почки относится:

A) туберкулезный пионефроз

B) туберкулезный папиллит

C) гидронефроз

D) туберкулез почечной паренхимы

E) кавернозный туберкулез

ОТВЕТ: D

56. Наиболее информативным методом диагностики костно-суставного туберкулеза - это

A) туберкулинодиагностика

B) рентгенологическое исследование

C) бактериологическое исследование

D) лабораторные анализы крови и ее плазмы

E) все перечисленное не верно

ОТВЕТ: В

57. К своевременно выявленным формам туберкулеза почки относится:

A) гидронефроз

B) облаковидный инфильтрат

C) туберкулезный пионефроз

D) туберкулезный папиллит

E) туберкулез почечной паренхимы

ОТВЕТ: Е

58. При туберкулезе почек рентгенологическая картина полости, заполненной контрастным веществом с фестончатыми краями, соответствует:

A) кавернозной форме

B) пионефрозу

- С) туберкулезу почечной паренхимы
 - Д) казеоме почки
 - Е) туберкулезному папиллиту
- ОТВЕТ: А

59. Отсутствие уретрита при наличии клинической картины эпидидимита является характерным признаком:

- А) неспецифической этиологии процесса
- В) туберкулезной этиологии эпидидимита
- С) опухолевого поражения придатка
- Д) гнойного поражения придатка
- Е) вирусной этиологии заболевания

ОТВЕТ: В

60. Для выявления больных туберкулезом мочевой системы особое внимание следует обращать на лиц

- А) с опухолью почек
- В) с аномалией развития мочевой системы и с хроническими воспалительными заболеваниями почек
- С) с мочекаменной болезнью
- Д) с нефрозом
- Е) с заболеваниями туберкулезом других органов

ОТВЕТ: Е

61. Основной путь проникновения микобактерий туберкулеза в кости и суставы — это

- А) лимфогенный путь из внутригрудных лимфатических узлов
- В) лимфогенный путь из очага в легочной ткани
- С) гематогенный путь
- Д) контактный путь при переходе инфекции с мягких тканей на костную

ОТВЕТ: С

62. Специфический процесс при туберкулезном менингите локализуется преимущественно

- А) в веществе головного мозга
- В) в мозговых оболочках
- С) в стволе головного мозга

ОТВЕТ: В

63. Среди инструментальных методов исследования наибольшее значение для распознавания туберкулеза мочевого пузыря имеет

- А) ретроградная пиелография
- В) цистоскопия
- С) внутривенная урография
- Д) инфузионная урография

Е) хромоцистография

ОТВЕТ: В

64. Основным путем проникновения инфекции в периферические лимфатические узлы является

А) лимфогенный

В) гематогенный

С) контактный

ОТВЕТ: А

65. Основным показанием к оперативному лечению при туберкулезе периферических лимфатических узлов является

А) образование свища

В) отечность в области лимфоузла

С) уплотнение ткани лимфатического узла

ОТВЕТ: А

66. Больные, страдающие туберкулезом глаз, должны наблюдаться

А) фтизиатром

В) офтальмологом

С) фтизиатром и офтальмологом

ОТВЕТ: С

67. В анализе спинномозговой жидкости при туберкулезном менингите обычно наблюдается

А) понижение содержания белка

В) понижение содержания сахара

С) увеличение числа нейтрофилов

ОТВЕТ: В

68. Применение антибиотиков широкого спектра действия при туберкулезе мочеполовой системы обусловлено

А) сочетанием специфической и неспецифической патологии мочевой системы

В) наличием клиники пиелонефрита

С) наличием признаков мочекаменной болезни

ОТВЕТ: А

69. Показаниями к проведению спинномозговой пункции являются

А) потеря сознания

В) нарушение иннервации черепномозговых нервов

С) головная боль

Д) наличие менингеальных симптомов

ОТВЕТ: Д

70. Применение патогенетических средств при лечении туберкулеза глаз позволяет

- А) уменьшить побочное действие химиопрепаратов
- В) снизить воспалительную реакцию
- С) уменьшить развитие рубцовых изменений в структурах органа зрения

ОТВЕТ: С

71. Основной путь проникновения инфекции в мозговые оболочки — это

- А) лимфогенный из очага в легком
- В) лимфогенный из лимфоузлов периферических или внутригрудных
- С) гематогенный, из первичного очага или очагов отсевов первичного туберкулеза
- Д) все перечисленное

ОТВЕТ:

72. Наиболее частым осложнением при туберкулезе суставов является

- А) деформация сустава
- В) ограничение подвижности сустава
- С) образование свища

ОТВЕТ: А

73. Уменьшение вдвое суточной дозы препаратов больным со сниженной функцией почек или единственной почки обусловлено

- А) кумуляцией препаратов в организме и риском возникновения их токсического действия
- В) риском появления аллергических реакций
- С) и тем, и другим
- Д) ни тем, ни другим

ОТВЕТ: А

74. В качестве дополнительных методов исследования при туберкулезном менингите следует провести

- А) исследование глазного дна
- В) снимок черепа и позвоночника
- С) туберкулиновые пробы
- Д) аудиометрию

ОТВЕТ: А

75. О функциональном состоянии почек наиболее полное суждение может быть получено с помощью

- А) анализа мочи
- В) анализа мочи по Нечипоренко
- С) пробы Зимницкого

Д) пробы Реберга — Тареева

ОТВЕТ: D

76. Показаниями к проведению операций при туберкулезе мочевой системы являются

А) наличие кисты или деструкции в пораженной почке

В) появление микобактерий туберкулеза в моче

С) обнаружение малого мочевого пузыря

Д) отсутствие или резкое снижение функции органа

ОТВЕТ: A

77. Туберкулез глаза чаще всего сочетается

А) с очаговым туберкулезом легких

В) диссеминированным туберкулезом легких

С) туберкулезом внутригрудных лимфоузлов и туберкулезным менингитом

ОТВЕТ: C

78. Симптомы интоксикации для клинического течения нефротуберкулеза

А) характерны

В) не характерны

С) встречаются не всегда

ОТВЕТ: C

79. Частота поражения мочеполовой системы туберкулезом составляет

А) около 10%

В) около 5%

С) около 2.5%

Д) около 1.5-2.0%

ОТВЕТ: C

80. При лечении нефротуберкулеза у детей раннего возраста применяют повышение дозы специфических препаратов, что обусловлено

А) распространенностью туберкулезного процесса

В) высокой экскрецией препарата через мочевые пути

С) непереносимостью препаратов

ОТВЕТ: B

81. При туберкулезе периферических лимфатических узлов чаще всего поражается

А) подмышечная группа

В) шейная группа

С) паховая группа

Д) подчелюстная группа

ОТВЕТ: B

82. Критериями излечения туберкулеза периферических лимфатических узлов является

- А) закрытие свищей
- В) исчезновение интоксикации
- С) уменьшение размера лимфоузлов
- Д) уплотнение ткани лимфоузлов
- Е) все перечисленное

ОТВЕТ: Е

83. Начало заболевания при туберкулезе периферических лимфатических узлов обычно

- А) острое
- В) подострое
- С) постепенное

ОТВЕТ: С

84. Ранний и характерный клинический признак туберкулеза коленного сустава — это

- А) повышение температуры тела
- В) боль в суставе в покое
- С) появление болей при физической нагрузке
- Д) отечность кожи в области сустава

ОТВЕТ: С

85. Длительность основного курса лечения должна быть не менее

- А) 6 месяцев
- В) 9 месяцев
- С) 1 года
- Д) 1.5 лет
- Е) 2.0 лет

ОТВЕТ: В

86. Начальный признак туберкулезного менингита — это

- А) вялость
- В) снижение аппетита
- С) головная боль
- Д) повышение температуры тела

ОТВЕТ: С

87. Туберкулезные изменения в почке локализуются преимущественно

- А) в мозговом слое
- В) в корковом слое
- С) в чашечно-лоханочной системе

ОТВЕТ: В

88. Ранний клинический признак туберкулезного спондилита — это

- (+) А) боль в области позвоночника при ходьбе
- В) ограничение подвижности в области позвоночника
- С) боль в области позвоночника в покое
- Д) нарушение функции тазовых органов
- Е) все перечисленное

ОТВЕТ: А

89. Туберкулезный менингит необходимо дифференцировать с серозным менингитом, гнойным менингитом и менингеальной формой полиомиелита

- А) из-за сходства клинических проявлений
- В) из-за одинакового для них начала заболевания
- С) из-за сходства состава спинномозговой жидкости
- Д) из-за выраженности менингеальных симптомов

ОТВЕТ: С

90. Основными противопоказаниями к проведению операций при туберкулезе мочевой системы являются

- А) большая распространенность специфического процесса, в том числе и в других органах
- В) хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- С) активный туберкулез почек

ОТВЕТ: В

91. Верификация диагноза туберкулеза глаз проводится

- А) в туберкулезном санатории
- В) в специализированной туберкулезной больнице
- С) в туберкулезном диспансере

ОТВЕТ: В

92. При туберкулезе периферических лимфатических узлов целесообразно

- А) применить только общее лечение
- В) сочетать общее лечение с местным
- С) использовать только местные методы

ОТВЕТ: В

93. Общая длительность наблюдения за лицами, перенесшими туберкулезный менингит, составляет

- А) 12 месяцев
- В) 2 года
- С) 3 года
- Д) 5 лет

Е) 10 лет
ОТВЕТ: С

94. Наиболее часто болеют туберкулезным менингитом дети в возрасте

- А) до 1 года
- В) от 1 до 2 лет
- С) от 2 до 3 лет
- Д) от 5 до 7 лет
- Е) от 7 до 10 лет

ОТВЕТ: В

95. У детей туберкулез периферических лимфатических узлов чаще протекает в

- А) гиперпластической форме
- В) фиброзной форме
- С) казеозной форме
- Д) флегмонозной форме

ОТВЕТ: С

96. Наиболее информативным методом диагностики костно-суставного туберкулеза — это

- А) туберкулинодиагностика
- В) рентгенологическое исследование
- С) бактериологическое исследование
- Д) лабораторные анализы крови и ее плазмы

ОТВЕТ: В

97. Патогенетические средства лечения при туберкулезном менингите преследуют цель

- А) уменьшить интенсивность воспалительной реакции
- В) уменьшить частоту побочного действия химиопрепаратов
- С) восстановить ликворообращение

ОТВЕТ: А

98. Туберкулез периферических лимфатических узлов чаще всего сочетается

- А) с туберкулезом легких
- В) с костно-суставным туберкулезом
- С) с туберкулезом почек
- Д) с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов

ОТВЕТ: Д

99. Основной путь проникновения микобактерий туберкулеза в орган зрения — это

- А) лимфогенный, из очага поражения в периферических лимфоузлах
- В) гематогенный, из первичного очага в легочной ткани

- С) гематогенный, при распространении инфекции по кровеносным сосудам (период бактериемии)
 - Д) контактный
- ОТВЕТ: С

100. Наиболее характерными для туберкулеза мочевой системы клиническими признаками являются
- А) ноющие боли в области поясницы
 - В) изменения в моче в виде гематурии
 - С) острая боль в животе
 - Д) субфебрилитет
 - Е) изменения в моче в виде лейкоцитурии
- ОТВЕТ: Е

101. Исходы туберкулеза мочевой системы — это
- А) нефролитиаз
 - В) рубцовое изменение мочеточника с нарушением оттока мочи
 - С) гидронефроз
 - Д) переход в неспецифический нефрит
 - Е) все ответы правильные
- ОТВЕТ: Е

102. Туберкулез периферических лимфатических узлов обычно приходится дифференцировать
- А) с опухолевым их поражением (лимфома Ходжкина, лимфосаркома и т.д.)
 - В) с неспецифическим лимфаденитом
 - С) с поражением лимфатических узлов при саркоидозе
 - Д) со всеми перечисленными болезнями
- ОТВЕТ: Д

103. Наиболее частым осложнением туберкулезного лимфаденита является
- А) образование свищей
 - В) кровотечение
 - С) аллергические реакции
- ОТВЕТ: А

104. Самое частое осложнение при туберкулезном спондилите — это
- А) параплегия нижних конечностей
 - В) кровотечение
 - С) туберкулезный менингит
 - Д) натечный абсцесс
- ОТВЕТ: А

105. При обследовании больных с подозрением на туберкулез мочевой

системы вспомогательное значение имеет

- A) рентгенологический метод
- B) микробиологический метод
- C) серологический метод
- D) провокационная туберкулиновая проба

ОТВЕТ: D

106. Туберкулез глаз обычно выявляется

- A) при туберкулинодиагностике
- B) при диспансеризации населения
- C) при обращении в связи со снижением зрения

ОТВЕТ: C

107. Самая частая форма костно-суставного туберкулеза — это

- A) туберкулезный спондилит
- B) туберкулез тазобедренного сустава
- C) туберкулез коленного сустава
- D) туберкулезный синовит

ОТВЕТ: A

108. Основными методами выявления туберкулеза мочевой системы являются

- A) рентгенологический
- B) микробиологический
- C) туберкулиновых проб
- D) клинический

ОТВЕТ: B

109. Основными критериями излечения туберкулеза мочевой системы являются все перечисленные, кроме

- A) прекращения бактериовыделения
- B) прекращения лейкоцитурии
- C) нормализации функциональных показателей почек
- D) стеноза мочеточника
- E) кальцинатов в паренхиме почек

ОТВЕТ: D

110. Наиболее частая локализация процесса туберкулеза глаз — это

- A) туберкулез конъюнктивы глаз
- B) туберкулезный кератит и склерит
- C) туберкулезный иридоциклит
- D) туберкулезный увеит
- E) туберкулезный хориоретинит

ОТВЕТ: D

111. Ранний и характерный клинический признак туберкулеза тазобедренного сустава — это

- А) ограничение подвижности в суставе
- В) боль в суставе при нагрузке
- С) боль в суставе в покое
- Д) гиперемия кожи над суставом
- Е) отечность в области сустава

ОТВЕТ: А

112. Наиболее характерный ранний симптом туберкулезного менингита — это

- А) снижение слуха
- В) снижение зрения
- С) повышение сухожильных рефлексов
- Д) ригидность затылочных мышц

ОТВЕТ: С

113. Для диагностики туберкулеза мочевой системы особенно у детей и подростков следует учитывать

- А) наличие контакта с больными туберкулезом
- В) ранее перенесенный внелегочный туберкулез
- С) текущий туберкулез других локализаций
- Д) все вышеперечисленные факторы

ОТВЕТ: D

114. Наиболее характерный клинический симптом болезни при туберкулезном поражении глаз — это

- А) боль и зуд в глазу
- В) снижение зрения
- С) гиперемия склер
- Д) чувство давления на глаз

ОТВЕТ: В

115. Длительность лечения туберкулеза мочевой системы должна быть не менее

- А) 6 месяцев
- В) 9 месяцев
- С) 12 месяцев
- Д) 18-24 месяцев
- Е) более 2 лет

ОТВЕТ: В

116. Понижение дозы противотуберкулезных препаратов у больных туберкулезом мочеполовой системы применяют в случае

- А) нарушения функции почек

В) распространенного процесса

С) и в том, и в другом случае

ОТВЕТ: А

117. Дети раннего возраста чаще заболевают туберкулезным менингитом из-за

А) несформировавшегося послевакцинального иммунитета

В) несформировавшегося общего иммунитета

С) высокой реактивности организма

Д) высокой сосудистой проницаемости

Е) из-за незрелости центральной нервной системы

ОТВЕТ: А

118. Основным методом в дифференциальной диагностике туберкулезного менингита от других заболеваний центральной нервной системы является

А) исследование периферической крови

В) биохимическое исследование крови

С) исследование спинномозговой жидкости

ОТВЕТ: С

119. Наиболее частой формой туберкулеза мочевой системы является

А) туберкулезный папиллит

В) фиброзно-кавернозная

С) кавернозная

Д) паренхиматозная (туберкулез почечной паренхимы)

ОТВЕТ: D

120. Оптимальные сроки комплексного лечения больных костно-суставным туберкулезом составляют

А) около 6 месяцев

В) около 9 месяцев

С) около 1 года

Д) около 1.5 лет

Е) около 2 лет

ОТВЕТ: Е