

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по **ОБЩАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ**

(наименование дисциплины/ практики, либо – раздела дисциплины/ практики)

основная профессиональная образовательная программа

высшего образования – программа магистратуры

33.00.00 Фармация

указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)

33.04.01 Промышленная фармация

указывается код и наименование направления подготовки (специальности)

Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

1. Анксиолитическим эффектом называется:

- A) устранение тревоги, страха, напряженности;
- B) купирование эпилептических припадков;
- C) угнетение когнитивных функций, снижение краткосрочной памяти;
- D) успокоение, уменьшение быстроты реакции;

ОТВЕТ: A

2. Антагонистом морфина является:

- A) Налоксон;
- B) Бупренорфин;
- C) Эндорфин;
- D) Фентанил;

ОТВЕТ: A

3. Всасывающийся антацид:

- A) Гидрокарбонат натрия;
- B) Оксид магния;
- C) Гидроксид алюминия;
- D) Фосфат алюминия;

ОТВЕТ: A

4. Для снижения риска негативных эффектов при длительном применении омепразола желательно:

- A) провести эрадикацию *H. pylori*;
- B) дополнительно применять соли кальция;
- C) принимать препарат только после еды;
- D) одновременно принимать антацид;

ОТВЕТ: A

5. Доксиламин – снотворное, механизм которого:

- A) блокада гистаминовых рецепторов;
- B) активация бензодиазепиновых рецепторов;
- C) активация барбитуратных рецепторов;
- D) блокада ГАМК-рецептора;

ОТВЕТ: A

6. Использование лизатов бактерий в период высокой температуры на пике острой респираторной инфекции:

- A) бесполезно;
- B) может использоваться для профилактики хронизации процесса;
- C) ускоряет выздоровление;
- D) усугубит состояние;

ОТВЕТ: A

7. Исследование биоэквивалентности лекарственного препарата - вид клинического исследования лекарственного препарата, при котором определяется его:

- A) фармакокинетические параметры;
- B) биофармацевтические характеристики;
- C) биологические эффекты на организм здоровых добровольцев;
- D) терапевтическая активность;

ОТВЕТ: А

8. Как называется подход к медицинской практике, при котором решения о применении лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов?

- A) доказательная медицина;
- B) персонализированная медицина;
- C) клиническая фармакология;
- D) биофармация;

ОТВЕТ: А

9. Какой из НПВП обладает наименьшей способностью раздражать желудок?

- A) Целекоксиб
- B) Диклофенак;
- C) Ибупрофен
- D) Мелоксикам;

ОТВЕТ: А

10. Наиболее быстро эффект наступит, если вещество вводилось:

- A) сублингвально;
- B) перорально;
- C) ректально;
- D) подкожно;

ОТВЕТ: А

11. Нормализующее действие на микрофлору кишечника может оказать:

- A) Лактулоза;
- B) экстракт Сенны узколистной;
- C) Бисакодил;
- D) Микrokристаллическая целлюлоза;

ОТВЕТ: А

12. Основная цель применения настоев и сиропов из лекарственного растительного сырья при кашле как правило:

- A) Увеличение количества мокроты;
- B) Подавление кашлевого рефлекса;
- C) Расширение бронхов;
- D) Снижение вязкости мокроты;

ОТВЕТ: А

13. Основной эффект применения периферических α_2 -адреномиметиков:

- A) сужение сосудов;
- B) тахикардия;
- C) расширение бронхов;
- D) купирование аритмий;

ОТВЕТ: A

14. Препарат для профилактики сахарного диабета

- A) метформин
- B) инсулин
- C) глибенкламид
- D) акарбоза

ОТВЕТ: A

15. При нанесении мази, содержащей глюкокортикоид, на кожу с герпетическими высыпаниями наиболее вероятно:

- A) обострение герпеса;
- B) ускорение заживления;
- C) обезболивающее действие;
- D) противовирусное действие;

ОТВЕТ: A

16. При применении препаратов инсулина типичный побочный эффект:

- A) гипогликемия;
- B) гипергликемия;
- C) глюкозурия;
- D) гликирование белка;

ОТВЕТ: A

17. Синдром отмены характерен для:

- A) β -адреноблокаторов;
- B) α -адреноблокаторов;
- C) M-холинолитиков;
- D) H-холинолитиков (миорелаксантов);

ОТВЕТ: A

18. Сродство вещества с рецептором, способность связываться с ним называется:

- A) аффинитет;
- B) клиренс;
- C) аллостерия;
- D) конгруэнтность;

ОТВЕТ: A

19. Сухой кашель – типичный побочный эффект при применении:

- A) Ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента;
- B) Бета-блокаторов;
- C) Диуретиков;
- D) Блокаторов кальциевых каналов;

ОТВЕТ: А

20. Фторхинолоны нежелательно назначать детям, так как они могут:

- A) разрушать связки и суставы;
- B) повреждать печень;
- C) вызывать развитие бронхиальной астмы;
- D) задерживать умственное развитие;

ОТВЕТ: А