



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ»

Вариант 1

Выпишите в рецептах:

1. Фенилэфрин (глазные капли)
2. Дексаметазон (раствор д/инъекций)
3. Метронидазол (раствор д/инъекций)
4. Прогестерон (раствор д/инъекций)
5. Хлоргексидин
6. Стрептомицин
7. Гонадотропин
8. Суспензию гидрокортизона
9. Суспензию ибупрофена
10. Настой плодов боярышника
11. Отвар коры крушины
12. Настойка валерианы
13. Экстракт элеутерококка жидкий

Название препарата	Средняя терапевтическая доза и путь введения	Форма выпуска
Absinthium	15 – 20 капель внутрь	Настойка во флаконах по 25 мл
Acidum boricum	1-2 капли в каждый слуховой ход	Спиртовой раствор 3% во флаконах по 10 мл
Betamethasoni dipropionas	0,007 – 0,014 в мышцу, интросиновиально	Суспензия в ампулах по 1 мл, содержащая 0,007 бетаметазона
Chlorhexidinum	Наносить на пораженные участки кожи	Спиртовой раствор 0,5% во флаконах по 25, 50 и 100 мл
Ciprofloxacinum	0,1 – 0,4 в вену струйно или капельно	Флаконы по 100 мл раствора, в 1 мл 0,002 ципрофлоксацина
Crataegus	15 – 30 мл внутрь	Плоды для приготовления настоя в концентрации 1:10
Dexamethasonum	0,004 в мышцу, в вену	Раствор для инъекций 0,4% в ампулах по 1 мл.
	1-2 капли в конъюнктивальный мешок	Раствор 0,1% во флаконах по 5 мл (глазные капли)
Eleuterococcus	30 – 50 капель внутрь	Экстракт жидкий во флаконах по 50 мл
Erythromycinum	0,1 – 0,4 в вену капельно	Флаконы по 0,1 и 0,2
Glycyrrhiza	20 – 30 капель внутрь	Экстракт жидкий во флаконах по 50 мл
Gonadotropinum chorionicum	1000 – 5000 МЕ в мышцу, перед введением растворить в 0,9% р-ре натрия хлорида, 2-3 раза в неделю	Флаконы по 500 МЕ и 1000 МЕ объемом 5 мл
Hydrocortisoni acetat	0,005 – 0,025 в мышцу, интрасиновиально	Суспензия 2,5% во флаконах по 5 мл.
Ibuprofenum	5 мл внутрь	Флаконы по 100 мл, содержащие 2,0 ибупрофена
Metronidazolum	0,25 – 1,0 в мышцу, в вену	Флаконы по 100 мл раствора, в 1 мл 0,005 метронидазола
Oxytocinum	1-3 МЕ в мышцу, в вену	Ампулы по 2 МЕ объемом 2 мл
	5-10 МЕ в мышцу, под кожу	Ампулы по 5 МЕ объемом 1 мл
Phenylephrinum (Mesatonum)	0,003 – 0,005 в мышцу, подкожно	Раствор для инъекций 1% в ампулах по 1 мл.
	0,001 – 0,003 в вену	
	1-2 капли в конъюнктивальный мешок	Раствор 2,5% и 10% во флаконах по 5 мл (глазные капли).
Progesteronum	0,005 – 0,015 под кожу, в мышцу	Масляный раствор для инъекций 1% и 2,5% в ампулах по 1 мл.
Rhamnus	15 – 30 мл внутрь	Кора для приготовления отвара в концентрации 1:10
Rosa	15 – 30 мл внутрь	Плоды для приготовления отвара в концентрации 1:30
Simethiconum	5 мл внутрь	Флаконы по 30 мл, содержащие 2,0 симетикона
Streptomycini sulphas	0,5 – 1,0 в мышцу	Флаконы по 0,5 и 1,0
Testosteroni propionas	0,005 – 0,05 в мышцу	Масляный раствор для инъекций 1% и 5% в ампулах по 1 мл.
Valeriana	15 – 30 мл внутрь	Корневища с корнями для приготовления настоя в концентрации 1:10 и 1:30
	20 – 30 капель внутрь	Настойка во флаконах по 30 мл



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ»

Вариант 2

Выпишите в рецептах:

1. Дексаметазон (глазные капли)
2. Фенилэфрин (раствор д/инъекций)
3. Ципрофлоксацин (раствор д/инъекций)
4. Тестостерон (раствор д/инъекций)
5. Борный спирт
6. Эритромицин
7. Окситоцин
8. Суспензию бетаметазона
9. Суспензию симетикона
10. Настой корневищ с корнями валерианы
11. Отвар плодов шиповника
12. Настойка полыни
13. Экстракт солодки жидкий

Название препарата	Средняя терапевтическая доза и путь введения	Форма выпуска
Absinthium	15 – 20 капель внутрь	Настойка во флаконах по 25 мл
Acidum boricum	1-2 капли в каждый слуховой ход	Спиртовой раствор 3% во флаконах по 10 мл
Betamethasoni dipropionas	0,007 – 0,014 в мышцу, интросиновиально	Суспензия в ампулах по 1 мл, содержащая 0,007 бетаметазона
Chlorhexidinum	Наносить на пораженные участки кожи	Спиртовой раствор 0,5% во флаконах по 25, 50 и 100 мл
Ciprofloxacinum	0,1 – 0,4 в вену струйно или капельно	Флаконы по 100 мл раствора, в 1 мл 0,002 ципрофлоксацина
Crataegus	15 – 30 мл внутрь	Плоды для приготовления настоя в концентрации 1:10
Dexamethasonum	0,004 в мышцу, в вену	Раствор для инъекций 0,4% в ампулах по 1 мл.
	1-2 капли в конъюнктивальный мешок	Раствор 0,1% во флаконах по 5 мл (глазные капли)
Eleuterococcus	30 – 50 капель внутрь	Экстракт жидкий во флаконах по 50 мл
Erythromycinum	0,1 – 0,4 в вену капельно	Флаконы по 0,1 и 0,2
Glycyrrhiza	20 – 30 капель внутрь	Экстракт жидкий во флаконах по 50 мл
Gonadotropinum choricum	1000 – 5000 МЕ в мышцу, перед введением растворить в 0,9% р-ре натрия хлорида, 2-3 раза в неделю	Флаконы по 500 МЕ и 1000 МЕ объемом 5 мл
Hydrocortisoni acetat	0,005 – 0,025 в мышцу, интрасиновиально	Суспензия 2,5% во флаконах по 5 мл.
Ibuprofenum	5 мл внутрь	Флаконы по 100 мл, содержащие 2,0 ибупрофена
Metronidazolium	0,25 – 1,0 в мышцу, в вену	Флаконы по 100 мл раствора, в 1 мл 0,005 метронидазола
Oxytocinum	1-3 МЕ в мышцу, в вену	Ампулы по 2 МЕ объемом 2 мл
	5-10 МЕ в мышцу, под кожу	Ампулы по 5 МЕ объемом 1 мл
Phenylephrinum (Mesatonum)	0,003 – 0,005 в мышцу, подкожно	Раствор для инъекций 1% в ампулах по 1 мл.
	0,001 – 0,003 в вену	
	1-2 капли в конъюнктивальный мешок	Раствор 2,5% и 10% во флаконах по 5 мл (глазные капли).
Progesteronum	0,005 – 0,015 под кожу, в мышцу	Масляный раствор для инъекций 1% и 2,5% в ампулах по 1 мл.
Rhamnus	15 – 30 мл внутрь	Кора для приготовления отвара в концентрации 1:10
Rosa	15 – 30 мл внутрь	Плоды для приготовления отвара в концентрации 1:30
Simethiconum	5 мл внутрь	Флаконы по 30 мл, содержащие 2,0 симетикона
Streptomycini sulphas	0,5 – 1,0 в мышцу	Флаконы по 0,5 и 1,0
Testosteroni propionas	0,005 – 0,05 в мышцу	Масляный раствор для инъекций 1% и 5% в ампулах по 1 мл.
Valeriana	15 – 30 мл внутрь	Корневища с корнями для приготовления настоя в концентрации 1:10 и 1:30
	20 – 30 капель внутрь	Настойка во флаконах по 30 мл