

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

(Сеченовский Университет)

Институт стоматологии имени Е.В. Боровского

Кафедра челюстно-лицевой хирургии имени Н.Н. Бажанова

Методические материалы по дисциплине:

Челюстно-лицевая хирургия

основная профессиональная образовательная программа высшего профессионального образования – программа специалитета

33.05.03 Стоматология

Местные поздние осложнения после пересадки свободной кожи

Выберите один ответ:

- a. кровотечение из лоскута
- b. гематома
- c. гиперпигментация
- d. некроз лоскута
- e. парестезии

Серьезным осложнением флегмон верхних отделов лица является:

Выберите один ответ:

- a. гематома мягких тканей
- b. тромбоз синусов головного мозга
- c. паротит
- d. парез лицевого нерва
- e. медиастенит

Временная остановка кровотечения у раненых в челюстно-лицевую область

Выберите один ответ:

- a. не проводится
- b. в перевязке сосуда на протяжении
- c. в тугий тампонаде
- d. в наложении жгута
- e. в пальцевом прижатии сосуда

Способ пластики частичного дефекта крыла носа

Выберите один ответ:

- a. артеризированным лоскутом височной области
- b. по Суслову
- c. по Рауэру
- d. лоскутом на микроанастомозе

Свободный кожный лоскут фиксируют на ране

Выберите один ответ:

- a. парафиновой повязкой и узловыми швами
- b. внутрикожными швами
- c. узловыми швами и давящей повязкой
- d. пластиночными швами и давящей повязкой
- e. узловыми швами
- f. давящей повязкой

Филатовский стебель, формируемый и поэтапно переносимый к месту дефекта, называется

Выберите один ответ:

- a. шагающим
- b. ускоренным
- c. классическим
- d. острым

Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных опухолей челюстей является

Выберите один ответ:

- a. отсутствие рецидива
- b. объем опухоли
- c. вид первичной опухоли
- d. характер метастазирования

Пиогенная мембрана - это:

Выберите один ответ:

- a. наружный слой гнойника, отграничивающий его от мягких тканей
- b. внутренний слой гнойника, отграничивающий его от мягких тканей
- c. средний слой гнойника, отграничивающий его от мягких тканей

При невозможности остановки кровотечения из корня языка или боковой стенки глотки

Выберите один ответ:

- a. тугую тампонаду
- b.

заднюю тампонаду

c.

положить гемостатическую трубку

d.

экстренную трахеотомию и тугую тампонаду

e.

пальцевое прижатие сосуда

Методика пластики частичных дефектов нижней губы

Выберите один ответ:

a.

свободная пересадка тканей

b.

Шимановского

c.

Аббе

d.

Крайля

Местные ранние осложнения после пластики дефекта губ

Выберите один ответ:

a.

гиперпигментация

b.

рубцовая трансформация

c.

гематома

d.

неврит лицевого нерва

Плотная ткань с четкими контурами на рентгенограмме наблюдается при:

Выберите один ответ:

a.

амелобластоме

b.

мягкой одонтоме

c.

твердой одонтоме

d.

фиброзном эпулисе

Остеосинтез по Макиенко проводится

Выберите один ответ:

a.

бронзо-алюминиевой лигатурой

b.

минипластинами

c.

спицей

d.

компрессионно-дистракционным аппаратом

e.

стальной проволокой

Ксенотрансплантат – это материал, взятый

Выберите один ответ:

- a.
у пациента
- b.
у другого индивида
- c.
у однояйцевого близнеца
- d.
у животного

Амелобластома развивается:

Выберите один ответ:

- a.
в челюстях
- b.
в костях мозгового черепа
- c.
во всех костях лицевого скелета

При выкраивании лоскута на ножке соотношение его ширины к длине должно быть

Выберите один ответ:

- a.
1:4
- b.
1:8
- c.
1:3
- d.
1:5

Местные поздние осложнения после пересадки сводной кожи

Выберите один ответ:

- a.
рубцовая трансформация
- b.
гематома
- c.
кровотечение из лоскута
- d.
парестезии
- e.
некроз «материнского ложа»

Определите показания к лечебной физкультуре

Выберите один ответ:

- a.
неправильно сросшийся перелом
- b.
дефект челюсти

- c. контрактура нижней челюсти
- d. ложный сустав нижней челюсти

Для туберкулезного лимфаденита шейных лимфатических узлов характерны:
Выберите один ответ:

- a. в пунктате лимфоузлов – масса нейтрофилов
- b. в легких –отсутствие рентгенологических изменений
- c. слабость, субфебрильная температура, потеря аппетита, лимфоузлы при пальпации слабоболезненны, поверхность бугристая, четко контурируются, кожа над ними не изменена
- d. реакция Манту отрицательная

При односторонней флегмоне дна полости рта разрез:
Выберите один ответ:

- a. внутриротовой
- b. воротникообразный
- c. подчелюстной

Какая из сочетанных травм лица встречается наиболее часто в практике стоматолога-хирурга?

Выберите один ответ:

- a. абдоминальная
- b. торакальная
- c. закрытая черепно-мозговая травма
- d. перелом длинных трубчатых костей

Количество этапов пластики тотального дефекта носа по Хитрову без учета корригирующих операций

Выберите один ответ:

- a. 5
- b. 3
- c. 2
- d. 6
- e. 4

f.

1

Как отличить гнойный периостит верхней челюсти от абсцесса крылонебной ямки?

Выберите один ответ:

a.

по наличию флюктуации

b.

по наличию сглаженности (выбухания) слизистой оболочки по переходной складке

c.

по выраженности интоксикации организма

d.

по выраженности температуры тела

Показанием для проведения вторичной костной пластики является

Выберите один ответ:

a.

врожденные деформации челюстей

b.

секвестрэктомия

c.

удаление злокачественных опухолей

d.

периостит

e.

удаление доброкачественных опухолей челюстей

Для актиномикозного гайморита характерны:

Выберите один ответ:

a.

обильные выделения из носа гнойного характера

b.

головная боль в области затылка

c.

истончение костных стенок антрума

d.

наличие инфильтрата в области переходной складки, свищи

e.

наличие сопутствующего фронтита, этмоидита

f.

острое течение с повышением температуры тела до 39°C

В основу деления опухолей на доброкачественные и злокачественные положен критерий:

Выберите один ответ:

a.

клинический

b.

гистологический

c.

патологоанатомический

d.

этиологический

е.
патогенетический

Вторичная костная пластика после основной операции проводится
Выберите один ответ:

- а.
через 1 – 1,5 года
- б.
через 6 – 8 месяцев
- с.
через 10 дней
- д.
через 1 - 2 месяца
- е.
через 3 – 4 месяца

Больной с диагнозом «Злокачественное новообразование» челюстно-лицевой области
должен быть направлен.
Выберите один ответ:

- а.
к специалисту-радиологу
- б.
к хирургу общего профиля
- с.
к участковому терапевту
- д.
к районному онкологу.
- е.
к специалисту-стоматологу

Начало развития амелобластомы:
Выберите один ответ:

- а.
малосимптомное
- б.
бессимптомное
- с.
выраженное

Продолжительность пластики тотального дефекта носа по Хитрову без учета
корректирующих операций
Выберите один ответ:

- а.
3 недели
- б.
3 месяца
- с.
6 месяцев

Основное правило пластики местными тканями
Выберите один ответ:

- а.

недопустима мобилизация тканей

b.

не ушивать рану наглухо

c.

отсутствие натяжения в краях раны

d.

длина разреза должна быть минимальной

Симптомы перелома скуловой кости

Выберите один ответ:

a.

кровотечение из носа, головокружение, диплопия

b.

гематома скуловой области

c.

кровоизлияние в нижнее веко

d.

все ответы верны

e.

уплощение скуловой области, нарушение чувствительности, в зоне иннервации подглазничного нерва

При гнилостно-некротической флегмоне лица наиболее часто поражаются клетчаточные пространства

Выберите один ответ:

a.

крыло-небной, височной и подвисочной областей

b.

височной, щечной областей и клыковой ямки

c.

все клетчаточные пространства дна полости рта

d.

височной и подвисочной областей

Для актиномикоза гайморовой пазухи характерно:

Выберите один ответ:

a.

двусторонний процесс

b.

частичная оссификация пазухи при рентгенологическом исследовании

c.

частые носовые кровотечения

d.

наличие разрушения или отсутствия некоторых стенок антрума

e.

острое начало с признаками значительной интоксикации

Толщина полнослойного свободного кожного лоскута составляет

Выберите один ответ:

a.

0,6 - 0,7 мм

b.

0,2 – 0,4 мм

с.

0,5 - 0,6 мм

d.

0,8 - 1 мм

Идентичность цвета пересаженной кожи и окружающей кожи лица достигается при помощи

Выберите один ответ:

a.

криотерапии

b.

физиотерапия

с.

гидромассаж

d.

деэпидермизации

e.

электрокоагуляция

К органонеспецифическим опухолям относятся новообразования, которые:

Выберите один ответ:

a.

подлежат традиционному лечению

b.

могут возникать в разных анатомических областях

с.

часто метастазируют

d.

часто встречаются

Методы временной иммобилизации при переломах челюстей

Выберите один ответ:

a.

импровизированные повязки

b.

компрессионно-дистракционный аппарат

с.

назубные шины

d.

костных швов

Толщина свободного кожного лоскута по Педжету составляет

Выберите один ответ:

a.

0,2 – 0,4 мм

b.

0,6 - 0,7 мм

с.

0,8 - 1 мм

d.

0,5 - 0,6 мм

Доступ для репозиции скуловой кости и дуги крючком Лимберга

Выберите один ответ:

- a. внеротовой
- b. внутриротовой

Поздний вторичный шов при ранениях лица накладывают

Выберите один ответ:

- a. на 4 – 5-е сутки
- b. после эпителизации раны
- c. после отторжения некротизированных тканей и появления грануляций
- d. с началом формирования рубца

При двустороннем поражении нижнего отдела дна полости рта применяют разрез:

Выберите один ответ:

- a. внутриротовой
- b. воротникообразный

Доступ для репозиции скуловой кости элеватором Карапетяна

Выберите один ответ:

- a. внутриротовой
- b. внеротовой

Какую вынужденную позу принимает больной с флегмоной дна полости рта.

Выберите один ответ:

- a. наклонив голову назад
- b. лёжа
- c. наклонив голову вперёд