

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России
(Пироговский Университет)

д.б.н., профессор, профессор РАН



Д.В. Ребриков

«28» февраля 2026 г.

ОТЗЫВ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации о научно-практической ценности диссертации Камилова Шамсулвары Таймахановича «Сравнительная оценка эффективности склерозантов при лечении венозных мальформаций в области лица, шеи и полости рта», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.2. Челюстно-лицевая хирургия.

Актуальность темы исследования

Венозные мальформации (ВМ) челюстно-лицевой области относятся к наиболее частым вариантам сосудистых мальформаций и характеризуются вариабельностью клинических проявлений, склонностью к прогрессированию и частым вовлечением функционально значимых анатомических зон. Поражения лица, шеи и полости рта могут приводить к нарушению жевания, речи, глотания и дыхания, формированию хронического болевого синдрома, эпизодам кровоточивости и выраженному косметическому дефекту. Указанные особенности определяют высокую социальную значимость проблемы и необходимость выбора щадящих, но эффективных методов лечения.

Склеротерапия является одним из наиболее распространённых органосохраняющих методов лечения ВМ. Вместе с тем в клинической практике

сохраняется неоднозначность выбора склерозанта и критериев оценки результата: различные препараты отличаются по силе действия, профилю переносимости, выраженности коллатерального отёка и локальных осложнений, что особенно критично при вмешательствах в челюстно-лицевой области. Поэтому сравнительная оценка эффективности и безопасности склерозантов с последующей разработкой алгоритма их дифференцированного выбора представляет существенный практический интерес.

Выполненное исследование, посвящённое сравнительной оценке пенной формы Этоксисклерола 3% и Фибро-вейна 3% при лечении ВМ в области лица, шеи и полости рта, является актуальным и своевременным для современной челюстно-лицевой хирургии.

Связь работы с планом соответствующих отраслей науки и народного хозяйства

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Института стоматологии имени Е.В. Боровского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и соответствует приоритетным направлениям развития практического здравоохранения, ориентированным на повышение эффективности и безопасности специализированной помощи пациентам с патологией сосудистой системы головы и шеи. Полученные результаты имеют потенциал внедрения в клиническую практику и образовательный процесс, что определяет их значение для отрасли и системы здравоохранения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Методологическая основа исследования представлена достаточным объёмом клинического материала (60 пациентов) и сопоставлением результатов лечения в группах в зависимости от применяемого склерозанта. Наряду с клинической оценкой жалоб и функциональных нарушений применялись

инструментальные методы контроля и объективизации результата: ультразвуковое исследование, количественная оценка коллатерального отёка с использованием 3D-сканирования и цифровая оценка изменения окраски тканей (RGB-анализ).

Статистическая обработка данных выполнена с использованием общепринятых методов анализа и оценкой достоверности различий при принятом уровне значимости. Представленные материалы внутренне согласованы: поставленная цель и задачи адекватны дизайну исследования, а выводы и практические рекомендации логически следуют из полученных результатов и подтверждаются их анализом. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций следует признать высокой.

Новизна исследования, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна работы заключается в комплексной сравнительной оценке эффективности и безопасности двух распространённых склерозантов (пенная форма Этоксисклерола 3% и Фибро-вейна 3%) при венозных мальформациях в области лица, шеи и полости рта с использованием объективизирующих методик. В рамках единого протокола сопоставлены клинические исходы лечения, ультразвуковая динамика, количественная характеристика отёка по данным 3D-сканирования и параметры изменения окраски тканей (RGB).

На основании совокупности результатов обоснована целесообразность дифференцированного выбора склерозанта в зависимости от размеров венозной мальформации и предложен практический алгоритм, направленный на повышение предсказуемости лечения и снижение риска осложнений. Указанные положения обладают как научной, так и прикладной новизной.

Личный вклад автора

Автором лично проведён анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследования, сформулированы цель и задачи, разработан дизайн

исследования. Диссертант принимал непосредственное участие в клиническом обследовании пациентов, планировании и проведении курсов склеротерапии, динамическом наблюдении, а также в сборе и систематизации клинических и инструментальных данных.

Автором выполнены анализ полученного материала и статистическая обработка результатов, сформулированы выводы и практические рекомендации, подготовлены публикации и доклады на научно-практических мероприятиях. Таким образом, личный вклад соискателя является существенным и определяющим.

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации результатов

Полученные результаты имеют выраженное научное и практическое значение. Научная значимость определяется уточнением представлений о сравнительной эффективности и безопасности Этоксисклерола 3% и Фибровейна 3% при лечении венозных мальформаций челюстно-лицевой области, а также расширением методических подходов к объективной оценке результатов лечения.

Практическая значимость заключается в разработке алгоритма выбора склерозанта и рекомендаций по мониторингу результата лечения, позволяющих повысить качество и безопасность оказания помощи. Рекомендации могут быть использованы в отделениях челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, а также в образовательных программах для ординаторов и врачей-специалистов.

Основные научные положения, выводы и рекомендации кандидатской диссертации Камилова Шамсулвары Таймасхановича на тему «Сравнительная оценка эффективности склерозантов при лечении венозных мальформаций в области лица, шеи и полости рта» внедрены в учебный процесс кафедры челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова ФГАОУ ВО

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) при изучении дисциплин: челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология, читаемых студентам, ординаторам по направлению подготовки (специальности) 3.1.7. Стоматология. Акт № 549 от 25.11.2024 г.

Основные научные положения, выводы и рекомендации кандидатской диссертации Камилова Шамсулвары Таймасхановича на тему «Сравнительная оценка эффективности склерозантов при лечении венозных мальформаций в области лица, шеи и полости рта» внедрены в лечебный процесс отделения челюстно-лицевой хирургии Университетской клинической больницы №4 ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Акт № 553 от 25.11.2024 г.

Полнота освещения результатов диссертации в печати

По результатам исследования автором опубликовано 9 печатных работ, в том числе 1 статья в издании, включенном в RSCI; 2 статьи в изданиях, индексируемых в международной базе Scopus; 3 иные публикации, 3 публикации в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций. Результаты исследования апробированы на профильных научно-практических мероприятиях, что подтверждает их обсуждение в профессиональной среде.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты диссертационного исследования могут быть внедрены в клиническую практику отделений челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, осуществляющих лечение пациентов с венозными мальформациями области лица, шеи и полости рта. Разработанный алгоритм выбора склерозанта целесообразно применять при планировании курсов склеротерапии с учётом размеров поражения и клинических особенностей локализации.

Представляется целесообразным включение предложенных подходов к мониторингу эффективности (ультразвуковой контроль, количественная оценка отёка по 3D-сканированию, стандартизированная оценка изменения окраски тканей) в клинические протоколы, а также в программы обучения врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, ординаторов и аспирантов.

Заключение

Диссертационная работа Камилова Шамсулвары Таймахановича «Сравнительная оценка эффективности склерозантов при лечении венозных мальформаций в области лица, шеи и полости рта» является научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной научно-практической задачи повышения эффективности и безопасности склеротерапии венозных мальформаций челюстно-лицевой области на основе сравнительного анализа Этоксисклерола 3% и Фибро-вейна 3% и разработки алгоритма выбора склерозанта.

По своей актуальности, научной новизне, практической значимости, достоверности результатов и обоснованности выводов диссертационная работа соответствует требованиям пункта п.16 в Положении о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденным приказом ректора Сеченовского университета № 0692/Р от 06.06.2022 года (с изменениями, утвержденными: приказом №1179/Р от 29.08.2023., приказом №0787/Р от 24.05.2024г.) и не содержит заимствованного материала без ссылки на автора, а её автор Камилов Шамсулвара Таймасханович заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по научной специальности 3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия.

Отзыв о научно-практической значимости диссертационной работы обсужден на совместном заседании кафедр челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, терапевтической стоматологии, ортопедической стоматологии Института стоматологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, протокол № 4 от «25» февраля 2026 года.

директор Института стоматологии,
Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
Института стоматологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России (Пироговский Университет)
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор

Копецкий Игорь Сергеевич

Подпись Копецкого И.С. заверяю:

Ученый секретарь
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России (Пироговский Университет)
к.м.н., доцент



Демина Ольга Михайловна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Адрес: 117513, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островитянова, д.1, стр.6; Телефоны: +7 (495) 434-03-29, +7 (495) 434-61-29; E-mail: rsmu@rsmu.ru; Сайт: <https://rsmu.ru>