федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Института Фармации им. А.П. Нелюбина

Кафедра химии

Методические материалы по дисциплине:

Химия

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа специалитета

КОД Наименование ОП: 31.05.02 Педиатрия

Лекция

- ТЕОРИИ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ.
-
- БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Теория кислот и оснований С.Аррениуса

- Кислота – электролит, диссоциирующий с образованием H^+ (не путать с кислыми солями)
- Основание – электролит, диссоциирующий с образованием OH^- (не путать с основными солями)
- Кислотно-основное взаимодействие сводится к реакции нейтрализации
- $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$

Ограниченность теории Аррениуса

- 1) молекула NH_3 в водном растворе – основание, молекула CO_2 - кислота
- 2) в водном растворе существует H_3O^+ , в жидком аммиаке NH_4^+ , в этаноле $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+$
- 3) многие электролиты проявляют свойства и кислоты и основания
- $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{NH}_3 \leftrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}^- + \text{NH}_4^+$
- $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$

Протолитическая теория Бренстеда - Лоури

- *кислота* (обозначается a , от англ. *acid*) – это частица (молекула или ион) – донор протона;
- *основание* (обозначается b , от англ. *base*) – это частица (молекула или ион) – акцептор протона.

Классификация кислот оснований

	Молекулярные	Катионные	Анионные
Кислоты	HCl, HF, H ₂ SO ₄ , CH ₃ COOH, C ₂ H ₅ OH	NH ₄ ⁺ (NH ₄ Cl), RNH ₃ ⁺ (RNH ₃ Cl)	HSO ₄ ⁻ (NaHSO ₄), H ₂ PO ₄ ⁻ (NaH ₂ PO ₄)
Основания	NH ₃ , RNH ₂	NH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₃ ⁺ (NH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₃ Cl)	(NaOH), O ²⁻ (Na ₂ O), NH ₂ ⁻ (NaNH ₂), C ₂ H ₅ O ⁻ (C ₂ H ₅ ONa), Cl ⁻ (NaCl), F ⁻ (NaF), CH ₃ COO ⁻ (NaCH ₃ COO), HSO ₄ ⁻ (NaHSO ₄),
Амфолиты	RCH(NH ₂)COOH, Zn(OH) ₂ , белки, H ₂ O	Al(OH) ²⁺ (Al(OH)Cl ₂)	HCO ₃ ⁻ (NaHCO ₃)

Протолитическая теория кислот и оснований

- Кислоты бывают трех типов:
- 1) нейтральные молекулы: HCl, H₂SO₄
- 2) катионные $\text{NH}_4^+ \leftrightarrow \text{NH}_3 + \text{H}^+$
- 3) анионные $\text{H}_2\text{PO}_4^- \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$
- Основания:
- 1) нейтральные молекулы: NH₃
- 2) катионные H₂N-NH₃⁺
- 3) анионные $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \leftrightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$
-

Протолитическая теория Бренстеда - Лоури

- *Амфолит* – молекула или ион, способный быть как донором, так и акцептором протона в зависимости от партнера по реакции.
- $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- $(b_1) \quad (a_2) \quad (a_1) \quad (b_2)$
- $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
- $(a_1) \quad (b_2) \quad (b_1) \quad (a_2)$
- $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$
- $(b_1) \quad (a_2) \quad (a_1) \quad (b_2)$
- $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$
- $(a_1) \quad (b_2) \quad (b_1) \quad (a_2)$

Типы протолитических процессов

Процесс	Уравнение реакции (пример)
Нейтрализация	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- = 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{NH}_2 = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CH}_3\text{NH}_3^+$
Ионизация	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Автоионизация (автопротолиз)	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ $\text{NH}_3 + \text{NH}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$
Гидролиз (ионный)	$\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})^{2+} + \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}(\text{OH})^+ + \text{H}_3\text{O}^+$

Протолитическая теория Бренстеда - Лоури

- Любая протолитическая реакция представляет собой конкуренцию оснований за протон. Выигрывает конкуренцию более сильное основание, т.к. сильнее акцептирует протон.
- Кисотно-основные свойства вещества проявляются только при взаимодействии его с другими веществами или растворителем, т.е. понятия «кислота» и «основание» являются относительными.
- $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ (безводн)} = \text{CH}_3\text{COOH}_2^+ + \text{HSO}_4^-$
- В водном растворе самой сильной кислотой является ион гидроксония H_3O^+ , а самым сильным основанием – гидроксильный ион OH^- .

- Отличие от теории Аррениуса:
- 1) не ограничивается молекулярной формой;
- 2) кислотно-основные свойства проявляются при взаимодействии с другими веществами или растворителями
- Терминология:
- Частицы, отличающиеся по составу наличием в одной из них (или отсутствием в другой) передаваемого протона – сопряженная пара.

- Чем сильнее кислота, тем слабее сопряженное основание.
- Протолитический процесс идет в направлении переноса протона от более сильной кислоты к более сильному основанию.

- Концепция Бренстеда-Лоури дает:
- 1) критерий отнесения химической реакции к кислотно-основному типу;
- 2) позволяет расположить водородсодержащие вещества в ряд по возрастанию их химической активности;
- **НО** не рассматривает большое число веществ, не содержащих водород в своем составе.

Автопротолиз воды

- Для реакции автопротолиза воды:

- эффективная константа равновесия:
- $K_w = K_{\text{ионизации}} \cdot c(\text{H}_2\text{O}) = c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OH}^-) = 1 \cdot 10^{-14}$
(при $T=298\text{K}$)
- Константу K_w называют *константой автопротолиза воды* (ионным произведением воды). На основании величины K_w определяется шкала pH.
- pH – *водородный показатель*, равный
- $$\text{pH} = -\lg c(\text{H}_3\text{O}^+)$$

Ионизация

- Количественной характеристикой силы кислот и оснований служат константы ионизации кислоты – *константа кислотности K_a* или основания – *константа основности K_b*),
- показатель кислотности
 - $pK_a = -\lg K_a$
- показатель основности
 - $pK_b = -\lg K_b$

- Чем **больше** значение константы кислотности K_a , тем **сильнее кислота!**
- Чем **меньше** значение показателя кислотности pK_a , тем **сильнее кислота!**

Ионизация

- **Процесс ионизации вещества происходит в контакте с растворителем.**
- Для процессов ионизации сопряженной пары: кислоты (А) и основания (В)
- $A + H_2O = B + H_3O^+$ $B + H_2O = A + OH^-$
- константы кислотности константа основности

$$K_a = \frac{c(B) \cdot c(H_3O^+)}{c(A)} \qquad K_b = \frac{c(A) \cdot c(OH^-)}{c(B)}$$

• тогда $K_a \cdot K_b = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-) = K_w$
или $pK_a + pK_b = pK_w = 14$

• аналогично получаем ($pOH = -\lg c(OH^-)$):

$$pH + pOH = 14$$

Расчет pH в растворе слабой кислоты или основания

- $c(\text{H}_3\text{O}^+) = \sqrt{K_a \cdot c(\text{A})}$
- Логарифмируя левую и правую части уравнения и меняя знаки, получим:
- $-\lg c(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,5 (-\lg K_a - \lg c(\text{A}))$
- **pH = 0,5 (pK_a – lg c(A))** - кислота
- **pH = 14 - 0,5 (pK_b – lg c(B))** - основание

Расчет pH в растворе сильной кислоты или основания

- Сильная кислота

- $\text{pH} = -\lg \alpha (\text{HA})$

Сильное основание

$$\text{pH} = 14 - \lg \alpha (\text{B})$$

Гидролиз

частный случай кислотно-основного взаимодействия ионов соли с молекулами воды

Гидролиз по аниону : $\text{An}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{HAn} + \text{OH}^-$

$$K_h = \frac{c(\text{HAn}) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{An}^-)}$$

Домножая числитель и знаменатель на $c(\text{H}_3\text{O}^+)$, и учитывая и выражение для константы кислотности HAn получаем:

$$K_h = K_b = \frac{K_w}{K_a(\text{HAn})}$$

$$\text{p}K_h = 14 - \text{p}K_a$$

гидролиз

- *pH в растворе соли, гидролизующейся по аниону*
- **$pH = 7 + 0,5 (pK_a + \lg c(An^-))$**
- *pH в растворе соли, гидролизующейся по катиону*
- **$pH = 7 - 0,5 (pK_b - \lg c(Kat^{n+}))$**

Кислотность биожидкостей

- Для количественной характеристики кислотных свойств биожидкостей пользуются величинами **общей, активной и потенциальной** кислотности.
- **Общая кислотность** – это концентрация всех имеющихся в растворе ионов водорода.
- Она складывается из концентрации свободных (гидратированных) ионов H^+ - **активной кислотности** и концентрации ионов H^+ , связанных в молекулы или ионы слабых кислот – **потенциальная кислотность**, т.е.:
$$C(H^+)_{\text{общ}} = C(H^+)_{\text{акт}} + C(H^+)_{\text{потенц.}}$$
- Мерой активной кислотности является значение pH.

Буферные системы

- ***Буферными системами*** называются равновесные системы, способные поддерживать на приблизительно постоянном уровне какой-либо при незначительных внешних воздействиях.

Протолитические буферные системы

- системы способные поддерживать на постоянном уровне величину рН при добавлении небольших количеств сильных протолитов (кислот, щелочей), а также при разбавлении.
- Такие системы поддерживают протолитический гомеостаз организма – постоянство рН биожидкостей, тканей и органов.

Протолитические буферные системы

- **Буферные системы образованы сопряженной кислотно-основной парой** и бывают следующих типов:
 - **1) Слабая кислота и сопряженное ей сильное основание (кислотная буферная система):**
 - $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ - ацетатный буфер
 - $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ - карбонатный буфер
 - **2) Сильная кислота и сопряженное ей слабое основание (основная буферная система):**
 - $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ – аммиачный буфер
 - **3) Ионы и молекулы амфонитов:**
 - $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ - гидрофосфатный буфер

Способы приготовления буферных растворов

- 1) частичная нейтрализация слабого электролита сильным:
- CH_3COOH (изб) + $\text{KOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOK} + \text{H}_2\text{O}$
- NH_3 (изб) + $\text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$
- 2) смешивание растворов слабых электролитов с солями:
- CH_3COOH и CH_3COOK , NH_3 и NH_4Cl
- 3) смешивание растворов солей многоосновных кислот: H_2PO_4^- и HPO_4^{2-}

Механизм буферного действия

- ионы H_3O^+ сильной кислоты связываются сопряженным основанием с образованием малодиссоциирующего соединения:
- $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$
- а добавляемые ионы OH^- – сопряженной кислотой:
- $\text{OH}^- + \text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$.

расчет pH буферной системы

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \lg \frac{C \text{ ОСНОВАНИЯ}}{C \text{ КИСЛОТЫ}}$$

Буферная емкость

$$\beta_a = \frac{c(1/z A) V(A)}{V_{\text{буф}} \cdot \Delta \text{pH}}$$

$$\beta_b = \frac{c(1/z B) V(B)}{V_{\text{буф}} \cdot \Delta \text{pH}}$$

зона буферного действия

-

$$0,1 < \frac{V(\text{основания})}{V(\text{кислоты})} < 10$$

-

$$\text{p}K_a - 1 < \text{pH} < \text{p}K_a + 1$$

Буферная емкость

Буферные системы крови

Буферная система	Буферная емкость, ммоль/л	Доля в общей буферной емкости, %	Функционирование
Гидрокарбонатная $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-$	$\beta_a = 40$ $\beta_b = 2$	53	Плазма, эритроциты, межклеточная жидкость, почечная ткань, слюна
Гемоглобиновая $\text{Hb} / \text{Hb}^- \text{HbO}_2 / \text{HbO}_2^-$	$\beta_a = 25$	35	Основная буферная система эритроцитов
Гидрофосфатная $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$	$\beta_a = 2$ $\beta_b = 0,5$	5	Плазма крови, эритроциты, почечная ткань, слюна
Белковая $\text{HProt} / \text{Prot}^-$	$\beta_a = 10$ (альбуминовая) $\beta_a = 3$ (глобулиновая) $\beta_a < 1$ (фибриновая)	7	Плазма крови

Гидрокарбонатная система

$$K'_a = \frac{\tilde{c}(\text{H}^+) \cdot \tilde{c}(\text{HCO}_3^-)}{\tilde{c}(\text{CO}_2) \cdot \tilde{c}(\text{H}_2\text{CO}_3^*)} = 7,95 \cdot 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \text{p}K'_a + \lg \frac{c(\text{HCO}_3^-)}{S(\text{CO}_2) \cdot p(\text{CO}_2)}$$

уравнение Гендельсона-Гассельбаха

$$\text{pH} = 6,1 + \lg\left[\frac{c(\text{HCO}_3^-)}{0,033 \cdot p(\text{CO}_2)}\right]$$

Белковая (протеиновая) система

- $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- = \text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{H}^+$
- сопряженная кислота сопряженное основание
- условно: $\text{HProt} = \text{Prot}^- + \text{H}^+$

- в присутствии ферментов образование карбаминовой кислоты:
- $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{CO}_2 \rightarrow \begin{array}{c} \text{HN} - \text{CH}(\text{R}) - \text{COOH} \\ | \\ \text{COOH} \end{array}$
-

Гемоглобиновая система

$$pK_a(\text{HHb}) = 8,20$$

$$pK_a(\text{HHbO}_2) = 6,95$$

Выведение углекислоты из тканей

карбоан-
гидраза

Выведение углекислоты из легких

АЦИДОЗ

уменьшение буферной емкости по кислоте

$B_a < \text{норма}$

КОМПЕНСИРОВАННЫЙ
НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ

$pH \approx \text{норма}$

$pH < \text{норма}$

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ (М)

$pH \leq \text{норма}$
накопление нелетучих кислот
 $c(\text{HCO}_3^-) < \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) < \text{норма}$
 $BE < \text{норма}$

Причины:

- кислородное голодание тканей;
- нарушение функции почек;
- диарея (понос);
- диабет

$[\text{донор протона}] > \text{норма}$

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ (Р)

$pH \leq \text{норма}$
накопление летучей кислоты (CO_2)
 $c(\text{HCO}_3^-) > \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) > \text{норма}$
 $BE > \text{норма}$

Причины:

- заболевания органов дыхания;
- угнетение дыхательного центра

АЛКАЛОЗ

увеличение буферной емкости по кислоте

$V_a > \text{норма}$

КОМПЕНСИРОВАННЫЙ
НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ

$pH \approx \text{норма}$

$pH > \text{норма}$

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ (М)

$pH \geq \text{норма}$
удаление нелетучих кислот или накопление буферных оснований

$c(\text{HCO}_3^-) > \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) > \text{норма}$
 $BE > \text{норма}$

Причины:

- неукротимая рвота, запор;
- щелочная пища и вода

[донор протона] < норма

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ (Р)

$pH \geq \text{норма}$
удаление летучей кислоты (CO_2)
 $c(\text{HCO}_3^-) < \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) < \text{норма}$
 $BE < \text{норма}$

Причины:

- разрежение воздуха;
- гипервентиляция легких;
- чрезмерное возбуждение дыхательного центра

Комплексные соединения

Черты, характерные для КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

- 1) К.С. построены из соединений, существующих независимо друг от друга
 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$: AgCl и NH_3
 $\text{K}[\text{Al}(\text{OH})_4]$: $\text{Al}(\text{OH})_3$ и KOH
- 2) В образовании К.С. важную роль играет связь, образованная по донорно-акцепторному механизму – ее называют **КООРДИНАЦИОННОЙ**
- 3) К.С. – устойчивы как в кристаллическом состоянии, так и в растворах

- *Комплексными* называют соединения, содержащие в своем составе сложную молекулярную частицу (комплексную частицу), состоящую из *центрального атома (комплексообразователя)* и *лигандов*.

Строение комплексных соединений

Внутренняя сфера

Центральный атом (комплексообразователь)

- 1) атомы или ионы d-, p-, s- элементов, имеющие свободные орбитали, т.е.
- 2) акцепторы электронных пар
- 3) всегда катионы(искл. $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$)

Лиганды

- 1) молекулы, анионы, имеющие неподеленные электронные пары, т.е.
- 2) доноры электронных пар как правило p-элементы

Характеристики комплексообразователя и лиганда

- *Координационное число* комплексообразователя – это число связей, которые центральный атом образует с лигандами.
- *Дентатность лиганда* определяется числом донорных атомов, доступных для координации.
- Между ц.а. и лигандами – ковалентная полярная связь; одна из них обязательно образованна по донорно-акцепторному механизму.
- Между внешней и внутренней сферами – ионная связь.

Характеристика лигандов

Лиганды могут быть **нейтральными молекулами** (H_2O , NH_3 , CO , амины RNH_2 , пиридин $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$ и т.д.) или **анионами** (Cl^- , F^- , OH^- , NO_2^- , CN^- и т.д.), имеющими в своем составе *донорные атомы*

По числу донорных атомов лиганды подразделяют на моно-, би- и полидентатные

Характеристика лигандов

монодентатные: NH_3 , $\text{H}_2\ddot{\text{O}}$

бидентатные $\text{H}_2\ddot{\text{N}}(\text{CH}_2)_2\ddot{\text{N}}\text{H}_2$, $\begin{array}{c} \ddot{\text{O}} \\ \parallel \\ \text{O}-\text{C}-\text{C} \\ \parallel \\ \ddot{\text{O}} \\ \text{O} \end{array}$

полидентатные - этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) $\begin{array}{c} \text{O} \ddot{\text{O}} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \text{C} - \text{CH}_2 - \ddot{\text{N}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \ddot{\text{N}} - \begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{C} \ddot{\text{O}} \text{O}^- \\ \text{CH}_2 - \text{C} \ddot{\text{O}} \text{OH} \end{array}$

Классификация К.С.

1) **Неэлектролиты:** $[\text{Pt}(\text{NH}_3)\text{Cl}_2]$, $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$

Электролиты: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ (соль),
 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$ (гидроксид), $\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ (кислота)

2) **Полиядерные-** наличие нескольких ц.а.
Связь между ц.а. осуществляется за счет мостиковых лигандов: железосеропротеины.

3) **металлоцены (сэндвичевые)** - вакантные орбитали ц.а. связаны с π -системой ароматических структур

4) По характеру электрического заряда комплексной частицы

различают:

- катионные комплексы –

ион тетрааквацинк $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$, или тетрааквацинкат-ион
ион дис(этилендиаммин) меди (II) или
диэтилендиамминкупрат(I)ион- $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_2]^{2+}$;

- анионные комплексы –

гексацианоферрат (III)-ион $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$, триоксалатоманганат
(III)-ион $[\text{Mn}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$;

- нейтральные комплексы - дихлородиамминплатина
 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$, тетракарбонилникель $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$.

5) Хелатные комплексы

- Бидентатные и полидентатные лиганды (чаще органические молекулы) при соединении с центральным атомом могут образовывать циклические группировки атомов, включающие атом металла-комплексообразователя. Такие циклические структуры называют *хелатными* (или *внутрициклическими*) комплексами

Хелатные комплексы

б) природные макроциклические полидентатные лиганды,
во внутренней полости которых размещается
комплексообразователь

2,2,1-криптан

18-краун-6

порфин

Тип гибридизации атомных орбиталей комплексообразователя

sp - гибридизация

(а)

sp^3 -гибридизация

(б)

sp^2d -гибридизация

(в)

sp^3d^2 -гибридизация

(г)

Изомерия комплексных соединений

геометрическая (цис-, транс-) изомерия возможна в квадратных и октаэдрических комплексах при наличии двух одинаковых лигандов.

Например, соединение дихлордиамминплатина $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ может иметь:

Изомерия комплексных соединений

цис-изомер

транс-изомер

Изомерия комплексных соединений

- оптическая изомерия характерна для тетраэдрических комплексов с четырьмя различными лигандами и октаэдрических комплексов с бидентатными лигандами. По направлению вращения плоскости поляризованного света различают левовращающие и правовращающие комплексы. Такие оптические изомеры называют *энантиомерами*. Например, ион дисалицилатодиакваферрат (III) может существовать в виде трех пространственных изомеров (цис-изомер имеет два оптических изомера)

Изомерия комплексных соединений

транс -изомер

цис-изомеры

● - ион Fe^{3+}

Изомерия комплексных соединений

Ионизационная изомерия-обмен частицами внешней и внутренней координационной сфер

(частичный случай – гидратная изомерия),

Например:

Кинетическая характеристика К.С.

- Лабильный комплекс – быстро замещающий свои лиганды (в течение 1 мин при 298K),
- Инертный комплекс – медленно замещающий свои лиганды

Химические свойства

- $\text{H}_2[\text{PtCl}_6] + 2\text{KCl} = \text{K}_2[\text{PtCl}_6] \downarrow + 2\text{HCl}$
- $2\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + \text{Br}_2 = 2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] + 2\text{KBr}$
- $\text{K}_2[\text{PtCl}_6] + \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \text{K}_2[\text{PtCl}_4] + 2\text{KCl} + 2\text{CO}_2$
- *цис*- $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2] + 2\text{NH}_3 = [\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2\text{Cl}^-$

Ионизация комплексных соединений

Ионизация комплексных ионов

- $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} = [\text{Zn}(\text{NH}_3)_3]^{2+} + \text{NH}_3, K_1 = 1,1 \cdot 10^{-3}$
- $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_3]^{2+} = [\text{Zn}(\text{NH}_3)_2]^{2+} + \text{NH}_3, K_2 = 4,9 \cdot 10^{-3}$
- $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_2]^{2+} = [\text{Zn}(\text{NH}_3)]^{2+} + \text{NH}_3, K_3 = 5,6 \cdot 10^{-3}$
- $[\text{Zn}(\text{NH}_3)]^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{NH}_3, K_4 = 6,6 \cdot 10^{-3}$
- $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} = \text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3, K_H = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 = 2,0 \cdot 10^{-10}$

- $$K_H = \frac{\tilde{c}(\text{Zn}^{2+}) \cdot \tilde{c}^4(\text{NH}_3)}{\tilde{c}([\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+})}$$

С позиций термодинамики устойчивость к.с.
характеризуется значением K_n .

Чем меньше значение K_n , тем прочнее комплекс

Прочность к.с. зависит от:

- 1) природы реагирующих веществ (теория ЖМКО)
- 2) природы растворителя
- 3) температуры

Теория мягких и жестких кислот и оснований (Пирсон)

- Кислоты по Льюису – частицы-акцепторы электронных пар; основания – доноры электронных пар.
- Мягкие частицы имеют большой радиус и маленький заряд; жесткие – маленький радиус и большой заряд
- М.к.: Pb^{2+} , Pt^{2+} , Ag, Hg^{2+} ; М.о.: SCN^- , CO, I⁻, S^{2-}
- Ж.к.: H^+ , Li^+ , NH_3 ; Ж.о.: H_2O , PO_4^{3-} , O^{2-}
- Мягкие кислоты преимущественно координируют мягкие основания, жесткие кислоты – жесткие основания

Ионизация комплексных ионов

- Рассчитайте концентрацию свободных ионов цинка в растворе нитрата тетраамминцинка с концентрацией 0,1 моль/л, содержащем также избыток аммиака 0,5 моль/л.

$$\tilde{c}(\text{Zn}^{2+}) = K_{1-4} \frac{\tilde{c}(\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+})}{\tilde{c}^4(\text{NH}_3)} = 2 \cdot 10^{-10} \frac{0,1}{0,5^4} = 3,2 \cdot 10^{-10} \text{ моль / л}$$

Конкурирующие процессы

$$K = \frac{\tilde{c}([\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}) \tilde{c}^4(\text{CN}^-)}{\tilde{c}([\text{Zn}(\text{CN}^-)_4]) \tilde{c}^4(\text{NH}_3)}$$

$$K = 2 \cdot 10^{-10} \frac{1}{1 \cdot 10^{-19}} = 2 \cdot 10^9$$

Комплексообразование и комплексные соединения в медицине.

Комплексные соединения применяются для корректировки обмена веществ (витамин B_{12}), терапии (комплексы платины), для детоксикации.

Принципы хелатотерапии

- **Хелатотерапия** – выведение из организма ионов тяжелых металлов под действием хелатирующих реагентов.
- 1) вводимый детоксикант должен связывать ионы-токсиканты прочнее, чем те, которые существуют в организме;
- 2) не должен разрушать жизненно необходимые комплексные соединения

принципы выведения из организма ТОКСИЧЕСКИХ ИОНОВ

- применяется комплексонат кальция $\text{Na}_2[\text{Ca}(\text{-O}_2\text{CCH}_2)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_2\text{CO}_2^-)_2]$.
Препарат получил название тетацин-кальций. Коротко обозначим комплексный ион CaЭДТА^{2-} . Рассмотрим возможность выведения с его помощью ионов Cr^{3+} .

принципы выведения из организма ТОКСИЧЕСКИХ ИОНОВ

- Рассмотрим пример потери активности карбоангидразы (КА) вследствие замещения активного иона Zn^{2+} ионами ртути:

$$K_H \quad 3 \cdot 10^{-11} \qquad \qquad 3,2 \cdot 10^{-22}$$

$$K = 3 \cdot 10^{-11} / 3,2 \cdot 10^{-22} = 9,4 \cdot 10^{10}$$

- Активность можно восстановить, вводя в качестве антидота тиосульфат натрия

$$K_H \quad 3,2 \cdot 10^{-22} \qquad \qquad 2,4 \cdot 10^{-34}$$

$$K = 3,2 \cdot 10^{-22} / 2,4 \cdot 10^{-34} = 1,3 \cdot 10^{12}$$

Комплексные соединения как лекарства

Унитиол выводит из организма мышьяк, ртуть, висмут
Комплексные соединения железа(II) применяются при пониженном содержании железа: цитрат, фумарат, лактат, глицерофосфат и др.

Миокризин $\text{Cl-Au-S}(\text{CH}_2\text{COONa})_2$ при артритах (в настоящее время не применяется, но есть и другие препараты)

Тетрасукцинимидозолото(III) $\text{Au-(NCOCH}_2\text{CH}_2\text{CO)}_4^-$

Детоксиканты

БАЛ CH_2CHCH_2 и унитиол $\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{-SO}_3\text{Na}$

| | |

SH SH OH

| |

SH SH

Комплексные соединения как лекарства

Пеницилламин – выведение меди

Лекция

- ТЕОРИИ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ.
-
- БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Теория кислот и оснований С.Аррениуса

- Кислота – электролит, диссоциирующий с образованием H^+ (не путать с кислыми солями)
- Основание – электролит, диссоциирующий с образованием OH^- (не путать с основными солями)
- Кислотно-основное взаимодействие сводится к реакции нейтрализации
- $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$

Ограниченность теории Аррениуса

- 1) молекула NH_3 в водном растворе – основание, молекула CO_2 - кислота
- 2) в водном растворе существует H_3O^+ , в жидком аммиаке NH_4^+ , в этаноле $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+$
- 3) многие электролиты проявляют свойства и кислоты и основания
- $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{NH}_3 \leftrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}^- + \text{NH}_4^+$
- $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$

Протолитическая теория Бренстеда - Лоури

- *кислота* (обозначается a , от англ. *acid*) – это частица (молекула или ион) – донор протона;
- *основание* (обозначается b , от англ. *base*) – это частица (молекула или ион) – акцептор протона.

Классификация кислот оснований

	Молекулярные	Катионные	Анионные
Кислоты	HCl, HF, H ₂ SO ₄ , CH ₃ COOH, C ₂ H ₅ OH	NH ₄ ⁺ (NH ₄ Cl), RNH ₃ ⁺ (RNH ₃ Cl)	HSO ₄ ⁻ (NaHSO ₄), H ₂ PO ₄ ⁻ (NaH ₂ PO ₄)
Основания	NH ₃ , RNH ₂	NH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₃ ⁺ (NH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₃ Cl)	(NaOH), O ²⁻ (Na ₂ O), NH ₂ ⁻ (NaNH ₂), C ₂ H ₅ O ⁻ (C ₂ H ₅ ONa), Cl ⁻ (NaCl), F ⁻ (NaF), CH ₃ COO ⁻ (NaCH ₃ COO), HSO ₄ ⁻ (NaHSO ₄),
Амфолиты	RCH(NH ₂)COOH, Zn(OH) ₂ , белки, H ₂ O	Al(OH) ²⁺ (Al(OH)Cl ₂)	HCO ₃ ⁻ (NaHCO ₃)

Протолитическая теория кислот и оснований

- Кислоты бывают трех типов:
- 1) нейтральные молекулы: HCl, H₂SO₄
- 2) катионные $\text{NH}_4^+ \leftrightarrow \text{NH}_3 + \text{H}^+$
- 3) анионные $\text{H}_2\text{PO}_4^- \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$
- Основания:
- 1) нейтральные молекулы: NH₃
- 2) катионные H₂N-NH₃⁺
- 3) анионные $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \leftrightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$
-

Протолитическая теория Бренстеда - Лоури

- *Амфолит* – молекула или ион, способный быть как донором, так и акцептором протона в зависимости от партнера по реакции.
- $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
• $(b_1) \quad (a_2) \quad (a_1) \quad (b_2)$
- $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
• $(a_1) \quad (b_2) \quad (b_1) \quad (a_2)$
- $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$
• $(b_1) \quad (a_2) \quad (a_1) \quad (b_2)$
- $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$
• $(a_1) \quad (b_2) \quad (b_1) \quad (a_2)$

Типы протолитических процессов

Процесс	Уравнение реакции (пример)
Нейтрализация	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- = 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{NH}_2 = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CH}_3\text{NH}_3^+$
Ионизация	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Автоионизация (автопротолиз)	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ $\text{NH}_3 + \text{NH}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$
Гидролиз (ионный)	$\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})^{2+} + \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}(\text{OH})^+ + \text{H}_3\text{O}^+$

Протолитическая теория Бренстеда - Лоури

- Любая протолитическая реакция представляет собой конкуренцию оснований за протон. Выигрывает конкуренцию более сильное основание, т.к. сильнее акцептирует протон.
- Кисотно-основные свойства вещества проявляются только при взаимодействии его с другими веществами или растворителем, т.е. понятия «кислота» и «основание» являются относительными.
- $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ (безводн)} = \text{CH}_3\text{COOH}_2^+ + \text{HSO}_4^-$
- В водном растворе самой сильной кислотой является ион гидроксония H_3O^+ , а самым сильным основанием – гидроксильный ион OH^- .

- Отличие от теории Аррениуса:
- 1) не ограничивается молекулярной формой;
- 2) кислотно-основные свойства проявляются при взаимодействии с другими веществами или растворителями
- Терминология:
- Частицы, отличающиеся по составу наличием в одной из них (или отсутствием в другой) передаваемого протона – сопряженная пара.

- Чем сильнее кислота, тем слабее сопряженное основание.
- Протолитический процесс идет в направлении переноса протона от более сильной кислоты к более сильному основанию.

- Концепция Бренстеда-Лоури дает:
- 1) критерий отнесения химической реакции к кислотно-основному типу;
- 2) позволяет расположить водородсодержащие вещества в ряд по возрастанию их химической активности;
- **НО** не рассматривает большое число веществ, не содержащих водород в своем составе.

Автопротолиз воды

- Для реакции автопротолиза воды:

- эффективная константа равновесия:
- $K_w = K_{\text{ионизации}} \cdot c(\text{H}_2\text{O}) = c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OH}^-) = 1 \cdot 10^{-14}$
(при $T=298\text{K}$)
- Константу K_w называют *константой автопротолиза воды* (ионным произведением воды). На основании величины K_w определяется шкала pH.
- pH – *водородный показатель*, равный
- $$\text{pH} = -\lg c(\text{H}_3\text{O}^+)$$

Ионизация

- Количественной характеристикой силы кислот и оснований служат константы ионизации кислоты – *константа кислотности K_a* или основания – *константа основности K_b*),
- показатель кислотности
 - $pK_a = -\lg K_a$
- показатель основности
 - $pK_b = -\lg K_b$

- Чем **больше** значение константы кислотности K_a , тем **сильнее кислота!**
- Чем **меньше** значение показателя кислотности pK_a , тем **сильнее кислота!**

Ионизация

- **Процесс ионизации вещества происходит в контакте с растворителем.**
- Для процессов ионизации сопряженной пары: кислоты (А) и основания (В)
- $A + H_2O = B + H_3O^+$ $B + H_2O = A + OH^-$
- константы кислотности константа основности

$$K_a = \frac{c(B) \cdot c(H_3O^+)}{c(A)} \qquad K_b = \frac{c(A) \cdot c(OH^-)}{c(B)}$$

• тогда $K_a \cdot K_b = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-) = K_w$
или $pK_a + pK_b = pK_w = 14$

• аналогично получаем ($pOH = -\lg c(OH^-)$):

$$pH + pOH = 14$$

Расчет pH в растворе слабой кислоты или основания

- $c(\text{H}_3\text{O}^+) = \sqrt{K_a \cdot c(\text{A})}$
- Логарифмируя левую и правую части уравнения и меняя знаки, получим:
- $-\lg c(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,5 (-\lg K_a - \lg c(\text{A}))$
- **pH = 0,5 (pK_a – lg c(A))** - кислота
- **pH = 14 - 0,5 (pK_b – lg c(B))** - основание

Расчет pH в растворе сильной кислоты или основания

- Сильная кислота

- $\text{pH} = -\lg \alpha (\text{HA})$

Сильное основание

$$\text{pH} = 14 - \lg \alpha (\text{B})$$

Гидролиз

частный случай кислотно-основного взаимодействия ионов соли с молекулами воды

Гидролиз по аниону : $\text{An}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{HAn} + \text{OH}^-$

$$K_h = \frac{c(\text{HAn}) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{An}^-)}$$

Домножая числитель и знаменатель на $c(\text{H}_3\text{O}^+)$, и учитывая и выражение для константы кислотности HAn получаем:

$$K_h = K_b = \frac{K_w}{K_a(\text{HAn})}$$

$$\text{p}K_h = 14 - \text{p}K_a$$

гидролиз

- *pH в растворе соли, гидролизующейся по аниону*
- **$pH = 7 + 0,5 (pK_a + \lg c(An^-))$**
- *pH в растворе соли, гидролизующейся по катиону*
- **$pH = 7 - 0,5 (pK_b - \lg c(Kat^{n+}))$**

Кислотность биожидкостей

- Для количественной характеристики кислотных свойств биожидкостей пользуются величинами **общей, активной и потенциальной** кислотности.
- **Общая кислотность** – это концентрация всех имеющихся в растворе ионов водорода.
- Она складывается из концентрации свободных (гидратированных) ионов H^+ - **активной кислотности** и концентрации ионов H^+ , связанных в молекулы или ионы слабых кислот – **потенциальная кислотность**, т.е.:
$$C(H^+)_{\text{общ}} = C(H^+)_{\text{акт}} + C(H^+)_{\text{потенц.}}$$
- Мерой активной кислотности является значение pH.

Буферные системы

- ***Буферными системами*** называются равновесные системы, способные поддерживать на приблизительно постоянном уровне какой-либо при незначительных внешних воздействиях.

Протолитические буферные системы

- системы способные поддерживать на постоянном уровне величину рН при добавлении небольших количеств сильных протолитов (кислот, щелочей), а также при разбавлении.
- Такие системы поддерживают протолитический гомеостаз организма – постоянство рН биожидкостей, тканей и органов.

Протолитические буферные системы

- **Буферные системы образованы сопряженной кислотно-основной парой** и бывают следующих типов:
 - **1) Слабая кислота и сопряженное ей сильное основание (кислотная буферная система):**
 - $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ - ацетатный буфер
 - $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ - карбонатный буфер
 - **2) Сильная кислота и сопряженное ей слабое основание (основная буферная система):**
 - $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ – аммиачный буфер
 - **3) Ионы и молекулы амфонитов:**
 - $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ - гидрофосфатный буфер

Способы приготовления буферных растворов

- 1) частичная нейтрализация слабого электролита сильным:
- CH_3COOH (изб) + $\text{KOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOK} + \text{H}_2\text{O}$
- NH_3 (изб) + $\text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$
- 2) смешивание растворов слабых электролитов с солями:
- CH_3COOH и CH_3COOK , NH_3 и NH_4Cl
- 3) смешивание растворов солей многоосновных кислот: H_2PO_4^- и HPO_4^{2-}

Механизм буферного действия

- ионы H_3O^+ сильной кислоты связываются сопряженным основанием с образованием малодиссоциирующего соединения:
- $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$
- а добавляемые ионы OH^- – сопряженной кислотой:
- $\text{OH}^- + \text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$.

расчет pH буферной системы

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \lg \frac{C \text{ ОСНОВАНИЯ}}{C \text{ КИСЛОТЫ}}$$

Буферная емкость

$$\beta_a = \frac{c(1/z A) V(A)}{V_{\text{буф}} \cdot \Delta \text{pH}}$$

$$\beta_b = \frac{c(1/z B) V(B)}{V_{\text{буф}} \cdot \Delta \text{pH}}$$

зона буферного действия

-

$$0,1 < \frac{V(\text{основания})}{V(\text{кислоты})} < 10$$

-

$$\text{p}K_a - 1 < \text{pH} < \text{p}K_a + 1$$

Буферная емкость

Буферные системы крови

Буферная система	Буферная емкость, ммоль/л	Доля в общей буферной емкости, %	Функционирование
Гидрокарбонатная $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-$	$\beta_a = 40$ $\beta_b = 2$	53	Плазма, эритроциты, межклеточная жидкость, почечная ткань, слюна
Гемоглобиновая $\text{Hb} / \text{Hb}^- \text{HbO}_2 / \text{HbO}_2^-$	$\beta_a = 25$	35	Основная буферная система эритроцитов
Гидрофосфатная $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$	$\beta_a = 2$ $\beta_b = 0,5$	5	Плазма крови, эритроциты, почечная ткань, слюна
Белковая $\text{HProt} / \text{Prot}^-$	$\beta_a = 10$ (альбуминовая) $\beta_a = 3$ (глобулиновая) $\beta_a < 1$ (фибриновая)	7	Плазма крови

Гидрокарбонатная система

$$K'_a = \frac{\tilde{c}(\text{H}^+) \cdot \tilde{c}(\text{HCO}_3^-)}{\tilde{c}(\text{CO}_2) \cdot \tilde{c}(\text{H}_2\text{CO}_3^*)} = 7,95 \cdot 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \text{p}K'_a + \lg \frac{c(\text{HCO}_3^-)}{S(\text{CO}_2) \cdot p(\text{CO}_2)}$$

уравнение Гендельсона-Гассельбаха

$$\text{pH} = 6,1 + \lg\left[\frac{c(\text{HCO}_3^-)}{0,033 \cdot p(\text{CO}_2)}\right]$$

Гемоглобиновая система

$$pK_a(\text{HHb}) = 8,20$$

$$pK_a(\text{HHbO}_2) = 6,95$$

Выведение углекислоты из тканей

карбоан-
гидраза

Выведение углекислоты из легких

АЦИДОЗ

уменьшение буферной емкости по кислоте

$B_a < \text{норма}$

КОМПЕНСИРОВАННЫЙ
НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ

$pH \approx \text{норма}$

$pH < \text{норма}$

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ (М)

$pH \leq \text{норма}$
накопление
нелетучих кислот
 $c(\text{HCO}_3^-) < \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) < \text{норма}$
 $BE < \text{норма}$

Причины:

- кислородное голодание тканей;
- нарушение функции почек;
- диарея (понос);
- диабет

$[\text{донор протона}] > \text{норма}$

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ (Р)

$pH \leq \text{норма}$
накопление летучей кислоты (CO_2)
 $c(\text{HCO}_3^-) > \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) > \text{норма}$
 $BE > \text{норма}$

Причины:

- заболевания органов дыхания;
- угнетение дыхательного центра

АЛКАЛОЗ

увеличение буферной емкости по кислоте

$V_a > \text{норма}$

КОМПЕНСИРОВАННЫЙ
НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ

$pH \approx \text{норма}$

$pH > \text{норма}$

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ (М)

$pH \geq \text{норма}$
удаление нелетучих кислот или накопление буферных оснований

$c(\text{HCO}_3^-) > \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) > \text{норма}$
 $BE > \text{норма}$

Причины:

- неукротимая рвота, запор;
- щелочная пища и вода

[донор протона] < норма

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ (Р)

$pH \geq \text{норма}$
удаление летучей кислоты (CO_2)
 $c(\text{HCO}_3^-) < \text{норма}$
 $p(\text{CO}_2) < \text{норма}$
 $BE < \text{норма}$

Причины:

- разрежение воздуха;
- гипервентиляция легких;
- чрезмерное возбуждение дыхательного центра