Нарушения сердечного ритма в практике терапевта

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №2
ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АРИТМИЯ

Любой сердечный ритм , отличающийся от синусового по:

- Частоте
- Регулярности
- Источнику
- Последовательности сокращений предсердий и желудочков

Причины развития аритмий

- Нарушения нейрогенной, эндокринной регуляции
- Структурные заболевания миокарда, наследственные и врождённые дефекты
- Сочетание нарушений регуляции и структурных заболеваний сердца

ЭКГ диагностика аритмии

- ЧСС
- Регулярность ритма
- Вид возбуждения предсердий
- Форма и продолжительность QRS
- Связь между возбуждением предсердий и желудочков

Нормальная ЭКГ

Упрощённая ЭКГ диагностика тахиаритмий

- С нормальным комплексом QRS
- С широким комплексом QRS

Тахисистолическая форма ФП

а- без WPW; б- на фоне WPW

Клинико-электрокардиографическая классификация аритмий (М.С.Кушаковский, 1992г)

- **Нарушения образования импульса.**

А. Автоматические механизмы

- Изменения или нарушения автоматизма СА узла(синусовая тахи-, брадикардия, аритмия, СССУ)
- Проявление или изменение автоматизма латентных водителей ритма(замещающие ритмы, миграция водителя ритма)

CCCY

Клинико-электрокардиографическая классификация аритмий (М.С.Кушаковский, 1992г)

Б. Неавтоматические механизмы(ри-энтри, триггерная активность)

- Экстрасистолия
- Реципрокные комплексы и ритмы
- Пароксизмальные и хронические тахикардии
- Фибрилляция и трепетание предсердий
- Фибрилляция и трепетание желудочков

Частые желудочковые экстрасистолы из вынос. тракта правого желудочка

Тахикардия из ав соединения

Фибрилляция предсердий, тахисистолия

Трепетание предсердий

Желудочковая тахикардия

Т 73

Клинико-электрокардиографическая классификация аритмий (М.С.Кушаковский, 1992г)

- Нарушения и аномалии проведения импульса
 - А. Блокады (синоатриальная, атрио-вентрикулярная, внутрижелудочковая)
 - Б. Преждевременное возбуждение желудочков (синдром WPW)
- Нарушения образования и проведения импульса
 - Парасистолия

Блокада левой ножки пучка Гиса

Неполная трёхпучковая блокада

Синдром WPW, тип В

Парасистолия

Vent. rate 87 BPM
PR interval 148 ms
QRS duration 88 ms
QT/QTc 360/432 ms
P-R-T axes 59 12 21

Cart: 1
Tech.:

Referred by:

Unconfirmed

Признаки нестабильного состояния пациента при аритмии (ERC, 2010г)

- **Аритмический коллапс**
- **Аритмический шок**
- **Синкопальные состояния**
- **Сердечная недостаточность по левожелудочковому типу**
- **Сердечная недостаточность по правожелудочковому типу**
- **Ишемия миокарда**

Основные принципы неотложной терапии аритмий

- **Вначале оценить состояние пациента, а не ЭКГ**
- **Назначать антиаритмические препараты только в случае необходимости**
- **Учесть наличие дополнительных путей проведения, внутрижелудочковых блокад, низкой ФВ**
- **Обеспечить надёжный центральный венозный доступ**
- **При тахикардиях с широким QRS не применять верапамил, с нормальным QRS - лидокаин**

Фибрилляция желудочков

Динамика ЭКГ в процессе развития фибрилляции желудочков

Сердечно-лёгочная реанимация

- Компрессии грудной клетки. Частота 100-120 в мин, глубина 5-6 см, паузы не более 10сек
- ИВЛ через маску- соотношение 30/2, кислород
- Дефибрилляция **как можно раньше** 360 Дж повторять трижды при отсутствии эффекта чередуя с ЗМС и ИВЛ)
- Центральный венозный доступ
- Эпинефрин(адреналин) по 1мг каждые 5 мин
- Амiodарон 300мг в/в – ЗМС+ИВЛ+ дефибрилляция

А-В блокада-высокостепенная, асистолия желудочков

Асистолия

- ЗМС+ИВЛ+кислород
- Центральный венозный доступ
- Эпинефрин по 1мг каждые 5 мин
- Эндокардиальная ЭКС как можно раньше
- Выявить и устранить причину
- **Не вводить атропин**

Электроимпульсная терапия

- Премедикация (кислород, фентанил 0,05мг или анальгин 2,5мг в/в)
- Ввести в медикаментозный сон
- Мониторинг сердечного ритма
- Синхронизировать заряд с зубцом R на ЭКГ
- ЭИТ (при трепетании предсердий и НЖТ начать с 50 Дж, в остальных случаях с 200 Дж)
- Если нет эффекта повторить ЭИТ с макс разрядом
- Если нет эффекта повторить ЭИТ на фоне амиодарона

Утилитарная классификация нарушений сердечного ритма (Сулимов В.А., 2011г)

- **Требующие неотложной помощи-
Желудочковые аритмии**
 - Фибрилляция желудочков
 - Устойчивая мономорфная ЖТ
 - Устойчивая полиморфная ЖТ
 - Неустойчивая ЖТ при ОКС
 - Частая, политопная, парная ЖЭ при ОКС

Неотложная медикаментозная помощь при аритмиях

- **Желудочковая тахикардия**- прокаинамид 100мг в/в; лидокаин 1,5-3мг/кг в/в; амиодарон 5мг/кг в/в капельно за 40-60мин
- Двунаправленная веретенообразная ЖТ(типа «пируэт») или полиморфная ЖТ-магния сульфат 1-2 гр в/в

R-na-T → Полиморфная ЖТ

Мономорфная устойчивая желудочковая тахикардия

ЖТ типа «пируэт»

Утилитарная классификация нарушений сердечного ритма (Сулимов В.А., 2011г)

- **Требующие неотложной помощи**
- **Наджелудочковые тахиаритмии**
- Пароксизм реципрокной ав узловой тахикардии
- Пароксизм реципрокной ав тахикардии с участием ДПП
- Устойчивая ФП
- Постоянная форма ФП, ТП
- Пароксизм ФП или ТП <48ч (независимо от осложнений)

Неотложная медикаментозная помощь при аритмиях

- **Пароксизм ФП:**
 - **Контроль ритма**- пропафенон 1,5-2мг/кг за 10мин в/в; новокаинамид до 1000мг в/в; амиодарон 5мг/кг в/в капельно за 60 мин
 - **Контроль ЧСС**- верапамил 5-10мг в/в(нельзя при WPW); пропранолол 40 мг внутрь; дигоксин 0,25 мг в/в(нельзя при WPW)
 - При длительности ПФП от 12 до 48 ч- ЧПЭхоКГ

Неотложная медикаментозная помощь при аритмиях

- **Реципрокная НЖТ**
 - Вагусные пробы
 - АТФ(трифосфаденин) 10-20 мг в/в
 - Верапамил 2,5-10 мг в/в
 - Может быть эффективно сочетание вагусных проб с медикаментозными препаратами

Тахикардия из ав соединения

Утилитарная классификация нарушений сердечного ритма (Сулимов В.А., 2011г)

- **Требующие неотложной помощи** – при ЧСС<40 в мин, с обмороками и синдромом МЭС

Нарушения проводимости

- Дисфункция СУ
- Ав блокада 2 степени
- Полная Ав блокада

CCCY

а- до медикаментов; б- на фоне атропина; в- на фоне эуфиллина

Интенсивная терапия при брадиаритмиях

- **Горизонтальное положение с приподнятыми ногами, кислород**
- **Атропин 0,04мг/кг в/в (неэффективен при дистальной ав блокаде II степени и полной ав блокаде)**
- **Эндокардиальная ЭКС**
- **Аминофиллин(эуфиллин) 240мг в/в**
- **Допамин 100мг или эпинефрин 1мг в/в капельной в 200мл 5% глю до учащения ритма**

Утилитарная классификация нарушений сердечного ритма (Сулимов В.А., 2011г)

- Не требующие неотложной помощи (без тахисистолии желудочков, артериальной гипотензии, отёка лёгких, острой коронарной недостаточности)

Наджелудочковые аритмии:

- Синусовая тахикардия
- Наджелудочковая экстра-, парасистолия
- Пароксизмальная форма ФП, ТП более 48ч
- Персистирующая форма фибрилляции предсердий
- Постоянная форма фибрилляции предсердий

Утилитарная классификация нарушений сердечного ритма (Сулимов В.А., 2011г)

- Не требующие неотложной помощи (ЧСС >50 в мин, без серьёзных нарушений гемодинамики)

Желудочковые аритмии

- Желудочковая экстрасистолия
- Замещающие ритмы – из ав соединения, идиовентрикулярный ритм
- Реперфузионные аритмии после ТЛТ при ОКС (медленная желудочковая тахикардия, ускоренный ИВР)

Утилитарная классификация нарушений сердечного ритма (Сулимов В.А., 2011г)

- Не требующие неотложной помощи (ЧСС >40 в мин, без обмороков и синдрома МЭС)

Нарушения проводимости

- Дисфункция СУ
- АВ блокада 1, 2, 3 степени
- Моно-, би-, трифасцикулярная блокада НПГ

Основные принципы плановой терапии аритмий

- **Необходимость в лечении зависит от симптомов и прогностического риска аритмии**
- **Асимптомная аритмия без серьёзного (прогностически) нарушения ритма не требует лечения**
- **Симптомные аритмии требуют лечения для улучшения качества жизни**
- **Угрожаемые для жизни аритмии требуют незамедлительного назначения лечения**

Основные принципы плановой терапии аритмий

- **Выявить этиологические факторы возникновения аритмии и воздействовать на них**
 - Структурные заболевания сердца(ИБС, КМП,ППС, ВПС)
 - Миокардит
 - Врождённые аномалии(дополнительные пути проведения, наследственные нарушения в ионных каналах)
 - Электролитные нарушения(гипо-,гиперкалиемия; гиперкальциемия, гипомагниемия)
 - Гормональные изменения(гипо-,гипертиреоз;феохромоцитома;беременность)
 - Токсические воздействия (алкоголь, кофеин,табак)
 - Приём проаритмогенных препаратов(антиаритмические, сердечные гликозиды, диуретики, симпатомиметики)
 - Очаги хронической инфекции
 - Рефлекторные аритмии(ГЭРБ; дегенеративно-дистрофически заболевания позвоночника)
 - Гипоксия(ХОБЛ; СХОАП)

Методы обследования при нарушениях сердечного ритма

- **Анализ стандартной ЭКГ**
- **3-х суточное мониторирование ЭКГ**
- **Нагрузочные ЭКГ-пробы**
- **Чреспищеводная и эндокардиальная электрограмма**
- **ЭФИ: воспроизведение , купирование и определение механизма аритмии**
- **Тестирование лекарственных препаратов**

Классификация антиаритмических препаратов

- Препараты I класса- блокаторы быстрых натриевых каналов(мембраностабилизаторы):
 - 1a группа- **новокаиномид**, хинидин, ритмилен(удлиняют ЭРП, интервал QT)
 - 1b группа- **лидокаин**(укорачивает ЭРП)
 - 1c группа- **пропафенон**, **флекаинид**, этмозин(мало влияют на ЭРП)
- Препараты II класса- **бета-адреноблокаторы** (уменьшают симпатические влияния, замедляют автоматизм СУ и проводимость ав узла)
- Препараты III класса- блокаторы калиевых каналов (**амиодарон**, **соталол**) равномерно удлиняют фазы реполяризации и потенциал действия
- Препараты IV класса- антагонисты кальция(**верапамил**)- замедляют автоматизм СУ и проведение ав узла

**Длительное лечение ЖА и
профилактика внезапной
сердечной смерти**

Внезапная смерть – в течение 1 часа после возникновения первых неблагоприятных симптомов по неизвестной причине у лиц, находящихся в стабильном состоянии.

Градация желудочковых аритмий (B.Lown)

- I - редкие (менее 30 в час);
- II - частые (более 30 в час);
- III А - политопные;
- III В - бигеминия;
- IV А - сливные желудочковые экстрасистолы;
- IV В - залп желудочковых экстрасистол (более трех последовательных циклов);
- V - ранние желудочковые экстрасистолы (экстрасистолы типа R на T).
- К опасным для жизни ("предупреждающим") относятся аритмии III-V градаций.

Длительное лечение ЖА и профилактика внезапной сердечной смерти

- **Бета-блокаторы** – препараты первой линии терапии ЖА и профилактики ВСС
- **Показания к назначению бета-блокаторов:**
 - ИБС(в т.ч. ОКС)
 - ХСН, систолическая дисфункция ЛЖ
 - Синдром удлинённого QT
 - Катехоаминаэргическая полиморфная ЖТ
 - Идиопатические ЖТ(из выходного тракта ПЖ или ЛЖ, фасцикулярная)
 - Пациенты с имплантированным КВД

Длительное лечение ЖА и профилактика внезапной сердечной смерти

- **Основные побочные эффекты бета-блокаторов:**
 - **Бронхообструктивный синдром**
 - **Брадикардия**
 - **Гипотензия**
 - **Утомляемость**
 - **Депрессия**
 - **Сексуальные расстройства**

Длительное лечение ЖА и профилактика внезапной сердечной смерти

- **Противопоказания к назначению бета-блокаторов:**
 - **Выраженная брадикардия (без ПЭКС)**
 - **Декомпенсация СН**
 - **Стенокардия Принцметала**

Длительное лечение ЖА и профилактика внезапной сердечной смерти

- **Неосновные препараты(показаны для пациентов без значимой структурной патологии сердца и NYHA не выше II ф.кл.) :**
 - **Дизопирамид 250-75мг/сут**
 - **Флекаинид 200-400мг/сут**
 - **Мексилетин 450-900мг/сут**
 - **Прокаинамид 1000-4000мг/сут**
 - **Пропафенон 450-900мг/сут**
 - **Ранолазин 750-2000мг/сут(ингибитор позднего тока ионов натрия в клетки миокарда, снижает диастолическое напряжение стенок желудочков)**
 - **Верапамил 120-480мг/сут(ЛЖ фасцикулярная тахикардия)**

Вспомогательная терапия ЖНСП

- **ИАПФ/БРА**
- **Антагонисты минералокортикоидных рецепторов**
- **Антикоагулянты, дезагреганты**
- **Статины**
- **Электролиты**
- **Метаболические препараты, антиоксиданты, цитопротекторы (мексидол, таурин, предуктал MB)**

Применение калия и магния при ЖНСП

- **ФЖ на фоне ОКС**
- **Желудочковые аритмии при ОКС**
- **ЖТ типа «пируэт»**
- **Приём препаратов, удлиняющих QT**
- **Передозировка сердечных гликозидов**
- **Приём тиазидных и петлевых диуретиков**
- **Обезвоживание**
- **Острая алкогольная интоксикация и абстинентный синдром**
- **Синдром Кона**
- **Гемодиализ при ХБП с неадекватной коррекцией калия**

ЖТ типа «пируэт» (веретенообразная)

ЖТ типа «пируэт»

Показания к КА при ЖТ

- **Устойчивые симптомные мономорфные ЖТ при истощенности ОМТ или нежелании пациента её применять**
- **ЖТ типа ри-энтри, обусловленные блокадой НПГ**
- **Пациенты с частым срабатыванием ИКД при мономорфной ЖТ**

Лечение НСР у пациентов с дисфункцией ЛЖ

- **Оптимальная медикаментозная терапия: ИАПФ/БРА, бета-блокаторы, АМР IA**
- **Частая симптомная ЖЭ, неустойчивая ЖТ: амиодарон, катетерная абляция IIaB**
- **Устойчивая, мономорфная, возвратная ЖТ: КВД +катетерная абляция, амиодарон**

Рекомендации по установке КВД для пациентов с ХСН и ЖНР

- **Первичная профилактика:** пациентам с ХСН III-IV ф.кл. По NYHA, с ФВ < 35%, несмотря на 3 месяца ОМТ, которые будут жить больше года для снижения риска ВСС **IA**
- **Вторичная профилактика:** пациентам с ЖА, вызывающими нестабильность гемодинамики, которые предположительно будут жить больше года с хорошим функциональным статусом для профилактики ВСС **IA**

Лечение фибрилляции предсердий

- **Оптимальная медикаментозная терапия**
- **Катетерная абляция ЛВ и/или ав соединения**
- **ПЭКС**
- **Хирургическое лечение**

Шкала CHA2DS2VASc и оценка риска Инсульта

Подход, основанный на Факторах риска, выраженный в баллах по оценочной системе, с аббревиатурой CHA₂DS₂VASc.

Фактор риска	Балл
Застойная сердечная недостаточность/ Дисфункция ЛЖ	1
Артериальная гипертензия	1
Возраст ≥ 75 лет	2
Сахарный диабет II типа	1
Инсульт, ТИА или системная эмболия	2
Сердечно-сосудистые заболевания	1
Возраст 65-74 года	1
Женский пол	1
Максимальная оценка	9

Рекомендации по профилактике тромбоэмболических осложнений

Класс

Уровень

Антитромботическая терапия рекомендована всем пациентам с ФП, кроме группы низкого риска ()

I

A

Выбор антитромботической терапии должен основываться на стратификации риска инсульта/ тромбоэмболий и кровотечений, пользы для пациента

I

A

Шкала CHADS₂ рекомендована как самая простая шкала оценки риска инсульта при неклапанных ФП

I

A

■ У пациентов с CHADS₂ риском ≥ 2 рекомендована длительная ОАК антагонистами витамина К до достижения целевого МНО 2,0–3,0 (цель 2,5), если нет противопоказаний

I

A

Антитромботическая терапия показана пациентам как с фибрилляцией, так и с трепетанием.

I

C

Двухкомпонентная терапия Аспирин 75-100мг + клопидогрель 75мг должна рассматриваться у пациентов с низким риском кровотечений, которые отказываются от ОАК (или если есть противопоказания+ невозможность контролировать МНО)

IIa

A

Шкала оценки риска развития кровотечений HAS-BLED

Факторы риска	Баллы
(H) Артериальная гипертензия	1
(A) Нарушение функции почек или печени (1 балл за каждое)	1
(S) Инсульт	1
(B) Кровотечение	1
(L) Неустойчивые значения МНО	1
(E) Старшая возрастная группа (> 65 лет)	1
(D) Прием лекарств или употребление алкоголя (1 балл за каждое)	1
Максимальное число баллов	9

Риск ЖКК и врачебная тактика при назначении НОАК

- Оценка риска ЖКК по шкале HASBLED
 - Менее 3 баллов – НОАК
 - 3 балла и более – НОАК +ИПП
- Приём НПВП
 - НПВП не принимает, менее 3 баллов – НОАК
 - НПВП принимает – НОАК + ИПП
 - Helicobacter pylori + - эрадикация Нр + НОАК+ ИПП
- Анализ кала на скрытую кровь(иммунохимический метод, в т.ч. С использование экспресс-тестов)
 - Эрозивно-язвенное поражение без ЖКК- терапия согласно стандартам, включая эрадикацию НР+/- НОАК(консультация гастроэнтеролога)
 - ЖКК- терапия согласно стандартам + консилиум с оценкой риск/польза приёма НОАК

Противопоказания к применению НОАК

- **Наличие злокачественных опухолей с высоким риском кровотечения(оценка соотношения «риск-польза», консилиум с участием онколога)**
- **Диагностированное варикозное расширение вен пищевода**
- **Артерио-венозная мальформация**
- **Клиренс креатинина менее 15(30) мл/мин**

Показания к применению АВК

Высокая приверженность к АВК

Значительное снижение СКФ (<15 мл\мин)

ОКС+ ЧКВ+Стент+ФП

Механические клапаны

ГКМП

У детей и подростков

Желание иметь антидот

Непереносимость НОАК

Финансовые обстоятельства

Плохой контроль МНО повышает риск развития инсульта в реальной клинической практике

- ◆ Пациент у которого МНО находится в пределах терапевтического диапазона < 60% времени, имеет такой же или даже более **высокий риск инсульта**, в сравнении с пациентом, который НЕ получает терапию варфарином

Оценка вероятности достижения оптимальной антикоагуляции на фоне терапии АВК

Шкала SAME-TT2R2

Sex	Женский пол	1 балл
Age	Возраст моложе 60 лет	1 балл
Medical history	Сопутствующие заболевания*	1 балл
Treatment	Препараты взаимодействующие с варфарином (например, амиодарон)	1 балл
Tobacco use	Курение (≥ 2 лет)	2 балла
Race	Не европеоидная раса	2 балла
Достижение оптимальной антикоагуляции на фоне АВК вероятно □		0-2 балла
Достижение оптимальной антикоагуляции на фоне АВК менее вероятно †		> 2 баллов

*- наличие как минимум 2-х из сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, сахарный диабет, ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, атеросклероз периферических артерий, хроническая сердечная недостаточность, перенесенный инсульт, заболевания легких, болезни почек или печени;
□ не требуется дополнительных мер для достижения высоких значений TTR (time in therapeutic range, времени нахождения МНО в терапевтическом диапазоне - > 65-70%)

† - требуются дополнительные интенсивные меры (например, обучение) для достижения высоких значений TTR или может быть предпочтительно лечение новыми пероральными антикоагулянтами АВК – антагонисты витамина К.

Интерпретация результатов оценки качества терапии АВК по шкале «SAMe-TT2R2» и действия врача

При количестве баллов 0-1 можно ожидать устойчивости МНО и хорошего клинического эффекта от приема варфарина

При наличии более 2 баллов — рекомендовать лечение НОАК (ППОАК) (предпочтительнее, поскольку вероятность адекватной гипокоагуляции АВК — низкая)

***** Независимо от результатов оценки, обязательным остается использование варфарина у пациентов с клапанными типами ФП (умеренный или тяжелый стеноз МК, протезированные клапаны, при ХБП с СКФ < 15 (30) мл/мин**

Индивидуализированная ППОАК терапия, основанная на характеристиках пациента может помочь в оптимизации прогноза

Первичная цель
Защита пациента от инсульта и сбалансированный риск кровотечения

Поиск наиболее эффективного средства для профилактики инсульта с лучшим профилем безопасности

Дабигатран (D)
2 раза в день

Апиксабан (A)
2 раза в день

Ривароксабан (R)
Варфарин (VKA)
Эдоксабан (E)
1 раз в день

Дополнительные условия для оптимизации защиты пациента

Предшествующий инсульт/ТИА
Пациент с высоким риском повторного инсульта; условие – лучшая эффективность по инсульту

У пациента есть умеренной степени выраженности ХБП
Баланс между эффективностью и безопасностью в такой популяции

ИБС или перенесенный инфаркт миокарда
Выгода по сравнению с варфарином, что было показано в исследованиях с двойной антиагрегантной терапией

Возраст > 80 лет
Снижение риска кровотечений

Высокий риск ЖКТ-кровотечений
Средство с низким числом случаев ЖКТ-кровотечений

Пациент предпочитает принимать препарат 1 раз в день:
Обсудить в плане главной цели терапии

D

D

A

D

D110

A

D110

A

R

VKA

E

*A = апиксабан; D = дабигатран; D110 = дабигатран 110 мг 2 раза в день; E = эдоксабан; R = ривароксабан, VKA – антагонисты витамина K

Контроль ЧСС при ФП

- «Острый»:
 - в/в бета блокаторы (эсмолол) или недигидропиридиновые АК (верапамил) под контролем АД и ЧСС
 - При синдроме предвозбуждения желудочков противопоказаны бета-блокаторы, верапамил, сердечные гликозиды; возможны антиаритмики I класса и амиодарон
- Длительный:
 - Бета-блокаторы/ верапамил, дигоксин или их комбинация под контролем ЧСС

Длительный контроль ритма при ФП

- **Отсутствие или незначимые заболевания сердца; АГ без гипертрофии ЛЖ:**
 - Дронедарон, флекаинид, пропафенон, соталол
 - Амиодарон
- **Значимые структурные заболевания сердца:**
 - **АГ с ГЛЖ; стаб. ХСН NYHAII** - дронедарон-амиодарон
 - **ИБС** - дронедарон-соталол-амиодарон
 - **ХСН NYHAIII-IV** - амиодарон

Показания к КА и ПЭКС при ФП

- **Неэффективность медикаментозной терапии**
- **Гемодинамически провокационные ПФП**
- **Непереносимость или нежелание принимать медикаментозные препараты**

Показания к ПЭКС

- **АВ блокада IIст и далеко зашедшая АВ блокада Iст на любом анатомическом уровне, связанная с любым из следующих условий:**
 - Симптомная брадикардия, включая СН
 - Необходимость применения препаратов, вызывающая симптомную брадикардию
 - Документированные периоды асистолии более 3сек или выскальзывающих ритмов менее 40/в мин без симптомов
 - Нейромышечные заболевания в сочетании с ав блокадой(миотоническая мышечная дистрофия, перонеальная мышечная атрофия и т.д.), т.к.возможно неподвижное ухудшение ав проводимости
 - АВ блокада после КА или операции, когда не ожидается её спонтанное разрешение
- **АВ блокада Iст любого типа и уровня при сочетании с симптомной брадикардией**

Виды кардиостимуляторов

- **Бивентрикулярный электрокардиостимулятор** разработан для того, чтобы обеспечить одновременное сокращение желудочков и устранить асинхронность сокращения мышцы левого желудочка. Именно поэтому он иногда называется **вентрикулярный ресинхронизатор**. Это позволяет прибору обеспечить более эффективную насосную функцию сердца.
- Обычный кардиостимулятор вызывает возбуждение либо только правого желудочка (**однокамерные электрокардиостимуляторы**), либо и правого предсердия и правого желудочка (**двухкамерные электрокардиостимуляторы**).