

**федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт клинической медицины
Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних
болезней

**Методические материалы по дисциплине:
Внутренние болезни**

основная профессиональная образовательная программа высшего
профессионального образования – программа специалитета

33.05.03 Стоматология

Вынужденным называется положение, которое:

A. больной сознательно или бессознательно принимает с целью облегчения своих страданий

B. больной принимает, руководствуясь рекомендациями лечащего врача

C. больной принимает в бессознательном состоянии или во сне

D. является признаком общего тяжёлого состояния пациента

ANSWER: A

Основными препаратами для пациента с внебольничной пневмонией в нижней доле левого легкого будут:

A. сильные диуретики

B. антибиотики пенициллинового ряда

C. отхаркивающие препараты

D. глюкокортикостероиды

ANSWER: B

Признаками дефицита железа являются все, кроме:

A. Выпадение волос

B. Ломкость ногтей

C. Иктеричность

D. Извращение вкуса

ANSWER: C

Какие стоматологические проявления характерны для терапии ингаляционными глюкокортикостероидами:

A. кандидозный стоматит

B. афты

C. парадонтоз

D. пульпит

ANSWER: A

Терапия антибиотиками обязательна при:

A. гломерулонефрите

B. тиреотоксикозе

C. инфекционном эндокардите

D. сахарном диабете

E. митральном стенозе

ANSWER: C

У пациента с СД при осмотре полости рта чаще выявляется:

A. Гиперплазия десен

B. Картина катарального гингивита

C. Петехиальная сыпь

D. Красный плоский лишай

ANSWER: B

Степень активности хронического гепатита определяется по:

- A. Степени повышения концентрации билирубина в крови
- B. Степени повышения концентрации АЛТ и АСТ в крови
- C. Степени повышения концентрации у-глутамилтранспептидазы в крови
- D. Степени снижения концентрации альбумина в крови

ANSWER: B

Назовите осложнения язвенной болезни:

- A. Болевой шок, неукротимая рвота, истощение
- B. В12-дефицитная анемия, хронический гепатит
- C. Железододефицитная анемия, хронический гастрит
- D. Перфорация, пенетрация, кровотечение

ANSWER: D

Стеаторея – это:

- A. Повышенное содержание в кале нейтрального жира
- B. Повышенное содержание мышечных волокон
- C. Повышение содержания в кале химотрипсина
- D. Обнаружение в кале элементов воспаления

ANSWER: A

Ранним признаком хронической почечной недостаточности является:

- A. Артериальная гипертензия
- B. Полиурия
- C. Олигоурия
- D. Гипокалиемия

ANSWER: C

Рентгенологическая картина, характерная для крупозной пневмонии:

- A. Диффузное повышение прозрачности легочных полей
- B. Появление полости распада в легком с уровнем жидкости
- C. Уплотнение тени корней без изменений легочного рисунка на периферии
- D. Интенсивное гомогенное затемнение, занимающее долю или целое легкое

ANSWER: D

При тяжелой дыхательной недостаточности у больного с пневмонией следует:

- A. Усилить антибактериальную терапию
- B. Увеличить дозы отхаркивающих средств
- C. Наложить трахеостому

D. Начать проведение искусственной вентиляции легких
ANSWER: D

При прорыве абсцесса в бронх отходит мокрота:

- A. Пенистая, светлая
- B. Жидкая, "ржавая"
- C. "Розовая пена"
- D. Гнойная, трехслойная, часто с прожилками крови

ANSWER: D

Почечные отёки появляются в первую очередь на:

- A. Голенях и стопах
- B. Пояснице
- C. Передней брюшной стенке
- D. Лице

ANSWER: D

Патогенез хронического атрофического гастрита обусловлен:

- A. Инфицированием *Helicobacter pylori*
- B. Рефлюксом дуоденального содержимого
- C. Появлением антител к париетальным клеткам желудка
- D. Атеросклеротическим поражением артерий чревного ствола

ANSWER: C

Отпечатки зубов по краям языка можно объяснить:

- A. Заболеванием дёсен (гингивитом)
- B. Вариантом нормы
- C. Гипертрофией сосочков языка
- D. Отёком языка

ANSWER: D

Основой терапии астматического статуса являются препараты:

- A. Адреномиметики
- B. Системные глюкокортикоиды в больших дозах
- C. Большие дозы адrenoблокаторов
- D. Диуретики

ANSWER: B

Основная причина стенокардии Принцметала:

- A. Коронароангиоспазм
- B. Облитерирующий атеросклероз артерий коронарной сети
- C. Артериальная гипертензия
- D. Рецидивирующий тромбоз коронарных сосудов

ANSWER: A

Определение стенокардии как формы ИБС:

А. Заболевание, характеризующееся болями в области сердца вследствие воспаления коронарных артерий

В. Заболевание, характеризующееся болями в области сердца, воспалением миокарда

С. Заболевание, характеризующееся болями в области сердца при транзиторной ишемии миокарда вследствие атеросклероза и/или спазма коронарных артерий

Д. Заболевание, характеризующееся болью в сердце вследствие тромботической окклюзии коронарных артерий

ANSWER: C

Нозокомиальной является пневмония:

А. Возникшая во внебольничных условиях (вне стационара)

В. Возникшая спустя 48 часов и более после госпитализации

С. Вызванная атипичными (внутриклеточными) возбудителями

Д. Возникшая вследствие аспирации рвотных масс

ANSWER: B

Наиболее частая этиологическая причина хронического гастрита:

А. Дуоденально-гастральный рефлюкс

В. *Helicobacter pylori*

С. Наличие антител в клетках слизистой оболочки желудка

Д. Нарушение диеты

ANSWER: B

Наиболее точно отражает степень хронической почечной недостаточности уровень:

А. Мочевины

В. Остаточного азота

С. Креатинина

Д. Калия

ANSWER: C

Наиболее информативный биохимический тест в диагностике инфаркта миокарда:

А. Щелочная фосфатаза (ЩФ)

В. Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП)

С. Тропонин

Д. Амилаза сыворотки крови

ANSWER: C

Мерцательная аритмия – это:

А. Синусовая тахикардия с высокой частотой

В. Частые внеочередные сокращения желудочков

C. Ритм сокращений предсердий с частотой менее 22 в одну минуту
D. Беспорядочное, некоординированное сокращение мышечных волокон предсердий
ANSWER: D

Лейкоцитурия является основным симптомом:

- A. Гломерулонефрита
 - B. Амилоидоза
 - C. Острой почечной недостаточности
 - D. Пиелонефрита
- ANSWER: D

Клапанный дефект, наиболее часто формирующийся при инфекционном эндокардите:

- A. Митральный стеноз
 - B. Митральный стеноз в сочетании с митральной недостаточностью
 - C. Аортальная недостаточность
 - D. Трикуспидальный стеноз
- ANSWER: C

Как изменяются нижние границы лёгких при эмфиземе:

- A. Не изменяются
 - B. Смещаются вверх
 - C. Смещаются вниз
 - D. Не определяются
- ANSWER: C

Как изменяются границы лёгких при наличии жидкости в полости плевры:

- A. Сместятся книзу
 - B. Сместятся кверху
 - C. Не изменятся
 - D. Не определяются
- ANSWER: B

К основным стоматологическим проявлениям язвенной болезни относятся за исключением:

- A. Обложенность языка
 - B. Катаральный стоматит
 - C. Гипертрофия грибовидных и листовидных сосочков
 - D. Отечности губ
- ANSWER: D

К основным диагностическим критериям ревматической лихорадки относятся:

- A. Кардит
- B. Полиартрит
- C. Подкожные ревматические узелки
- D. Все перечисленное

ANSWER: D

К основным клиническим симптомам СД не относится:

- A. Тахикардия
- B. Полиурия
- C. Полидипсия
- D. Полифагия

ANSWER: A

Изменение какого обмена является наиболее частой причиной развития атеросклероза?

- A. Туберкулезное повреждение сосудистой стенки
- B. Нарушение углеводного обмена
- C. Нарушение липидного обмена
- D. Нарушение белкового обмена

ANSWER: C

Зубец Р отражает проведение возбуждения:

- A. По левому предсердию
- B. По желудочкам
- C. По правому предсердию
- D. По обоим предсердиям

ANSWER: D

Заболевания, наиболее часто приводящие к симптоматической артериальной гипертензии:

- A. Сахарный диабет
- B. Заболевания легких
- C. Заболевания печени
- D. Заболевания почек

ANSWER: D

Для оценки сократительной способности сердца пациента следует направить на:

- A. Коронарографию
- B. Эхокардиографию
- C. ЭКГ
- D. ФКГ

ANSWER: B

Для желудочно-кишечного кровотечения при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки характерно:

- A. Положительный симптом раздражения брюшины
- B. Резкое усиление болей в эпигастральной области
- C. Рвота кофейной гущей
- D. Появление болей в правом подреберье

ANSWER: C

β -Клетки поджелудочной железы синтезируют:

- A. Соматостатин
- B. Секретин
- C. Инсулин
- D. Глюкагон

ANSWER: C

«Золотым стандартом» диагностики язвенной болезни двенадцатиперстной кишки считается:

- A. Рентгенография желудка с барием
- B. Клиническая картина заболевания
- C. Компьютерная томография органов брюшной полости
- D. Эзофагодуоденоскопия

ANSWER: D

Основными задачами лечения пациентов с сочетанием хронического генерализованного пародонтита и метаболического синдрома являются:

- A. Купирование воспалительно-деструктивного процесса в тканях пародонта
- B. Снижение массы тела, АД, нормализация показателей углеводного обмена и липидного спектра крови
- C. Коррекция дисбиоза пищеварительного тракта и оксидативных процессов
- D. Все верно

ANSWER: D

В ходе лечения язвенно-некротического гингивита следует отдавать предпочтение применению анестетиков в виде:

- A. Инъекций
- B. Аппликаций
- C. Спреев
- D. Повязок

ANSWER: A

Первый этап лечения пародонтита:

- A. Профессиональная гигиена полости рта
- B. Ортопедическое лечение

C. Местная противовоспалительная терапия
D. Ортодонтическое лечение
ANSWER: A

Основной диагностический критерий в дифференциальной диагностике пародонтита и гингивита:

A. Кровоточивость десны
B. Пародонтальный карман (ПК)
C. Гноетечение
D. Отек и гиперемия слизистой оболочки десневого края
ANSWER: B

Тактика лечения лекарственного гипертрофического гингивита:

A. Профессиональная гигиена полости рта
B. Гингивэктомия и противовоспалительная терапия
C. Полоскание антисептиками
D. Профессиональная гигиена полости рта, замена препарата, проведение локальной гингивэктомии
ANSWER: D

Прием каких препаратов может привести к гипертрофическому разрастанию десен:

A. Антикоагулянты
B. Противосудорожные средства, иммуносупрессивные, блокаторы кальциевых каналов
C. Нестероидные противовоспалительные препараты
D. Антибактериальные средства
ANSWER: B

Факторы, способствующие развитию метаболического синдрома:

A. Избыточное питание
B. Гиподинамия
C. Артериальная гипертензия
D. Все верно
ANSWER: D

Какой уровень артериального давления характерен для артериальной гипертензии I степени:

A. 140/90 -159/99 мм рт. ст.
B. 130/80 -139/89 мм рт. ст.
C. 160/100 мм рт. ст. и выше
D. 110/70 -120/80 мм рт. ст.
ANSWER: B

Что не является органом-мишенью при артериальной гипертензии?

- A. Глазное дно
 - B. Сердце
 - C. Почки
 - D. Печень
- ANSWER: D

Энтероколит – это заболевание, характеризующееся поражением:

- A. Желудка, тонкой и толстой кишки
- B. Тонкой и толстой кишки
- C. Печени и желчного пузыря
- D. Желудка

ANSWER: A

У пациентов с метаболическим синдромом чаще всего диагностируют проявления в полости рта в виде:

- A. Хронического катарального гингивита
- B. Хронического пародонтита легкой степени тяжести
- C. Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени тяжести
- D. Афтозный стоматит

ANSWER: C

Общим патогенетическим звеном метаболического синдрома и пародонтита является:

- A. Системное воспаление и оксидативный стресс
- B. Нарушения системы комплемента
- C. Вазомоторные нарушения
- D. Эндокринно-обменные нарушения

ANSWER: A

Метаболический синдром – это:

- A. Симптомо-комплекс, включающий абдоминальное ожирение, сахарный диабет I типа, атерогенная дислипидемия
- B. Симптомо-комплекс, включающий абдоминальное ожирение, нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет II типа, а также характерную для этого атерогенную дислипидемию
- C. Артериальная гипертензия
- D. Увеличение концентрации глюкозы в крови

ANSWER: B

К диабетическим комам не относится:

- A. Кетоацидотическая
- B. Лактацидемическая
- C. Гипогликемическая
- D. Алкогольная

ANSWER: D

Симптом глоссалгии характерен для анемии:

- A. Железодефицитной
- B. B12-дефицитной
- C. Постгеморрагической
- D. Гемолитической

ANSWER: B

Главный признак нефротического синдрома:

- A. Лейкоцитурия
- B. Протеинурия
- C. Гематурия
- D. Цилиндрурия

ANSWER: B

Ксеростомия в сочетании с ксерофтальмией может быть у пациентов с:

- A. Болезнью (синдромом) Шегрена
- B. Саркоидозом
- C. Системным склерозом
- D. Всем перечисленным

ANSWER: D

Запах мочевины в выдыхаемом воздухе характерен для больных:

- A. Сахарным диабетом
- B. Сердечной недостаточностью
- C. Хронической почечной недостаточностью (ХПН)
- D. Циррозом печени

ANSWER: C

Стоматологическими проявлениями сахарного диабета являются:

- A. Кандидоз полости рта
- B. Актинический хейлит
- C. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
- D. Все перечисленное

ANSWER: D

Для нефротического синдрома характерно:

- A. Массивная протеинурия
- B. Массивные отеки
- C. Гипоальбуминемия
- D. Все перечисленное

ANSWER: D

Какой из перечисленных синдромов наиболее рано появляется при билиарном циррозе печени:

- A. Диспепсический
- B. Астенический
- C. Портальная гипертензия
- D. Холестаз

ANSWER: D

Лихорадка обычно сопровождает следующие болезни:

- A. Очаговая пневмония
- B. Пиелонефрит
- C. Инфекционный эндокардит
- D. Все вышеперечисленные

ANSWER: D

При осмотре кожи определяют:

- A. Цвет
- B. Влажность
- C. Эластичность
- D. Все перечисленное

ANSWER: D

При осмотре лица можно выявить:

- A. Лицо Корвизара
- B. Лунообразное лицо
- C. Микседематозное лицо
- D. Все вышеперечисленное

ANSWER: D

Искривление позвоночника в сторону и кзади называется:

- A. Кифоз
- B. Сколиоз
- C. Лордоз
- D. Кифосколиоз

ANSWER: D

Пальпация применяется для исследования:

- A. Кровеносных сосудов
- B. Лимфатических узлов
- C. Мышц
- D. Всего перечисленного

ANSWER: D

Болевой синдром при стенокардии:

- A. Прокалывающие боли в области сердца, связанные с поворотом тела

В. Жгучее ощущение за грудиной, возникающее после еды
С. Сжимающие боли за грудиной, связанные с физической нагрузкой
D. Колющие боли в левом боку, связанные с дыханием
ANSWER: C

Причиной симптоматической артериальной гипертензии могут быть:
A. Опухоль коры надпочечников
B. Опухоль мозгового вещества надпочечников
C. Стеноз почечной артерии
D. Все вышеперечисленное
ANSWER: D

Наличие симптома «головы медузы» характерно для синдрома:
A. Печеночной недостаточности
B. Портальной гипертензии
C. Нефротического синдрома
D. Лимфопролиферативного
ANSWER: B

Какой цвет кожных покровов наблюдается при постгеморрагической анемии?
A. Бледность кожи с желтоватым оттенком
B. Бледность кожи с бледностью конъюнктив
C. Акроцианоз
D. Диффузный цианоз
ANSWER: B

Какой признак не характерен для мочеточниковой колики?
A. Положительный симптом Пастернацкого
B. Дизурия
C. Боли в поясничной области
D. Прекращение болей после рвоты
ANSWER: D

ИНСПИРАТОРНУЮ ОДЫШКУ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
A. Более затруднен вдох, чем выдох
B. Характерна для синдрома бронхоспазма
C. Одинаково затруднен вдох и выдох
D. Уменьшается в горизонтальном положении
ANSWER: A

КРЕАТОРЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НАРУШЕНИЯ ПЕРЕВАРИВАНИЯ:
A. Крахмала
B. Жира

С. Белка
D. Всех питательных веществ
ANSWER: C

ПРИ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НЕЛЬЗЯ ДО ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ПРИМЕНЯТЬ:

A. Спазмолитики
B. Морфиноподобные анальгетики
C. Антацидные препараты
D. Все вышеперечисленные
ANSWER: B

К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЫ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ОТНОСИТСЯ:

A. Возрастные изменения
B. Инфекция *Helicobacter pylori*
C. Недостаточность кардии
D. Ничего из вышеперечисленного
ANSWER: B

КАКОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД БУДЕТ НАИБОЛЕЕ АДЕКВАТЕН ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ГЭРБ?

A. Рентгенологическое исследование пищевода и желудка
B. Эзофагогастродуоденоскопия
C. Колоноскопия
D. Холецистография
ANSWER: B

КАКОЙ СИМПТОМ ОТНОСИТСЯ К СИМПТОМАМ РАЗДРАЖЕНИЯ БРЮШИНЫ?

A. Щеткина – Блюмберга
B. Василенко
C. Ортнера
D. Курвуазье – Терье
ANSWER: A

К СИМПТОМАМ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ОТНОСЯТСЯ:

A. Увеличение печени
B. Слабость
C. Желтуха
D. Отеки
E. Все вышеперечисленное
ANSWER: E

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА КАКОГО ВИТАМИНА ОБУСЛАВЛИВАЕТ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ:

A. B12

B. B1

C. PP

D. K

ANSWER: D

С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА КАКОГО ГОРМОНА СВЯЗАНО ПОЯВЛЕНИЕ «СОСУДИСТЫХ ЗВЕЗДОЧЕК» И «ПЕЧЕНОЧНЫХ ЛАДОНЕЙ» ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ:

A. Тиреотропного

B. АКТГ

C. Кортизола

D. Эстрогена

ANSWER: D

СОЧЕТАНИЕ ПОЛИУРИИ И ПОЛИДИПСИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЭНДОКРИННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:

A. Гипертиреоз

B. Сахарный диабет

C. Гипотиреоз

D. Подострый гломерулонефрит

ANSWER: B

ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

A. Развитие лейкоза

B. Развитие острой ревматической лихорадки

C. Развитие очаговой пневмонии

D. Тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастрии

ANSWER: B

САМЫМ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХПН ЯВЛЯЕТСЯ:

A. Артериальная гипертензия

B. Гиперкалиемия

C. Повышение уровня креатинина крови

D. Олигурия

ANSWER: C

ПРЕОБЛАДАНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАД ДНЕВНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ:

A. Олигурия

B. Анурия

C. Никтурия

D. Странгурия
ANSWER: C

ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. Растяжение почечной капсулы при увеличении размеров почечной ткани
 - B. Воспалительный отек слизистой оболочки почечной лоханки
 - C. Спастические сокращения мочеточника
 - D. Спастические сокращения мочевого пузыря
- ANSWER: C

ОЛИГОУРИЯ – ЭТО:

- A. Появление почечных отеков
 - B. Уменьшение выделения суточной мочи
 - C. Повышение артериального давления при гломерулонефрите
 - D. Верных утверждений нет
- ANSWER: B

КАКИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ БОЛЬНОЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВОДА?

- A. Затруднение прохождения пищи по пищеводу
 - B. Боли в животе
 - C. Тахикардия
 - D. Одышка
- ANSWER: A

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ДЛЯ БОЛЬНОЙ С ОБИЛЬНЫМ ЖИДКИМ СТУЛОМ, СТЕАТОРЕЕЙ, КРЕАТОРЕЕЙ И БОЛЯМИ В ЖИВОТЕ:

- A. Хронический энтерит
 - B. Хронический холецистит
 - C. Хронический гепатит
 - D. Хронический панкреатит
- ANSWER: A

КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (АН)?

- A. Инфекционный эндокардит
 - B. Сифилис
 - C. Ревматизм
 - D. Коарктация аорты
- ANSWER: D

КАКОЙ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА?

А. Голосистолический шум, иррадиирующий в левую аксиллярную область

В. Признаки гипертрофии и нагрузки объемом левого желудочка

С. Увеличение наполнения пульса и пульсового артериального давления

Д. Акцент II тона на легочной артерии

ANSWER: С

ТОН ТРАУБЕ И ДВОЙНОЙ ШУМ ВИНОГРАДОВА-ДЮРОЗЬЕ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ НА БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРИ ТАКОМ ПОРАЖЕНИИ КЛАПАНА, КАК:

А. Стеноз устья аорты

В. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия

С. Недостаточность клапана аорты

Д. Недостаточность митрального клапана

ANSWER: С

К ПОБОЧНЫМ ДЫХАТЕЛЬНЫМ ШУМАМ ОТНОСЯТСЯ:

А. Бронхиальное дыхание над гортанью

В. Крепитация

С. Везикулярное дыхание

Д. Ничего из перечисленного

ANSWER: В

БРОНХОФОНΙΑ ВЫЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ:

А. Перкуссии

В. Аускультации

С. Пальпации

Д. Ничего из перечисленного

ANSWER: В

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ БРОНХООБСТРУКЦИЯ ОБУСЛОВЛЕНА:

А. Спазмом гладкой мускулатуры бронхов

В. Фиброзными изменениями стенок бронхов

С. Хроническим воспалением в ткани бронхов

Д. Всем вышеперечисленным

ANSWER: А

ДЕФОРМАЦИЯ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ ПО ТИПУ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» ХАРАКТЕРНА ДЛЯ:

А. Поражения легких

В. Ревматоидного артрита

C. Системной красной волчанки
D. Ревматической лихорадки
ANSWER: A

РАЗМЕР ЭПИГАСТРАЛЬНОГО УГЛА РАВНЫЙ 90 ГРАДУСОВ
ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ:

A. Астенического телосложения
B. Нормостенического телосложения
C. Гиперстенического телосложения
D. Для всех видов телосложения
ANSWER: B

ПРИЧИНОЙ ПОХУДАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ВЫРАЖЕННОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ:

A. Гиперкортицизм (синдром Иценко-Кушинга)
B. Гипотиреоз
C. Гипертиреоз
D. Бронхиальная астма
ANSWER: C

ДЛЯ ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРНО:

A. Жалобы на кашель и повышение температуры тела
B. Крепитация
C. Ослабление голосового дрожания над местом поражения
D. Ослабление бронхофонии над местом поражения
ANSWER: A

К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ОТНОСИТСЯ:

A. Астеническая
B. Воронкообразная
C. Бочкообразная (эмфизематозная)
D. Ладьевидная
ANSWER: A

К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕ
ОТНОСИТСЯ:

A. Расспрос
B. Осмотр
C. Флюорография
D. Аускультация
ANSWER: C

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА НЕ ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

- A. Больного с больными
- B. Медицинского работника с медицинскими работниками
- C. Медицинского работника и больного
- D. Медицинского работника с родственниками больного

ANSWER: A

К ОСНОВНЫМ ЖАЛОБАМ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ОТНОСЯТСЯ:

- A. Кашель
- B. Лихорадка
- C. Сердцебиение
- D. Все вышеперечисленное

ANSWER: A