

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии 2024-2025г. 10 класс

Результаты проверки


9	6	3	9	8	6	2	0	0	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма баллов		52			Подпись				

1.3	10 баллов	Кариотип млекопитающего, самца, «виртуального пациента» равен десяти хромосомам (количество хромосом уменьшено для удобства расчётов). Из них две пары метацентрические, две пары акроцентрические хромосомы, одна пара - гетеросомы. 1. Для представленного в задании организма «виртуального пациента» нарисуйте метафазную пластинку.	
1			1 балл
2	На стадии метафазы 2		2 балла
	На стадии анафазы 2		
	По завершению зоны роста		
	По завершению зоны созревания		
3	На стадии метафазы 2		3 балла
	На стадии анафазы 2		
	По завершению зоны роста		
	По завершению зоны созревания		
4	На соматические клетки воздействовали химическим мутагеном. Дальнейшее исследование этих клеток выявило кольцевую хромосому по одной из пар акроцентрических хромосом. Изобразите, как будет выглядеть метафазная пластинка после мутации. Назовите и охарактеризуйте эту мутацию.		2 балла
5	До?		1 балл
	После?		1 балл

10 6 2 4 3

2.3 10 баллов

У пациента В. диагностирован порок развития сердца – неполная межжелудочковая перегородка. В генотипе человека есть ген TBX5, который расположен в длинном плече 12-й хромосомы в локусе 24.21 и состоит из 46 800 пар нуклеотидов. Белок, кодируемый геном TBX5, состоит из 518 аминокислот и представляет собой фактор транскрипции T-box5. На ранних стадиях эмбриогенеза T-box5 отвечает за формирование перегородок, разделяющих правые и левые предсердия и желудочки сердца. Позже этот транскрипционный фактор обуславливает создание проводящей системы сердца, которая отвечает за правильный ритм и очерёдность сокращений различных камер сердца.



1. Назовите вид крови в камерах сердца пациента В.

1	венозная + пр. пр. + артер. пр. часть жел. артер. лев. жел. лев. пр.	4 балла
---	---	---------

2. Назовите приносящие и выносящие кровь сосуды сердца пациента В. и вид крови в них.


2	аорта артериальная легочная артерия венозная + артериальная	5 баллов
---	--	----------

3. Рассчитайте длину гена TBX5 в нанометрах (βформа ДНК).

3	2,225	1 балл
---	--------------	--------

3.3 10 баллов

Эмбриогенез органа слуха начинается на ранних стадиях развития зародыша и включает формирование наружного, среднего и внутреннего уха. Новые структуры образуются из старых за счёт последовательных приспособительных изменений. Вспомните этапы развития органов человека в онтогенезе и филогенезе и ответьте на вопросы.



--	--	--	--	--

1. В какой последовательности появляются основные отделы органа слуха в процессе эволюции?

1

Внутреннее ухо, среднее ухо, наружное

1 балл

2. Из какого зародышевого листка образуются слуховые косточки среднего уха?

2

~~мезодерма~~ мезодерма

1 балл

3. Какие кости черепа развиваются в процессе эволюции из первой и второй жаберной дуг?

3

Теменные

1 балл

4. В процессе эволюции увеличивается частота воспринимаемых звуков. С развитием каких структур органа слуха это связано?

4

евстахиева труба

1 балл


5. Для проверки слуха используют пробу Ринне: сравнивают как ухо слышит звук, передаваемый через кость, по сравнению со звуком, передаваемым по воздуху. Для этого звучащий камертон помещают на косточке за большим ухом, затем подносят к наружному слуховому проходу. В норме звук слышен лучше через воздух. Если у пациента при обследовании левого уха звук слышен лучше через кость, в какой части левого уха могут быть проблемы?

5

в среднем
в наружном

1 балл

6. Перед вами фрагмент органа чувств виртуального пациента с выявленным поражением после перенесенного вирусного заболевания. Зона поражения обозначена буквой А. Проанализируйте иллюстрацию и решите задачу.



6 Назовите части органа чувств, попавшие в зону функционального исследования

барабан

5 баллов

Назовите элемент строения структуры 3

~~нерв~~ сосуда

Назовите элемент строения структуры 4

нерв

Тембр голоса, который не слышит пациент

низкий

Укажите максимально длинный путь волны до структуры под номером 1 и назовите её.

от 4 до 1

106273

4.3

10 баллов

Перед вами девять иллюстраций трех представителей высших растений.

представитель	кариотип
папоротник	52
сфагнум	38
лук	16

1. Проведите анализ по суммарному количеству хромосом в клетках объектов. Для облегчения анализа считайте количество клеток в объектах одинаковым. Расположите объекты в последовательный ряд. Сначала объекты с наименьшим суммарным количеством хромосом во всех клетках, затем средним количеством и в завершении максимальным количеством хромосом во всех клетках.

			Балл <u>9 баллов</u>

2. Определите представителей из предложенных в задании, которые можно использовать для изучения формирования гинцея.

2		1 балл
---	--	--------

5.3

10 баллов

В ядре эукариотической клетки обнаружен фрагмент хроматина, состоящий из 200 нуклеосом. Известно, что в состав нуклеосомы входит участок молекулы ДНК длиной 146 пар нуклеотидов (п.н.) и гистоновый октамер. Длина линкерной ДНК составляет около 50 п.н.

1. Рассчитайте общую длину этого фрагмента хроматина в п.н.

1	298000000 3870	<u>2 балла</u>
---	---------------------------	----------------

2. Рассчитайте длину ДНК в этом фрагменте хроматина в нм, учитывая, что хроматин содержит β-форму ДНК

2	13333 13313	<u>2 балла</u>
---	------------------------	----------------

3. Определите, сколько молекул гистона H3 содержится в этом фрагменте хроматина.

3	400	<u>2 балла</u>
---	-----	----------------

4. Определите, сколько молекул гистона H1 содержится в этом фрагменте хроматина.

4	199 199	<u>2 балла</u>
---	--------------------	----------------


5. В хромосоме 19 человека 58 617 524 п.н. Сколько нуклеосом потребуется для упаковки всей хромосомы?

5	19 539 174	2 балла
---	------------	---------

--	--	--	--	--

6.3 10 баллов

У новорожденного Б. обнаружено отсутствие правого легкого и правой части бронхиального дерева.



1. Сколько долей легкого и долевых бронхов у новорожденного Б.?

1	Долей легкого	5	1 балл
	Долевых бронхов	49	1 балл

2. Какая мышца отделяет легкие новорожденного Б. от брюшной полости, и какой тканью она представлена?

2	Какая мышца?	диафрагма	1 балл
	Какой тканью?	гладкой мускулатурой	1 балл

3. Из какого зародышевого листка образуются легкие и мышца, разделяющая брюшную и грудную полости?

3	Из какого зародышевого листка образуется легкие?	второго	1 балл
	Из какого зародышевого листка образуется мышца, разделяющая брюшную и грудную полости?	третьего	1 балл

4. Какие элементы скелета защищают легкие?

4	грудина, межреберный отросток, ребра (12 пар), грудной отдел позвоночника		3 балла
---	---	--	---------

5. Как называется эмбриональная перестройка с точки зрения филоэмбриогенеза изменяющая число закладок органа с точки зрения филоэмбриогенеза?

5	сегментация	1 балл
---	-------------	--------

7.3 10 баллов

Решите виртуальную задачу. Пациент К. 45 лет, рост 180 см, вес 75 кг. Объем крови пациента К. принимаем за 5,2 л. Нормальный уровень глюкозы в крови, составляет около 0,7-1,0 г/л.

1. После приема пищи у пациента К. уровень глюкозы в крови увеличился на 0,5 г/л. Печень начала активно превращать глюкозу в гликоген. Определите, сколько граммов глюкозы будет использовано в процессе гликогенеза для достижения первоначального уровня глюкозы в крови.

1	0,5	1 балл
---	-----	--------

2. Для поддержания нормального уровня глюкозы в крови на метаболизм 10 г глюкозы, в печени требуется 1 ЕД (единица) инсулина. Сколько ЕД инсулина потребуется пациенту М., чтобы уровень глюкозы уменьшился на 0,5 г/л.

2	5	1 балл
---	---	--------

106273

3. На каждые 2,5г глюкозы, которые используются для синтеза гликогена, образуется 1г воды и 0,1г АТФ. Какое количество воды и АТФ было произведено в результате гликогенеза у пациента К.?

3	3	1 балл
---	---	--------

4. Во время физической и умственной активности, печень расщепляет гликоген в процессе гликогенолиза для поддержания уровня глюкозы в крови. При этом 1 г гликогена дает примерно 0,9 г глюкозы и 0,1 г АТФ. Сколько глюкозы может быть выделено и сколько АТФ может быть получено в процессе гликогенолиза при расщеплении 20г гликогена?

4	2	1 балл
---	---	--------

5. При гликогенолизе образуется примерно 10 г глюкозы в час. Сколько времени потребуется для расщепления 20г гликогена?

5	2 часа	1 балл
---	--------	--------

6. Вещества X и Y активируют гликогенолиз. Назовите вещества X и Y.

6	АТФ, инсулин	1 балл
---	--------------	--------

7. Назовите органы и клетки, в которых вещества X и Y образуются

7	АТФ - митохондрии, инсулин - поджелудочная железа	1 балл
---	--	--------

8. Какое количество молекул АТФ образуется в аэробных условиях при полном окислении 150 молекул глюкозы, если из 1 молекулы глюкозы образуется 30-32 молекулы АТФ?

8	4500 - 4800	1 балл
---	-------------	--------

9. Почему иногда указывают значения 36-38 молекул АТФ на 1 молекулу глюкозы? На какие процессы может затрачиваться часть энергии?

9	на пищеварение	1 балл
---	----------------	--------

10. Если в печени и мышцах достигнут максимальный уровень запасов гликогена, как организм человека справляется с избытками глюкозы в крови?

10	через пот, мочу, кал, откладывает <u>лишнее</u> <u>жира</u>	1 балл
----	---	--------

8.3

10 баллов

Вы планируете эксперимент.

1. В Вашем распоряжении флуоресцентный ядерный краситель и определенный набор элементов подосиновика, рода *Leccinum*. Набор элементов включает 140 базидиоспор, по 80 гиф двух типов, различающихся по количеству ядер, шляпки плодового тела, каждая гифа состоит из 10 септ. Определите количество флуоресцирующих ядер в наборе элементов подосиновика, рода *Leccinum*.

1

11200

3 балла

2. Определите количество хромосом во всех ядрах, которые вы определили в задании выше, если кариотип подосиновика, рода *Leccinum*, равен 14 хромосомам.

2

400

3 балла

3. Охарактеризуйте тип питания, функциональную группу в экосистеме и трофические связи подосиновика, рода *Leccinum*.

3

фаготрофы







4 балла

9.3

10 баллов

Рассмотрите иллюстрации и решите задачу.

1. Определите последовательность развития, начиная с процесса оплодотворения. Если элемент не нужен, необходимо проставить 0.

			Баллы 4 балла
			

2. Определите количество теломер и центромер в клетках на стадии развития, на которой происходит образование половых клеток, учитывая, что кариотип растения равен 38 хромосомам и хромосомы не имеют вторичных перетяжек.

2

~~38~~ 76

4 балла

3. Какие связи образуются между ДНК зондом и ДНК мишенью при FISH окрашивании?

3

гисульфидные

2 балла

10 6 2 7 3

10.3

10 баллов

В лаборатории есть фрагмент ДНК для клонирования и четыре фермента рестрикции, представленные на рисунке.

5'- ЦТАТЦГЦГАТТЦЦТТГААГЦТТАГААГЦТТЦЦГЦЦАТГТТГЦЦГГГЦЦАТАТГАЦГА - 3'
3'- ГАТАГЦГЦТААГГААЦТТТЦГААТЦТТЦГААГГЦГГАТАЦАЦГТЦЦЦГГТАТАЦТГЦТ - 5'

5'- АГ | ЦТ - 3'
3'- ТЦ | ГА - 5'

Alu I

5'- АГ - 3'
3'- ТЦ - 5'

+

5'- ЦТ - 3'
3'- ГА - 5'

5'- Г | ГАТЦЦ - 3'
3'- ЦЦТАГ | Г - 5'

Bam I

5'- Г - 3'
3'- ЦЦТАГ - 5'

+

5'- ГАТЦЦ - 3'
3'- Г - 5'

5'- Г | ААТТЦ - 3'
3'- ЦТТАА | Г - 5'

EcoR I

5'- Г - 3'
3'- ЦТТАА - 5'

+

5'- ААТТЦ - 3'
3'- Г - 5'

5'- Ц | ЦГГ - 3'
3'- ГГЦ | Ц - 5'

Hpa II

5'- Ц - 3'
3'- ГГЦ - 5'

+

5'- ЦГГ - 3'
3'- Ц - 5'

1. Сколько пар нуклеотидов будет содержать самый короткий фрагмент ДНК после обработки всеми рестриктазами?

1	8	3 балла
---	---	---------

2. Определите количество пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов в самом длинном фрагменте ДНК, полученном после обработки всеми рестриктазами.

2	Количество пуриновых нуклеотидов	20	6 баллов
	Количество пиримидиновых нуклеотидов	20	

3. Определите химическую связь, которую могут образовывать «тупые» концы ДНК, полученные после обработки рестриктазой HpaII в присутствии ДНК-лигазы

3	дисульфидная	1 балл
---	--------------	--------