

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на соискателя кафедры хирургии Института Клинической Медицины
им.Н.В.Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)

Нековаль Валерия Михайловича

Нековаль Валерий Михайлович – заведующий отделением колопроктологии УКБ №2, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). В результате проведенного исследования получены данные, подтверждающие безопасность и онкологическую эффективность расширенных лимфодиссекций в объеме D3 при лечении колоректального рака II и III клинических стадий у пациентов старческого возраста. Результаты проведенной работы продемонстрировали возможность выполнения радикальной операции не только относительно здоровым пациентам старшей возрастной категории, но и полиморбидным больным с выраженными гериатрическими синдромами.

Научная работа Нековаль В.М. посвящена весьма актуальной проблеме лечения колоректального рака у пациентов старческого возраста. Колоректальный рак – возраст-ассоциированное заболевание, поэтому в ближайшей перспективе следует ожидать увеличения числа пациентов старшей возрастной группы с колоректальным раком. Однако, сейчас не существует единого мнения о тактике лечения данной категории больных. Пациенты старческого возраста в большинстве случаев выбывают из клинических исследований по причине высокой полиморбидности и значительного риска неблагоприятного исхода. Клинические исследования включают не более 22 % пациентов старше 75 лет. Онкологические стандарты лечения колоректального рака применимы, в основном, для более молодой категории больных. Для них определены и рекомендованы необходимые объемы лечения, в том числе объем лимфодиссекции. Для лечения II и III стадий колоректального рака показано выполнение расширенной

лимфодиссекции в объеме D3. Однако, выполнение расширенной лимфодиссекции пациентам старшей возрастной категории не включено ни в одни клинические рекомендации. Наиболее частая причина отказа от радикального вмешательства – выраженная полиморбидность.

Расхождение во мнениях о необходимости выполнения лимфодиссекции в объеме D3 является предметом многочисленных научных дискуссий. Более частое развитие ранних послеоперационных осложнений и высокая послеоперационная летальность, меньшая прогнозируемая продолжительность жизни у пациентов старческого возраста по сравнению с относительно молодыми больными с колоректальным раком диктуют необходимость проведения исследований, направленных на улучшение качества онкологической помощи возрастным пациентам с колоректальным раком.

Все вышеизложенное стало побудительным мотивом для проведения клинического исследования, направленного на изучение возможностей и определение рискованности выполнения радикальных операций при колоректальном раке с необходимым объемом лимфодиссекции, а также на изучение возможности выполнения данных вмешательств полиморбидным пациентам категории «хрупкий», с синдромом старческой астении. Одним из направлений исследования стала интеграция достижений современной гериатрии в онкоколопроктологию, а именно использование комплексной гериатрической оценки с последующей гериатрической пребилизацией возрастных пациентов.


При выполнении исследований автор проявил себя состоявшимся исследователем, способным самостоятельно определять и формулировать цели и задачи, при этом вдумчиво анализировать полученные результаты. Нековаль В.М., используя современные методы статистической обработки данных, грамотно проанализировал данные, полученные в ходе запланированного исследования, что объективизировало заключения и выводы, продемонстрированные в данной научно-квалификационной работе.

В процессе научной работы автор изучил большой объем литературных источников. Особенно стоит отметить работу с научными трудами иностранных авторов. Грамотно подготовленный систематический обзор позволил найти обоснование для внедрения инновационной методики подготовки к хирургическому лечению полиморбидных пациентов старческого возраста с колоректальным раком, отягощенным сопутствующими гериатрическими синдромами и старческой астенией.

Результаты работы были полно и своевременно опубликованы в периодических изданиях, докладывались на международных и всероссийских конференциях.

Научно-квалификационная работа Нековаль Валерия Михайловича **«Выбор объема лимфодиссекции при лечении колоректального рака у больных старческого возраста»** является законченным научным трудом, в котором всесторонне отражены результаты комплексного исследования.

Научный руководитель, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургии
Института Клинической Медицины им.Н.В.Склифосовского П.В.Царьков



А. Комарова О.В.

А. Комарова О.В.